


780
g613.32
W. JUNK
VERLAG U. BUCHHANDEL.
NATURWISS. U. MATHEMAT.
BERLIN N.W. 5

+OK313
• G645



LIBRARY

LXXII

ANTONII GOÜAN,

DOCT. MED. MONSP. REG. SOCIET. SCIENT.
SOCI, ET REG. SCIENT. HUMAN. LITTER.
ET INSCRIPT. ACAD. TOLOS. CORRESPOND.

*FLORA MONSPELIACA,
SISTENS PLANTAS N°. 1850
AD SUA GENERA RELATAS,*

ET

*HYBRIDA METHODO DIGESTAS;
ADJECTIS*

NOMINIBUS SPECIFICIS, TRIVIALIBUSQUE,
SYNONYMIS SELECTIS,
HABITATIONIBUS PLURIM IN AGRO MONS-
PELIENSI NUPER DETECTARUM,
ET EARUM QUÆ IN USUS MEDICOS VENIUNT
NOMINIBUS PHARMACEUTICIS,
VIRTUTIBUSQUE PROBATISSIMIS.



LUGDUNI,

Sumptibus BENEDICTI DUPLAINE, Bibliopolæ,
in vico majori Mercatorio, sub signo Aquilæ.


M. D C C. L X V.

+252 2
,664 5



V I R O S U M M O
D. D. GUIGNARD
DE S^T. PRIEST,
MÆCENATI SUO,

Næternum obſervantiæ
Et grati animi ſpecimen ,
Humillimè & ſecundùm
Voyet , dedicat , confeſcat
Obſequiosus ſervus & cliens ANT. GOÜAN.
à ij



PROÆMIUM.

TANTA fuit erga Hortum nostrum Regium Monspeliensem Botanicorum benignitas , ut plantas agri nostri rursus curiosis exhibere suscepimus. Expectata diu ab amicis prodit tandem Flora Monspeliaca , quam ab anno solido ad prælum missam nunc tantum cum Publico communicare valet Typographus negotiis multigenis impeditus. Opus hocce digessimus methodo hybridâ , quam itidem egregio *Ludwigio* arrisissime videmus ex generibus plantarum à viro prælaudato anno 1760 editis , & ad me pro Authoris clarissimi urbanitate mensis labentis initio missis. *Classes* ex Riviniano sistemate , *ordines* verò à classibus Linnæanis deponimus ; cùm primo intuitu facilius in Flore detegantur petalorum numerus , proportio , inferio , æqualitas , quām sexuum affectio-

nes. Ex corolla *Monopetala* vel *Polypetala*, *regulari* aut *irregulari*, duodecim extruximus classes. Has sequuntur *flores compositi* ex corollis regularibus, ex irregularibus, ex utrisque. Agmen claudunt plantæ *Apetalæ*, & tandem *Cryptanthemæ*. Sic methodus nostra classibus septendecim coërcetur. Flos *regularis* nobis dicitur cuius corolla monopetala polypetalave segmentis aut petalis constat inter se æqualibus, uniformibus, & à receptaculi centro æque dissitis: ubi verò horumce trium unum, alterumve, aut omnia deficiunt, flos nobis est *irregularis*; *veronica*, *verbascum*, *lycopsis*, *polyanthes*. Pro *compositis* habemus una syngenesiæ Linnæanæ genera, rejectis ad *simplices* aggregatis propriè dictis; ut *scabiosâ*, *globulariâ*, *dypsaco*, &c. Cùm nulli certi limites inter calycem & corollam adhuc reperti sint; & vix erret qui calycem pro corolla, aut corollam pro calyce sumit in plurimis generibus flore incompleto donatis, *daphne*, *thesia*, *polygono*, &c. monemus nos ea in re amicissimi *Cl. Linnaei* vestigiis constanter etiam inhæ-

rere. *Cryptanthemis* tandem diximus plantas quas complectitur *Linnæi celeb.* *Cryptogamia*, quarum flores inconspicui atque adhucdum indeterminati.

Cùm novissimorum illust. *Linnæi* operum copiam non haberent Medicinæ studiosi, & tantam jacturam lugerent, ipsorum precibus morigeri caræteres compendiosos quales exhibet sistematis naturæ tomus alter, cuilibet generi appinximus, mutatis aut locupletatis quibusdam. Notas secundarias compendiosè his subjunximus, ut in peregrinationibus botanicis librorum sarcinâ in posterum ii non premerentur.

Plura sunt genera quorum species collâ diversâ instruuntur, aut sexuum numero inter se discrepant; hinc coacti fuimus, attributis primario & secundario assumptis inhærentes, classe, ordine, imò & subsectione has separare, v. g. *scabiosa*, pag. 14. n°. 6. 7. & 8.. *gentiana*, pag. 15. n°. 9. 10. & 11.. *xanthium*, pag. 50. n°. 1. &c. &c. &c.

Repetita nonnulla genera monoïca, dioïca, aut polygama, in variis classi-

bus nostris legere datur : causa fuit *mascularum* à *femininis*, *hermaphroditorum* à reliquis discriminem, v. g. *najas*, pag. 55. & pag. 419.. *xanthium*, pag. 50. & pag. 412.. *holcus*, pag. 130. & pag. 431. &c. &c. Ergo ne tyroni plantam androgynam, dioicam, aut polygamam corollâ ludentem inquirenti aqua hæreret, genus bis scribendum fuit, in loco nimirum quem sibi vindicabat flos quilibet.

Plantas omnes à Magnolio memoratas, etiam obscuras plurimas atque inconcinnè determinatas, ad genera sua & species retulimus, rogantibus, ut id negotii in nos susceperimus, summis Europæ Botanicis *Linnaeo*, *Seguierio*, *Sauvagesio*, *Gerardo*, *Hallero*, aliisque; & paucissimas prorsus reliquimus ad calcern quas (si reverà existant) tenentur autoptæ determinare. Specierum nuper hîc detectarum, antecessoribus in agro Monspeliensi prætervisarum, habitationes indicavimus, & synonyma *Tournefortii*, *Bauhinorum*, *Dalechampii*, *Bocconi*, & clarissimorum viorum *Linnæi*, *Jacquini*, *Seguierii*, *Halleri*,

Gerardi, addidimus, ut adhibitus in Horto Regio nostro synonymorum ordo idem h̄ic servaretur.

Virtutibus assignatis ad species usuales, & datis nominibus ipsarum pharmaceuticis, nec non Gallicis, asterisco notantur ipsæ quarum quotidianus & familiaris usus in Medicina; cruce verò instruuntur illæ quarum virtutes heroïcx, appropriatæ, specificæ.

Exoticæ plures in hocce opusculo occurruunt apud nos cicures factæ, & ipsas veluti nostrates memoravimus, quia in ipsas ut in indigenas incurrere poterant Botanices studiosi.

Quemadmodum nomen idem vernaculum pluribus inditur speciebus, aut species eadem diverso nomine vernaculo insigniuntur; inde nomina illa se posuimus, quæ tamen in Indice proprio habentur, adjectis nomine latino numeroque speciei cujuslibet.

Ad calcem apponitur Appendix triplex. Prima sistit genera, species, & synonyma aut à nobis omissa, aut seriùs inventa. Appendix altera recenset species

x P R O C E M I U M.

à nobis nuper detectas, nimirum ab anno 1762, quo Hortum nostrum cum Publico communicavimus, ad hanc usque diem. Appendix tertia exhibet species animalium ad regnum vegetabile perperam à Magnolio relatas, adjectis ad quamlibet synonymiis Linnæi ex speciebus animalium deponitis. Hæc memoranda credidimus, ut plenior foret Botanici Magnoliani illustratio.

Sex Indicibus impletur ultimæ paginæ; primus nomina generica & specifica coërcet, secundus synonyma, tertius trivialia, quartus pharmaceutica, gallica quintus, tandem sextus verna-
cula.

Supereft ut publicè testemur quantum in inquirendis plantis nobiscum insudaverint honestissimi & indefessi viri, Amoreux, Lafosse, Clapiers, Arnaud, Vicari, Bonotti, Giraud, olim Medicinæ studiosi, nunc vero Doctores, diu Botanicorum laborum participes, qui montes, fluvia, præcipitiaque spreverunt; nec non eximii floræ cultores D. D. Soubri, Lugdunensis; Galliæ Quæsto-

rum Decanus, & Frater *Gabriel*, Capucinus, quibus omnibus plures novas species debemus. Ediscant rariori ipso-rum exemplo Medicinæ alumni Botani-
cam seriò excolere.

Dabam Monspelii, die 14^a.
mensis Septemb. 1764.



A U C T O R E S
IN HOC OPERE CITATI.

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| <i>B</i> auh. <i>pin.</i> | <i>Gaspari Bauhini pinax.</i> | 1 vol. in-4°. |
| <i>B</i> auh. <i>prod.</i> | <i>Ejusdem prodromus.</i> | 1 vol. in-4°. cum fig. |
| <i>B.</i> <i>hist.</i> | <i>Joannis Bauhini historia.</i> | 3 vol. in-fol. cum fig. |
| <i>Dalech.</i> <i>hist.</i> | <i>Dalechampii historia.</i> | 2 vol. in fol. cum fig. |
| <i>Lob.</i> <i>ic.</i> | <i>Lobelii Stirpium icones.</i> | 1 vol. in 4°. cum fig. |
| <i>Taber.</i> <i>ic.</i> | <i>Taberuæmontani icones.</i> | 1 vol. in 4°. cum fig. |
| <i>Barr.</i> <i>ic.</i> | <i>Barrelieri icones.</i> | 1 vol. in fol. cum fig. |
| <i>Bocc.</i> <i>musf.</i> | <i>Bocconi musæum.</i> | 2 vol. in-4°. cum fig. |
| <i>Loc.</i> <i>sic.</i> | <i>Bocconi descriptiones rario-</i>
<i>rum.</i> | 1 vol. in 4°. cum fig. |
| <i>Tour.</i> | <i>Tournefortii institutiones.</i> | 3 vol. in 4°. cum fig. |
| <i>Seg. ver.</i> | <i>Seguerii flora veronæ.</i> | 3 vol. in 8°. cum fig. |
| <i>Mug. Bot.</i> | <i>Magnolii Botanicum monspe-</i>
<i>liense.</i> | 1 vol. in-12. cum fig. |
| <i>Mug. hort.</i> | <i>Ejusdem hortus monspeliens-</i>
<i>sis.</i> | 1 vol. in-12. cum fig. |
| <i>H. m.</i> | <i>Antonii Goüan hortus regius</i>
<i>monspevensis.</i> | 1 vol. in-8°. cum fig. |
| <i>Linn. sp. ed. 2.</i> | <i>Linnæi species plantarum</i> ,
editio 2 ^a . | 2 vol. in-8°. |
| <i>Linn. fift.</i> | <i>Ejusdem sistema naturæ</i> ,
ed. 10 ^a . | 3 vol. in-8°. |
| <i>Linn. amæn.</i> | <i>Ejusdem amænitates acadé-</i>
<i>micas.</i> | 6 vol. in 8°. cum fig. |
| <i>Linn. cent.</i> | <i>Eiusdem centuriæ.</i> | 2 vol. in 8°. |
| <i>Scheuz. agr.</i> | <i>Scheuzeri agrostographia.</i> | 1 vol. in-4°. cum fig. |
| <i>Hill. en.</i> | <i>Halleri enumeratio.</i> | 1 vol. in-8°. |
| <i>Jacquinii</i> <i>historia plantarum vindobonensis.</i> | | 1 vol. in-fol. |
| <i>Sauv. meth.</i> | <i>Sauvagesii methodus folio-</i>
<i>rum.</i> | 1 vol. in-8°. |
| <i>Ger. gall.</i> | <i>Gerardi flora galloprovincia-</i>
<i>lis.</i> | 1 vol. in-8°. cum fig. |



EXTRAIT DES REGISTRES
DE LA
SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES.

Du 6. Septembre 1764.

Mrs. CUSSON, COULAS & AMOREUX, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. Goüan, qui a pour titre, *Flora Monspeliaca*, &c. en ayant fait leur rapport, la Compagnie a jugé que cet Ouvrage ne pouvoit être que très-utile aux Botanistes, tant par la nouvelle méthode qu'y propose l'Auteur, que par la description qu'il y donne d'un grand nombre de plantes, parmi lesquelles il indique des genres nouveaux, & beaucoup d'espèces nouvelles ; que plus de 150 de ces plantes ayant été découvertes par M. Goüan lui-même, dans les environs de Montpellier. ceux de ses compatriotes dont la curiosité se porte aux mêmes objets lui auroient dans tous les temps l'obligation particulière de leur avoir fait connoître leurs propres richesses ; qu'on ne pouvoit trop louer le soin qu'il a pris de rappeler aux genres établis par M. Linnæus & par d'autres Botanistes modernes les espèces indiquées par M. Magnol dans son *Botanicum Monspeliense*, qui par-là se trouve éclairci & rectifié en plusieurs endroits ; qu'enfin tout ce que dit M. Goüan sur les vertus médicinales des plantes usuelles, d'après des observations réitérées & constantes, augmentoit le mérite de l'Ouvrage, & le rendoit précieux à ceux qui désirent un bon Abrégé de Matière Médicale. En foi de quoi j'ai signé le présent certificat. A Montpellier, ce sixième Septembre mil sept cent soixante-quatre.

DE RATTE,
Directeur & Secrétaire perpétuel
de la Société Royale des
Sciences.

APPROBATION

*De Messieurs les Docteurs ordinaires en l'Université
des Médecins de Montpellier.*

NOS CLAUDIO CHAPTAL, NICOLAUS FOURNIER, THOMAS FITZ-MAURICE, LUDOVICUS ESTEVE, in alma & Regia Monspeliensium Medicorum Universitate octores ordinarii, unanimi Doctorum consensu præpositi, Opus Anionii Goüan cui titulus est *Flora Monspeliaca* summa cum cura pervolvimus, illudque seniori doctrinæ accommodatum judicavimus. Author methodo hybridâ hactenus intentatâ vegetabilia coordinat; species à *Magnolio* memoratas ad recentiorum genera & sub clariori luce refert; novas supra centum & quinquaginta, quarum aliquot adduxerat Nissolius, peregrinationibus & labori minimè parcens, intra biennium detexit; harum solemniores vires, dozes, adhibendi methodum d'illucidè & luculenter indicat, & tyrones dat informari maximo artis emolumento. In hoc certè plurimū laudandus, quod suis observationibus constat plantas 1800 in agro nostro hospitari, atque ita Hortum Regium qui Monspelli est speciebus 1000 facili marte locupletari docet. In cujus rei fidem has ei Litteras propriâ syngraphâ subscriptas dedimus. Monspelli, die 17^a. Septemb. anno 1764.

CHAPTAL, FOURNIER, FITZ-MAURICE,
ESTEVE.

E R R A T A.

- P**Ag. 4. lin. 16. ap-petala. *lege* apetala.
 ib. 27. ap-petala. *lege* apetala.
 21. 7. 5-subulatis. *lege* 5 subulatis.
 22. 13. 5-subulatis. *lege* 5 subulatis.
 31. 8. 2-erecti. *lege* 2 erecti.
 34. 18. 2-longitudinalibus. *lege* 2 longitudinalibus.
 40. 24. 6-staminiferis. *lege* 6 staminiferis.
 47. 11. peltata. *lege* peltata.
 55. 20. inter peduncularis. *lege* inter-peduncularis.
 60. 12. appetala. *lege* apetala.
 70. 11. 3-minoribus. *lege* 3 minoribus.
 76. 27. *stigma*. *lege* *stigma*.
 97. 26. 2-gibba. *lege* 2 gibba.
 107. 5. 2-lateralibus. *lege* 2 lateralibus.
 ib. 6. 2-membranacea. *lege* 2 membranacea.
 105. 25. lagopus. *deleatur*.
 197. 26. 2-gibba. *lege* 2 gibba.
 104. 5. 2-lateralibus. *lege* 2 lateralibus.
 ib. 6. 2-membranaceis. *lege* 2 membranaceis.
 148. 5. 4-fessilia. *lege* 4 fessilia.
 173. 6. 2-opposita. *lege* 2 opposita.
 251. 6. 2-floriferis. *lege* 2-floris.
 256. 7. cavente. *lege* carente.
 267. 22. petiolatis. *lege* fessilibus.
 ib. 27. petiolatis. *lege* fessilibus.
 276. 31. hyandrofænum. *lege* androfænum.
 333. 12. ramea-subalterna. *lege* ramea subalterna.

343. SCORZONERA n^o. 1. *ad marginem lege humilis.*
6. OLEA n^o. 1. *Angulosa. lege Angulosa.*
18. Myosotis n^o. 2. *Glabra. lege Glabra.*
- ib.* *γ. Hirsuta. lege Hirsuta.*
20. CYNOGLOSSUM n^o. 1. *β. Montanum.*
lege Montanum.
27. *lin. penultimā. β. Maritimus. lege β. Maritimus.*
35. 35. *β. Biflora. lege β. Biflora.*
72. 4. *Sylvestris. lege Sylvestris.*
107. 13. *Atropurpurea. lege Atropurpurea.*
259. 14. *Anserina. lege Anserina.*
262. 3. *Filipendulæ. lege Filipendulæ.*
278. *lin. penultimā. Lacmus. lege Lacmus.*



Classis I^a.

M O N O P E T A L I
REGULARES.

D I A N D R I A

* MONOGYNIA.

JASMINUM.

LIGUSTRUM.

PHYLLIREA.

OLEA.

SYRINGA.

T R I A N D R I A

* MONOGYNIA.

CROCUS.

IRIS.

T E T R A N D R I A

* MONOGYNIA.

PLANTAGO.

SANGUISORBA.

GALIUM.

ASPERULA.

SHERARDIA.

RUBIA.

CRUCIANELLA.

SCABIOSA. 6. 7. 8.

CONVALLARIA. 5.

GENTIANA. 9. 10. 11.

** DIGYNIA.

CUSCUTA.

*** TRIGYNIA.

ILEX.

2 MONOPETALI
PENTANDRIA
* MONOGYNIA. GYMNOSPERMÆ.

CRUCIANELLA. 4.
HELIOTROPIUM.
MYOSOTIS.
LITHOSPERMUM.
ANCHUSA,
PULMONARIA.
CYNOGLOSSUM.
SYMPHITUM.
CERINTHE.
BORRAGO.
ASPERUGO.

** MONOGYNIA. ANGIOSPERMÆ.
ANDROSACE.
PRIMULA.
CYCLAMEN.
SAMOLUS.
CAMPANULA.
PHYTEUMA.
PLUMBAGO.
CONVOLVULUS.
MENIANTHES.
HOTTONIA.
ANAGALLIS.
LYSIMACHIA,
VINEA.
ATROPA.
DATURA.
SOLANUM.

CAPSICUM.

LYCIUM.

*** DIGYNIA.

GENTIANA.

CYNANCHUM.

ASCLEPIAS.

CRESSA.

POLYGONUM. 6.

**** TRIGYNIA.

VIBURNUM.

SAMBUCUS.

HEXANDRIA

* MONOGYNIA.

CONVALLARIA.

HYACINTHUS.

ASPHODELUS.

* DIGYNIA.

POLYGONUM. 7. 8.

OCTANDRIA

* MONOGYNIA.

VACCINIUM.

ERICA.

DAPHNE.

STELLERA.

** DIGYNIA.

GENTIANA. 12.

*** TRIGYNIA.

POLYGONUM.

**** TETRAGYNIA.

ADOXA. 1.

4 MONOPETALI REGULARES.

DECANDRIA

* MONOGYNIA.

ARBUTUS.

** POLYGYNIA.

COTYLEDON.

ADOXA.

MONADELPHIA

* POLYANDRIA.

LAVATERA.

MALVA.

ALCEA.

ALTHÆA.

MONOCIA

* PENTANDRIA.

Femina ap- XANTHIUM. mas....
petala.

** POLYANDRIA.

JUGLANS. uterque sexus.

POTERIUM. uterque sexus.

*** SYNGENESIA.

MOMORDICA. uterque sexus.

CUCURBITA. uterque sexus.

CUCUMIS. uterque sexus.

BRYONIA. uterque sexus.

DICIA

* MONANDRIA.

Femina ap- NAJAS. mas....
petala.

** OCTANDRIA.

LAURUS. uterque sexus.

MONOPETALI REGULARES.

D I A N D R I A M O N O G Y N I A.

J A S M I N U M.

*Cor. 5-fida : tubo cylindrico. Bacc.,
2 - cocca.*

Fruticulus, flexuosus. fol. composita.

1. JASMINUM foliis oppositis pinnatis. *h. m. 5. Le Officinale.
jasmin.*
* PHARM. *Jasmini flores, oleum coctum. Extus, vis
uterina, antidystocica.*
2. JASM. foliis alternis ternatis simplicibusque, *Fruticans.*
ramis angulatis. *h. m. 6.*
*Jasminum luteum vulgo dictum Bacciferum. mag.
Bot. 139. hort. 105.*
3. JASM. foliis alternis pinnatis ternatisque, ramis *Humile.*
angulatis. *h. m. 6.*
Jasminum humilius luteum. mag. hort. 105.

L I G U S T R U M.

*Cor. 4-fida : tubo cylindrico. Bacc.
4-sperma.*

*Frutex. fol. simplex. inflor. racemosa
terminalis.*

1. LIGUSTRUM. *h. m. 6. Le troëne.* *Vulgare.*
Ligustrum germanicum. mag. Bot. 154. hort. 117.

PHILLYREA.

*Cor. 4-fida: tubo vix ullo. Bacc. 1-sperma.
Frutex. fol. simplex. inflor. glomerata
axillaris.*

Media. 1. PHILLYREA foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis. *linn. sif. nat.* 847.

Phillyrea foliis lanceolatis subintegerrimis. *b. m.* 6.

Phillyrea folio ligustri. *mag. Bot.* 202. *hort.* 159.

Angustifolia. 2. PHILLYR. foliis linear-lanceolatis integerrimis. *b. m.* 7. *β.*

Phillyrea angustifolia prima. *mag. Bot.* 202. *hort.* 159.

Latifolia. 3. PHYLL. foliis ovato-cordatis ferratis. *b. m.* 7. *Le filaris.*

Phillyrea folio ilicis. *mag. Bot.* 202.

Phillyrea latifolia spinosa. *mag. hort.* 158.

Phillyrea folio leviter ferrato. *mag. hort.* 159.

OLEA.

Cor. 4-fida: tubo brevi. drup. 1-sperma.

*Arbor. fol. subtus incano-nitens. inflor.
subracemosa axillaris.*

Europea. 1. OLEA. *b. m.* 7. *L'olivier.*

Angulosa. 2. Olea media oblonga angulosa. *mag. Bot.* 189. *hort.* 147.

Amygdalina. 3. Olea major angulosa amygdali forma. *cj. Bot.* 189. *hort.* 147.

Craniomorpha. 4. Olea media, fructu oblongo corni figura. *Bot.* 189. *hort.* 147.

Sphærica. 5. Olea major subrotunda. *Bot.* 189. *hort.* 147. *maxima.*

Oblonga. 6. Olea minor oblonga. *Bot.* 189. *hort.* 147.

Viridula. 7. Olea media rotunda viridior. *Bot.* 190. *hort.* 147.

Olea media rotunda præcox. *Bot.* 190. *hort.* 3. *Præcox.*

147.

Olea minor rotunda racemosa. *Bot.* 190. *hort.* 147. .. *Racemosa.*

Olea minor rotunda rubro-nigricans. *Bot.* 190. .. *Atro-rubens.*
hort. 147.

Olea minor rotunda ex rubro & nigro variegata. 1. *Variegata.*
Bot. 190. *hort.* 147.

Olea sylvestris. *Bot.* 189. .. *Sylvestris.*

* PHARM. *Olivæ oleum expressum.* Extus & intus
vis emolliens, laxans, lubricans, obvolvens,
antidolorifica, eccoprotтика, anthelmintica. *Con-*
ditæ stomachicæ. Fex resolvens. Oleum ad uncias
intus.

S Y R I N G A.

Cor. 4-fida : *tubo cylindrico. caps.* 2-lo-
cularis.

Frutex. *fol.* simplex. *inflor.* *thyrsoidæ*
terminalis.

1. SYRINGA foliis ovato-cordatis. *h. m.* 8. *Le lilac.* *Vulgaris.*

T R I A N D R I A

M O N O G Y N I A.

C R O C U S.

Cor. 6-partita æqualis. *stigmata convoluta.*

Herba. *fol.* fasciculata linearis : supernè
1-sulcata : infernè 2-sulcata.

1. CROCUS spatha univalvi radicali, corollæ tubo *Sativus.*
longissimo. *h. m.* 24. *Le safran.*

Crocus vernus minor alter, flore minori ex albo
purpureo. *mag.* *Bot.* 81.

Crocus vernus angustifolius gemino bulbo. *Bauh.*
pin. 67.

* PHARM. Croci orientalis stigma , pulvis , tinctura , extractum.. Vis anodina , alexiteria , exhilarans , resolvens , emmenagoga , anticterica , antiemetica , ophtalmica. *Stigmata , pulvis , tinctura ad scrup. fl... extractum ad grana v.*

HABITAT à la Garrigue du Terrail , à Montferrier , la Valette , la Colombiere. Floret Aprili , Februario,

I R I S.

Cal. o. cor. 6-partita supera : petalis 3 interioribus. stigma. 3-partito-petaloideum.

Herba. fol. disticha ensiformis. fulc. Bracteæ spatulæformes flores distinguentes.

* Barbatæ.

Germanica. 1. IRIS corollis barbatis , caule foliis longiore multifloro. *h. m. 25. La flambe.*

Iris vulgaris violacea sive purpurea sylvestris. mag. Bot. 141. hort. 105.

* PHARM. *Ireos nostratis radix. Intus vis diuretica ! antihydropica ! emmenagoga. Extus erthina , resolvens. succus ab uncia 1 ad 3.*

Pumila. 2. IRIS corollis barbatis , caule foliis subæquali uniflora. *h. m. 26.*

Iris perpusilla acaulis fermè saxatilis. mag. Bot. 141. hort. 106.

Iris humilis latifolia colore violaceo. mag. hort. 106.

Angustifolia. 6. Iris maritima Narbonensis. *mag. Bot. 141. hort. 106.*

Iris angustifolia maritima minor. Bauh. pin. 33.

Lutea. 7. Iris minor lutea. *Bot. 142. hort. 106. & flore albo. ibid. 106.*

Iris humilis flore luteo. Tour. 362.

HABITAT copiose in saxosis citra & ultra amnem , à Grabels , ubi Martio floribus cæruleis , albis , & luteis variat.

* *Imberbes.*

3. IRIS corollis imberibus, petalis interioribus stig-
mate minoribus. *h. m.* 26. *Pseu...-aco-*
rus.
Iris palustris lutea sive acorus adulterinus. *mag.*
Bot. 142. *hort.* 106.
* PHARM. *acori palustris* radix. Intus vis adstringens.
4. IRIS corollis imberibus, petalis internis longi-
tudine stigmatiſ. *h. m.* 26. *Le glayeul puant.*
Iris sylvestris seu xyris. *mag.* *Bot.* 142.
Iris agria foetida sive xyris. *mag.* *hort.* 106.

*Fætidissima.**TETRANDRIA*
MONOGYNIA.

PLANTAGO.

Cor. 4 - fida reflexa. *caps.* 2 - locularis
polysperma.

Herba. *fol.* simplex. *inflor.* spicata ter-
minalis.

* *Scapo nudo.*

1. PLANTAGO foliis ovatis glabris, scapo tereti, *Major.*
spica flosculis imbricatis. *h. m.* 69. *Le plantain*
large.

Plantago latifolia sinuata. *mag.* *Bot.* 205. *hort.* 160.

Plantago latifolia tota glabra. *mag.* *Bot.* 205. *hort.*
160.

* PHARM. *Plantaginis* radix, folia, aqua destil-
lata, semina. Intus & extus vis adstringens,
vulneraria, antiulcerosa, ophtalmica.

2. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubescenti-
bus, spica cylindrica, scapo tereti. *h. m.* 69.
Le plantain moyen.

Plantago latifolia incana. *mag.* *Bot.* 303. *hort.* 160.

Media.

β. *Plantago latifolia hirsuta minor.* *mag. hort. 160.*
 * *Vis speciei primæ.*

Lanceolata. 3. *PLANTAGO* foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *b. m. 69.* *Le plantain étroit.*
Plantago angustifolia major. *mag. Bot. 206. hort. 160.*

* *Vis speciei primæ.*

Lazopus. 4. *PLANTAGO* foliis lanceolatis, spica ovata hirsuta, scapo angulato. *b. m. 670.*
Plantago angustifolia, capitulis lagopi. *mag. Bot. 206. hort. 160.*

Albicans. 5. *PLANT.* foliis linear-lanceolatis hirsutis, spica cylindrica erecta, scapo tereti foliis longiore. *b. m. 70.*

Holosteum hirsutum albicans minus. *mag. Bot. 132.*

Plantago angustifolia albida Monspeliensis. *mag. hort. 160.*

Alpina. 6. *PLANT.* foliis linearibus planis hirsutis, spica oblonga erecta. *b. m. 70.*

Maritima. 7. *PLANT.* foliis semi-cylindricis integerimis basi lanatis, scapo tereti. *b. m. 70.*

Coronopus maritima major. *mag. Bot. 76. hort. 63.*

Subulata. 8. *PLANT.* foliis subulatis triquetris rigidis, scapo tereti. *b. m. 70.*

9. *Coronopus serpentina.* *mag. Bot. 79.*

Coronopus. 9. *PLANT.* foliis linear-pinnatifidis. *b. m. 70.*

Coronopus hortensis. *mag. Bot. 79.*

Coronopus sive *cornu cervinum vulgo spica plantaginea.* *mag. hort. 63.*

* *Caule ramoso.*

Psyllium. 10. *PLANTAGO* caule ramoso suffruticoso, foliis integerimis, spicis aphyllois. *b. m. 71.* & foliosis. *ibid. L'herbe aux puces.*

Psyllium majus supinum. *mag. Bot. 214. hort. 165.*

* *PHARM. Psyllii semina, mucilago. Vis obvolvens refrigerans, consolidans, ophtalmica, antidyfenterica. antibæmptoïca, gargarismica.*

Cynops. 11. *PLANTAGO* caule ramoso herbaceo, foliis dentatis recurvatis, spicis aphyllois. *b. m. 71.*

Psyllium majus erectum. mag. Bot. 214. hort. 165.

S A N G U I S O R B A.

Cal. 2-phyllo. cor. plana. caps. inter calycem & corollam.

Herba. fol. impari-pinnata. inflor. spicata terminalis.

1. SANGUISORBA spicis ovatis. *h. m. 71. La pim- prenelle.* *Officinalis.*

Pimpinella sanguisorba major. mag. Bot. 204. hort. 159.

* PHARM. *Pimpinellæ italicæ majoris radix. Intus vis adstringens tonica, antidysenterica.*

G A L I U M.

Cor. 4-fida plana supera. sem. 2, sub-globosa.

Herba. fol. verticillata. inflor. sub-paniculata.

* *Fructu glabro.*

1. GALIUM foliis quaternis ovatis inæqualibus, *caulibus diffusis. h. m. 68. Le caille lait blanc.* *Palustre.*

Galium palustre album. mag. Bot. 105. hort. 84.

2. GALIUM foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevioribus. *h. m. 66. Le caille lait jaune.* *Verum.*

Galium luteum. mag. Bot. 105. hort. 84.

* PHARM. *Galii lutei comæ floridæ. Vis antidy- senterica, antiepileptica, lac coagulans.*

3. GALIUM foliis senis lanceolatis, retrorsum serato-aculeatis rigidis, corollis fructu majoribus. *linn. sp. pl. 106. sist. nat. 892.* *Uliginosum.*

HABITAT au Capouladou & à Lesperon in fossis udis, & pratis.

4. GALIUM foliis octonis linearibus subserratis pa-

Mollugo.

tentissimis mucronatis , caule flaccido , ramis patentibus. *b. m.* 67.

Rubia sylvestris lævis. *mag. Bot.* 224.

Aparine sylvestris lævis. *mag. hort.* 19.

6. *Galium album*. *mag. Bot.* 104. *vulgare. hort.* 84.

Galium album vulgare. Tour. 115.

Mollugo montana angustifolia vel *galium album latifolium. B. pin.* 334.

5. **GALIUM** foliis verticillatis linearibus , pedunculis dichotomis summo caule floriferis. *b. m.* 67.

Rubia montana angustifolia. mag. Bot. 225.

* *Fruētū hispido.*

Rotundifo- 6. **GALIUM** foliis ovatis quaternis lævibus obtusis ,
lium. panicula dichotoma , seminibus hispidis. *b. m.* 67.

Aparine. 7. **GALIUM** foliis octonis lanceolatis carinatis sca-
bris , retrorsum aculeatis , geniculis villosis ,
fructu hispido. *b. m.* 67. *Le grateron.*

Aparine vulgaris. mag. Bot. 25. *hort.* 19.

8. **GALIUM** foliis verticillatis linearibus , pedunculis
bifidis , fructibus hispidis. *linn. sp. pl.* 108.

Aparine minima. mag. Bot. app. 291.

HABITAT in sterilibus & saxosis , à la Valette , la
Colombiere , & à Gramont.

Copiosius cum flore vidimus estate à Lamalou
inter muscos.

A S P E R U L A.

Cor. tubulosa supera. sem. 2 , globosa.

*Herba. fol. verticillata. inflor. fasciculata
terminalis.*

Odorata. 1. **ASPERULA** foliis octonis , fasciculis peduncula-
tis. *b. m.* 65.

* **PHARM.** *Matrisylvæ herba.* Vis diluens , diuretica ,
antihexanthematica.

HABITAT à Lamalou , & à Lesperou.

2. **ASPERULA** foliis senis , floribus sessilibus aggre-
gatis terminalibus. *b. m.* 65.

Rubia cærulea elatior vel erectior. *mag. Bot. 224.*

Aparine cærulea elatior. *mag. hort. 19.*

3. ASPERULA foliis quaternis ovato-lanceolatis, *Taurina:*
floribus fasciculatis terminalibus. *b. m. 65.*
Aparine latifolia lœvis. *mag. hort. 19.*
4. ASPERULA foliis linearibus, inferioribus senis, *Tinctoria:*
intermediis quaternis, caule flaccido, floribus
plerisque trifidis. *b. m. 66.*
5. ASPERULA foliis inferioribus senis, summis
quaternis: alternis minoribus, floribus 4-fidis.
b. m. 66.
Rubia cynanchica. *mag. Bot. 225.*
Apatine foliis gramineis. *mag. hort. 19.*

S H E R A R D I A.

Cor. tubulosa supera. sem. 2, tridentata.

Herba. fol. verticillata. fulc. Bractea ro-
tata involucriformis flores aggregatos
sustinens.

1. SHERARDIA foliis omnibus verticillatis, floribus *Arvensis:*
terminalibus. *b. m. 64.*
Rubia parva, flore cæruleo se spargens. *mag.*
Bot. 224.
Aparine pumila supina flore cæruleo. *mag. hort. 19.*

R U B I A.

Cor. campanulata supera. sem. 2, Baccata.

Herba. fol. verticillata. rad. stolonifera.
inflor. dichotoma.

1. RUBIA foliis senis. *b. m. 68. La garence.* *Tinctorum:*
Rubia sylvestris Monspessulana major. *mag. Bot.*
224. hort. 175.
- * PHARM. *Rubia tinctorum radix. Intus vis adstrin-*
gens, diuretica, emmenagogue, antirachitica.

CRUCIANELLA.

- Cor. tubulosa supera. cal. 2 - phyllus inferus. sem. 2, linearia inter calycem & corollam.*
Herba. fol. verticillata. inflor. spicata terminalis.

Angustifolia. 1. CRUCIANELLA erecta, foliis linearibus senis. b. m. 68.

Rubeola angustifolia spicata. mag. Bot. 225. hort. 175.

Latifolia. 2. CRUCIANELLA procumbens, foliis quaternis lanceolatis. b. m. 68.

Rubia latifolia spicata. mag. hort. 175.

Monspeliana. 3. CRUCIANELLA procumbens, foliis quaternis ovatis, rameis subquinatis linearibus. linn. sist. nat. p. 893.

Crucianella repens, foliis senis, spicis longis. b. m. 68.

Rubia spicata repens. mag. Bot. 225.

Rubeola spicata repens. mag. hort. 175.

HABITAT in saxosis à Magüri, & au pont de Ville-neuve.

SCABIOSA.

Cal. recept. inflor. fol. vide classem 2^{em}.

Tetrand. monogyn.

Cor. 4 - fida.

Leucantha. 6. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, squamis calycinis ovatis obtusis. b. m. 61.

Scabiosa montana calidarum regionum. mag. Bot. 231. hort. 180.

Succisa. 7. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. b. m. 62. La scabieuse des bois, ou la succise.

Succisa sive *morsus diaboli*. *mag. Bot.* 247.

Scabiosa folio integro. *mag. hort.* 180.

**PHARM. Morsus diaboli vel succise* radix, herba.
Vis alexiteria, vulneraria, antianginosa, scabiosa succedanea.

8. **SCABIOSA** corollulis æqualibus quadrifidis, trifidisque, foliis caulinis sub 3 pinnatis. *b. m.* 62. *Gramuntiana*
Scabiosa capitulo globoso, foliis in tenuissimas lacinias divisus. *mag. Bot.* 231. *hort.* 170.

C O N V A L L A R I A.

Cal. Bacc. caul. vide ejusdem classeos
Hexand. monogyniam.

Cor. 4-fida rotata. fol. petiolata. *inflor.*
racemosa.

5. **CONVALLARIA** caule folioso, foliis cordatis *Bifolia*, petiolatis. *b. m.* 177.

G E N T I A N A.

Casp. caul. fol. vide ejusdem classeos
Pentand. digyniam.

Cal. & Cor. 4-fida.

9. **GENTIANA** corollis quadrifidis fauce barbatis. *Campestris*,
b. m. 129.

Gentiana verna minor. *mag. hort.* 85.

10. **GENTIANA** corollulis imberbibus quadrifidis *Cruciata*, verticillatis sessilibus. *b. m.* 129.

11. **GENTIANA** corollis quadrifidis margine ciliatis. *Ciliata*,
linn. sp. 231.

HABITAT à *Lisperon*. Floret Augusto & Septembri.



TETRANDRIA

DIGYNIA.

CUSCUTA.

Cal. 4-partitus. *cor.* 4-fida ovata. *caps.* 2 locul. circumscissa.

Cotyl. o. *fol.* o. *rad.* o. *herba* parasitica, filamentosa.

Nota. Semina sata emitunt caulinum filiformem, volubilem, cotyledonibus, foliis & radicibus desitutum; ubi autem pars hujus superior, plantæ vicinæ cuilibet ita adhæsit ut ex illa nutrientum hauriat, tunc pars inferior marcescit, perit. Imo si corpori exsucce, uti petræ, adhæreat, tota perit.

Europæz.

1. CUSCUTA floribus sessilibus. *b. m.* 74. *La cuscute, l'épithyme.*

Cuscuta major. *mag.* *Bot.* 81. *hort.* 65.

Cuscuta minor sive *epithymum.* *mag.* *Bot.* 82. *hort.* 65.

* *PHARM.* *Cuscutæ, epithymi herba.* Vis dubia, aperiens, antimelancholica, antihypochondriaca *ex Tournefortio.*

TETRANDRIA

TETRAGYNIA.

ILEX.

Cal. 4-dentatus. *cor.* rotata. *stil.* o. *Bacc.* 4-sperma.

Arbor. *fol.* simplex, marginibus cartilagineo-callosa.

Aquifolium. 1. ILEX foliis ovatis acutis spinosis. *b. m.* 75. *Le houx.* *Aquifolium vulgò.* *mag.* *Bot.* 6.

Aquifolium

Aquifolium sive *agrifolium vulgò.* *mag. hort.* 21.
Obs. Variat foliis integerrimis, apice tantum spino-

nolis.

PENTANDRIA

MONOGYNIA,

CRUCIANELLA.

Cal. sem. caul. fol. fulc. vide ejusd.
classeos *Tetrand.* *z-gyniam.*

Cor. 5-fida.

4. CRUCIANELLA procumbens, foliis quaternis,
spicis interruptis. *b. m.* 68. *Maritima*
Rubia maritima. *mag. Bot.* 226. Rubeola. *ejusd.*
hort. 175.
Rubia maritima aspera. *mag. Bot.* 226.

* GYMNOTETRASPERMÆ.

HELIOTROPIUM.

Cor. infundibuliformis, 5-fida, interjec-

tis dentibus: fauce clausâ fornicibus.

Herba. *inflor.* spicata suboppositifolia:

spicæ pars florifera recurva: fructifera

stricta.

1. HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis pli-

catis tomentosis, spicis solitariis. *Linn. sist. nat.*

pag. 913. *Supinum:*

HABITAT in herbidis, à Valene & au Capouladou

secus fluvium.

Procumbit, & heliotropio vulgari multò ramosius.

2. HELIOTROPIUM foliis ovatis petiolatis, caule

erecto. *b. m.* 78. *L'heliotrope ou l'herbe aux*

verrues.

Europaeum.

Heliotropium majus Dioscoridis. *mag.* *Bot.* 125.
hort.

* PHARM. *Helictropii herba*, succus. Extus vis
abstergens, antiulcerosa antiherpetica, antiver-
rucosa.

M Y O S O T I S.

Cor. Hypocrateriformis, 5-fida: lobis
emarginatis fauce clausâ fornicibus.

Herba. *inflor.* racemosa terminalis: ra-
cemi pars florifera recurva: fructifera
stricta.

Scorpioides. 1. MYOSOTIS seminibus nudis, foliorum apicibus
callosis. *b. m.* 79. *L'oreille de souris.*

Glabra. 2. *Echium scorpioides* palustre. *mag.* *Bot.* 88.
Lithospermum palustre minus. *mag.* *hort.* 121.

Hirsuta. 2. *Echium scorpioides arvense.* *mag.* *Bot.* 88.
Lithospermum arvense minus. *mag.* *hort.* 121.

Lappula. 2. MYOSOT. seminum aculeis triglochidibus, foliis
pilosis lanceolatis. *b. m.* 79.
Cynoglossum medium & minus. *mag.* *Bot.* 79.
hort. 67.

Apula. 3. MYOSOTIS seminibus nudis, foliis hispidis,
racemis foliosis. *b. m.* 79.
Anchusa lutea minima. *mag.* *Bot.* 19. *hort.* 14.
HABITAT copiosissimè in luco, en allant à Perauls.

L I T H O S P E R M U M.

Cal. 5-partitus. *Cor.* infundibuliformis:
fauce nudâ.

Herba & frutex; ramis floriferis bifidis.

Officinale. 1. LITHOSPERMUM seminibus lăvibus, corollis
calicem vix superantibus, foliis lanceolatis. *b.*
m. 80. *Le gremil.*
Lithospermum sive milium solis. *mag.* *Bot.* 163.
hort. 122.

- * PHARM. *Lithospermi* semina. Intus vis absorbens, adstringens, diuretica? mucosa è renibus everrens?
2. LITHOSPERMUM seminibus rugosis, corollis vix calyces superantibus. *h. m.* 80. *Arvensis.*
 - Lithospermum nigrum flore albo; semine echii. *mag. Bot.* 164.
 - Anchusa angustifolia lithospermi folio flore albo. *mag. hort.* 14.
 3. LITHOSPERMUM seminibus lèvibus, corollis calycem multoties superantibus. *h. m.* 80. *Purpureo-caeruleum.*
 - Lithospermum repens majus, *mag. Bot.* 163.
 - Anchusa latifolia, flore purpureo. *mag. hort.* 14.
 4. LITHOSPERMUM staminibus corollam æquantibus. *h. m.* 80. *Fruticosum.*
 - Anchusa lignosior angustifolia. *mag. Bot.* 18. *hort.* 14.

A N C H U S A.

Cor. infundibuliformis : tubo basi prismatico : fauce fornicate. *sem.* oblonga.
Herba. inflor. spicata secunda terminalis.

1. ANCHUSA foliis lanceolatis, spicis imbricatis, *h. m.* 81. *La buglosse.* *Officinalis.*
Buglossum angustifolium majus. *mag. Bot.* 40.
hort. 35.
- * PHARM. *Buglossi* radix, herba, succus, flores. Vis eadém ac borraginis.
2. ANCHUSA subtomentosa, foliis lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. *Linn. sp. pl. edit.* 22. pag. 192. *L'orcanette.* *Tintoria.*
Lithospermum tinctorium, villosum, caulis pro-cumbentibus simplicissimis. *h. m.* 80.
Anchusa monspeliaca. *mag. Bot.* 18.
Anchusa puniceis floribus. *mag. hort.* 14.

P U L M O N A R I A.

- Cor.* infundibuliformis : fauce pervia,
cal. prismatico-5-gonus.

Herba. fol. scabra sessilis. inflor. terminalis congesta.

Officinalis.

1. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-cordatis. scabris. h. m. 82. *La pulmonaire.*

* PHARM. *Pulmonaria maculata herba, syrupus. Vis vulneraria consolidans, demulcens, bechica, antiphysica... Datur in ptisanis jusculis... syrupus ad unc. 11.*

HABITAT in fagetis à *Lamalou*, à *l'Esperou*, au *Vigan*.

C Y N O G L O S S U M.

Cor. infundibuliformis. fauce fornicatâ. sem. depressa, interiori tantum latere stylo affixa.

Herba. fol. mollis. inflor. secunda subracemosa.

Officinale.

1. CYNOGLOSSUM staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis sessilibus tomentosis. h. m. 81. *Le cynoglosse.*

2. Cynoglossum majus vulgare. mag. Bot. 83. hort. 67. Linn. demonst. plant. & aman. acad. 3. pag. 402. HABITAT 2. in declivibus au *Capouladou*, & à *Lamalou*.

* PHARM. *Cynoglossi radix, herba. Intus vis adstringens subnarcotica; extus resolvens, antiulcerosa, antiphitriaca. Intus radix decocta ad usque unc. 1. folia verò ad usque man. 1... * pillulae cynoglossi à gran. iv ad x.*

2. CYNOGLOSSUM staminibus corollam æquantiibus. h. m. 82.

Cynoglossum montanum maximum. mag. hort. 67.

Cynoglossum folio virenti. mag. Bot. app. 294.

Cynoglossum sempervirens. Baub. pin. 257. mag. hort. 67.

Cynoglossum montanum virente folio, flore majori. Tour. 140. & minori. ibidem.

Apenninum.

3. CYNOGLOSSUM foliis tomentosis incanis spathulatis semiamplexicaulibus. h. m. 82. *Cheirifolium.*
Cynoglossum creticum argenteo angusto folio.
mag. Bot. 83. hort. 67.

S Y M P H Y T U M.

Cor. limbus tubulato-ventricosus : *fauce* radiis 5-subulatis clausâ. *stil.* calycibus longior.

Herba. *fol.* decurrentes. *inflor.* congesta terminalis.

1. SYMPHYTUM foliis omnibus alternis. h. m. 83. *Officinale.*
La consoude.

Symphytum consolida major. *mag. Bot. 247.* *mas & femina.* *hort. 190.*

* PHARM. *Consolidæ majoris* radix, herba, flores, syrpus. Extus & intus vis glutinans, vulneraria, obvolvens, adstringens, antihæmoptoïca antidysenterica, ischæma, ... ab unc. ff. ad unc. 2, in decocto.

2. SYMPHYTUM foliis summis oppositis. h. m. 83. *Tuberosum.*
Symphytum majus tuberosâ radice. *mag. Bot. 248.*
hort. 191.

C E R I N T H E.

Cor. limbus tubulato-ventricosus : *fauce* nudâ. *sem.* 2, ossea bilocularia.

Herba, scabra. *inflor.* laterifolia solitaria pedunculata. *fol.* scabra alterna.

1. CERINTHE foliis amplexicaulibus, corollis obtusiusculis patulis. *Linn. sp. pl. edit. 2^a.* 194.
h. m. 83. Le melinet.

HABITAT à Pezenas, in arvis circa urbem,

ONOSMA.

Cor. limbus tubulato-ventricosus : fauce nudâ. sem. 4.

Herba pilis rigidis exasperata. inflor. laterifolia solitaria pedunculata. fol. conferta sparsa hispida.

Echioïdes.

1. ONOSMA foliis lanceolatis hispidis, fructibus erectis. Linn. sp. pl. edit. 2^a. pag. 196.

Cerinthe, echoïdes, foliis lanceolato-linearibus hispidis, seminibus quaternis distinctis. b. m. 84.

BORRAGO.

Cor. rotata : fauce clausâ, radiis 5 - subulatis.

Herba. inflor. laterifolia subracemosa.

Officinalis.

1. BORRAGO foliis omnibus alternis, caulis patentibus. b. m. 84. *La bourrache.*

Borrago floribus cæruleis, & albis. mag. hort. 34.

* PHARM. *Borraginiæ herba, succus, flores. Intus vis expectorans incidens, antipleuritica, anti-peripneumonica... nitro scatet.*

ASPERUGO.

Cal. seminifer compressus, lamellis plano-parallelis.

Herba. inflor. axillaris subsolitaria subsessilis.

Procumbens.

1. ASPERUGO calycibus fructiferis reflexis cauli appressis. b. m. 85.

Buglossum sylvestre caulis procumbentibus. mag. Bot. 41.

Buglossoides caulis procumbentibus. mag. hort. 35.

** ANGIOSPERMÆ.

A N D R O S A C E.

Cor. Hypocrat. infera : *fauce glandulosâ.*
caps. 1 - locularis.

Herba. inflor. umbellata simplex , terminans scapum.

1. ANDROSACE perianthiis maximis. *b. m.* 87. *Maxima.*
Androsace altera Mathioli. *mag. hort.* 14. *nov. char.*
2. ANDROSACE foliis lanceolatis dentatis glabris , perianthiis angulatis corolla brevioribus. *b. m.* 87. *Septentrionalis.*
3. ANDROSACE foliis linearibus glabris , umbella involucris multoties longiore. *b. m.* 87. *Lætæz.*
4. ANDROSACE foliis subulatis glabris , umbella involucris breviore. *b. m.* 88. *Cærnea.*

P R I M U L A.

Cor. infundibul. infera : *fauce perviâ.*
caps. 1 - locularis.

Herba. inflor. umbellata terminans scapus.

1. PRIMULA foliis dentatis rugosis. *b. m.* 88. *La Officinalis prime-vere.*
Primula veris caulifera pallido flore vix odoro. *mag. Bot.* 213.
2. PRIMULÆ veris species omnes. *mag. hort.* 164.
* PHARM. *Primula veris* radix , herba , flores , conserva , aqua.
3. Vis subanodina , nervina , cardiaca , resolvens , antiparetica. *flor.* antivertiginosi. *rad.* anticephalæica.
2. PRIMULA foliis ferratis glabris. *b. m.* 88. *L'oreille d'ours.* *Auricula.*
Obs. hujus & prioris innumeræ in hortis varieta- tes. Utraque variat calycibus & corollis 8-fidis , 8-andris.

- Farinosa.* 3. PRIMULA foliis crenatis glabris. *b. m.* 88.
Vitaliana. 4. PRIMULA foliis linearibus integerrimis, floribus
 sessilibus. *b. m.* 89.
Integrifolia. 5. PRIMULA foliis integerrimis glabris oblongis,
 calycibus tubulosis obtusis. *b. m.* 89.

C Y C L A M E N.

Cor. rotata reflexa infera. *cap.* baccam
 fovens.

Herba. *scapus* 1 - florus : florifer spiralis :
 fructifer convolutus.

- Europaeum.* 1. CYCLAMEN corolla retroflexa. *b. m.* 89. *Le pain de pourceau.*

Cyclamen byzantinum. *mag.* Bot. 82. hort. 66, &
 varietates.

* PHARM. *Cyclaminis* radix. *Arthanite* unguen-
 tum. Intus vis minus tuta, draistica, emmena-
 goga. Extus tutior, resolvens, antischirrosa,
 cathartica, emmenagoga, anthelmintica.

S A M O L U S.

Cor. rotata supera. *stigm.* capitatum.
stam. munita squamulis corollæ.

Herba. *fol.* alterna. *inflor.* racemosæ
 terminalis.

- Valerandi.* 1. SAMOLUS. *b. m.* *Le mouron d'eau.*
 Anagallis aquatica folio rotundo non crenato. *mag.*
Bot. 18.
 Samolus valerandi. *mag.* hort. 178.

C A M P A N U L A.

Cor. campanulata. *filam.* basi dilatata.
stigm. 3-fidum.

Herba. *fulc.* glandulæ ad margines fo-
 liorum... *laet.* alba *sæpius.*

OBS. Variat calycibus, corollisque 6-fidis, hexandris.

* *Foliis lævioribus angustioribus.*

1. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, *Rotundifolia.*
caulinis linearibus. *h. m. 96.*
2. Campanula alpina linifolia cærulea. *mag. Bot.*
47. icon. 46.
2. Campanula alpina rotundifolia minor. *mag. hort.*
29.
1. Campanula rotundifolia minor vulgaris. *mag. hort.*
29.
2. CAMPAN. foliis undulatis, radicalibus lanceola-
to-ovalibus, panicula coarctata. *h. m. 96. Le-*
raiponce. *Rapunculus.*
- Rapunculus esculentus. *mag. Bot. 220.*
- Campanula radice esculentâ, flore cæruleo. *mag.*
hort. 29.
3. CAMPANULA foliis radicalibus obovatis, cau-
linis lanceolato-linearibus subserratis, sessilibus
remotis. *h. m. 97.* *Perficiolia.*
- Rapunculus perficiolius magno flore. *mag. Bot.*
220.
- Campanula perficiolia. *mag. hort. 29.*

** *Foliis scabris latioribus.*

4. CAMPANULA caule angulato, foliis petiolatis,
calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *h. m. 97.* *Trachelium.*
- Campanula vulgatior foliis urticæ, major &
asperior. *mag. Bot. 45. hort. 39.*
5. CAMPANULA caule angulato simplici, floribus *Glomerata.*
sessilibus, capitulo terminali. *h. m. 97.*
- Campanula pratensis, flore conglomerato. *mag.*
Bot. 45. hort. 39.
6. CAMPANULA capsulis 5-locularibus tectis, ca-
lycum sinibus reflexis. *h. m. 96.* *Medium.*
- Campanula foliis echii, floribus villosis. *mag.*
Bot. 45. hort. 39.
- Campanula hortensis, folio & flore oblongo. *mag.*
hort. 38.

*** Caule subdiviso.

- Speculum.* 7. CAMPANULA caule diffuso ramosissimo , foliis sessilibus utrinque dentatis. *b. m.* 98.
Onobrychis arvensis , seu *campanula arvensis erecta*. *mag. Bot.* 45.
Campanula arvensis erecta. *mag. hort.* 39.
- Hybrida.* 8. CAMPANULA caule basi subramoso stricto , foliis oblongis crenatis , calycibus aggregatis corollâ longioribus , capsulis prismaticis. *Linn.* *sp. pl.* 168.
HABITAT in arvis , à *Aniane* , *Villemagne* , *Viols*.
Affinis priori.
- Erinus.* 9. CAMPANULA caule simplici , foliis cordatis amplexicaulibus dentatis , floribus sessilibus aggregatis. *b. m.* 98.
Rapunculus minor foliis incisis. *mag. Bot.* 220.
Campanula minor annua , foliis incisis. *mag. hort.* 39.
- Hederacea.* 10. CAMPANULA foliis cordatis quinquelobis petiolatis glabris , caule laxe. *Linn. sp.* 169.
Campanula cymbalariae folio vel hederaceo. *Tour.*
112. *mag. hort.* 39.
HABITAT in arvis , à *Montpeyroux*.

PHYTEUMA.

Cor. rotata , 5-partita : laciniis linearibus. *stigm.* 3-fidum.

Herba. inflor. terminalis. *fulc.* bracteæ setaceæ flosculis interjectæ:

- Hemisphaerica* 1. PHYTEUMA capitulo subrotundo , foliis linearibus integerrimis. *b. m.* 99.
- Orbicularis.* 2. PHYTEUMA capitulo subrotundo , foliis serratis, radicalibus cordatis. *b. m.* 99.
- Spicata.* 3. PHYTEUMA spicâ oblongâ , capsulis 2 - locularibus , foliis radicalibus cordatis. *b. m.* 99.
Rapunculus spicatus sive *comosus* *cæruleus*. *mag. Bot.* 220. *hort.* 172. & flore albo. *ibid.*

4. PHYTEUMA fasciculo terminali sessili, foliis *Comosa.*
dentatis, radicalibus cordatis. *b. m. 100.*

P L U M B A G O.

Cor. infundibul. infera. *stam.* squamis
basin corollæ cludentibus inserta.
stigm. 5-fidum. *sem.* 1, oblongum tu-
nicatum.

Herba. fulc. glandulæ supra calyces pe-
dicellatæ glutinosæ.

1. PLUMBAGO foliis amplexicaulibus ciliatis, basi *Europæa.*
angustioribus. *b. m. 92.* *La dentaire.*
Lepidium dentillaria dictum. *mag. Bot. 135.*
Plumbago quorundam Clusii. *mag. hort. 160.*
* PHARM. *Dentariae* radix. Extus vis caustica,
antiodontalgica.

C O N V O L V U L U S.

Cor. campanulata plicata. *stigm. 2. caps.*
2 - locularis loculis 2 - spermis....calycis
foliola (sæpe) inæqualia.

Herba. inflor. axillaris pedunculata.

* *Caule volubili.*

1. CONVOLVULUS foliis sagittatis utrinque accu-
tis, pedunculis trifloris. *b. m. 93.* *Le petit liseron.* *Arvensis.*
Convolvulus minor arvensis. *mag. Bot. 74. hort.*
61. flore albo. *ibid.*
* PHARM. *Convolvuli minoris* herba. Extus vis re-
solvens, subanodina.
2. CONVOLVULUS foliis sagittatis posticè tran-
scatis, pedunculis unifloris. *b. m. 93.* *Le grand*
liseron. *Sepium.*
Convolvulus major albus. *mag. Bot. 73. hort. 61.*
Convolvulus major albus maritimus, crassiori & β. *Maritimus.*
auriculato folio. *mag. Bot. 73.*

* PHARM. *Convolvuli majoris* herba. Extus vis eadem prioris.

Althoides. 3. CONVOLVULUS foliis palmatis cordatis sericeis; lobis repandis, pedunculis bifloris. h. m. 93.

Convolvulus peregrinus pulcher folio betonicæ. mag. Bot. 74.

Convolvulus argenteus althææ folio. mag. hort. 61.

** *Caule prostrato nec volubili.*

Cneorum. 4. CONVOLVULUS foliis lanceolatis obtusis sericeis. h. m. 94.

Convolvulus spicæfolius argenteus radice repente. mag. Bot. 74. hort. 62.

Cantabrica. 5. CONVOLVULUS foliis linear-lanceolatis acutis, caule ramoso recto, pedunculis bifloris. h. m. 94.

Convolvulus minimus spicæfolius, vel stæchadi citrinæ affinis aut linariæ folio. mag. Bot. 74. hort. 62.

Soldanella. 6. CONVOLVULUS foliis reniformibus, pedunculis unifloris. h. m. 94. *La soldanelle ou chose marin.*

Soldanella maritima minor. mag. Bot. 244.

Convolvulus maritimus nostras. mag. hort. 61.

* PHARM. *Soldanellæ* herba. Vis draistica, hydragoga, antihydropica. pulvis à drachm. fl. ad drachm. i. succus ad unc. fl. folia ad man. i. in jusculo.

MENIANTHES.

Cor. rotata hirsuta. *stigm.* 2-fidum. *caps.* 2-locularis.

Herba, immersa. *fol.* natans. *inflor.* emersa racemosa vel solitaria.

Trifoliata. 1. MENIANTHES foliis ternatis. h. m. 91. *Le trefoil d'eau.*

* PHARM. *Trifolii aquatici* herba, succus. Vis

robora, *saponacea*, *diuretica* *antihydropica*,
antiscorbutica, *antipodagrifica*.
HABITAT circa Nemausum, ubi observavit illam
Clar. Seguierus.

2. **MENIANTHES** foliis cordatis integerrimis. *Linn.* *Nymphoides*.
sp. 145.

Nymphaea minor lutea, flore fimbriato. *mag. Bot.*
 302.

Nymphoides aquis innatans. *mag. hort.* 145.

HABITAT in fossis inundatis cum utricularia; à
Lattes ad lævam, & eodem tempore floret:
 pedunculi uniflori, solitarii, aut geminati, sæpe
 aggregati.

H O T T O N I A.

Cor. *Hypocrat.* *stam.* tubo corollæ im-
 posita. *stigm.* globosum. *caps.* 1-lo-
 laris.

Herba immersa. *fol.* alterna pinnata.
inflor. emersa, verticillato-racemosa
 terminans scapum.

1. **HOTTONIA** pedunculis verticillato-multifloris. *Palustris*.
Linn. sp. 145.

HABITAT in paludibus *au Caila*. Floret Junio, Ju-
 lioque.

A N A G A L L I S.

Cor. rotata. *stigm.* capitatum. *caps.* 1-lo-
 laris, circumscissa.

Herba 4-gona. *fol.* opposita sessilis inte-
 gerrima.

1. **ANAGALLIS** foliis indivisis, caule procumbente. *Arvensis*.
b. m. 93. *Le mouron.*

Anagallis phæniceo flore. *mag. Bot.* 17. *mag. B.* *Phænica*.
hort. 14.

Cærulea. 2. Anagallis cærneæ flore. mag. Bot. 17. fæmina; hort. 14.

* PHARM. *Anagallidis* herba, succus. Vis cephalica, anticonvulsiva vulneraria.... Variat foliis summis ternis.

L Y S I M A C H I A.

Cor. rotata. *stigm.* obtusum. *caps.* mucronata 10-valvis.

Herba. fol. opposita simplex. *inflor.* incerta.

* *Floribus terminalibus.*

Vulgaris.

1. LYSIMACHIA paniculata, racemis terminalibus. h. m. 90. *La corneille ou chasseboisse.*

Ly simachia lutea major. mag. Bot. 172. hort. 123.

* PHARM. *Pellibosse* herba. Vis astringens, vulneraria.

** *Floribus axillaribus.*

Linum Stellatum.

2. LYSIMACHIA foliis subulatis, pedunculis folio brevioribus, caule erecto ramosissimo. h. m. 91.

Linum minimum stellatum. mag. Bot. 163. icon. 162. hort. 122.

HABITAT copiosissimè in sterilibus, & herbidis, à Selleneuve.

Nemorum.

3. LYSIMACHIA foliis orbiculatis acuminatis sessilibus, pedunculis folio duplo longioribus, caule procumbente. h. m. 91.

Anagallis lutea nemorum. mag. hort. 14.

Nummularia.

4. LYSIMACHIA foliis orbiculatis obtusis subpetiolatis, pedunculis longitudine foliorum, caule repente. h. m. 91. *L'herbe aux écus ou la nummulaire.*

Nummularia major lutea. mag. Bot. 187. hort. 144.

* PHARM. *Nummularia* herba. Vis saponacea, subastringens, ischaëma vulneraria, antileucorrhœïca.

5. LYSIMACHIA foliis ovatis acutiusculis, pedunculis folio longioribus, caule repente. *b. m.* 91. *Tenella,*
Nummularia minor purpurascente flore. *mag. Bot.*
187. hort. 144.

V I N C A.

Cor. Hypocrater. contorta. *stigm.* alterum
altero impositum. *folliculi* 2 - erecti.
Herba suffruticosa flexuosa. *fol.* enervia
opposita integerima.

1. VINCA floribus pedunculatis solitariis,nectariis *Major.*
globosis. *b. m.* 119. *La pervanche.*
Clematis daphnoides major. *mag. Bot.* 70. *hort.*
§ 8. flore albo, variegato. *ibid.*
* PHARM. *Vincea pervincæ* herba. Intus vis ad-
stringens. Extus sophisticans, gargarismica.

D A T U R A.

Cal. tubulosus angulatus deciduus. *cor.*
infundibul. plicata. *caps.* 2-locularis,
4-valvis.
Herba. inflor. interfoliacea solitaria. *fulc.*
spinulæ capsulares.

1. DATURA pericarpiis spinosis ovatis erectis. *b. m.* *Stramonium:*
104. *L'endormie ou le stramonium.*
Solanum fætidum, pomo spinoso, flore albo. *mag.*
Bot. 243.
Stramonia seu datura major sætida, pomo spinoso
oblongo. *mag. hort.* 190.
* PHARM. *Stramonii* folia, semina. Intus vis ine-
brians, phantastica, perniciosa; extus stupefac-
tiva, emolliens, subresolvens, antihemorrhoi-
dal, anticancrofa, antilcerosa.

ATROPA.

Cor. campanulata. Stam. distantia incurvata. bacc. globosa 2-locularis.

Herba. inflor. interfoliacea solitaria. fructus nudi.

Belladonna. i. ATROPA foliis geminatis , calycibus monocarpis , caule erecto. *b. m. 107. La belladonne.*

Solanum somniferum & lethale. mag. Bot. 243.

Solanis affinis belladonna dicta. mag. hort. 186.

*. PHARM. *Belladonnae* folia , baccæ , aqua. Intus vis vertiginosa , phantastica , paralytica , anodina , narcotica , perniciosa nisi cautissime agatur ; extus anodina , resolvens , faciei rubori , hemorrhoidum phlogosi , cacoethie adversa , anticarcinomatosa †... Contra carcinoma intus datur quâlibet vice cyathus infusi foliorum belladonnae exsiccatorum ad scrup. i. in aq. lib. v. Obs. frequens à l'Esperou , ubi variat floribus 6-fidis dodecandris.

SOLANUM.

Cor. rotata. antheræ subcoalitæ , apice poro gemino dehiscente. bacc. 2-locularis.

Frutex & herba. inflor. caulina subracemosæ , supra axillaris.

* *Inermia.*

Dulcamara. i. SOLANUM caule inermi flexuoso frutescente ; foliis superioribus hastatis , racemis cymosis. *b. m. 108. La douce amere.*

Solanum scandens seu dulcamara. mag. Bot. 243. hort. 186.

* PHARM. *Dulcamarae* stipites. Vis diluens , mundificans , diuretica , pellens , antiæsthetica , rheumatismo ,

- matismo, pleuritidi, asthamati adversa ex Linneo.
Stipitum unc. 2 in aq. comm. pint. 1 coctæ.
2. SOLANUM foliis pinnatis, foliolis integerrimis: *Tuberofum*
 impari maximo. b. m. 109. *Le taupinambour.*
 Solanum tuberosum esculentum. mag. hort. 186.
 3. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis *Nigrum.*
 dentato-angulatis, umbellis nutantibus. b. m.
 109. *La morelle.*
 Solanum officinarum baccis rubris. mag. Bot. 243.
 hort. 186.
 3. Solanum officinarum baccis luteo-virescentibus.
 mag. hort. 186.
- * PHARM. *Solani* herba, succus, aqua. Extus vis
 anodina, repellens, antiphlogistica, anticar-
 cinomatosa, antiproctalgica.

** *Spinosa.*

4. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis *Melongena.*
 tomentosis nigris, calycibus spinosis. b. m. 110.
L'aubergine.
 Solanum pomiferum fructu oblongo. mag. hort.
 187. albo. *ibid.*
5. Solanum pomiferum fructu incurvo. mag. hort.
 187.
6. Solanum pomiferum fructu aculeato. mag. hort.
 177.

C A P S I C U M.

Cor. rotata. *antheræ.* conniventæ im-
 perforatæ. *bacc.* exsucca.

Herba. inflor. solitaria, vaga ut *itz*
priori.

1. CAPSICUM caule herbaceo, pedunculis uniflo-
 ris. b. m. 111. *Le corail des jardins.*
Capicum majus vulgatus. mag. hort. 41.
- * PHARM. *Piperis indici* fructus. Vis acerrima,
 tussiva, orexica, subinflammatoria.
- Obs. In hortis variat (*uti melongena*) fructu oblongo

aut sphærico, rubro, flavo, aut cœrulecente; erecto aut propendente. *Tour. mag. hort.* 41.

LYCIUM.

Cor. tubulosa : *fause clausâ filamentis barbatis. bacc. 2-locularis.*

Frutex. fol. carnosa integerrima. fulc. aculei stipulares.

Europæum.

1. LYCIUM foliis cuneiformibus. *b. m. 111.*

Rhamnus cortice albo monspeliensis. *mag. Bot. 221. hort. 172.*

OBS. Pedunculi axillares plures, uniflori, æquales.

PENTANDRIA

DIGYNIA.

* OPPPOSITIFOLIA.

GENTIANA.

Cor. tubulosa indeterminata. *caps. 2-valvis, 1-locularis : receptaculis 2-longitudinalibus.*

Herba, angulata. fol. sessilis. inflor. indeterminata.

* *Corollis subcampaniformibus.*

Lutea. 1. GENTIANA corollis quinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. *b. m. 108. La gentiane.*

Gentiana major lutea. *mag. hort. 85.*

* PHARM. *Gentiana* radix, extractum. Vis tonica, stomachica, antiæterica anthelmintica, anticaechetica, febribus intermittentibus adversa. In substan. à scrup. 1. ad drach. 1. extract. à gr. x ad scrup. 1.

2. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis
oppositis sessilibus, foliis amplexicaulibus. *b. m.*
128.
3. GENTIANA corollis quinquefidis campanifor-
mibus verticillatis, calycibus subsphataceis. *Linn.*
sp. pl. 227.
- HABITAT in pascuis humidis, entre l'Espinouse &
Lamalou.
4. GENTIANA corollis quinquefidis campaniformi-
bus punctatis, calycibus quinquedentatis. *Linn.*
sp. 227.
- HABITAT cum priori, & à l'Esperou.
5. GENTIANA corolla quinquefida campanulata *Aeulis.*
caule excente. *Linn. sp. pl. 228.*
- Gentiana alpina magno flore. *mag. hort. 85.*
- HABITAT cum priori. Variat foliis latioribus, an-
gustioribusque.
- * * *Corollis infundibuliformibus.*
6. GENTIANA corollis quinquefidis infundibulifor-
mibus, caule ramoso dichotomo, floribus sessili-
bus. *b. m. 129. La petite centaurée.*
- Centaurium minus. mag. Bot. 57. hort. 49. & flore*
purpureo; & albo. ibid.
6. *Centaurium minimum ramosum. mag. Bot. 57.*
purpureum. hort. 49.
- * PHARM. *Centaurii minoris herba, extractum,*
flores. Vis tonica, stomachica, anticachectica,
antiicterica, antitertianaria. In subst. à scrup.
1 ad drach. 1. extractum à gran. 10 ad
scrup. 1.
7. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuli-
formibus, caule simplici apice dichotomo,
floribus pedunculatis.
- Caule simplicissimo, floribus terminalibus sub-* β. *Bistora.*
ternis: intermedio sessili.
- Centaurium pusillum luteum. mag. Bot. 58. hort.*
59.
- Centaurium luteum novum. col. ep. 78. ic. 77.*
bona.

Centaurium luteum pusillum non perfoliatum;
B. pin. 278. *mag. Bot.* 58. *ejusd. hort.* 49.
HABITAT ultra pagum *Ferauls* ad dexteram, in
sylva dicta lou bos de Latour, ubi copiosè flo-
rentem Maio vidimus. *Caulis* palmaris, raro al-
tior, acutè tetragonus, apice dichotomus. *Folia*
uninervia, *sæpius* ovalia, nec ovato-lanceolata
ut in gent. cent. Pedunculi crassi teretes semi-
unciales. *Calyces* acutè quinquangulares, foliolis
subulatis longitudine tubi corollæ. *Corolla* flavæ
unciales. *Capsula* cylindrica paulò longiores. *Ca-*
lyces persistentes à corollis difficile separabiles..
P. caule donatur ferè palmari apice bifloro :
altero terminali: altero lateralì; interdum bifido,
triflorove: floribus lateralibus æqualiter pedun-
culatis: intermedio sessili.

Spicata. 8. **GENTIANA** corollis quinquefidis infundibulifor-
mibus, floribus sessilibus alternis. *Linn. sif. nat.*
tom. 2. 952.

Centaurium minus spicatum album. *mag. Bot.* 59.
hort. 49. *rubrum.* *ibid.*

HABITAT cum priori & in maritimis herbidis.
Occurrit frequens à l'Esperou.

C Y N A N C H U M.

Cor. rotata contorta. *nectar.* cylindricum.
5-dentatum. *folliculi* 2.

Herba volubilis. *fol.* petiolata. *inflor.*
cymosa. *lactesc.* alba.

Monspeliacum. 1. **CYNANCHUM** caule volubili herbaceo, foliis
reniformicordatis acutis. *b. m.* 121. *La scammo-*
née de Montpellier.

Scammonea monspeliaca foliis rotundioribus. *mag.*
Bot. 232.

Apocynum scammoneæ facie monspeliacum foliis
rotundioribus. *mag. hort.* 20.

* **PHARM.** *Scammonium monspeliacum.* Vis ferè ea-
dem ac *scammonii syriaci*, sed debilior.

A S C L E P I A S.

Cor. reflexa contorta. nectar. 5, auri-formia, corniculata. folliculi 2.

Herba subvolubilis. fol. petiolata. inflor. umbellata. lactesc. alba.

1. ASCLEPIAS foliis ovatis basi pubescentibus, caule erecto, umbellis proliferis. *h. m. 122. Le Vincetoxica cum, dompte-venin.*

Asclepias albo flore. *mag. Bot. 30. hort. 23.*

* PHARM. *Asclepiadis, vincetoxici, birundinariae radix, herba, aqua, extractum. Vis pellens, sudorifera, diuretica, antihydropica! ex Linnaeo, & emmenagogia. In subst. à drach. 1 : in infuso aut decocto ab unc. fl. ad unc. 1 : extract. à drach. fl. ad drach. 1. fl.*

2. ASCLEPIAS foliis ovatis basi pubescentibus, caule superne subvolubili. *h. m. 122. Nigra*

Asclepias nigro flore. *mag. Bot. 30. hort. 24.*

* A L T E R N I F O L I A.

C R E S S A.

Cal. 2 - phyllus. cor. hypocrat : limbo reflexo. stam. tubo insidentia. caps. 2-valvis 1-sperma.

Herba. fol. integerrima. inflor. glomerato-racemosa.

1. CRESSA. *h. m. 127.*

Anthyllis. mag. Bot. app. 290. hort. 18.

Creticula

P O L Y G O N U M.

Cal. o. cor. 5-partita calycina. sem. 1, angulatum.

Caul. inflor. fulcr. Vide ejusd. classeos. Octand. tryginiam.

- Amphibium.* 6. POLYGONUM floribus pentandris semidigynis,
staminibus corollâ longioribus. *b. m.* 198.
Potamogeton salicis folio. *mag. Bot.* 213.
Persicaria salicis folio, perennis. *mag. hort.* 157.

P E N T A N D R I A T R I G Y N I A. V I B U R N U M.

Cal. 5 - partitus superus. *cor.* 5 - fida. *bacc.*
1 - sperma.

Arbor. *fol.* opposita. *inflo.* cymosa ter-
minalis.

- Tinus.* 1. VIBURNUM foliis integerrimis ovatis, ramifica-
tionibus subtus villoso - glandulosis. *b. m.* 153.
Le laurier-tin.

Laurus sylvestris corni fæminæ folio hirsuto. *mag.*
Bot. 153. *hort.* 114.

- Lantana.* 2. Laurus sylvestris foliis venosis. *mag.* *hort.* 114.

2. VIBURNUM foliis cordatis serratis venosis subtus
tomentosis. *b. m.* 153. *La viorne.*

Viburnum vulgæ. *mag. Bot.* 275. *hort.* 204.

- Opulus.* 3. VIBURNUM foliis lobatis, petiolis glandulosis.
b. m. 153. *L'obier.*

Sambuco affinis, opulus. *mag. hort.* 177.

S A M B U C U S.

Cal. 5 - partitus. *cor.* 5 - fida. *bacc.* 3 -
sperma.

Arbor. & *herba.* *fol.* opposita composita.

- Ebulus.* 1. SAMBUCUS cymis tripartitis, stipulis foliaceis.
b. m. 154. *L'ieble.*

Sambucus ebulus sive sambucus humilis. *mag. Bot.*
229. hort. 177.

* PHARM. *Ebuli* radix, cortex interior, folia,

flores , semina. Intus vis subnarcotica , draistica , pellens , antihydropica. Extus resolvens anticædematosæ.

2. SAMBUCUS cymis quinquepartitis , caule arbo- *Nigra.*
reo. *b. m. 154. Le sureau.*

Sambucus fructu in umbella nigro. *mag. Bot. 229.*
hort. 177.

- * PHARM. *Sambuci* cortex interior , folia , flores , baccæ , rob. Vis subanodina , pellens alvum , urinam , sudores , lac : cortex antihydropicus † : flores resolventes , antierysipelatosi † : baccæ antidysertericæ : corticis succus ab unc. 1 ad 3.

H E X A N D R I A

M O N O G Y N I A.

C O N V A L L A R I A.

Cal. o. cor. campanulata infera. bacc.
maculosa 3-locularis , 3-sperma.

Herba. inflor. & fol. indeterminata. rad.
nodosa.

1. CONVALLARIA scapo nudo , corollis campa- *Majalis.*
nulatis. *b. m. 176. Le lys de vallée.*

Lilium convallium album. *mag. Bot. app. 301.*
hort. 118.

- * PHARM. *Lilii convallii* flores , aqua. Vis cephalica , nervina , errhina , resolvens , suspecta *Linnæo.* Aqua simplex ad unc. 4 ; spirituosa ad unc. 1.

HABITAT à St. Guilhen le désert , à la Serane.

2. CONVALLARIA foliis verticillatis. *b. m. Verticillatae.*
177.

3. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus , *Polygonatum*
caule ancipti , pedunculis axillaribus unifloris.
b. m. 177. Le sceau de Salomon.

Polygonatum latifolium vulgare. mag. Bot. 208.
hort. 162.

40 MONOPETALI

* PHARM. *Sigilli Salomonis* radix. Vis vulneraria; astringens, antiherniosa.

Multiflora.

4. CONVALLARIA foliis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. b. m. 177.
Polygonatum latifolium maximum. mag. hort. 162.

H Y A C I N T H U S.

Cal. o. cor. campanulato-globosa infera:
pori 3 melliferi supra germen.

Herba scaposa. rad. bulbosa.

- Comosus.* 1. HYACINTHUS corollis angulato-cylindricis, summis sterilibus longius pedicellatis. b. m. 178.
Hyacinthus maximus botryoides. mag. Bot. 133.
Hyacinthus botryoides maximus comâ cæruleâ. mag. hort. 100.

Botryoides.

2. HYACINTHUS corolli globosis uniformibus, foliis canaliculato-cylindricis. b. m. 179.
Hyacinthus vernus botryoides cæruleus minor, angustioribus foliis, & odoratius. mag. Bot. 133.
hort. 100.

A S P H O D E L U S.

Cal. o. cor. 6-partita infera. neclar. ex valvulis 6-staminiferis germen tegentibus.

Herba. rad. tuberosa fasciculata.

Ramosus.

1. ASPHODELUS scapo nudo, foliis ensiformibus carinatis lævibus. b. m. 175. *L'aspodele.*
Asphodelus albus ramosus mas & non ramosus. mag. Bot. 31. hort. 24.
HABITAT copiosissimè citra & ultra amnem in saxosis, à Grabels & à Selleneuve. Folia intericta subtriquetra & carnosiora,

HEXANDRIA

DIGYNIA.

POLYGONUM.

Cal. cor. sem. caul. inflor. Vide ejusdem
classeos *Octandr. trigyniam*....

7. POLYGONUM floribus hexandris semidigynis, *Hydropiper*:
foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *b. m.* 198.
Le poivre d'eau.
Persicaria urens seu *hydropiper*. *mag.* *Bot.* 201.
hort. 157.
* PHARM. *Persicariae urentis* herba. Intus vis diuretica. Extus resolvens, abstergens, antiœdematoſa.
8. POLYGONUM floribus hexandris digynis, spicis *Persicaria*:
ovatis oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ci-
liatis. *b. m.* 198. *La persicaire.*
Persicaria mitis maculosa & non *maculosa*. *mag.*
Bot. 201. *hort.* 157.
* PHARM. *Persicariae mitis* herba. Vis astringens,
vulneraria, abstergens, antigangrænodæa. *Tourn.*

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

VACCINIUM.

Cal. 4-dentatus superus. cor. 4-fida.
bacc. 4-locul. polysperma.

Fruticulus. fol. alterna petiolata. inflor.
solitaria.

9. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis ovatis *Mystillus*:
ferratis deciduis, caule angulato, *b. m.* 196.

42 *M O N O P E T A L I*

Lairelle ou myrtille. Vitis idaea angulosa. *mag. hort.* 206.

* PHARM. *Myrtilli baccæ, rob.* Vis subrefrigerans, subastringens, antidiarrhoïca.

Uliginosum. 2. *VACCINIUM* pedunculis unifloris, foliis integrerrimis ovalibus basi ciliatis... *Linn. sp. 352.*

Vitis idaea foliis subrotundis exalbidis. *Tour. 608.*

HABITAT in uliginosis à l'Esperou, ubi primus æstate præterit adinvenerat D. D. de Soubri lugdunensis, Zoologiae & Botanices indefessus ac eximus cultor.

E R I C A.

Cal. 4-phylloides inferus. *cor.* 4-fida. *capf.* 4-locularis.

Arbor. & *frutex.* *fol.* sessilis, opposita, terna, quaterna, quina.

* *Antheris bicornibus.*

Vulgaris. 1. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis. *b. m. 194. La bruyere.*

Erica vulgaris glabra. *mag. Bot. 90. hort. 74. & hirsuta. ibid.*

Scoparia. 2. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis longioribus, foliis patentibus ternis, ramis tomentosis. *b. m. 195.*

Erica scoparia flosculis herbaceis. *mag. Bot. 90. hort. 74.*

Viridi-purpurea. 3. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis longioribus, racemis corymbosis secundis, folii ternis. *b. m. 195.*

Erica major floribus herbaceo-purpurascensibus. *mag. Bot. 90. hort. 74.*

Cinerea. 4. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis racemosis ovatis, foliis ternis linearibus glabris. *b. m. 195.*

Erica humilis cortice cinereo, arbuti flore. *mag. hort. 74.*

*Erica ternis per intervalla ramulis. mag. Bot. 91.
hort. 74.*

5. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis longioribus, foliis quaternis patentissimis, caule subarboreo tomentoso. *h. m. 195.* *Arboresc.*

Erica maxima alba. mag. Bot. 90. hort. 74.

** *Antheris simplicibus obtusis emarginatis.*

6. ERICA antheris simplicibus bifidis exsertis, corollis campanulatis longioribus, foliis quinis linearibus patentibus. *h. m. 195.* *Multiflora.*

Erica juniperifolia dense fruticans narbonensis. mag. Bot. 90. hort. 74.

D A P H N E.

*Cal. o. cor. 4 - fida marcescens. bacc.
1-sperma pulposa.*

*Frutex. fol. sparsa conferta integerrima
sessilis.*

OBS. In prioribus 2 generibus, stamna receptaculo incerta, in isto autem & sequenti, tubo corollæ affixa sunt.

* *Floribus lateralibus.*

1. DAPHNE floribus sessilibus ternis axillaribus, foliis lanceolatis, caulibus simplicissimis. *h. m. 196. Le bois gentil.* *Mezereyn.*

*Thymelæa lauri folio deciduo sive laureola fæmina.
mag. hort. 195.*

2. DAPHNE floribus sessilibus axillaribus, foliis lanceolatis glabris. *h. m. 196.* *Thymæla.*

Thymelæa foliis polygalæ glabris. mag. Bot. 305.

3. DAPHNE racemis axillaribus, foliis lanceolatis glabris. *h. m. 196. La laureole male.* *Laureola.*

*Laureola semperfirrens flore viridi, seu laureola
mas. mag. Bot. 152. hort. 113.*

* PHARM. *Mezerei cortex, folia, baccæ. Vis inflammatoria, draistica, malè tuta. Cortex & folia à gran. 6 ad 12. baccæ. n°. 3 aut 4.*

** *Floribus terminalibus.**Gnidium.*

4. DAPHNE paniculâ terminali , foliis linearî lanceolatis acuminatis. *b. m.* 196.

Thymelæa monspeliaca. *mag. Bot.* 252.Thymelæa foliis lini. *mag. hort.* 195.*Cneorum.*

5. DAPHNE floribus congestis terminalibus sessilibus , foliis nudis lanceolatis. *Linn. sp.* 357.

Daphne humifusa foliis oblongis flores sessiles subcinctentibus. *sauv.* 57.Thymelæa affinis facie externâ. *mag. hort.* 195.

HABITAT à l'Esperou.

S T E L L E R A.

*Cal. o. cor. 4-fida. sem. 1 , rostratum.**Herba rigescens. fol. rigida alterna sessilis integerrima.**Pafferina.*

1. STELLERA foliis linearibus , floribus 4-fidis. *b. m.* 197.

Lithospermum linariæ folio germanicum. *mag. Bot.* 164.Sanamunda annua linariæ folio. *mag. hort.* 178. *ejusd. char.* 150.

O C T A N D R I A

D I G Y N I A.

G E N T I A N A.

*Cal. 8-partitus. cor. 8-fida. caps. caul. fol. inflor. Vide suprà ejusdem classeos Pentandriam digyniam.**Perfoliata.*

12. GENTIANA corollis octandris , foliis perfoliatis. *b. m.* 129.

Centaurium luteum perfoliatum. *mag. Bot.* 57. *hort.* 49.

OBS. Variat foliis ternis, calycibus campanulatis
8-dentatis vel 8-partitis.

O C T A N D R I A

T R I G Y N I A.

P O L Y G O N U M.

Cal. o. cor. 5-partita calycina. sem. 1,
angulatum. suffruticulus & herba. fol.
alterna. fulc. stipulæ vaginantes.

- 1. POLYGONUM caule simplicissimo monostachyo, *Bistorta.*
foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *h. m.*
198. *La bistorte.*
Bistorta major radice minùs intortâ. *mag. hort.* 33.
& minor. *ibid.*
- * PHARM. *Bistorta* radix. Vis adstringens, ischæma, antidiarrhoïca, antileucorrhœïca. In subst. à scrup. 1. ad drach. 1 : ab unc. ff, ad unc. 1.
cocta in aquæ lib. 3.
- 2. POLYGONUM floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule herbaceo procumbente. *h. m.* 199. *La renouée ou trenasse.*
Datur foliis linearibus.
Polygonum latifolium. *mag. Bot.* 209. *hort.* 162.
- 3. Polygonum angustifolium. *mag. Bot.* 209. *hort.* 162.
- * PHARM. *Centinodæ* herba, aqua. Vis adstringens, vulneraria, ischæma, antidysenterica + Chomel.
- 3. POLYGONUM floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule stipulis obducto fruticoso. *h. m.* 199.
Polygonum maritimum latifolium. *mag. Bot.* 209.
hort. 162.
- 4. POLYGONUM foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, semen angulis æqualibus. *h. m.* 199. *Le bled noir, ou sarrasin.* *Fagopyrum.*

- Convolvulus.* 5. *POLYGONUM* foliis cordatis, caule volubili; floribus planiusculis. *Linn. sp. 364.*
Fagopyrum vulgare scandens. mag. hort. 77.
Convolvulus minor semine triangulo. mag. Bot. 75.
HABITAT in arvis & vineis, à Grammont, Selle-neuve, Castelnau.

O C T A N D R I A TETRAGYNIA.

A D O X A.

Cal. 2-fidus inferus. cor. supera 4-f. 5-fida.
bacc. 4-f. 5-locularis calyce coalita.
Herba. fol. digitata opposita. inflor. glo-
merata terminalis.

- Moschatel-* 1. *ADOXA. b. m. 200.*
lina. Obs. Flores laterales 5-fidi, decandri, pentagyni; terminales quadrifidi octandri tetragyni numero plures.

D E C A N D R I A MONOGYNIA.

ARBUTUS.

Cal. 5-partitus. cor. ovata basi diaphanâ.
bacc. 5-locularis.
Frutex. fol. alterna. inflor. racemosa ter-
minalis.

- Unedo.* 1. *ARBUTUS caule erecto, foliis glabris serratis,*
baccis polyspermis. h. m. 208. L'arbousier.
Arbutus folio serrato. mag. Bot. 26. hort. 21.
Uva ursi. 2. *ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis in-*
tegerrimis. h. m. 208. La bousserole.

* PHARM. *Uva ursi* folia. Vis adstringens, ulceri
renum adversa, & dolores à calculo mirè se-
dans. *Haën. rat. med. part. v.* pulvis ad drach.
ff. quolibet die.

D E C A N D R I A

P E N T A G Y N I A.

C O T Y L E D O N.

Cal. 5-fidus. squamæ nectariferæ. 5 ad
basin germinis. *caps.* 5.

Herba. fol. succulenta petiolata pettata
inflor. racemosa.

1. COTYLEDON foliis cucullatis ferrato-dentatis
alternis caule ramoso, floribus erectis, fructibus
recurvis. *h. m.* 220. *Le nombril de Venus.*

Cotyledon major. *mag. Bot.* 80.

Cotyledon vera radice tuberosâ. *mag. hort.* 64.

* PHARM. *Umbilici Veneris* folia. Extus vis refri-
gerans, emolliens antiphlogistica, sedi succe-
danea.

OBS. Variat calycibus corollisque 6-fidis dode-
candris.

Adoxa. Vide ejusdem classeos Octandriam tetragyniam.

Umbilicus.

M O N A D E L P H I A

P O L Y A N D R I A.

OBS. Genera sequentia ita placentatione, radicatione, caules-
centia, foliatione inflorescentia, & fulcratione affinia
sunt, ut solo calyce distinguantur: an sufficienter?

Malvaceæ
authorum.

L A V A T E R A.

Cal. duplex: exterior 3-fidus. *caps.* lo-
culis 1-spermis verticillatis.

*Frutex & herba. fol. mollis, tomentofo-
pubescens.*

- Triloba.* 1. LAVATERA caule fruticoso, foliis subcordatis subtrilobis crenatis rotundatis, stipulis cordatis, pedunculis unifloris. *b. m.* 349.
Althaea arborescens. mag. Bot. 16.

*Althaea frutescens folio rotundiore incano. mag.
hort.* 12.

- Thuringiaca.* 2. LAVATERA caule herbaceo, fructibus denudatis, calycibus incisis. *b. m.* 349.
Althaea flore majore. mag. Bot. 16. *hort.* 12.

M A L V A.

Cal. duplex : exterior 3 - phyllus. *caps.*
loculis verticillatis 1-spermis.

Herba. fol. glabra, nec tomentosa.

- Rotundifo-
lia.* 1. MALVA caule repente, foliis cordato-orbicula-
tis obsoletè quinquelobis. *b. m.* 348. *La petite
mauve.*

Malva sylvestris folio rotundo. mag. Bot. 173. &
301.

*Malva vulgaris flore minore folio rotundo. mag.
hort.* 128.

* PHARM. *Malva vulgaris minoris* radix, herba,
flores. Vis emolliens demulcens, laxans, anti-
phlogistica, anodyna, antinephritica, antidysurica.

- Sylvestris.* 2. MALVA caule herbaceo, foliis lobatis obtusis,
pedunculis petiolisque pilosis. *b. m.* 348. *La
mauve.*

Malva vulgaris folio sinuato. mag. Bot. 173. & 301.
*Malva vulgaris flore majore, folio sinuato. mag.
hort.* 128.

* PHARM. *Malva vulgaris majoris* radix, herba,
flores. Vis prioris.

- Alcea.* 3. MALVA caule erecto, foliis multipartitis sca-
briusculis. *b. m.* 348. *L'alcée ou mauve sauvage.*
Alcea vulgaris major. mag. Bot. 6. *hort.* 8.

* PHARM.

- * PHARM. *Alcea* radix, herba, flores; malvæ succedanea.
4. MALVA foliis radicalibus remiformibus incisis, caulinis quinquepartitis pinnato - multifidis. *b.* *m. 348.*
- Alcea* folio rotundo laciniato. *mag. hort. 8.*

A L T H Æ A.

Cal. duplex : exterior 9-fidus. *cap.* loculis 1-spermis verticillatis.

Herba. pubescentia in diversis diversa.

1. ALTHÆA foliis cordato-ovatis angulatis crenatis, pedunculis subtrifloris. *b. m. 345.* *La guimauve.* *Officinalis.*
- * PHARM. *Althæa* radix, herba, semina, mucilago, syrpus, tabellæ, pasta. Vis emolliens, demulcens, lubricans, anodina, antiphlogistica, nephralgiae, dysuriæ, tussi, & raucedini adversa.
2. ALTHÆA foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis, caule suffruticoso. *b. m. 346.* *Cannabina.*
- Alcea pentaphylli* folio vel cannabino. *mag. hort. 8.*
3. ALTHÆA foliis inferioribus subcordatis inciso-crenatis, cæteris trifidis. *b. m. 346.* *Hirsuta.*
- Alcea hirsuta.* *mag. Bot. 6.* seu *villosa.* *ejusd. hort. 8.*
- HABITAT in monte, & ultra montem, à *Cette*, *au Capouladou*, & à *saint Loup.*

A L C E A.

Cal. exterior 6-fidus. *cap.* loculis 1-spermis verticillatis.

Herba. fol. piloso-tomentosa.

1. ALCEA foliis cordatis sinuato-angulosis. *b. m. 346.* *Rosea.*
- La mauve rose*, ou *passeroise.*
- Malva rosea sive hortensis. *mag. hort. 129.*
- * PHARM. *Malva rosea* flores, semina. Vis prioris.

- Ficifolia.* 2. ALCEA foliis palmatis. *b. m.* p. 346. *Autre passe-rose.*
 * PHARM. *Malvae roseæ* semina, flores. Vis prioris.

MONŒCIA PENTANDRIA. XANTHIUM.

Masculi flores. *Cal.* communis imbricatus.
cor. infundibuliformis 5-fida. *recept.*
 paleaceum.

Herba. *fol.* simplex. *inflor.* aggregata
 terminalis. (*masf.*).

Strumarium. 1. XANTHIUM caule inermi, foliis cordato-lobatis, floribus aggregatis. *b. m.* 485. *Le petit glouteron.*

Lappa minor, sive xanthium Dioscoridis. *mag.*
Bot. 150. *hort.* 208.

* PHARM. *Xanthii* herba, semina. Vis pellens, aperiens, resolvens, antiscrophulosa..... flores
feminei plures, axillares, glomerati.

Spinosum. 2. XANTHIUM spinis tridentatis stipularibus, foliis fuscescens libus hastato-trilobis integrerrimis, floribus solitariis. *b. m.* 486.

Xanthium lusitanicum validissimis aculeis munitum, & laciniatum. *mag. hort.* 208. *icon.* 209....

OBS. *Flos femineus alternus, solitarius, laterifolius,*
sessilis.



MONŒCIA POLYANDRIA.

JUGLANS.

Mas. Ament. cylindricum. *cal.* squamæ-formis 1-phyllus. *cor.* 6-partita. *flam.* 18.

Fem. *cal.* 4-fidus superus. *cor.* 4-partita. *styl.* 2. *drupa* nucleo sulcato.

Arbor. *fol.* composita alterna: mas. *inflor.* amentis sparsis subternatis: fem. flores distincti gemini ad apicem *gemmæ* ramiferæ.

1. JUGLANS foliolis ovalibus glabris subserratis *Regia*, subæqualibus. *b. m.* 492. *Le noyer.*

Nux juglans regia vulgaris. *mag. Bot.* 187. *bort.*
^{144.}

* PHARM. *Juglandis nucis*, dissepiメントum, oleum, aqua. Vis stomachica, emmenagoga, antihysterica, anticolicalis.

POTERIUM.

Mas. *Cal.* 4-phyllus. *cor.* 4-partita. *flam.* 30-40.

Fem. *Cal.* & *cor.* maris. *pist.* 2. *bacc.* (2-sperma) è tubo corollæ indurato.

Herba. *fol.* composita alterna.

1. POTERIUM inerme, caulis subangulosus. *b.* *Sanguisorba*, *m. 490.*

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. *mag. Bot.*
^{204.}

Pimpinella sanguisorba lævis. mag. hort. 158. & hirsuta. ibid.

β. Pimpinella sanguisorba minor, semine majore & crassiore. mag. Bot. 205. hort. 159.

* PHARM. *Pimpinelle italicæ minoris* herba. Vis tonica, vulneraria, diuretica, ischæma?

MONŒCIA SYNGENESIA.

MOMORDICA.

Maf. *Cal.* 5 - fidus. *cor.* 5 - partita. *filam.* 3.

Fem. *Cal.* & *cor.* maris. *stylus* 3 - fidus. *pomum* elasticè diffiliens.

Herba. *inflor.* subracemosa (*maf.*) axillaris... (*semina.*) flosculo solitario, longè pedunculato, axillari, ad latus racemi masculi.

Elaterium. 1. MOMORDICA pomis hispidis, cirrhis nullis. b. m. 497. *Le concombre d'âne.*

Cucumis sylvestris, asininus dictus. mag. Bot. 81. hort. 61.

* PHARM. *Cucumeris asinini dicti* radix, elaterium viride; album. Vis draistica, emmenagogia, abortiva, hydragoga, antihydropica †, resolvens. *Radix* à gran. 15 ad 30. *Elaterium viride* ad scrup. 1; *album* à gran. ss. ad gran. 2, imo 3, 4 gradatim ac cautè.

CUCURBITA.

Maf. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-fida. *filam.* 3.

Fem. *Cal.* & *cor.* maris. *pist.* 5 - fidum. *pomi* semina margine tumido.

*Herba. inflor. axillaris solitaria : femineo
flore inter tertium & quartum quem-
libet masculum. fulc. cirrus lateri-
folius.*

Obs. Flores omnes axillares solitarii , quorum series (*sepius*) ita se habet ut inter quemlibet tertium & quartum florem masculum adsit feminineus ; ergo alter inter 6um. & 7um. , 9um. & 10um. ; & sic deinceps , servato ferè semper eodem fructificatio-
nis ordine.

1. CUCURBITA foliis lobato - pinnatifidis : lobis *Citrullus*
obtusis. h. m. 497. *La citrouille.*
Anguria *citrullus* dicta. mag. hort. 16.
* PHARM. *Citrulli* semina. Vis cucurbitæ.
2. CUCURBITA foliis subangulatis cordatis to-
mentosis , basi subtus biglandulosis. h. m. 497. *Lagenariae*
La calebasse.
Cucurbita *lagenaria*. mag. hort. 64.
3. CUCURBITA foliis lobatis , pomis levibus. h. *Pepo*.
m. 497. *La courge.*
Pepo vulgaris. mag. hort. 155.
* PHARM. *Cucurbitæ* caro , semina: Vis demul-
cens , refrigerans , febribus putridis , pervigilio ,
nephritidi , disuriæ adversa. sem. ab unc. ff. ad
unc. I.
4. CUCURBITA foliis lobatis , pomis dépresso-
nodosis , caule erecto. h. m. 497. *Le bonnet*
d'Eleteur. *Melopeos*

C U C U M I S.

Mas. *Cal.* 5 - dentatus. *cor.* 5 - partita.
" *filam.* 3.

Fem. *Cal.* & *cor.* maris. *pist.* 3 - fidum.
pomi semina arguta.

Herba. inflor. & fulc. ut in priori.

Obs. Cucumeris & cucurbitæ genera , cotyledonibus
iisdem , caulescentia eadem , foliatione , inflores-

D iij.

centia , fulcris , & ipsamet fructificatione gaudere ,
an ergo ex seminibus nota essentialis ?

Melo. 1. CUCUMIS foliorum angulis rotundatis , pomis
torulosis. *b. m. 498.* *Le melon.*

Melo vulgaris cortice aspero & rugoso. *mag. hort.*
134. & *lævi. ibid.*

* PHARM. *Melonis* caro , semina. Vis cucurbitæ.

Sativus. 2. CUCUMIS foliorum angulis rectis , pomis oblongis
scabris. *b. m. 498.* *Le concombre.*

Cucumis sativus vulgaris. mag. hort.

* PHARM. *Cucumeris* caro. Vis cucurbitæ.

B R Y O N I A.

Maf. Cal. 5-dentatus. *cor.* 5-partita. *fl-*
lam. 3.

Fem. Cal. & *cor.* maris. *styl.* 3-fidus. *bacc.*
subglobosa polysperma.

Herba. *inflor.* axillaris subracemosa. *fulc.*
cirrus subaxillatis.

Alba. 1. BRYONIA foliis palmatis utrinque calloso. scabris. *b. m. 498.* *La bryone ou couleuvrée.*

Bryonia alba alpera baccis rubris. *mag. Bot.* 39.
hort. 35.

* PHARM. *Bryonia* radix , succus , aqua , syrpus , extractum , baccæ. Vis purgans , anthelmintica , emmenagogue , antihydropica , antiasthmatica , antiepileptica , antimaniaca , antiscorphulosa. *Extractum* resolvens. *Succus* radicis à drach. 2 ad unc. fl. *radicis pulvis* à scrup. 1 ad drach. 1.. *Radix* infusa aut decocta à drach. 3 ad 6.. *syrpus* ad unc. 1.. *extractum* à drach. fl. ad drach. 1.



D I C C I A
M O N A N D R I A.
N A J A S.

Mas. *Cal.* 2 - fidus. *cor.* 4 - fida : *anthera* erecta sessilis.

Herba immersa. *fulc.* aculei in caule sparsi.

1. NAJAS. *b. m.* 500. *La nayade.*

Martine

D I C C I A
O C T A N D R I A.
L A U R U S.

Mas. *Cal.* 0. *cor.* calycina 4 - fida. *filamenta* interiora glandulifera. *nectar.* glandulis bifetis circa germen.

Fem. *Cal.* & *cor.* maris. *styl.* simplex. *stigm.* obtusum. *drupa* 1 - sperma.

Arbor. *fol.* integerrima. *inflor.* mas. & fem. utraque, axillaris, subcorymbosa, pedunculis bifidis, binatis ; *ramus* inter peduncularis.

2. LAURUS foliis lanceolatis venosis perennanti-
 bus, floribus dioicis 4 - fidis. *b. m.* 201. *Le Nobilis.
 laurier.*


Laurus vulgaris. mag. Bot. 152. *hort.* 114.

* PHARM. *Lauri baccæ, oleum stillatitium, coc-*

D ix

tum, folia. Vis calefaciens, stomachica, emmenagogia, carminativa, anticolicalis, resolvens, antidolorifica. *Oleum stillatitium* à gutt. 3 ad 6.. *folia* infusa n°. 6.. *pulvis* ad drach. 1... in clysteribus *bacca* ad manip. 1.. aut *oleum coctum* ad unc. 1.

OBS. Vernat laurus Septembri, flores expandit in fine Martis, Augusto maturat fructus.



Classis II.

M O N O P E T A L I
I R R E G U L A R E S.

M O N A N D R I A

* *MONOGYNIA.*

VALERIANA. s. 6.

D I A N D R I A

* *MONOGYNIA.*

SALVIA.

LYCOPUS.

ROSMARINUS.

VERONICA.

GRATIOLA.

PINGUICULA.

UTRICULARIA.

T R I A N D R I A

* *MONOGYNIA.*

GLADIOLUS.

VALERIANA.

** *DIGYNIA.*

ALOPECURUS.

*** *TRIGYNIA.*

MONTIA.

*M O N O P E T A L I
T E T R A N D R I A*

* *MONOGYNIA.*

V E R B E N A.

G L O B U L A R I A.

D I P S A C U S.

S C A B I O S A. 1. 2. 3. 4. 5.

P E N T A N D R I A

* *MONOGYNIA.*

L Y C O P S I S.

E C H I U M.

V E R B A S C U M.

C O R I S.

H Y O S C Y A M U S.

L O N I C E R A.

D I D Y N A M I A

* *GYMNOSPERMIA.*

A. *CALYCES 2-LABIATE.*

S C U T E L L A R I A.

T H Y M U S.

P R U N E L L A.

O R I G A N U M.

C L I N O P O D I U M.

M E L I T T I S.

M E L I S S A.

T E U C R I U M.

S I D E R I T I S. 5.

B. *CALYCES SUB 5-FIDIA.*

G L E C H O M A.

M E N T H A.

S I D E R I T I S.

LAVANDULA.

TEUCRIUM.

AJUGA.

PHLOMIS.

BETONICA.

LAMIUM.

GALEOPSIS.

STACHYS.

NEPETA.

MENTHA.

SATUREJA.

BALLOTA.

MARRUBIUM.

** ANGIOSPERMIA.

A. CALYCES 2-FIDÆ.

OROBANCHE.

ACANTHUS. EX LINNÆO?

B. CALYCES 4-FIDÆ.

EUPHRASIA.

RHINANTHUS.

MELAMPYRUM.

C. CALYCES 5-FIDÆ.

SCROPHULARIA.

DIGITALIS.

ERINUS.

ANTHIRRINUM.

PEDICULARIS.

LINNÆA.

VITEX.

60 *MONOPETALI IRREGULARES.*

DIADELPHIA

* *HEXANDRIA.*

FUMARIA.

** *DECANDRIA.*

TRIFOLIUM. 18. 19. 20. 21. 22.

GYNANDRIA

* *HEXANDRIA.*

ARISTOLOCHIA.

MONOCIA

* *TETRANDRIA.*

Femina ap- *BETULA,* *maſ....*
petala.



MONOPETALI IRREGULARES.

M O N A N D R I A *M O . N O G Y N I A .*

V A L E R I A N A .

Cal. cor. sem. fol. Vide ejusdem classeos
Triand. monogyniam.

- 5. VALERIANA floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. *b. m. p. 21. La valeriane rouge.* *Rubrae* 15
 - 8. Valeriana foliis lanceolato-linearibus integerrimis. Valeriana rubra angustifolia. *Bot. mons. 273. hort. 202.*
 - 6. VALERIANA floribus monandris, foliis pinnatifidis. *b. m. 21.* *Calcitrapæ*
Valeriana foliis calcitrapæ. *mag. hort. 201. Bot. 263.*
- HABITAT frequens circa montem Cetium, & in fabulctis.. à Castelnau.

D I A N D R I A

M O N O G Y N I A .

* *G Y M N O T E T R A S P E R M A E.*

S A L V I A .

Cal. 2-labiatus $\frac{3}{2}$. cor. ringens. filamenta transversim pedicello affixa.

Herba. 4-gona. inflor. terminalis verticillata. fulc. bracteæ. 2.

Officinalis. 1. SALVIA foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. *b. m. p. 17.*
La sauge.

Salvia major. Bot. mons. 228. hort. 177.

* PHARM. *Salvia herba, aqua, flores, oleum stillatitium, coctum, conserva. Vis cephalica, nervina, tonica, stomachica, adstringens, ... aqua ab unc. 2 ad 4...conservâ à drach. fl. ad drach. i. ... oleum stillatitium à gutt. 2 ad 6 intus.*

Pratensis. 2. SALVIA foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexi-caulibus, verticillis subnudis, corollis galeâ glutinosâ. *b. m. p. 18. L'orval des prés.*

Horminum pratense foliis ferratis. Bot. mons. 133. hort. 99.

* PHARM. *Orvalæ sylvestris folia. antiulcerosa † Garidel.*

Verbenaca. 3. SALVIA foliis ferratis sinuosâ, corollis calyce angustioribus. *b. m. p. 19.*

Horminum sylvestre lavendulæ flore. Bot. mons. 133. hort. 100.

Glutinosa. 4. SALVIA foliis cordato-sagillatis servatis acutis. *b. m. 19. La sauge de montagne. Horminum glutinosum. mag. hort. 93.*

Sclarea. 5. SALVIA foliis rugosis oblongo-cordatis ferratis; floralibus calyce longioribus concavis acuminate. *b. m. 19. La toute-bonne horminum sclarea dictum. Bot. mons. 133. hort. 99.*

* PHARM. *Sclarea herba. Vis salviæ, ast fortior, exhilarans, antispasmodica, antihysterica, anticolicalis, antileucorrhœica, sternutatoria, resolvens, antiulcerosa †. Extus & intus, in infuso, decocto.*

L Y C O P U S.

Cal. æqualis. cor. 4-fida subæqualis: lacinia unica emarginata. stam. distantiæ. sem. retusa.

Herba 4-gona. *inflor.* verticillata axillaris sessilis.

1. LYCOPUS foliis ovatis sessilibus basi sinuato-pinnatifidis superne - serratis. *b. m.* 15. *Le pied de loup.* *Palustris.*

Marrubiis affinis. *mag. hort.* 131.

Marrubium palustre glabrum. *Bot. mons.* 174.

2. Lycopus foliis subtrus subtomentosis. *Tomentosus.*

Marrubium palustre hirsutum. *Bot. mons.* 174.

R O S M A R I N U S.

Cal. 2-labiatus $\frac{1}{2}$. *cor.* ringens : labio superiore 2-partito. *filamenta* longa distantia curva.

Frutex. fol. margine revoluta , subtrus tomentosa , linearis.

1. ROSMARINUS foliis sessilibus. *b. m. p.* 17. *Le Officinalis; romarin.*

Rosmarinus coronarius fruticosus. *Bot. mons.* 223.
hort. 174.

* PHARM. *Rorismarini* sive *anthos* herba , flores , conserva , oleum stillatitium , aqua reginæ Hungaricæ. Vis cephalica , antihysterica , nervina , tonica , excitans , cardiaca , resolvens , antiasthmatica , antitetianaria , extus & intus , in infuso.. *oleum stillatitium* à gutt. 3 ad 6 , *ex Boerhaavia* anti - epilepticum †.

** *ANGIOSPERMÆ.*

V E R O N I C A.

Cal. 4-partitus : foliolis 2-majoribus. *cor.* 4-fida rotata : lacinia una minore. *caps.* 2-locularis cordata.

Herba. fol. & *inflor.* indeterminata.

* *Spicatae.*

Spicata. 1. VERONICA spicâ terminali, foliis oppositis, crenatis obtusis, caule ascendente simplicissimo. *b. m. p. 9.*

* PHARM. *Veronica spicata* herba. Vis incidens, aperiens major quam in subsequente.

Officinalis. 2. VERONICA spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis ovatis serratis, caule procumbente. *b. m. p. 9. La véronique, thé de l'Europe.*

Veronica mas supina. Bot. mons. 275. hort. 203.

* PHARM. *Veronica* herba, syrupus, aqua, conserva. Vis vulneraria, incidens diuretica, sudorifera, antiasthmatica, antinephralgica, antiscabiosa, antiulcerosa. Extus in decocto, intus in infuso.

HABITAT in ilicetis à Meurviel, & circa montem Lupi.

* *Racemosæ.*

Alpina. 3. VERONICA foliis oppositis lanceolatis ferrulatis, caule frutescente. *b. m. p. 10.*

Serpentifolia. 4. VERONICA foliis imis oppositis ovatis, summis alternis lanceolatis, racemo terminali. *b. m. p. 9.*

Beccabunga. 5. VERONICA racemis lateralibus, foliis oppositis planis, caule repente. *b. m. p. 10. Le becabunga. Veronica aquatica minor & major folio subrotundo. Tour. 145. mag. hort. 204.*

Anagallis aquatica minor folio subrotundo. Bot. mons. 18.

* PHARM. *Beccabunga* herba, succus, extractum, conserva. Vis antiscorbutica. *Herba ad pug. 2. extractum ad drach. 1.*

Anagallis. 6. VERONICA racemis lateralibus, foliis oppositis lanceolatis serratis, caule erecto. *b. m. p. 10. Anagallis aquatica major folio oblongo. Bot. mons. 18. hort. 204.*

Chamaedrys. 7. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis sessilibus dentatis, foliolis calycinis linearibus. *b. m.*

p. 11.

p. 11. *La véronique des hayes.* Chamædrys spuria angustifolia. Bot. mons. 59.

* PHARM. *Veronicae pratensis, rotundifoliae herba.*
Vis cathartica. Ad man. 1, in aquæ cyatho,
magis incidens, aperiens quam veronicæ 2^e.

8. VERONICA racemis lateralibus, foliolis calycinis *Latifolia.*
ovatis subæqualibus. b. m. p. 11.

Chamædrys latifolia spuria. Bot. mons. 59.
HABITAT *au mont S, Loup,* & vicinis.

* * *Pedunculis unifloris.*

9. VERONICA floribus axillaribus pedunculatis, *Agrestis.*
foliolis calycinis ovatis subæqualibus. b. m. 11.

Alsine chamædryfolia, flosculis oblongis pediculis
insidentibus. mag. Bot. 12.

Veronica flosculis oblongis, &c. mag. hort. 203.

10. VERONICA floribus axillaribus subsessilibus, *Arvensis.*
foliolis calycinis lanceolatis inæqualibus. b. m.
12.

Alsine veronicæ facie, flosculis caulinis adhæren-
tibus. mag. Bot. 12.

Veronica flosculis caulinis adhærentibus. mag.
hort. 203.

11. VERONICA floribus axillaribus pedunculatis, *Hederafolia.*
foliis cordatis planis quinquelobis. b. m. 12.

Alsine hederulæ folio. mag. Bot. 12.

Veronica cymbalariae folio, verna. mag. hort.
203.

12. VERONICA floribus axillaribus pedunculatis, *Triphyllæ.*
foliis inferioribus quinquepartitis, summis tri-
partitis. b. m. 12.

Alsine triphyllæ cærulea. mag. Bot. 12.

Veronica verna trifido vel quinquefido folio. mag.
hort. 204.

G R A T I O L A.

Cal. 5-phillus. cor. 5-fida ringens. Stanz,
2, sterilia. caps. 5-locularis.

Herba, stolonifera. *inflor.* axillaris solitaria. *fulc.* bracteæ 2.

Officinalis. 1. GRATIOLA foliis ovato-lanceolatis supernè serratis, bracteis linearibus. *b. m.* 13. *La gratiola ou l'herbe au pauvre homme.*

Gratiola centoroïdes. *mag. Bot.* 123. *hort.* 94.

* PHARM. *Gratiola herba*. Vis mochlica, emetica, emmenagogia, antelmintica, antihydropica, aperiens. Intus *herba recens* ad man. fl. subincosta in lactis cyatho. *Herba exsiccata* ad drach. 1, in infuso simili, cautè: tutius in clysmate lacteo ad man. 1. incoquitur. Pro calcari in clysmate communi adduntur *stipites* aliquot.

P I N G U I C U L A.

Cal. sub 2-labiatus $\frac{3}{2}$, 5-fidus. *cor.* ringens calcarata. *caps.* 1-locularis.

Herba. fol. simplex, glandulos-pinguis, radicalis. *inflor.* solitaria terminans *scapum.*

Vulgaris. 1. PINGUICULA nectario cylindraceo longitudine petali. *Linn. sp. pl.* 17. *La grassette.*

HABITAT à l'Esperou, à la Louzere. Floret primo vere.

U T R I C U L A R I A.

Cal. 2-phylloë æqualis. *cor.* ringens calcarata. *caps.* 1-locularis.

Herba immersa. fol. pinnato-multipartita: vesiculis sparsis.

Vulgaris. 1. UTRICULARIA nectario conico, pedunculis squamofisis. *b. m.* 14.

Millefolium aquaticum flore luteo galericulato. *mag. Bot. app.* 302.

Linariæ affinis palustris millefolii folio, lenticulato flore luteo. *mag. hort.* 120.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

GLADIOLUS.

Cal. o. cor. supera, 6-petaloidea, ringens: petalis superioribus tribus convergentibus. stam. ascendentia.

Herba. fol. ensiformis disticha. inflor. spicata secunda.

i. GLADIOLUS foliis ensiformibus, floribus distan- *communis.*
tibus. b. m. 25. *Le glaieul.*

Gladiolus floribus uno versu dispositis. *mag. Bot.*
109. hort. 89.

Gladiolus major flore purpuro-rubente. *mag. β. Grandiflorus.*
Bot. 296. hort. 89.

Spicā distichā, floribus alternis. ν. Distichus,

Gladiolus utrinque floridus. *mag. Bot. 110. hort.*
89. & flore albo. ibid.

HABITAT utraque varietas in pratis à Lattes, sed
ν rarius est quam β.

VALERIANA.

Cal. o. cor. 5-fida, basi gibba. sem. I.
inferum.

Herba. fol. opposita. inflor. terminalis
subpaniculata.

i. VALERIANA floribus triandris, foliis caulinis *Phu.*
pinnatis, radicalibus indivisis. b. m. 21. & ly-
ratis. *ibid. La valeriane des jardins.*

Valeriana major odoratâ radice. *mag. hort. 201.*

* PHARM. *Valeriana hortensis* radix. Vis eadem ac
valerianæ sylvestris, quæ usitator est, ac gau-
det vi antiepilepticâ † antihystericâ †, sudori-

ferâ , diureticâ , emmenagogâ , purganti , anti-
asthmaticâ , radicis *pulvis* à drach. fl. , ad drach. j.
fl.. infus. à drach. ij ad unc. fl.

Tripteris. 2. VALERIANA floribus triandris , foliis radicalibus
cordatis , caulinis ternatis lanceolatis ferratis,
b. m. 22.

Valeriana alpina minor. *mag. Bot. 307. hort. 201.*

Locusta. 3. VALERIANA floribus triandris , caule dichoto-
mo , foliis linearibus. *b. m. 22.*

Valerianella semine umbilicato oblongo nudo. *mag.*
Bot. 274. hort. 201.

Olitoria. 5. Foliis lanceolatis integris , fructu simplici. *b. m. 22.*
La mâche , la doucette.

Valerianella arvensis præcox humilis , semine com-
presso. *mag. hort. 202.*

Coronata. 7. Foliis lanceolatis dentatis , fructu 6-dentato. *b.*
m. 22.

Valerianella semine stellato. *mag. Bot. 273. hort.*
202.

Dentata. 8. Foliis oblongis subserratis , fructu tridentato : den-
ticulo extimo majore recurvato. *b. m. 22.*

Valerianella cornucopiaeoides echinata. *mag. Bot.*
273. hort. 202.

Multifida. 6. Foliis imis dentatis , summis linearis-multifidis. *b.*
m. 22.

Valerianella semine umbilicato rotundo nudo.
mag. Bot. 273. hort. 202.

* PHARM. *Valerianellæ* herba. Vis refrigerans , de-
mulcens , laetucæ succedanea.

Mixta. 4. VALERIANA caule tetragonum semi 4-fido , fruc-
tibus hispidis.

Valeriana caule quadrifido , foliis imis bipinnati-
fidis , seminis pappo plumoso. *b. m. 23.*

HABITAT in sylvula en allant à Perauls ; & in
saxosis à Villeneuve & Selleneuve. Prioribus
multò minor & humilior , minùsque ramosa.
Caule primùm simplici , in medio ramulos 4 ex-
serente bifidos tantùm.

TRIANDRIA

DIGYNIA.

ALOPECURUS.

Cal. 2-valvis. *cor.* 1-valvis: *arista* è dorso, prope basin.

Herba. (*gramen*) *inflor.* spica cylindrica flexilis.

1. ALOPECURUS culmo spicato erecto, bulbis superimpositis. *b. m.* 37. *Bulbosus*
2. ALOPECURUS culmo spicato erecto. *b. m.* 38. *Pratenis*
Gramen phalaroides majus sive italicum. mag. Bot.
115. hort.
3. ALOPECURUS culmo infraecto spicato. *b. m.* 38. *Geniculatus*
Gramen typhoides culmo reclinato. mag. Bot.
115. hort. 91.
4. ALOPECURUS paniculâ subspicatâ, glumis scabris, corollis aristatis. *Linn. edit. spl. pl. 2^a.* *Monspeliensis.*
pag. 89.
Alopecurus, *aristatus*, paniculâ erectâ ovatâ, glumis calycinis ovatis aristatis, oris vaginæ foliorum stipulatis. *Goian. b. m.* 37.
Agrostis paniculâ oblongâ, calycibus æqualibus, terminatis aristis longis rectis. *Gerard. flor. gallop.* 80.
Panicum maritimum spicâ longiore villosâ. *Tour. inf.* 515.
Gramen alopecuros majus, spicâ virescente diversâ pilis longioribus. *Barr. icon.* 115. n° 2.
5. ALOPECURUS paniculâ subspicatâ debili, glumis villosis, corollis aristatis. *Linn. spl. pl. edit. 2^a.* *Paniculus*
pag. 90.
Alopecurus, *aristatus*, β. *Goian. b. m.* 37.
Gramen alopecuros minor spicâ longiore. *mag. Bot.*
115. Scheuz. agr. p. 154.

HABITAT copiosè in pratalis gramuntianis cum gratiola, myosaro, lythro thymifolio, necnon ad littora maris & stagnorum subjacentium. *Culmus* palmaris debilis mollis villosus; panicula nutans mollis.

TRIANDRIA

TRIGYNIA.

MONTIA.

Cal. 2-phyllus. *cor.* 5-partita: foliolis alternis 3-minoribus staminiferis. *caps.* 1-locularis, 3-valvis, 3-sperma.

Herba. *fol.* opposita integerrima. *inflor.* axillaris aggregata.

Fontana. I. MONTIA. *b. m. app.* 546.

HABITAT quoque à Alais, in paludosis, & pratis humidis. Variat calycibus triphyllis, corollis pentandris.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

VERBENA.

Cal. 5-dentatus: altero breviore. *cor.* subæqualis, curva. *sem.* 4, nuda.

Herba 4-gona. *fol.* opposita. *inflor.* spicata.

Officinalis. I. VERBENA spicis paniculatis, foliis multifidis, caule simplici. *b. m.* 15. *La verveine.*

Verbenæ communis flote cæruleo, mag. Bot. 275. hort. 202.

* PHARM. *Verbenæ* herba, succus, extractum, aqua. Vis aperiens, febrifuga; extus vulneraria, ophtalmica, resolvens, dolori splenis, lateris adversa. Extract. ad drach. 1.. succus ab unc. 2 ad drach. 4.

GLOBULARIA.

Cal. communis imbricatus: proprius inferus tubulatus. recept. paleaceo. cor. infera: labio superiore 2-partito.

Frutex & herba. inflor. aggregato-capitata.

1. GLOBULARIA caule fruticoso, foliis lanceolatis tridentatis integerrimisque. *h. m.* 60. *Alypum montis Ceti.* *mag. Bot.* 8.

Globularia fruticosa myrtifolio tridentato. *mag. hort.* 89.

Thymelæa foliis acutis capitulo succisæ. *mag. Bot.* 253. *hort.* 89.

HABITAT ponè montem à *Cette*, & à *Lamalou*. Vernaculè *lou pichot senè*.

2. GLOBULARIA caule herbaceo simplici, foliis radicalibus dentatis, caulinis lanceolatis, radicibus perennantibus lignosis. *h. m.* 60. *La globulaire.* *Vulgaris.*

Globularia seu *bellis cærulea* caule folioso. *mag. Bot.* 37.

Globularia bellidi similis. *mag. hort.* 89. Variat flore albo.

DIPSACUS.

Cal. communis polyphyllus: proprius superus. recept. paleaceo asperò columnari. cor. supera 4-fida: extima majore.

Herba. fol. caulinæ connato-vaginans. fulc. aculei sparsi.

- Fullonum.* 1. DIPSACUS foliis sessilibus serratis. *b. m. 61.* *Le chardon à foulon.*
- Sylvestris.* 2. *Dipsacus perianthii communis foliolis capitulo longioribus.*
Dipsacus sylvestris, sive *labrum Veneris*. *mag. Bot. 86. hort. 70.*
3. *Dipsacus sativus*. *mag. hort. 70.* *perianthii communis foliolis capitulo longè brevioribus.*
Dipsacus aristis fructuum hamatis. *Sauv. 156.*

S C A B I O S A.

Cal. *communis polyphyllus* : *proprius superius duplex. cor. supera : recept. paleaceo subsphærico. sem. coronata.*

Herba. inflor. *capitato-dimidiata. fol. opposita, indeterminata.*

- Integrifolia.* 1. SCABIOSA corollis quadrifidis radiantibus, foliis omnibus lanceolatis : inferioribus serratis, summis integerimis. *b. m. 62.*
Scabiosa annua integrifolia sive *folio bellidis*. *mag. Bot. 231.*

- Aryensis.* 2. SCABIOSA corollis quadrifidis radiantibus, caule hispido. *b. m. 62.* *La scabieuse.*
Scabiosa major hirsuta, folio laciniato. *mag. Bot. 230.*
Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum. *mag. hort. 179.*

* PHARM. *Scabiosæ radix, herba, syrpus, aqua.*
Vis alexiteria, sudorifica, expectorans, vulneraria, abstergens, antianthracina... Succus, aqua,
ab unic. 3. ad 6.

- Columbaria.* 3. SCABIOSA corollis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. *b. m. 63.*
Scabiosa minor vulgaris. *mag. Bot. 230. hort. 170.*
- Maritima.* 4. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, calyce brevioribus, foliis pinnatis, summis linearibus integerimis. *b. m. 64.*

Scabiosa maritima parva. mag. Bot. 231. hort. 170.

5. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, foliis bipinnatis linearibus. b. m. 63. *Ochroleuca.*

OBS. Scabiosæ plures variant corollulis pentandris; &c species alias quæ gerunt flosculos quadrifidos regulares, occurunt flosculus radiantibus quadrifidis quinquefidis; & vice versa.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

* *G Y M N O T E T R A S P E R M A E.*

L Y C O P S I S.

Cor. tubus incurvatus: fauce clausâ squamis 5.

Herba. fol. aspera. inflor. laterifolia solitaria.

1. LYCOPSIS foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis, b. m. 86.
Buglossum sylvestre minus. mag. Bot. 40. hort. 35.
2. LYCOPSIS foliis integerrimis, calycibus fructiferis inflatis pendulis. b. m. 86. *Vesicaria:*

E C H I U M.

Cor. campanulata: fauce nudâ.

Herba. fol. aspera. inflor. subspicata.

1. ECHIUM corollis vix calycem superantibus margine villosis. b. m. 86. *Italicum:*

Echium majus & asperius flore albo. mag. Bot. 88.
hort. 71.

Lycopsis monspeliaca floribus albis. hort. reg. bles.

2. Echium asperimum, caule erecto, flore minore.
Sauv. 61.

Echium majus & asperius, flore dilutè purpureo.
mag. Bot. 88. hort. 72.

Lycopsis monspeliaca floribus dilutè purpureis. *hort.*
reg. bleſ.

Vulgare. 2. *ECHIUM* caule erecto simplici, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus.
b. m. 86. *La viperine.*

Echium vulgare. *mag. Bot.* 88. *hort.* 71.

3. *Echium sylvestre* hirsutum maculatum. *mag. Bot.* 88. *hort.* 71.

Creticum. 3. *ECHIUM* calycibus fructiferis distantibus, caule procumbente. *b. m.* 87.

Echium creticum latifolium rubrum. *mag. hort.* 71.
HABITAT præfertim ad margines rivulorum &
Lattes.

* *ANGIOSPERMÆ.*

V E R B A S C U M.

Cor. rotata infera : lacinia altera inæquali. *ſtam.* villosa *caps.* 2-locularis,
2-valvis.

Herba. *inflor.* pubescentiaque in diversis.
diversa.

Thapsus. 1. *VERBASCUM* foliis decurrentibus utrinque tomentosis. *b. m.* 103. *Le bouillon blanc mâle.*

Verbascum flore luteo magno, folio maximo. *mag. Bot.* 274. *hort.* 202.

* *PHARM.* *Verbasci maris* herba, flores. Intus & extus. Vis emolliens anodina, antispasmodica, antitenebrismodæa, antihemorrhoidalis.

Tychnitis. 2. *VERBASCUM* foliis cuneiformibus oblongis. *b. m.* 103.

Verbascum pulverulentum flore luteo parvo. *mag. Bot.* 274. *hort.* 202.

3. *Verbascum femina* flore albo. *mag. hort.* 202.

Phlomoïdes. 3. *VERBASCUM* foliis ovatis utrinque tomentosis: inferioribus petiolatis. *Linn. ſpl. pl. edit.* 1^a. pag. 1194. *edit.* 2^a. 253. *fift. nat.* 931.

Verbascum femina flore luteo magno. *Tour.* 147.

- Verbascum maximum meridionalium odoratum luteum. *B. hist. app.* 3. 871.
- Verbascum luteum aut phlomos vulgaris mas. *Tar-bern. icon.* 561.
- HABITAT copiosè in arvis circa *S. Jean de Vedas* & *Laverune*.
4. VERBASCUM foliis cordato-oblongis petiolatis. *Nigrum.*
b. m. 103. Le bouillon blanc femelle.
- VERBASCUM nigrum flore ex luteo purpurascente. *mag. Bot. 178. hort. 202.*
- * PHARM. *Verbasci feminæ radix, herba, flores.. succedanea speciei 1^æ.*
5. VERBASCUM foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis axillaribus solitariis. *h. m. 103.* *Blattaria.*
- Blattaria flore luteo, folio longo laciniato. *mag. Bot. 38.*
- Blattaria lutea folio longo. *mag. hort. 32.* flore albo. *ibid.*
6. VERBASCUM foliis radicalibus oblongis sinuatis undulatis tomentosis, caulinis cordatis amplexicaulibus nudiusculis. *b. m. 103.* *Sinuatum.*
- Verbascum nigrum folio papaveris corniculati. *mag. Bot. 274. hort. 202.*

C O R I S.

- Cal.* spinosus. *cor.* ringens infera. *stigm.* 5-fidum. *caps.* 1-locularis, 5-valvis.
Subfrutex. *fol.* linearis carnosa integerrima ciliata.

1. CORIS. *b. m. 102.* *Monspelien-sis.*
Coris cœrulea maritima. *mag. Bot. 78. hort. 63.* & flore albo. *ibid.*
- * PHARM. *Coreos* herba, decoctum. Inusitata, attamen eximia ex *Linneo*. Vis pellens, nauseosa, antisyphilitica.

HYOSCYAMUS.

Cor. infundib. obtusa infera. *stam.* inclinata. *caps.* 2-locularis, operculo convexo perpendiculari.

Herba. *fol.* disticha; pilis glutiniferis. *inflor.* axillaris secunda.

Niger. 1. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus. *b. m.* 105.
Hyoscyamus vulgaris & niger. *mag.* Bot. 134. *hort.* 101.

HABITAT copiosè à Bontonet, & au mont S. Loup, ubi Maio florens humanam attingebat altitudinem. Folia radicalia lanceolata laciniiata.

Albus. 2. HYOSCYAMUS foliis petiolatis, floribus sessiliibus. *b. m.* 105. *La jusquiane.*

Hyoscyamus albus major. *mag.* Bot. 134. *hort.* 100.

* PHARM. *Hyoscyami* radix, herba, semina. Visinebrians, phantaistica, venenata, anodina, emolliens, resolvens, antihæmorrhoidalis.

Aureus. 3. HYOSCYAMUS foliis petiolatis, floribus pedunculatis. *b. m.* 105.

Hyoscyamus aureus creticus luteus major. *mag.* Bot. 134. *hort.* 101.

HABITAT à Nîmes, à la Tourmagne.

LONICERA.

Cal. superus parvus. *cor.* supera : tubo longo deorsum gibbo. *ostigm.* capitatum. *bacc.* 2-locularis polysperma.

Frutex. *fol.* opposita. *inflor.* indeterminata.

* PERYCLIMENA caule volubili.

Caprifolium. 1. LONICERA floribus terminalibus verticillatis sessilibus, foliis summis connato-perfoliatis. *b. m.* 101.

Peryclimenum perfoliatum. mag. Bot. 201. hort.

156.

* PHARM. *Caprifolii* herba, aqua. Vis subse-
quentis.

2. LONICERA capitulis ovatis imbricatis termina-
libus, foliis omnibus distinctis. b. m. 101. Che-
vreuille. Peryclime-
num.

Peryclimenum germanicum non perfoliatum. mag.

Bot. 200. hort. 155.

* PHARM. *Caprifolii* herba, aqua. Vis vulneraria,
mundificans, ophtalmica, gargarismica.

** CHAMÆCERASA pedunculis bifloris.

3. LONICERA pedunculis bifloris, baccis dis-
tinctis, foliis integerrimis pubescentibus. b. m.
101. Xylosteum.

Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro.
mag. Bot. 293.

Peryclimenum rectum fructu gemino rubro. mag.
hort. 155.

4. LONICERA pedunculis bifloris, baccis coadu-
natis didymis. b. m. 101. Alpigena;

Peryclimenum alpinum fructu rubro gemino, duo-
bus punctis notato. mag. hort. 156.

HABITAT à Meyrueis cum specie ultima.

5. LONICERA pedunculis bifloris, baccis distinc-
tis, foliis ferratis. Linn. sp. pl. 173. Nigra;

Chamæcerasus alpina fructu nigro gemino. Tour.
609.

HABITAT à l'Esperou.

6. LONICERA pedunculis bifloris, baccis coaduna-
tis globosis, stylis indivisis. Linn. sp. pl. 174. Cærulea;

Chamæcerasus montana, fructu singulari cæru-
leo. Tour. 609.

HABITAT à Meyrueis cum lon. nigra, & alpi-
gena.

D I D Y N A M I A

GYMNOSPERMIA.

OBS. *Caulescentia semper tetragona; foliatio opposita. inflor. s̄epissimè verticillata.*

* *CALYCIBUS BILABIATIS.*

S C U T E L L A R I A.

Cal. ore integro : fructiferus galeæformis, operculatus labio superiore cristato ponè concavo.

Herba. *inflor.* axillaris, opposita, solitaria, pedunculata.

- Galericulata.* 1. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis. *h. m.* 294.
Cassida palustris vulgatior, flore cæruleo. *mag. hort.* 47.

T H Y M U S:

Cal. fauce. villis clausa : fructiferus collo angustatus.

Fruticulus & herba. *inflor.* verticillata, aut verticillato - capitata.

- Serpyllum.* 1. THYMUS floribus capitatis, caulis repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *h. m.* 59. *Le serpolet.*
Serpyllum vulgare repens. *mag. Bot.* 238. *majus. hort.* 183. & minus.
- Cytratus.* β. Serpyllum citri odore. *mag. Bot.* 305. *hort.* 184.
 * PHARM. *Serpylli* herba, aqua, oleum stillatum. Vis cephalica stomachica, antihysterica, resolvens, adstringens, cephalalgiae ex crapulâ aduersa.

2. THYMUS erectus , foliis ovatis revolutis , floribus verticillato-capitatis. *b. m.* 289. *Le thym.*
Thymum vulgare rigidius folio cinereo. mag. Bot.
253. hort. 196.
Thymum supinum candicans odoratius. mag. β. Incanus.
Bot. 254.. hort. 196.
- * PHARM. *Thymi vulgaris* herba , aqua , oleum stillatitium. Vis pellens , corroborans , antiasthmatica , antileucophlegmatica.. *Oleum stillatum* anticolicale , stomachicum , antiodontalgicum ; à gutt. 4 ad 6.
3. THYMUS floribus verticillato-spicatis , caule suffruticoso , foliis linearibus basi ciliatis. *b. m.* 289. *Zigys.*
Serpillum longifolium hispidum. mag. Bot. 239.
hort. 184.
4. THYMUS floribus verticillatis , pedunculis unifloris , caulis erectis subramosis , foliis acutis serratis , calycibus basi ventricosis. *b. m.* 290.
Clinopodium arvense ocyti facie. mag. Bot. 71.
Acinos multis. mag. hort. 4.
5. THYMUS ramis verticillatis longis , foliis ovalibus striatis. *b. m.* 290. *Pulegioides.*

P R U N E L L A.

Cal. fructiferus apice compressus. *filam.*
 omnia basi bifurca : altero apice antherifera.

Herba. fulc. bracteæ oppositæ amplexicaules ciliatæ verticillos contiguos distinguentes.

1. PRUNELLA foliis ovato-oblongis petiolatis. *b. m.* *Vulgaris.*
295. La prunelle.
Prunella major folio non dissecto. mag. Bot. 39.
hort. 34.
Foliis integris subdentatis , spicâ foliis majore. β. Grandiflora;
Prunella cæruleo magno flore. mag. hort. 34.
2. PRUNELLA foliis radicalibus petiolatis integerrimis , caulinis laciniatis. *Laciniata.*

Prunella folio laciniato. *mag.* *Bot.* 40. *hort.* 34.
 * PHARM. *Prunellæ* herba, aqua. Vis vulneraria, adstringens, antianginosa.

Hyssopifolia. 3. PRUNELLA foliis lanceolato-linearibus sessilibus ciliatis. *b. m.* 295.

Prunella hyssopifolia. *mag.* *Bot.* 40. *hort.* 34.

ORIGANUM.

Cal. minimus figuræ incertæ: 2-labiatus:
 2-phyllus: 5-dentatus.

Herba subfrutescens. *fulc.* bracteæ in spicam strobiliformem 4-gonam congestæ flosculos distinguentes.

Creticum. 1. ORIGANUM spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. *b. m.* 288. *L'origan de Crête.*

Origanum monspeliense pulchrum. *mag.* *Bot.* 194. *hort.* 150.

* PHARM. *Origani cretici* spicæ, oleum stillatum. Vis calida, stimulans, stomachica, antiodontalgica.

Vulgare. 2. *Origanum* spicis subrotundis paniculatis conglobatis, bracteis calyce longioribus. *b. m.* 288. *L'origan commun.*

Origanum sylvestre. *mag.* *Bot.* 194.

Origanum vulgare spontaneum. *mag.* *hort.* 149.

* PHARM. *Origani vulgaris* herba, oleum stillatum. Priori succedanea.

Majorana. 3. ORIGANUM foliis ovatis obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. *b. m.* 289. *La marjolaine.*

* PHARM. *Majorana* herba, aqua, oleum stillatum. Vis resolvens, nervina, cephalica, antiepileptica, sternutatoria, coryzæ adversa, stomachica.... *Oleum stillatum* ad gutt. 2. ele Sachari formâ.

CLINOPODIUM.

Stigma acutum compressum.

Herba. inflor. verticillato-capitata terminalis. fulc. bracteæ setaceæ involucriformes innumeræ capitulo subiectæ.

1. CLINOPODIUM capitulis subrotundis hispidis, *Vulgare*,
bracteis setaceis. *h. m. 287. Le basilic sauvage.*
Clinopodium origano simile. mag. Bot. hort. 59.

MELITTIS.

Cal. campanulatus tubo corollæ amplior.
cor. labium superius planum : inferius crenatum. Antheræ per paria cruciatæ.
Herba. inflor. axillaris solitaria pedunculata opposita.

1. MELITTIS. *h. m. 293. La melisse bâtarde, ou de montagne.* *Melysophyllum.*
Lamium montanum melissæ folio. mag. Bot. 149.
Melissa tragi. mag. hort. 133.
* PHARM. *Melisse sylvestris seu melysophylli herba. Vis vulneraria, antiischurica † ex Tournef.*

MELISSA.

Cal. angulatus scariosus : labio superiore ascendentem. cor. labio supremo fornicate 2-fido.

Herba. inflor. pedunculi axillares multiflori.

1. MELISSA racemis axillaribus verticillatis, pedicellis simplicibus. *h. m. 290. La melisse ou citronnelle.* *Officinalis.*

Melissa hortensis. mag. Bot. 175. hort. 133.

* PHARM. *Melissa citrina*. Herba, aqua, oleum fullatitium, conserva. Vis resolvens, emmenagogia, cardiaca, cephalica, antihysterica, antimelancholica.

Grandiflora. 2. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. h. m. 290. *Le calament de montagne*. Calamintha montana præstantior. mag. hort. 38.
* PHARM. *Calamintha magno flore herba*. Vis subsequens.

Calamintha. 3. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. h. m. 290. *Le calament ordinaire*.

Calamintha vulgaris officinarum Germaniae. mag. Bot. 44. hort. 38.

* PHARM. *Calaminthe vulgaris herba*. Vis resolvens, pellens, expectorans, stomachica, antiasthmatica... præstans, exoleta licet.

Nepeta. 4. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus, caule decumbente.. h. m. 291. *Le calament à odeur de pouliot*.

Calamintha pulegii odore, sive nepeta. mag. Bot. 44. hort. 37.

* PHARM. *Calamintha pulegii odore herba*. Vis prioris.

TEUCRIUM.

Cor. stam. caul. vide infrà; calyces quinquefidos. inflor. racemosa secunda.

Scorodonia. 10. TEUCRIUM calycibus bilabiatis infernè ventricosis, racemis secundis, foliis cordatis serratis petiolatis. h. m. 270. *La fausse sauge*.

Scordium alterum, sive salvia sylvestris. mag. hort. 181.

* PHARM. *Scorodonia herba*, flores. Vis scordii vi analogâ, quandoque succedantâ.

SIDERITIS.

Cor. stigm. caul. inflor. vide infrà; calyces quinquefidos. fol. spinulâ terminata.

- J. SIDERITIS herbacea decumbens, calycibus spinosis; labio superiore integerrimo. b. m. 277. Romanz.
 Sideritis verticillaris spinosis. mag. Bot. 241.
 Sideritidis genus verticillaris spinosis. mag. hort. 184.

** CALYCIBUS SUBQUINQUE FIDIS.

G L E C H O M A.

Cal. 5-fidus. Antheræ per paria in crugem conniventes.

Herba, stolonifera. *inflor.* verticillata axilaris subfessilis.

- I. GLECHOMA foliis reniformibus crenatis. b. m. Hederaeæ 280. *Le lierre terrestre.*

Hedera terrestris vulgaris. mag. Bot. 124. hort. 94.

* PHARM. *Hedera terrestris* herba, succus, syrpus. Vis vulneraria abstergens, anticephalaligica, tussi, ulceri interno adversa. syrpus ad unc. 1.. herba ad pug. 1. 2. pro cyatho.

M E N T H A.

Cor. 4-fida subæqualis: lacinia laticre emarginata. *flam.* distantia.

Herba. *inflor.* verticillaris nudis remotis: aut approximatis.

- I. MENTHA floribus spicatis, foliis oblongis serratis. b. m. 279. *La menthe sauvage.* Spicata.

Mentha sylvestris longioribus, nigrioribus, & minus incanis foliis. mag. hort. 134.

Spicis confertis, foliis tomentosis ferratis linearilanceolatis. Longifolia.

Mentha sylvestris folio longiore. mag. Bot. 176. hort. 134.

Foliis ovatis tomentosis, floribus verticillato-spicatis. Rotundifolia.

Mentha sylvestris rotundiore folio. mag. Bot. 175. hort. 134.

Mentha sylvestris rotundiore folio, purpureo flore.
mag. Bot. 175. hort. 174.

* PHARM. *Mentha striata* herba. Vis anthelmintica,
antiasthmatica, emmenagogue.

Aquatica. 2. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis serratis
petiolatis, staminibus corollâ longioribus. b. m.
279. *Le baume ou la menthe aquatique.*

Mentha aquatica, sive *Sisymbrium*. mag. Bot. 175.
hirsutius. hort. 134.

Mentha rotundifolia palustris, seu *aquatica major*. mag. hort. 134.

* PHARM. *Mentha aquatica* herba, succus. Vis stomachica, diuretica, antiemetica, antispasmodica, anticolicalis.

Pulegium. 3. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulis subteretibus repentibus. b. m. 279. *Le pouliot.*

Pulegium latifolium. mag. Bot. 214. hort. 166.

* PHARM. *Pulegium* herba. Vis præcedentium sed fortior, asthmati, tussi convulsivæ adversa.

Cervina. 4. MENTHA floribus verticillatis, foliis linearibus.
b. m. 280.

Pulegium cervinum monspeliense odoratius. mag.
Bot. 214.

Pulegium angustifolium, sive *cervinum*. mag. hort.
166.

Gentilis. 5. MENTHA floribus verticillatis, foliis acutis ovatis serratis, staminibus corollâ brevioribus. b. m.
577. *La menthe des jardins.*

* PHARM. *Mentha hortensis* herba, aqua, extractum, syrpus, oleum. Vis stomachica, antiemetica, antispasmodica, lac resolvens, pellens, antihysterica, carminativa, emmenagogue, sterilitans... extract. à gran. x. ad xx. succus, aqua ad unc. 1. 2. syrpus ad unc. 1.

S I D E R I T I S.

Cor. stam. intra tubum latitantia. *stigmatis lacinia alteram subvaginans.* *Calyces pungentes.*

Herba. *inflor.* verticillata sessilis. *fulc.* bracteæ pungentes.

1. SIDERITIS herbacea erecta hispido-pilosa, foliis summis amplexicaulibus. *b. m.* 277. *Perfoliata.*
2. SIDERITIS foliis lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus. *b. m.* 278. *Hyssopifolia.*
3. SIDERITIS foliis lanceolatis acutis dentatis, bracteis ovatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus, spicis ovatis. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 803. *Scordioïdes.*
- Sideritis monspeliaca scordioïdes. *mag. Bot.* 240. *hort.* 184.
- Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis. *Tour.* 197.
- Sideritis montana scordioïdes tomentosa. *Barr. icon.* 1150. optima.
- Sideritis, *hirsuta*, foliis lanceolatis subdentatis, bracteis cordatis. *Linn. sp. pl. edit.* 1^a. pag. 375. *Gouan. hort. mons.* 278. *Gerard. fl. gallop.* 270.
- β. Sideritis scordioïdes pyrenaica latiore folio. *mag. hort.* 184.
4. SIDERITIS foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, bracteis dentato-spinosis, caule hirto, spicis interruptis elongatis. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 803. *Hirsuta.*
- Betonica, *hirta*, verticillata spinosa, calycibus sub-spinosis. *Linn. sist. Gouan. b. m.* 276.
- Tetrahit caule procumbente, foliis sessilibus. *Gerard. gall.* 272.
- Sideritis hirsuta procumbens. *Tour.* 191.
- Sideritis vulgaris hirsuta. *mag. Bot.* 240. *hort.* 184.

L A V A N D U L A.

Cal. ovatus subintegerrimus. *cor.* resupinata. *stam.* intra tubum corollæ.

Fruticulus. *inflor.* terminalis spicata.

1. LAVANDULA foliis lanceolato-linearibus spiculatis comosâ. *b. m.* 275. *Le stechas.* *Stæchas.*

Stæchas arabica vulgò dicta. mag. Bot. 246. hort. 183.

β. Stæchas arabica cum ligulis albis. mag. Bot. 246. hort. 189.

Obs. Bractæ terminales steriles albæ. Corolla pureæ.

* PHARM. *Stachadis arabicae flores. Vis cephalica, nervina, antiparalytica, antivertiginosa.*

Spira. 2. **LAVANDULA** bracteis calyce brevioribus, floribus verticillato-spicatis, foliis integerrimis. *h. m. 276. La lavande, l'aspic.*

Lavandula latifolia. mag. Bot. 151. hort. 113. angustifolia. ibid.

* PHARM. *Lavandulae flores, semina, oleum esse essentiale; spicæ oleum essentiale. Extus & intus. Vis nervina, cephalica, uterina, antiparalytica, sialagogæ, balbutiei & aphoniae adversa. Flores & semina pulverata à scrup. 1 ad drach. 1... flores etiam in infuso theiformi... aqua stillatitii simplex aut spirituosa, necnon tinctura florum spirituosa ad usque unc. 2... oleum à gutt. 2. ad 6.*

T E U C R I U M.

Cor. labium superius (nullum?) minimum ultra basin 2-partitum, divaricatum. stam. inter ipsius divisuram.

Caul. inflor. fol. & fulcr. indeterminata.

* *Floribus subcapitatis.*

Montanum. 1. **TEUCRIUM** floribus subcapitatis, foliis integrimis lanceolatis. *h. m. 270.*

Podium lavandulæ folio. mag. Bot. 207. hort. 162.

Polium. 2. **TEUCRIUM** floribus subcapitatis, foliis linearibus sessilibus tormentosis apice crenatis. *h. m. 270. Le polium.*

Polium montanum luteum. mag. Bot. 207. hort. 161.

Variegatum. 2. *Polium incanum flore luteo & purpuro-ferrugineo mixto. mag. Bot. app. 311. hort. 161.*

* PHARM. *Polii comæ floridæ. Vis tónica antiauriginosa.*

3. TEUCRIUM capitulis pedunculatis, foliis lan-
- ceolatis crenatis tomentosis, caule erecto. Linn.
- edit. 2^a. sp. pl. 792. Le poniot de mer.*

- β. Polium maritimum erectum monspeliacum. Baub.
- hist. 3. pag. 699. mag. Bot. pag. 207. hort. 162.*
Tour. 208.

HABITAT in monte Cetio, à Maguelone, & in
saxosis circa Selleneuve, Corpouiran.

** *Floribus axillaribus sessilibus.*

4. TEUCRIUM floribus axillaribus solitariis, foliis
lineari-tripartitis integerrimis. b. m. 270. *L'ivette*
ordinaire.

Chamaepitys lutea vulgaris folio trifido. mag. Bot.
61. hort. 54.

* PHARM. *Chamaepityos* herba, flores. Vis aperiens, pellens, nervina, cephalica, antihystericā, emmenagoga, antirhumatismalis, antiarthritica. Datur in infuso.

5. TEUCRIUM floribus axillaribus solitariis sessilibus, *Iva*
foliis linearibus tridentatis sessilibus. b. m. 271.
L'ivette musquée.

Chamaepitys moschata folio serrato. mag. Bot. 61.
hort. 54.

* PHARM. *Iva moschata* herba, flores. Vis praecedentis.

*** *Floribus verticillatis.*

6. TEUCRIUM floribus axillaribus verticillatis pe-
dunculatis senis, calycibus infernè ventricosis,
foliis pinnatifidis. b. m. 272. *Botrys.*

Chamædrys folio laciniato. *mag. Bot. 59. hort. 52.* *Scordium.*

7. TEUCRIUM floribus verticillatis pedunculatis
quaternis, calycibus ventricosis, foliis ovatis
sessilibus dentatis. b. m. 273. *Le scordium ou*
chamarras.

Scordium. mag. Bot. 233. hort. 161.

* PHARM. *Scordii* herba, syrpus, aqua stillativa. Vis diaphoretica, alexiteria, anthelmintica.

aperiens, pellens, antigangrænosa, abstergens.
Flores & folia ad manip. 1. pro aquæ pinta..
syrupus ad unc. 1.. *aqua stillatitia* ab unc. 2 ad
6... *Diascordii Fracastorii*. Vis hypnotica, anodina,
antidiarrhoica: datur à scrup. 1. ad drach. 1.

- Chamædrys.* 8. TEUCRIUM floribus verticillatis pedunculatis quaternis, calycibus ventricosis, foliis ova-
tis inciso-crenatis petiolatis. b. m. 273. *La ger-
mandrée ou petit chêne.*

Chamædrys vulgò vera existimata. mag. Bot. 58.
hort. 51.

- * PHARM. *Chamædryos* herba. Vis corroborans,
incidens, pellens, diuretica, sudorifera, em-
menagoga, febrifuga, antiarthritica, antiscro-
phulosa, stomachica. *Herba* ad pug. 1. 2. in
infuso... *pulvis* ad usque drach. 1.

- Flavum.* 9. TEUCRIUM floribus verticillatis pedunculatis
senis, calycibus ventricosis, foliis subcordatis
crenatis petiolatis, bracteis concavis intèger-
rimis. b. m. 273.

Teucrium vulgare fruticans. mag. Bot. 249.

Chamædrys frutescens, teucrium vulgò. mag. hort.
51.

A J U G A.

Cor. labio superiore minimo staminibus
breviore.

Herba, simplicissima. *inflor.* verticillis ap-
proximatis.

- Reptans.* 1. AJUGA stolonibus reptantibus. b. m. 269. *La
bugle.*

Consolida media pratensis cærulea. mag. Bot. 73.

Bugula. mag. hort. 34.

- * PHARM. *Bugula*, *consolidæ mediæ*, herba, suc-
cus, flores. Vis vulneraria, sub-astringens, itchæ-
ma. *Flores* ad pugill. 1. 2.. *folia* ad man. 1.. *succus*
depuratus ab unc. iv ad vi.

- Pyramidalis.* 2. AJUGA tetragono-pyramidalis. Linn. sif: nat.

Consolida media pratensis hirsuta. mag. Bot. 294.

Bugula sylvestris villosa. mag. hort. 35.

HABITAT in umbrosis au Capouladou, la Serane,
& à Lamalou.

P H L O M I S.

Cal. angulatus. cor. labio superiore compresso, incumbente, villoso.

Suffrutex. fulc. bracteæ involucriformes verticillis subjectæ.

1. PHLOMIS foliis lanceolatis tomentosis, floralibus ovatis, involucris setaceis lanatis. h. m. 286. *Lychnites*
Verbascum sylvestre monspeliacum, flore luteo
hiante. mag. Bot. 275.
Phlomis lychnites. mag. hort. 159.
2. PHLOMIS involucris setaceis hispidis, foliis ova-
to-oblongis scabris, caule herbaceo. h. m. 286. *Herba venti.*
Marrubium nigrum latifolium. mag. Bot. 174.
Herba venti. mag. Bot. 127.
Phlomis narbonensis hormini folio, flore purpuras-
cente. mag. hort. 158.

B E T O N I C A.

*Cal. aristatus. cor. labio superiore ascen-
dente planiusculo : tubo filiformi.*

*Herba. inflor. verticillata. fulc. bracteæ
oppositæ.*

1. BETONICA spicâ interrupta, corollarum laci-
nia labii intermedii emarginata. h. m. 276. *La
betoine.*
Betonica purpurea. mag. Bot. 38. hort. 32.
- * PHARM. *Betonica* herba, flores, aqua, syrpus.
Vis nervina, tonica, cephalica, sternutatoria,
dolori capitis adversa. *folia* ad man. 1. in infu-
so, decocto... *syrpus* ab unc. fl. ad unc. 1.

L A M I U M.

Cor. labio superiore integro fornicate : inferiore 2-lobo : *faux* utrinque margine dentata.

Herba. *inflor.* axillaris : verticillis multifloris sessilibus.

Album. 1. LAMIUM foliis cordatis acuminatis ferratis petiolatis. *b. m.* 281. *L'ortie morte.*

Lamium album, sive archangelica flore albo. *mag. hort.* 110.

* PHARM. *Lamii albi* herba, flores. *Herba* vis antileucorrhœica. In infuso theiformi.... *flores* in oleo olivarum ad solem infusi, vulneribus tendinum appropriati *ex Dodartio.*

Purpureum. 2. LAMIUM foliis cordatis obtusis petiolatis. *b. m.* 281.

Lamium purpureum sætidum folio subrotundo. *mag. Bot.* 148. *hort.* 110.

Amplexicaule. 3. LAMIUM foliis cordatis crenatis, bracteis cordatis incisis amplexicaulibus. *b. m.* 281.

Lamium folio caulem ambiente, minus. *mag. Bot.* 149. *hort.* 110.

G A L E O P S I S.

Cal. aristatus. *cor.* labio superiore crenato fornicate : labio inferiore utrinque denticum exferente.

Herba. *fulc.* bractea subulata ad basin cuiuslibet calycis.

Ladanum. 1. GALEOPSIS internodiis caulinis æqualibus, verticillis omnibus remotis. *b. m.* 281.

Sideritis arvensis angustifolia rubra. *mag. Bot.* 241. Galeopsis patula segetum purpurascente flore. *mag. hort.* 84.

2. GALEOPSIS internodiis supernè incrassatis, verticillis subnudis, subcontiguis. *b. m.* 282. *Tetrahit.*
Urtica procerior calyculis aculeatis. mag. hort. 84.
 3. GALEOPSIS verticillis sexfloris, involucro tetraphylo. *b. m.* 282. *L'ortie morte à fleurs jaunes.*
Lamium folio oblongo luteum. mag. Bot. 149.
Galeopsis sive urtica iners flore luteo. mag. hort. 82.
 * PHARM. *Galeopseos sive urticae inertis flore luteo herba, lamii albi quandoque succedanea, rari usus.*

S T A C H Y S.

Cal. pungens. *cor.* labium inferius lateribus reflexum. *flam.* deflorata ad latera deflexa.

Herba fulc. bracteæ binæ pluresve involucriformes.

1. STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *b. m.* 282. *La grande ortie puante.* *Sylvatica.*
Lamium maximum sylvaticum fætidum. mag. Bot. 299.
Galeopsis procerior fætida spicata. mag. hort. 82.
 * PHARM. *Galeopseos, sive urticae inertis magna fetidissima herba. Vis vulneraria, resolvens, antiacerosa.*
2. STACHYS verticillis sexfloris, foliis linearilanceolatis semi-amplexicaulibus. *b. m.* 282. *La petite ortie puante.* *Palustris.*
Stachys palustris fætida. mag. Bot. 246.
Sideritis anglica strumosa radice. mag. hort. 184.
 * PHARM. *Galeopseos angustifoliae fætida herba. Vis præcedentis.*
3. STACHYS verticillis multifloris, foliorum serraturis imbricatis. *b. m.* 282. *Germanica.*
Stachys major germanica. mag. Bot. 245. *hort.* 189.
4. STACHYS verticillis 6-floris, foliis radicalibus ovalibus crenatis, summis ovatis integerrimis, corollis calyce duplo longioribus. *Muritima.*

Sideritis salviae folio nostras. mag. Bot. 203. Bocconius. 1. p. 164. tab. 127.

Sideritis maritima flore ex luteo pallescente. Tour. 203.

HABITAT Monspelii versus mare & stagna, à Mauguio, Perauls, Lattes.

Hanc etiam circa Massiliam & S. Tropes vidit & mecum communicavit eruditissimus & generosissimus Frater Gabriel Capucinus.

Caulis fruticulosus lanatus. *Folia* radicalia longè petiolata lanata, crenata rugosa, obtusa, ovalia. Summa & verticillis subjecta sessilia, sèpius ovata acutiuscula integerrima. *Calyses* lanati inermes magni. *Corolla* flavæ magnæ villosæ. *Stamina longiora* labium superius adæquantia.

Annua. 5. STACHYS verticillis 6-floris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis levibus petiolatis. Linn. sift. nat. sp. pl. edit. 2^a. 218.

Sideritis arvensis annua latifolia glabra. mag. Bot. 305. hort.

Betonica, annua, verticillata calycibus spinosis. Linn. sp. pl. edit. 1^a. 573.

HABITAT circa Lunel & Sommieres.

Hirta. 6. STACHYS verticillis 6-floris, caulibus prostratis, corollis labio superiore bifido divaricato reflexo. Linn. sp. pl. edit. 2^a. 813.

Galeopsis, hirsuta, caule piloso, calycibus labio corollæ superiore longioribus. Linn. sp. pl. edit. 1^a. 580.

Sideritis, ocymastrum, foliis ovatis obtusis, corollis labio superiore divaricatis. Linn. sift. nat. 1098. Goüan. b. m. 278.

HABITAT in saxosis circa Pezenas & Gigean. Folia radicalia obtusa cordata, longè petiolata hirsuta; calyses aristati; rami debiles, flexiles.

N E P E T A.

Cor. labium inferius crenatum: faux marginé reflexo.

Herba, canescens. *fulc.* bracteæ subulatæ verticillis subjectæ margine exalbido submembranaceo.

1. NEPETA verticillis spicatis pedicellatis, foliis *Cataria*. cordatis petiolatis dentato-ferratis. *b. m.* 275.
L'herbe au chat.

Mentha cataria major & *vulgaris*. *mag.* *Bot.*
176.

Cataria major vulgaris. *mag.* *hort.* 48.

* PHARM. *Nepeta* herba. Vis aperiens, emmenagogia, antihysterica, anthelmintica, cephalica, antichlorotica. Datur in infuso aquoso vel vinofo.

S A T U R E J A.

Cor. laciniæ subæquales; *stigmata* setacea.

Fruticulus & *herba*. *fol.* punctulis (*glandulæ?*) adspersa.

1. SATUREJA pedunculis bifloris. *b. m.* 273. *La Hortensis*. *farriette.*

Satureja hortensis. *mag.* *Bot.* 230.

Satureja hortensis, sive *cunila sativa* Plinii. *mag.* *hort.* 178.

* PHARM. *Saturejæ* herba, aqua, oleum. Vis orexica, incidens, antiasthmatica, aphrodisiaca, pellens. Datur in infuso.. *oleum* in dolore dentium à carie optimum.

2. SATUREJA pedunculis dichotomis lateralibus solitariis, calycibus foliisque mucronatis. *b. m.* 273. *Montana*.

La farriette sauvage.

Satureja montana flosculis candidis. *mag.* *Bot.* 230. *hort.* 178.

HABITAT cum priori in glareosis circa *Causnelles*.

BALLOTTA.

Cal. hypocrateris. 5-dentatus, 10-striatus. *cor.* labium superius crenatum concavum.

Herba. inflor. verticillata, flosculis pendunculatis. *fulc.* bracteæ involucriformes.

Nigra. 1. BALLOTTA foliis cordatis indivisis serratis. *b. m.* 283. *Le marrube noir, le marrube plant, la ballotte.*

Marrubium nigrum fætidum. *mag. Bot.* 174.

Marrubiastrum rivini. *mag. hort.* 130.

* PHARM. *Marrubii nigri* seu *ballottes* herba, verticilli. Extus vis resolvens, absurgens, antiulcerosa, subanodina. Intus *verticilli* antiauriginosi †: dantur ad drach. 1.

MARRUBIUM.

Cal. hypocrateris. rigidus, 10-striatus. *cor.* labium superius rectum lineare 2-fidum.

Herba. inflor. verticillata sessilis. *fulc.* bracteæ involucriformes.

Vulgare. 1. MARRUBIUM dentibus calycinis setaceis uncinatis. *b. m.* 284. *Le marrube blanc.*

Marrubium vulgare album. *mag. Bot.* 174. *hort.* 131.

* PHARM. *Marrubii albi* herba, summitates, succus, syrpus. Vis aperiens, pellens, incidens, emmenagogue, thoracica, anthelmintica, antasthmatica, antiauriginosa. *Herba* à pug. ff. ad pugil. 1. in decocto, pulverata à drach. 1. ad drach. 2.. *syrpus* ab unc. 1. ad unc, 2.. *succus* ad unc. 2 vel 3.

DIDYNAMIA

ANGIOSPERMIA.

* CALYCIBUS 2-FIDIS.

OROBANCHE.

Cor. ringens, subæqualis, 4-fida. *caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma. *glandula* sub basi germinis.

Herba. fol. o. inflor. spicata. fulc. bracteæ squamosæ sparsæ.

1. OROBANCHE scapo lævi simplicissimo staminibus exsertis. *b. m. 308.* *Lævis.*

Orobanche magna purpurea monspessulana. *mag.*
Bot. 195. hort. 151.

HABITAT in pratis à *Lattes*, ubi altitudinem sesquipedalem sèpius attingit.

2. OROBANCHE scapo pubescente simplicissimo, *Major:* staminibus exsertis. *b. m. 308.*

Orobanche prima Dodonæi. *mag. Bot. 195.*

Orobanche major garyophyllum olens. *mag. hort. 151.*

3. OROBANCHE scapo ramoso, corollis quinquefidis. *b. m. 308.* *Ramosa.*

Orobanche subcæruleo flore, sive secunda. *mag.*
Bot. 197. hort. 151.

4. Orobanche minor purpureo flore, sive ramosa. *mag. Bot. 197. hort. 151.*

ACANTHUS.

Cal. 6-phyllo? lateralibus foliolis 2-sulculatis: latioribus 2-oppositis: internis 2-lateralibus minimis. cor. 1-labiata deflexa, 3-fida. stam. lignosa villosa.

96 *M O N O P E T A L I*
Herba, scaposa nuda. *fol.* radicalis. *in-*
flor. spicata.

- Mollis.* 1. ACANTHUS foliis sinuatis inermibus. *h. m.* 309.
L'acanthe ou brancusine.
 Acanthus mollis, sive Virgilii. *mag. Bot.* 2. *hort.* 3.
 * PHARM. *Acanthi*, seu *brancae usinæ herba*. Vis
 emolliens, demulcens.
- Spinosus.* 2. ACANTHUS foliis spinosis pinnatifidis. *h. m.* 309.
Acanthus aculeatus. mag. hort. 3.

** *CALYCIBUS 4-FIDIS.*

E U P H R A S I A.

Cal. cylindricus. *cor.* personata. *antheræ*
 inferiores altero lobo basi hinc spi-
 nosæ.

Herba. fol. & *inflor.* indeterminata. *fulc.*
bracteæ foliis subæquales.

OBS. Dicant alii quâ notâ secundariâ distinguan-
 tur *euphrasia*, *rhinanthus*, *melampyrum*? Gaudent
caule 4-gono, *foliatione* opposita-sessili simplici,
inflorescentia eadem, & *fulcris*.

- Latifolia.* 1. EUPHRASIA foliis dentato-palmatis, floribus sub-
 capitatis. *h. m.* 296.
Euphrasia purpurea minor. mag. Bot. 95.
Pedicularis annua purpurea verna minor. mag.
hort. 154.
- Officinalis.* 2. EUPHRASIA foliis ovatis acutè dentatis, floribus
 sparsis. *h. m.* 297. *L'eufraise.*
Euphrasia officinarum. mag. hort. 76.
 * PHARM. *Euphrasie herba*, *aqua*, *succus*. Vis
 incidens, tonica, cephalica, ophtalmica †.
 Datur *herba* in *infuso*, & melius pulverata à
 drach. 1. ad drach. 3.. *aqua* vel *succus* pro col-
 lyrio.
- Dontites.* 3. EUPHRASIA foliis linearibus, omnibus ferratis.
h. m. 297.

Euphrasia

I R R E G U L A R E S. 97

Euphrasia pratensis rubra. *mag. Bot.* 93.

Pedicularis serotina purpurascente flore. *mag. hort.*

^{154.}

4. EUPHRASIA foliis linearibus serratis, superioribus integerrimis. *b. m.* 297.

Euphrasia pratensis lutea. *mag. Bot.* 95.

Pedicularis serotina lutea. *mag. hort.* 154.

R H I N A N T H U S.

Cal. ventricosus. *cor.* personata. *caps.* obtusa compressa.

Herba. inflor. fol. & fulc. indeterminata. bracteæ foliis latiores.

1. RHINANTHUS calycibus hirsuto-tomentosis, foliis oppositis obtusè serratis. *b. m.* 296. *Trivago.*

Anthirrinum album ferrato folio. *mag. Bot.* 23.

Pedicularis maritima folio oblongo ferrato. *mag. hort.* 154.

2. RHINANTHUS corollarum labio superiore compresso breviore. *b. m.* 296. *Crista galli.*

Pedicularis pratensis lutea, sive crista galli. *mag. Bot.* 200. *hort.* 154.

M E L A M P Y R U M.

Cal. tubulatus. *cor.* personata : labio superiore compresso margine replicato : *caps.* 2 - locularis compressa. *sem.* 2 - gibba.

Herba. inflor. indeterminata. bracteæ foliis latiores.

1. MELAMPYRUM spicis conicis laxis laceris. *b. m.* 297. *Le blé de vache.* *Arvensis.*

Melampyrum purpurascente comâ. *mag. Bot.* 174.

Melampyrum multis, seu triticum vaccinum. *mag. hort.* 132.

- Pratense.* 2. MELAMPYRUM florum conjugationibus remotis, corollis clausis. *b. m.* 297.
Melampyrum luteum latifolium. mag. Bot. 302.
Melampyrum sylvaticum flore luteo, seu satureja lutea sylvestris. mag. hort. 132.
- Sylvaticum.* 3. MELAMPYRUM corollis hiantibus. *Linn. sp. pl.* 605.
Melampyrum floribus sparsis sessilibus binatis, foliis omnibus indivisis. Hall. helv. 627.
HABITAT in humidis à l'Esperou & Lamalou. Corollæ parvæ luteæ.
- Nemorosum.* 4. MELAMPYRUM bracteis cordato-lanceolatis : summis sterilibus coloratis, calycibus lanatis. *Linn. sp. pl.* 605.
Melampyrum cristatum flore albo & purpureo. Tour. 173.
HABITAT in sylvis à Lamalou.
- Cristatum.* 5. MELAMPYRUM spicis quadrangularibus compactis obtusis imbricatis. *Linn. sp. pl.* 605.
HABITAT à la Louzere, & cum prioribus.

*** CALYCIBUS 5-FIDIS.

SCROPHULARIA.

Cor. subglobosa resupinata : fauce auctâ segmento labium mentiente.
Herba, 4-gona fistulosa. fol. opposita.

- Nodosa.* 1. SCROPHULARIA foliis cordatis basi transversis, caule obtusangulo. *b. m.* 303. *La grande scrophulaire commune.*
Scrophularia nodosa fætida. mag. Bot. 234. *hort.* 181.
** PHARM. Scrophulariæ fætidaæ herba, radix, semina, unguentum. Vis antihæmorrhoidalis, anti-scrophulosa, antiulcerosa, antiscabiosa, antiherpetica.... radix ad drach. 1... folia applicata.*
- Aquatica.* 2. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis lateralibus. *b. m.* 303. *La scrophulaire aquatique ou l'herbe du siege.*

Scrophularia aquatica major. mag. Bot. 234. hort. 182.

* PHARM. *Scrophularia aquatica* folia. Vis precedens, sed debilior. *Folia sennam corrigunt anaticè ipsi mixta.*

3. SCROPHULARIA foliis cordatis, pedunculis axillaribus solitariis dichotomis. h. m. 304. *Vernalis.*

Scrophularia flore luteo. mag. hort. 182.

4. SCROPHULARIA foliis pinnatis, racemo terminali nudo. h. m. 304. *Canina.*

Scrophularia ruta, canina dicta. mag. Bot. 224. hort. 182.

5. SCROPHULARIA foliis cordatis: summis alternis, pedunculis axillaribus bifloris. h. m. 304. *Peregrina.*

Scrophularia urticæ folio. mag. Bot. 234. hort. 182.

D I G I T A L I S.

*Cal. 5-partitus. cor. campanulata 5-fida
subtus ventricosa. Stam. declinata.*

Herba teres. inflor. racemosa secunda.

1. DIGITALIS foliolis calycinis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro. h. m. 305. *Purpurea.*

La digitale, ou gants de Notre-Dame.

Digitalis purpurea, folio aspero. mag. hort. 70.

* PHARM. *Digitalis* herba, flores, unguentum. Vis emetica, antiepileptica, extus antiscrophulosa. *herba à pug.* 1. ad pug. 2. in decocto.

2. DIGITALIS foliolis calycinis lanceolatis, corollis acutis: labio superiore bifido. h. m. 305. *Lutea.*

Digitalis major lutea seu pallida, parvo flore. mag. Bot. 86. hort. 70.

E R I N U S.

Cal. 5-phyllus. cor. limbo subæquali 5-fido: lobis emarginatis. labio superiore breviore reflexo.

Herba. inflor. racemosa æqualis: flosculis sessilibus.

- Alpinus.* 1. ERINUS floribus racemosis. *b. m.* 307.
Moschatellina cærulea. *mag. hort.* 138.

ANTHIRRINUM.

Cal. 5-phyllus. *cor.* pérsonata: basi deorsum prominente nectarifera.

Herba. *fol.* *inflor.* & *fulc.* indeterminata.

OBS. *Anthirrinum* inter Didynatmas, & *veronica* inter Diandras irregulares eandem ex toto servant radicationem, caulescentiam, foliationem, inflorescentiam, & fulcra eadem. Nimurum species aliæ *radicibus* gaudent horizontalibus, aliæ perpendicularibus; *caule* repente aut erecto; *foliis* oppositis, ternis, quaternis, alternis aut sparsis; & gerunt flores solitarios, aut racemosos, aut spicatos, & fulcra diversa.

* *Foliis angulatis.*

- Ajarina.* 1. ANTHIRRINUM foliis crenatis cordatis oppositis. *b. m.* 299.

Anthirrinum saxatile repens hederæ terrestris folio. *mag. hort.* 19.

- Cymbalaria.* 2. ANTHIRRINUM foliis alternis cordatis quinquelobis. *b. m.* 299.

Linaria hederaceo folio, seu *cymbalaria*. *mag. hort.* 120.

- Elatine.* 3. ANTHIRRINUM foliis alternis hastatis, caule flaccido. *b. m.* 299. *La velvete.*

Elatine folio acuminato, flore cæruleo. *mag. Bot.* 89.
Linaria segetum nummulariæ folio aurito & villoso. *mag. hort.* 120.

- Sfurium.* 4. ANTHIRRINUM foliis ovatis alternis, caulis procumbentibus, corollis calcaratis. *b. m.* 300. *La velvete femelle.*

Elatine folio subrotundo. *mag. Bot.* 88.
Linaria elatine dicta folio subrotundo. *mag. hort.* 120.

*** *Foliis oppositis.*

5. ANTHIRRINUM foliis carnosis glabris, inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus spicato: capitatis. *b. m. 300.* *Bipunctatum.*
6. ANTHIRRINUM foliis sublinearibus, inferioribus verticillatis, calycibus piloso-viscidis, floribus spicatis, caule erecto. *b. m. 300.* *Arvense.*
7. Linaria lutea parva annua. *mag. Bot. 159. hort. 120.*
7. ANTHIRRINUM foliis caulinis lanceolato-linearibus sparsis, radicalibus rotundis ternis. *b. m. 120.* *Pelisserianum.*
- Linaria annua purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus. *mag. Bot. 159. icon. 158. hort. 119.*
8. ANTHIRRINUM foliis oppositis ovato-lanceolatis, summis alternis, floribus laxè racemosis. *b. m. 301.* *Origanifolium.*
- Anthirrinum saxatile serpylli folio. mag. Bot. 25. icon. 24.*
- Linaria saxatilis serpyllifolia. *mag. hort. 120.*
9. ANTHIRRINUM foliis lanceolato-linearibus oppositis: summis alternis, corollis ecaudatis, calycibus corollâ longioribus. *Anthirrinum corollis ecaudatis, calycibus corollâ longioribus. b. m. 302.* *Orontium.*
- Anthirrinum arvense majus. mag. Bot. 23. hort. 19.*

*** *Foliis alternis.*

10. ANTHIRRINUM foliis linearibus acuminatis alternis, floribus racemosis, caule diffuso. *b. m. 301.* *Supinum.*
- Linaria pumila supina lutea. *mag. Bot. 159. hort. 120.*
- OBS. Non solum in saxosis montis Lupi & montis Capouladou oritur, ut notat *Magnolius*, sed & in herbidis juxta fluvium Herau, in descensu ipsius montis, & à la Scambrettes, ubi variat.

foliis omnibus inferioribus quaternis, calycibusque piloso-hispidis, & ex toto *ant. arvensis* faciem induit. Flores lutei magni odoratissimi.

- Linaria.* 11. ANTHIRRINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis sessilibus terminalibus, floribus imbricatis. *b. m. 301.*

Linaria vulgaris lutea flore majore. *mag. hort. 120.*

* PHARM. *Linariae* herba, *aqua stillatitia*, *unguentum*. Extus vis anodina, antihaemorrhoidalis, antiulcerosa, antiephelica. Intus aperiens, incidens, antiicterica, diuretica †, antihydropica, eccoprotica. . *aqua stillatitia* ab unc. iv ad unc. vi.

- Monspeſſu-
lum.* 12. ANTHIRRINUM foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis spicatis nudis. *b. m. 301.*

Linaria odorata monspessulana. *mag. Bot. 157.
hort. 119.*

- Linus.* 13. ANTHIRRINUM foliis lanceolatis obtusis alternis, caule ramosissimo diffuso. *b. m. 301.*

Anthirrinum arvense minus. *mag. Bot. 23.*

Linaria pumila vulgatior arvensis. *mag. hort. 120.*

**** *Corollis ecaudatis hiantibus, foliis alternis.*

- Majus.* 14. ANTHIRRINUM corollis ecaudatis, calycibus rotundatis. *b. m. 302. Le muse de veau.*

Anthirrinum majus flore roseo. *mag. Bot. 23. hort. 18.*

- Bellidifo-
lium.* 15. ANTHIRRINUM foliis imis spathulatis, summis digitatis. *b. m. 302.*

Linariae aliquatenus similis folio bellidis. *mag. hort. 120.*

P E D I C U L A R I S.

Cal. 5-fidus. cor. personata. caps. mucronata obliqua. sem. tunicata.

Herba. fol. composita, pinnata, bipinnata.

1. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus angulis obtusis. *b. m.* 298. *Sylvatica.*
2. PEDICULARIS caule subramoso, corollis galea rostrato-acuminatis, calycibus subhirsutis. *b. m.* 298. *Rostrata.*
3. PEDICULARIS caule simplici, foliis quaternis. *b. m.* 298. *Verticillata.*
4. PEDICULARIS caule simplici, calycibus crenatis, corollis galea rostrato-uncinatis. *b. m.* 298. Pedicularis alpina asphodeli radice, flore purpurascente. *mag. hort.* 154. *Tuberosa.*

LINNÆA.

Cal. duplex : *floris* 5-partitus superus : *fructus* diphyllus. *bacc.* 2-sperma sicca. *cor.* campanulata.

Herba repens. *inflor.* terminalis geminata : *flosculis* duobus pedicello proprio innixis.

1. LINNÆA floribus geminatis. *b. m.* 307. *La lin-* *née.* *Borealis.*

* PHARM. *Linnæe* herba. Vis diluens, diuretica, anodina, in rheumatismo specifica, ex Linnæi epistola ad me scripta.

VITEX.

Cal. 5-dentatus. *cor.* limbus 6-fidus. *baca-* *ca,* 4-sperma.

Arbor. *fol.* opposita composita digitata.

1. VITEX. *b. m.* 309. *Le faux poivrier.*

Agnus castus flore exalbido aut cœruleo. *mag. hort.* 7.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

FUMARIA.

Cal. foliolis 2-lateralibus oppositis. cor. ringens: filamenta 2-membranacea singula antheris 3.

Herba. fol. sparsa composita pinnata.

* *Floribus unicalcaratis.*

Bulbosa. 1. FUMARIA caule simplici, bracteis longitudine florum. *b. m. 353.*

Fumaria bulbosa radice cavâ major. *mag. Bot. 296. hort. 82.*

2. Fumaria bulbosa radice non cavâ major. *mag. hort. 82.*

Officinalis. 2. FUMARIA pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso. *b. m. 353. La fumeterre.*

Fumaria officinarum. *mag. Bot. 100. hort. 82. & floribus dilutè, purpureis. ibid.*

* PHARM. *Fumaria herba, succus, conserva, extractum. Vis incidens, aperiens, pellens, visceralis, roborans, anticachectica, antihypochondriaca, antimelancholica, antiauriginosa, anti-scabiosa †. Succus ab unc. III ad unc. VI.. conserva ad usque unc. fl. extractum à drach. fl. ad drach. I.*

Spicata. 3. FUMARIA pericarpiis monospermis spicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *b. m. 354.*

Fumaria minor, seu nobilis monspeliaca. *mag. Bot. 101.*

Fumaria minor tenuifolia, seu nobilis monspeliaca. *mag. hort. 82.*

4. Fumaria foliis tenuissimis, floribus albis circa Monspelium nascens. *Bauh. pin.*

Fumaria tenuissimis foliis, flore albo. mag. Bot.
101. hort. 82.

4. FUMARIA pericarpis racemosis monospermis, *Capreolata*
foliis scandentibus subcirculariis. b. m. 354.

Fumaria viticulis & capreolis plantis vicinis adhae-
rens. mag. Bot. 101. hort. 82.

5. FUMARIA siliquis linearibus, foliis cirriferis. *Claviculata*.
b. m. 354.

HABITAT in sterilibus saxosis, ericetis, & ilicetis
au-delà de Perenaz.

DIADELPHIA

DECANDRIA.

TRIFOLIUM.

18. TRIFOLIUM corollis monopetalis, spicis villo-
sis longis, caule erecto, foliis ferrulatis. b. m.
389. *Rubens*.
- Trifolium montanum spicâ longissimâ rubente.
mag. Bot. 261. hort. 198.
19. TRIFOLIUM corollis monopetalis, spicis sub-
villoso, cinctis bracteis oppositis membranaceis.
b. m. 390. *Pratense*.
- Trifolium pratense purpureum. mag. Bot. 261.
hort. 198.
20. TRIFOLIUM spicis villoso ovalibus, dentibus
calycinis setaceis æqualibus. b. m. 390. *La patte*
de lievre. *Lagopus*
arvense.
- Trifolium arvense humile spicatum, sive lago-
pus. mag. Bot. 262. hort. 198.
21. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminini-
bus tetraspermis, caule repente. b. m. 388. *Repens*.
- Trifolium pratense album. mag. Bot. 261. hort.
198.
22. TRIFOLIUM capitulis sessilibus globosis hirsutis,
calycibus inflatis reflexis. b. m. 392. *Tomentosum*.
- Trifolium fragiferum tomentosum. mag. Bot. 265,
icon. 264. hort. 199.

G Y N A N D R I A
H E X A N D R I A.
A R I S T O L O C H I A.

Hexagyna. cal. o. cor. ligulata integra.
caps. infera 6-locularis.

Herba flexuosa angulata.. *rad.* tuberosa
 solida stolonifera..

- Pistochia.* 1. ARISTOLOCHIA foliis cordatis crenulatis petiolatis , floribus solitariis. *b. m.* 476. foliis subtus reticulatis.
Aristolochia pistochia dicta. *mag.* *Bot.* 28. *hort.* 22.
- Atropurpurea.* 2. Aristolochia dicta flore nigro. *mag.* *hort.* 22.
 HABITAT reverà β in umbrosis montis Capouladou , & in sylvula quadam ad dexteram ascendendo ad montem dictum *le puy de S. Loup.*
- Rotunda.* 2. ARISTOLOCHIA foliis cordatis subsessilibus obtusis , caule infirmo , floribus solitariis. *b. m.* 476.
Aristolochia rotunda flore ex purpura nigro. *mag.* *Bot.* 27. *hort.* 22.
3. Aristolochia rotunda flore ex albo purpurascente..
mag. *Bot.* 27. *hort.* 22.
- * PHARM. *Aristolochia rotundæ* radix. Vis emmenagogæ , abortiva , diuretica , resolvens , calefaciens , abstergens , *in substantia à drach. ff. ad drach. 11. in infuso ad usque unc. ff.*
- Longa.* 3. ARISTOLOCHIA foliis cordatis petiolatis integrimis obtusiusculis , caule infirmo , floribus solitariis. *b. m.* 477. *L'aristolochie longue.*
Aristolochia longa vera. *mag.* *Bot.* 28. *hort.* 22.
- * PHARM. *Aristolochia longæ* radix. Vis prædantis.
- Clematitis.* 4. ARISTOLOCHIA foliis cordatis , caule erecto , floribus axillaribus confertis. *b. m.* 477.
Aristolochia clematitidis recta. *mag.* *Bot.* 28. *hort.* 22.

* PHARM. *Aristolochia vulgaris* radix, præcedentis succedanca.

MONŒCIA TETRANDRIA.

BETULA.

Masc. flores. cal. 1-phyllus 3-fidus,
3-florus. cor. 4-partita.

Arbor. inflor. amenta subterna pedunculata... gluten in tota arbore.

- I. BETULA pedunculis ramosis. *b. m. 483.* *Alnus.*
Alnus rotundifolia glutinosa viridis. mag. Bot. 11.
hort. 10.
- * PHARM. *Alni folia, cortex, juli, flores fructus.* Vis adstringens, resolvens, antiphlogistica, gargarismica.



Classis III.

D I P E T A L I

R E G U L A R E S.

*M O N A N D R I A** *DIGYNIA.*

C O R I S P E R M U M .

C A L L I T R I C H E . 1.

*D I A N D R I A** *MONOGYNIA.*

C I R C A E A .

* *DIGYNIA.*

A N T H O X A N T H U M .

*M O N O G Y N I A** *MONANDRIA.*

C A L L I T R I C H E . 2.. uterque sexus.

* *TRIANDRIA.*

Z E A .. uterque sexus.

* *TETRANDRIA.*B U X U S . mal... (*femina tripetala.*)

109

D I P E T A L I REGULARES.

M O N A N D R I A D I G Y N I A.

C O R I S P E R M U M.

Cal. o. sem. 1, orbiculatum cemprellum.

Herba. fol. alterna. inflor. solitaria sessilis.

1. CORISPERMUM foliis lanceolato-linearibus integrimis, floribus lateralibus. b. m. 3.

Hyssopifolium.

C A L L I T R I C H E.

Cal. o. caps. 2-loocularis 4-sperma.

Herba immersa & emersa. fol. immersa distans; emersa natans & veluti in rosam approximata.

2. CALLITRICHE floribus hermaphroditis. b. m. 4.
Corispernum foliis oppositis. Sauv. 127.

Autumnalis.

D I A N D R I A M O N O G Y N I A.

C I R C Æ A.

Cal. 2-phylloides, superus. cor. 2-petala obcordata. sem. 1, 2-lokulare hispidum.

310 D I P E T A L I

Herba. fol. opposita petiolata. inflor. rācemosā.

Lutetiana. 1. CIRCAEA caule erecto, racemis pluribus. *b. m.*
g. La circée.

Circæa lutetiana. mag. hort. 56.

* PHARM. *Circæa herba.* Extus vis anodina, resolvens, antihæmorrhoidalis.

OBS. HABITAT copiosissimè secus amnem à *La-melou.*

D I A N D R I A

D I G Y N I A.

A N T H O X A N T H U M.

Cal. gluma, 2-valvis, 1-flora. cor. gluma, 2-valvis, aristata.

Herba (gramen) inflor. spicata terminalis.

Odoratum. 1. ANTHOXANTHUM spicâ ovato-oblongâ, flosculis subpedunculatis aristâ longioribus. *b. m. 20.*

M O N O N D R I A

M O N A N D R I A.

C A L L I T R I C H E.

Cal. caps. caul. & fol. Vide ejusdem clas- seos Monand. digyniam masc. & feminei flores ut suprà.

Verna. 1. CALLITRICHÉ floribus androgynis. *b. m. 14.*
Lenticula palustris bifolia fructu tetragono. mag.
Bot. 300.

MONŒCIA

T R I A N D R I A.

Z E A.

Maf. *cal.* gluma 2-flora mutica. *cor.* gluma mutica.

Fem. *cal.* & *cor.* maris. *styl.* 1, filiformis pendulus. *sem.* solitaria receptaculo oblongo immersa.

Herba (gramen) *inflor.* maf. panicula terminalis. fem. spica cylindrica infra masculos, folio involuta.

z. ZEA. b. m. 481. *Le blé de Turquie.*

Mays.

Mays acostæ. mag. hort. 132. granis cœruleis. *ibid.*
& rubris. *ibid.*

MONŒCIA

T E T R A N D R I A.

B U X U S.

Maf. *cal.* 3 - phyllus. rudimentum *germinis.*

Subarbor. *fol.* integerrima opposita dura. *inflor.* flosculis masculis & femineis simul, glomeratis.

z. BUXUS. b. m. 484. *Le buis. mag. Bot. 44. hort. 37.*

Arborescens.

* PHARM. *Buxi* lignum oleum empyreumaticum. *Vis ligni* sudorifera mundificans. *Olei* anodina, antiepileptica, antihysterica, datur à gutt. x ad gutt. xx.

Classis IV^a.

D I P E T A L I
 I R R E G U L A R E S.

*TRIANDRIA.** *MONOGYNIA.*

NARDUS.

* *DIGYNIA.*

A. CALYCES UNIFLORI.

PANICUM.

PHALARIS.

PHLEUM.

MILIUM.

AGROSTIS.

DACTYLIS.

STIPA.

LAGURUS.

ARUNDO.

B. CALYCES 2-FLORE.

AIRA.

MELICA.

D. CALYCES MULTIFLORI.

POA.

BRIZA.

FESTUCA.

BROMUS.

AVENA.

ARUNDO. 3. 4.

E. CALYCES

E. CALYCES MULTIPLORI INSIDENTES RECEP-
TACULI ELONGATI DENTIBUS.

CYNOSURUS.

LOLIUM.

ELYMUS.

TRITICUM.

HORDEUM. I.

POLYGAMIA

* MONOECIA.

AVENA. ♂. masc. & hermaph.


HORDEUM. masc. & hermaph.

HOLCUS. hermaph.... (*masc. apetalis*).

ANDROPOGON. masc. & hermaph.

CENCHRUS. masc. & hermaph.

AEGYLOPS. masc. & hermaph.



DIPETALI IRREGULARES.

TRIANDRIA MONOGYNIA. NARDUS.

Cal. o. sem. tectum. herba (gramen) in-
flor. spicata.

OBS. Assignent alii notam secundariam essentialem quā dif-
ferant inter se plantæ *gramina* dictæ.

Stridæ. 1. NARDUS spicâ secundâ linearî rectâ compactâ.
b. m. 32.

Aristatus. 2. NARDUS spicâ incurvâ æquali, glumâ calycinâ
exteriore aristato-acuminatâ longissimâ, floribus
distantibus alternis. *b. m. 33.*

Gramen sparteum monspeliacum, sive capillaceo
folio minimum. *mag. Bot. 119. hort. 92.*

TRIANDRIA DIGYNIA.

* *CALYCIBUS UNIFLORIS.*

PANICUM.

Cal. 3-valvis: tertiâ minore dorsali.
Herba (gramen) inflor. paniculata, aut
spicata.

* *Floribus spicatis.*

1. PANICUM spicâ compositâ, spiculis conglomera-
tatis setis immixtis, pedunculo hirsuto. *b. m. 34.*
Le panis.
Panicum italicum, sive panicula majore. *mag. Bot.*
197. hort. 152.
2. PANICUM spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis. *b. m. 34.*
Gramen paniceum spicâ divisâ, aristis longis ar-
matâ. *mag. Bot. 116. hort. 91.*
3. PANICUM spicis aggregatis, basi interiore no-
dosis, flosculis geminis muticis, vaginis folio-
rum punctatis. *b. m. 35.*
Gramen dactylon folio latiore. *mag. Bot. 112.*
hort. 90.
4. PANICUM spicâ tereti, involucellis bifloris, fas-
ciculato pilosis, seminibus nervosis. *Linn. sif.
nat. Goëtan. b. m. app. 545. glaucum.*
Gramen paniceum spicâ simplici. *mag. Bot. 116.*
hort. 91.
5. PANICUM spicâ verticillatâ, racemulis quater-
nis, involucellis unifloris bisetis, culmis diffusis.
Linn. sp. pl. edit. 2^a. 82.
Gramen paniceum spicâ asperâ. *mag. Bot. 116.*
Panicum vulgare spicâ simplici & asperâ. *Tour.*
515.

** *Paniculata.*

6. PANICUM spicis digitatis patentibus: basi inte-
riore villosis, floribus solitariis, sarmenis rep-
tantibus. *b. m. 35.*
Gramen legitimum Clusii. *mag. Bot. 111. hort. 90.*
7. PANICUM paniculâ laxâ flaccidâ, foliorum va-
ginis pubescentibus. *b. m. 35. Le millet.*
Milium semine luteo & albo. *mag. Bot. 177. hort.*
136; & nigro. ibid.

P H A L A R I S.

Cal. 2-valvis : valvulis carinatis æqualibus *corollam* includentibus.

Herba. (gramen) *inflor.* paniculâ coarctatâ : spiculis (si in arcum flectatur) radiatis.

Utriculata. 1. PHALARIS paniculâ spicatâ , petalis aristâ articulatâ , vaginâ supremi folii spathæformi. *b. m.* app. 545.

Gramen pratense spicâ purpureâ ex utriculo prodeunte. *mag. Bot.*

Canariensis. 2. PHALARIS paniculâ subovatâ spiciformi , glumis carinatis. *b. m.* 33. *La graine de canari.*

Phalaris major semine nigro & albo. *mag. Bot.* 202. *hort.* 158.

Phleoides. 3. PHALARIS paniculâ cylindricâ spiciformi. *b. m.* 33.

Gramen typhoïdes asperum primum. *mag. Bot.* 114. *hort.* 91.

Arundinacea. 4. PHALARIS paniculâ oblongâ ramosissimâ ventricosâ. *b. m.* 34.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *mag. Bot. app.* 397. *hort.*

5. Gramen paniculatum folio variegato. *mag. Bot.* 113. *hort.* 90.

P H L E U M.

Cal. 2-valvis , linearis , truncatus , apice 2-cuspidato. *cor.* inclusa.

Herba. (gramen) *inflor.* spica cylindrica coarctata.

Pratense. 1. PHLEUM spicâ cylindricâ longissimâ. *b. m.* 36.

2. Gramen typhoïdes molle. *mag. Bot.* 114. *hort.* 91?

Schænoïdes. 2. PHLEUM spicis ovatis obvolutis , foliis brevissimis mucronatis amplexicaulibus. *b. m.* 36.

3. PHLEUM spicâ ovato-oblongâ, basi sterili, culmo subrepente, radice bulbosâ. *b. m.* 36. *Bulbosum.*
 Gramen nodosum spicâ parvâ. *mag. Bot.* 114.
hort. 91.
4. PHLEUM spicâ ovatâ ciliatâ, caule ramoso. *Arenarium.*
Linn. sif. p. 871.
 Gramen spicatum maritimum minimum spicâ cylindraceâ. *Tour. 520.*
 HABITAT in sterilibus fabulosis ad mare.

M I L I U M.

Cal. 2-valvis corollam subexcedens. *stigm.*
 penicilliformia.

Arista è glumæ corollinæ majoris dorso.

Herba. (gramen) *inflor.* paniculâ patens.

1. MILIUM floribus paniculatis aristatis. *b. m.* 38. *Paradoxum.*
 2. MILIUM paniculâ subspicata, floribus aristatis. *Lendigerum.*
Goian. b. m. 39. & *append. 547.* agrostis ventricosa.
icon... *Linn. sp. pl. edit.* 2^a.
 Gramen loliaceum paniculâ ramosâ luteâ. *mag.*
app. 297.
 HABITAT copiosè in luco à *Perauls*; in sterilibus saxosis ad dexteram à *Selleneuve*; & copiosissimè ad pratorum margines à *Lamalou*.

A G R O S T I S.

Cal. 2-valvis, corolla minor. *stigm.* longitudinaliter hispida.

Arista è dorso, aut ex apice, in pluribus.

* *Aristatae.*

1. AGROSTIS petalo exteriore aristato, paniculâ coarctatâ interruptâ. *Linn. sif. nat.* 872. *Interrupta.*
 Gramen arvense paniculatum spicâ interruptâ.
Scheuz. gram. 146.
 HABITAT in ilicetis & ericetis inter *Pezenas* &

Lamalou, in locis dictis *Las barraques*, & monte dicto *Peteſiou*. Altitudinem tripedalem attingit. Panicula subſpicata. Aristæ longæ. Culmus debilis vix acu futoriā majo. i crassior. Rami paniculæ remoti à se invicem.

Calamagrostis. 2. AGROSTIS paniculâ incrassatâ, petalo exteriore toto lanato apice aristato, culmo ramoso. *b. m. 39.*

Spica venti. 3. AGROSTIS petalo exteriore aristâ rectâ striatâ longissimâ. *b. m. 39.*

Rubra. 4. AGROSTIS paniculæ parte florente patentissimâ, petalo exteriore glabro terminato aristâ tortili recurvâ. *b. m. 40.*

Canina. 5. AGROSTIS calycibus coloratis, petalorum aristâ dorsali recurvâ. *b. m. 40.*

Gramen rubrum monspeliense. *mag. Bot. 122.*

** *Muticæ.*

Stolonifera. 6. AGROSTIS paniculæ ramis divaricatis muticis, culmo repente, calycibus æqualibus. *b. m. 40.*
Gramen caninum supinum monspeliense. *mag. Bot. 122.*

Alba. 6. Agrostis paniculâ interruptâ laxâ, calycibus ovatis. *b. m. app. 546.*

Viridis. 7. Agrostis paniculâ æquali laxâ, calycibus muticis æqualibus. *b. m. app. 546.*

Capillaris. 7. AGROSTIS paniculâ cäpillari patente, calycibus subula is æ qualibus hispidiusculis coloratis, flocculis muticis. *b. m. 40.*

Minima. 8. AGROSTIS paniculâ muticâ filiformi. *b. m. 40.*

Gramen minimum paniculis elegantiſſimis. *mag. Bot. 114. hort. 91.*

Obs. In agris omnibus Monspelio vicinis, Februario & Aprili copiose floret.

D A C T Y L I S.

Cal. 2-valvis obtusiusculus : valvula alterâ majore carinatâ.

Herba. (gramen) subanceps. *inflor.* panicula glomerata secunda rigida.

1. DACTYLIS vaginâ foliorum ancipi. *b. m.* 47. *Glomeratus:*
Gramen spicatum folio aspero. *mag. Bot.* 114.

S T I P A.

Cal. 2-valvis. *cor.* valvula exterior terminata aristâ longissimâ basi anticulatâ tortili.

Herba. (gramen) *inflor.* flosculi alterni axillares.

1. STIPA aristis lanatis. *b. m.* 51. *Pennata:*
Gramen spicatum aristis pennatis. *mag. Bot.* 119.
Gramen sparteum pennatum. *mag. Bot.* 119. *hort.* 92.
HABITAT ad dexteram in saxosis à *Selleneuve* & herbidis vicinis.
2. STIPA aristis nudis, calycibus semine longioribus. *b. m.* 52. *Juncea:*
Gramen sive festuca junceo folio longissimis aristis. *mag. Bot.* 122.
Gramen avenaceum maximum utriculis cum lanagine alba, & aristis longissimis. *mag. Bot.* 121. *icon.* 120. *hort.* 92.

L A G U R U S.

Cal. 2-valvis villosus aristatus. *cor.* petalo exteriore aristis 2-terminalibus: tertiatâque dorsali retortâ. *species altera ex toto mutica.*

Herba. (gramen) *inflor.* spica mollis viloso-incana.

1. LAGURUS spicâ ovatâ. *b. m.* 54. *La queue de Ovarus lapin.*

Gramen alopecuroïdes spicâ rotundiore. mag. Bot.
115. hort. 91.

Cylindricus. 2. LAGURUS spicâ cylindricâ muticâ. Linn. sif.
p. 878.

Gramen tomentosum spicatum. mag. Bot. 116.

Gramen alopecuroïdes major spicâ longiore. mag.
Bot. 115. hort. 91.

Alopecuros spicâ longiore tomentosâ candidâ. Bauh.
sift. 2. 474.

Gramen spicatum tomentosum creticum spicâ pur-
pureâ. Tour. coroll. & Scheuz. agrost. 57. tab. 11.
fig. 4. A.

A R U N D O.

Cal. 2-valvis. cor. basi lanata mutica.

Herba (gramen) radix. horizontalis no-
dosa stolonifera.

Arenaria. 1. ARUNDO calycibus unifloris, foliis involutis mu-
cronato-pungentibus. b. m. 55.

Gramen sparteum spicatum foliis mucronatis lon-
gioribus. mag. Bot. 119.

Calamagrostis. 2. ARUNDO calycibus unifloris, culmo ramoso. b.
m. 55.

Gramen arundinaceum ramosum plumosum album.
mag. Bot. 117.

Gramen arundinaceum calamagrostis dictum spicâ
multiplici. mag. hort. 93.

** CALYCIBUS BIFLORIS.

A I R A.

Cal. 2-valvis: flosculi absque rudimento
tertii. aristâ in plurimis.

Herba (gramen) inflor. spicata aut pa-
niculata.

* *Aristatæ.*

1. AIRA foliis planis, paniculâ patente, petalis basi villosis & aristatis: aristâ rectâ brevi. *b. m. 41.* *Cespitosa.*
2. AIRA foliis setaceis, paniculâ angustatâ, flosculis basi pilosis aristatis: aristâ tortili longiore. *b. m. 41.* *Montana.*
3. AIRA foliis setaceis, summâ paniculam infernè obvolvente. *b. m. 41.* *Canescens.*
4. AIRA foliis setaceis, paniculâ divaricatâ, floribus distantibus. *b. m. 42.* *Caryophyl-
laea.*
- Gramen paniculatum minimum molle. *mag. Bot.
296. hort. 91.*
- *Caryophyllum arvensis glaber minimus. mag. Bot.
54.*
5. AIRA foliis setaceis, culmis subnudis, paniculâ divaricatâ, pedunculis flexuosis. *b. m. 42.* *Flexuosa.*

** *Muticæ.*

6. AIRA paniculâ spicatâ, flosculis muticis pedunculo longioribus, glumis acuminatis inæqualibus. *b. m. 42.* *Cristata.*
7. AIRA foliis planis, paniculâ patente, floribus muticis lœvibus calyce longioribus. *b. m. 42.* *Aquatica.*

M E L I C A.

*Cal. 2 - valvis: rudimentum tertii flosculi
inter flosculos.*

*Herba. (gramen) inflor. panicula debilis
depauperata, vel subspicata.*

1. MELICA petalis imberibus, paniculâ simplici nutante. *b. m. 42.* *Nutans.*
Gramen montanum avenaceum locustis rubris. *mag. Bot. 122. hort. 92.*
2. MELICA petalis exterioribus ciliatis. *b. m. 43.* *Ciliata.*
Gramen montanum avenaceum lanuginosum. *mag. Bot. 122.*

$\beta.$ Gramen avenaceum montanum lanuginosum locustis rarioribus. mag. Bot. 122. hort. 93.

*** CALYCIBUS MULTIFLORIS.

P O A.

Cal. 2-valvis. cor. ovata : valvulis ovato-acutis.

Herba. (gramen) inflor. panicula : spiculis ovatis.

Aquatica. 1. POA paniculâ diffusâ, spiculis 6-floris linearibus. b. m. 43.

Trivialis. 2. POA paniculâ diffusâ, spiculis quinquefloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. b. m. 43.

Angustifolia. 3. POA paniculâ diffusâ, spiculis quadrisporis pubescentibus, culmo erecto tereti. b. m. 43.

Pratensis. 4. POA paniculâ diffusâ, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. b. m. 44.

Gramen pratense vulgatus. mag. Bot. 113. hort. 90.

Annua. 5. POA paniculâ diffusâ, angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. b. m. 44.

Gramen pratense paniculatum minus. mag. Bot. 113. hort. 90.

Eragrostis. 6. POA paniculâ patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris. b. m. 44.

Compressa. 7. POA paniculâ coarctatâ secundâ, culmo obliquo compresso. b. m. 44.

Nemoralis. 8. POA paniculâ attenuatâ, spiculis subbifloris scabris mucronatis, culmo incurvo. b. m. 44.

Bulbosa. 9. POA paniculâ secundâ patentiusculâ, spiculis 4-floris. b. m. 45.

Gramen arvense paniculâ crispâ. mag. Bot. 113. hort. 90.

Gramen kerampelinum miliaceâ prætenuique sparsâ paniculâ, seu kerampelino congener. mag. Bot. 113. hort. 90.

Rigida. 10. POA paniculâ lanceolatâ subramosâ, flosculis alternis secundis. Linn. sif. 875.

Gramen paniculatum minus radice repente, paniculâ duriore. *Tour. inf. 524.*

Gramen paniculâ multiplici. *mag. Bot. 113. hort. 90.*

Gramen aliud monspeliense. *mag. Bot. 122.*

HABITAT ad satorum margines. Vix palmaris.

B R I Z A.

Cal. 2-valvis. cor. cordata : valvulis ventricosif.

Herba. (gramen) inflor. panicula nutans laxa : spiculis cordatis.

1. BRIZA spicâ nutante simplici, spiculis alternis pedunculatis subsolitariis ovatis, calycibus quinque floris. *b. m. 45.* *Monspessulanæ.*
2. BRIZA spiculis lanceolatis, flosculis viginti. *b. m. 46.* *Eragrostis.*
Gramen paniculosum phalaroides. *mag. Bot. 114.*
hort. 91.
3. BRIZA spiculis triangulis, calycibus (flosculis 7) longioribus. *b. m. 46.* *Minor.*
Gramen tremulum minus paniculâ parvâ. *mag. Bot. 114. hort. 91.*
4. BRIZA spiculis ovatis, calyce flosculis (7) breviore. *b. m. 91.* *Media.*
Gramen tremulum majus. *mag. Bot. 113. hort. 91.*
Les amourettes.
5. BRIZA spicâ nutante simplici, spiculis alternis subsolitariis, pedunculis simplicibus bifidisque, calycibus quindecimfloris. *b. m. 91.* *Maxima.*

F E S T U C A.

Cal. 2 - valvis. cor. oblonga : glumis acutis.

Herba. (gramen) inflor. panicula : spiculis teretiusculis,

* *Paniculâ secundâ.*

Ovina. 1. FESTUCA paniculâ secundâ coarctatâ aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. *b. m. 49.*

Rubra. 2. FESTUCA paniculâ secundâ scabré, spiculis sex-floris, flosculo ultimo inutico, culmo semitereti. *b. m. 49.*

Myuros. 3. FESTUCA paniculâ spicatâ nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris. *b. m. 49.*

Bromoïdes. 4. FESTUCA paniculâ secundâ, spiculis erectis, calycis aiterâ valvulâ aristato-acuminatâ longiore, alterâ muticâ. *b. m. 49.*

Maritima. 5. FESTUCA spicâ linearî secundâ rectâ, floribus adpressis subaristatis. *Linn. sif. 876.*

Gramen phœnicoïdes foliis convolutis junceis ac pungentibus. *mag. Bot. 12.*

HABITAT ad littora maris à Maguelone, à Cete.

** *Paniculâ æquali.*

Fluitans. 6. FESTUCA paniculâ ramosâ æquali, spiculis subfessilibus teretibus muticis. *b. m. 49.*

Gramen aquaticum fluitans multiplici spicâ. *mag. Bot. 119.*

B R O M U S.

Cal. 2-valvis. *cor.* valvulis infra apicem aristatis.

Herba. (gramen) *inflor.* panicula : spiculis oblongis distichis.

Distachyos. 1. BROMUS spiculis duabus alternis fessilibus strictis. *Linn. sif.*

Cillata. Festuca spiculis, &c. *b. m. 48. & 547.*

Gramen spicâ brizæ minus. *mag. Bot. 121.*

Secalinus. 2. BROMUS paniculâ patente erectâ, spiculis ovatis, aristis rectis. *b. m. 50.*

Gramen gros montbelgard. *mag. Bot. 121. hort. 92.*

§. Gramen ad gramen dugros accedens. *mag. Bot.*

121.

Gramen spicâ hirsutâ ad gramen dugros accedens.
mag. hort. 92.

3. BROMUS paniculâ patulâ nutante, spicis ovatis, *Squarrosum.*
aristis divaricatis. *b. m. 50.*

Gramen, seu festuca graminea glumis vacuis. *mag.*
Bot. 121. hort. 92.

4. BROMUS paniculâ patulâ, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. *b. m. 50.* *Sterilis.*

5. BROMUS paniculâ nutante, spiculis ovato-oblongis. *b. m. 51.* *Arvensis.*

6. BROMUS paniculâ nutante, spiculis linearibus. *Tectorum.*
b. m. 52.

7. BROMUS spicâ strictâ distichâ, spiculis alternis foliariis sessilibus decemfloris linearibus. *b. m. 52.* *Pinnatus.*

Gramen spicâ brizæ majus. *mag. Bot. 121. hort. 92.*

OBS. Variat flosculis muticis, aut aristatis: aristâ sèpius flosculis longiore.

A V E N A.

Cal. 2 - valvis. cor. oblonga : valvulis aristâ contortâ vel è dorsi medio aut basi.

Herba. (gramen) *inflor.* panicula laxa : pedicellis incrassatis.

1. AVENA paniculâ subspicata, spiculis binatis, alterâ pedunculata, alterâ sessili : aristis divaricatis, calycibus octofloris. *b. m. 52.* *Bromoïdes.*

2. AVENA calycibus dispermis, seminibus lœvibus. *Sativa.*
b. m. 52. L'avoine.

Avena nigra & alba. *mag. Bot. 35. hort. 29.*

* PHARM. *Avena excorticata.* Vis nutriens, demulcens, refrigerans magis quam hordeum. Extus emolliens.

3. AVENA paniculâ patente, calycibus trifloris, flosculis basi pilosis. *b. m. 53. La folle avoine.*

Gramen sive festuca dumetorum utriculis cum

lanagine flavescentibus. *mag. Bot.* 121. *hort.* 93.

- Pratenis.* 4. AVENA calycibus 5-floris, paniculâ spicatâ. *b. m. 53.*

- Flavescens.* 5. AVENA paniculâ laxâ, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. *b. m. 53.*

- Fragilis.* 6. AVENA spicata, flosculis subquaternis calyce longioribus. *b. m. 53.*

A R U N D O.

Cal. cor. caul. rad. Vide suprà *Calyces unifloros.*

- Donax.* 3. ARUNDO calycibus trifloris, paniculâ diffusâ. *b. m. 54. Le roseau.*

Arundo sativa quæ donax Dioscoridis. *mag. Bot.* 29. *hort.* 23.

- Phragmites.* 4. ARUNDO calycibus quinquefloris, paniculâ laxâ. *b. m. 55.*

Arundo vulgaris, seu phragmites. *mag. Bot.* 29. *hort.* 23.

***** CALYCIBUS MULTIFLORIS INSIDENTIBUS RECEPTACULO.

C Y N O S U R U S.

Cal. 2-valvis: valvulis linear-i-acuminatis.

Herba. (gramen) inflor. panicula spiculis appressis. fulc. bracteæ unilaterales.

- Cristatus.* 1. CYNOSURUS bracteis pinnatifidis *b. m. 47.*
Gramen pratense cristatum, seu spicâ cristatâ levâ. *mag. Bot.* 114. *hort.* 91.

- Echinatus.* 2. CYNOSURUS bracteis pinnato-paleaceis aristatis. *b. m. 47.*
Gramen alopecuroïdes spicâ asperâ. *mag. Bot.* 116. *hort.* 91.

- Paniceus.* 3. CYNOSURUS paniculâ subspicatâ, flosculis simplicibus biaristatis. *b. m. 78.*
Gramen paniceum spicâ asperâ. *mag. Bot.* 116. *hort.* 91.

LOLIUM.

Cal. o. spicula multiflora linearis.

Herba. (gramen) inflor. spica disticha.

fulc. bractea solitaria flosculos receptaculo adprimens.

1. LOLIUM spicâ muticâ. b. m. 55. *La fausse ivrage.* Perenne.
Gramen loliaceum angustiore folio & spicâ, seu phœnix Dioscoridis. mag. Bot. 120. hort. 92.
- Gramen loliaceum minus lupinum spicâ multiplici. mag. Bot. 120. hort. 92.
2. LOLIUM spicâ aristatâ. b. m. 55. *L'ivrage.* Temulentum.
Gramen loliaceum spicâ longiore, seu lolium Dioscoridis. mag. Bot. 120. hort. 92.

ELYMUS.

Cal. o. cor. valvulis subulato-aristatis.

Herba. (gramen) inflor. spiculæ binatæ.

fulc. bractæ binatæ.

1. ELYMUS foliis mucronato-pungentibus. b. m. 56. Arenarius.

SECALE.

Cal. o. sem. oblongum subcylindricum.

Herba. (gramen) inflor. flosculi binati.

fulc. bractæ geminatæ.

1. SECALE glumarum ciliis scabris. b. m. 56. Le Cereale. seigle.
Secale hybernum majus & vernum minus. mag. Bot. 235. hort. 182.
- * PHARM. Secalis farina. Vis nutriend, extus farinæ hordei succedanea.
2. SECALE glumarum ciliis villosis, squamis calycinis cuneiformibus. b. m. 56. Villosum.

T R I T I C U M.

Cal. 2-valvis subtriflorus, sessilis, obtusiusculus, acutus; basis receptaculi callosa. *sem.* ovato-oblongum utrinque obtusum.

Herba. (*gramen*) *inflor.* spicata.

* *Annua.*

Aestivum. 1. TRITICUM glumis ventricosis, glabris, imbricatis, aristatis. *b. m.* 57.

Triticum aristis longioribus, spicâ albâ. *mag. hort.* 200.

Hybernum. 2. TRITICUM glumis ventricosis, lævibus, imbricatis, submuticis. *b. m.* 57.

Triticum hybernum aristis carens. *mag. Bot.* 271. *hort.* 200.

* PHARM. *Triticî farina.* Vis nutriendis; extus emolliens. *Amyli* vis mucilaginosa, demulcens, refrigerans, incrassans. *Furfuris* vis emolliens, demulcens.

Spelta. 3. TRITICUM calycibus truncatis quadrifloris, flosculis aristatis hermaphroditis, intermedio neutro. *b. m.* 57. *La fausse épautre.*

Monoccocon. 4. TRITICUM involucris unifloris, flosculis aristatis, spicâ distichâ. *b. m.* 57. *L'épautre.*

Zea briza dicta, seu monoccocos germanica. *mag. Bot.* 282.

Zea, sive spelta. *mag. hort.* 292.

** *Perennia.*

Repens. 5. TRITICUM calycibus subulatis trifloris acuminatis. *b. m.* 57. *Le chien-dent.*

* PHARM. *Graminis radix.* Vis diuretica, aperiens, hepatica, mundificans, subrefrigerans, subastrigens.

Caninum. 6. TRITICUM calycibus subulatis, æqualibus, quadrifloris, aristatis. *b. m.* 58.

Gramen

I R R E G U L A R E S. 129

Grauen caninum arvense. *mag. Bot.* 112. *hort.* 90.
Grauen caninum maritimum spicatum. *mag. Bot.*
112. *hort.* 90.

7. TRITICUM calycibus subquadrisfloris, flosculis *Tenellum.*
muticis, acutis; foliis setaceis. *Linn. sif.* 880.
Grauen loliaceum minus spicâ simplici. *mag. Bot.*
112. ? *hort.* 92. ?
Grauen sparteum monspeliacum, sive capillaceo
folio minimum. *mag. Bot.* 120. ? *hort.* 92. ?
HABITAT in glareolis, & argillosis, à Caunelles,
& in luco gramuntio.

H O R D E U M.

Cal. o. sem. angulatum ventricosum.

Herba. (*gramen*) *inflor.* flosculi ternati.
fulc. bractea ad quemlibet flosculum
binata.

1. HORDEUM flosculis omnibus hermaphroditis *Vulgare.*
aristatis, ordinibus duobus erectioribus. *b. m.*
58. *L'orge.*
* PHARM. *Hordeum integrum*, mundatum. Hu-
jus *farina*, vis nutriendis, refrigerans, demul-
cens, emolliens, abstergens.

P O L Y G A M I A

M O N @ C I A.

A V E N A.

Cal. cor. inflor. Vide suprà ejusdem clas-
seos *Triandr. digyniam.*

Mas & hermaphroditus in eodem calyce.
masculo, aristâ dorsali tortili.

7. AVENA calycibus bifloris, flosculo hermaphro- *Elatior.*
dito mutico. *h. m.* 53. *Le frontental.*

H O R D E U M.

Cal. sem. inflor. fulc. Vide suprà *catalyses multifloros Triand. digyniam.*
Hermaphroditus inter duos masculos.

Distichon. 2. HORDEUM flosculis masculis lateralibus muticis, seminibus angularibus patentibus corticatis. *b. m. 58.*

Murinum. 3. HORDEUM flosculis masculis lateralibus, masculis aristatis. *b. m. 58.*
Gramen hordeaceum minus & vulgare. *mag. Bot. 121. hort. 92.*

H O L C U S.

Hermaphroditii flores. *cal. gluma 1-flora. cor. gluma 2-valvis aristata: stam. 3. styl. 2. sem. 1.*

Herba. (*gramen*) *inflor.* panicula conica: flosculo hermaphrodito inter duos masculos, aut masc. & hermaphrodito conjugatis.

Halepensis. 1. HOLCUS glumis glabris, floribus hermaphroditis muticis, femineo aristato. *b. m. 513.*

HABITAT *au-delà de Boutonet. Cicur.*

Lanatus. 2. HOLCUS glumis villosis bifloris, hermaphrodito mutico, masculo aristâ recurvâ. *b. m. 514.*
Gramen pratense paniculatum molle. *mag. Bot. 112. hort. 90.*

Odoratus. 3. HOLCUS glumis trifloris muticis glabris, hermaphrodito diandro. *b. m. 514.*

HABITAT ad dexteram in saxosis *au pont de Villeneuve.*

Mollis. 4. HOLCUS glumis bifloris nudiusculis: hermaphrodito mutico: masculo aristâ geniculatâ. *b. m. 514.*

ANDROPOGON.

Hermaphrod. & masculi flores. *cal.* gluma 1-flora.

cor. gluma basi aristata. *stam.* 3. *styl.* 2.

sem. 1. masc. ut in hermaphr.

Herba. (gramen) *inflor.* spica digitata :

aut panicula : masculo inter hermaphroditos
(*sæpius*) aut vice versâ.

1. ANDROPOGON paniculæ pedunculis simplicissimi-
mis trifloris , flosculo hermaphroditico aristato ci-
liato basi barbato. *h. m.* 513. *Gryllus.*
 2. ANDROPOGON spicis digitatis linearibus pluri-
mis , flosculis sessilibus : aristato muticoque , pe-
dicellis lanatis. *h. m.* 513. *Ischænum.*
- Gramen dactylon spicis villosis. *mag. Bot.* 114.
Gramen angustifolium dactylon spicis villosis. *mag.*
hort. 90.

CENCHRUS.

Cal. gluma 2 - flora. hermaphroditii & masc.
flores.

Hermaphrod. *cor.* gluma mutica ; *stam.* 3.
styl. 2-fidus. *sem.* 1. *masc.* *cor.* & *stam.*
hermaphroditii.

Herba. (gramen) *inflor.* masc. & hermaphro-
ditus in eodem calyce. *fulc.* bractea
echinata laciniata biflora.

1. CENCHRUS paniculâ spicatâ , glumis murica-
tis , setis ciliaribus , foliis ciliatis. *h. m.* 514. *Racemosus.*
2. CENCHRUS spicâ ovatâ simplici. *h. m.* 514. *Capitatus.*
Gramen spicâ subrotundâ echinatâ. *mag. Bot.* 116.
hort. 91.

ÆGYLOPS.

Cal. gluma 2-flora, triflorave. hermaphroditæ & masculi flores. hermaphr. *cor.* gluma 2-valvis, exteriore aristato-acuminata *stam.* 3. *sém.* 1.

Mas. *cor.* & *stam.* ut in hermaphroditis.

Herba. (gramen) *inflor.* spica stricta aspera: flosculis ternis (in eodem calyce) intermedio masculo pedunculato: binatisve, altero masculo, hermaphrodito altero.

Ovata. 1. ÆGYLOPS spicâ ovatâ, aristis calycum ternis.
b. m. 515.

Gramen, sive festuca altera capitulis duris. *mag.*
Bot. 122. *hort.* 92.

Triuncialis. 2. ÆGYLOPS spicâ oblongâ, aristis calycum inferiorum binis, superiorum ternis. *b. m.* 515.

Gramen, sive festuca altera capitulis duris, spicâ longiore. *mag.* *Bot. app. altera.* 311.

Obs. Calyces inferiores in utraque specie, triflori; summi sæpius biflori. Masculo hermaphrodito interdum mutico.

■ *Incurva.* 3. ÆGYLOPS spicâ subulatâ muticâ lœvi incurvâ, calyculis unifloris. *Linn. sp. pl. edit.* 24. 1490.
Gramen loliaceum spicis articulosis erectis. *Tour.*
Scheuz. 43.

Gramen myuros erectum minimum arundinaceum.
Bocc. mus. 70. *t.* 59.

Nardus spicâ incurvâ subulatâ articulatâ tereti.
ger. fl. Gallop. 73.

HABITAT à Gramont, Selleneuve, S. George. Vix palmaris.



Classis V.

**T R I P E T A L I
R E G U L A R E S.**

*TRIANDRIA** *MONOGYNIA.*

CNEORUM.

*HEXANDRIA** *TRIGYNIA.*

RUMEX.

TRIGLOCHIN.

* *POLYGYNIA.*

ALISMA.

*MONŒCIA** *TETRANDRIA.*BUXUS. femina... (*mas dipetalus.*)* *POLYANDRIA.*

SAGITTARIA. uterque sexus.

*DIŒCIA** *HEXANDRIA.*

RUMEX. 9. 10.

* *ENNEANDRIA.*

HYDROCHARIS, uterque sexus.

* *MONADELPHIA.*JUNIPERUS, femina... (*mas apetalus.*)* *PALMÆ.*

PHœNIX, uterque sexus.

TRIPE TALI REGULARES.

TRIANDRIA MONOGYNIA. CNEORUM.

Cal. 3-dentatus. *bacc.* 3-cocca. *cor.* infera.

Frutex. *fol.* integerrima. *inflor.* axillaris solitaria.

Tricoccos. 1. CNFORUM foliis oblongis sessilibus, pedunculis solitariis. *h. m. 23.*
Chamælea tricoccos. *mag. Bot. 59. hort. 52.*

HEXANDRIA TRIGYNTIA. RUMEX.

Cal. 3-phillus. *cor.* petala conniventia. *sem.* 1, triquetrum.

Herba. *fol.* petiolata, petiolo vaginanti.

* *Valvulis grano notatis.*

Patientia. 1. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis integrimis : unâ graniferâ, foliis cordatis. *h. m. 186. La patience.*

2. Lapathum pratense capite comosiore. *mag. Bot. app. 300.*

Crispus. 2. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis inte-

TRIPETALI REGULARES. 135

gerrimis graniferis, foliis acutis lanceolatis undulatis. b. m. 186. *La patience sauvage frisée.*

Lapathum folio acuto crispo. mag. hort. 110.

* PHARM. *Lapathi crisi radix.* Radicis *lapathi acuti* succedanea.

3. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis. b. m. 186. *Acutus.*

Lapathum vulgare ramosum. mag. Bot. 299.

Lapathum folio acuto plano. mag. hort. 110.

* PHARM. *Lapathi acuti radix, semina.* Vis ecoprotica, aperiens, hepatica subastrigens, tonica, antiulcerosa, antiscabiosa! *seminum* antidiarrhoica.. *radix* ad unc. 1.

4. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis dentatis graniferis, foliis radicalibus lyratis. b. m. 187. *Pulcher.*

Lapathum pulchrum bononiense sinuatum. mag. Bot. 300. hort. 111.

* *Valvulis grano destitutis.*

5. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis nudis, pedicellis planis reflexis. b. m. 187. *Bucephalophorus.*
Acetosa ocymi folio neapolitana. mag. Bot. 311.
hort. 4.

6. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis integrerrimis nudis, foliis cordatis. b. m. 187. *Aquaticus.*

Lapathum aquaticum folio cubitali. mag. Bot. 149.

Lapathum maximum aquaticum sive hydrolapathum. mag. hort. 110.

* PHARM. *Lapathi aquatichi, seu herbæ britannicæ radix, herba.* Vis eccoprotica, aperiens, astrigens, antiulcerosa! *gargarismica*, morbis cutaneis, scelotyrbe adversa... *radix* ad unc. 1.

7. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis. b. m. 188. *L'oseille ronde ou des jardins.* *Scutatus.*

Acetosa rotundifolia hortensis. mag. Bot. 4. hort.

* PHARM. *Acetosa hortensis herba, radix, semina.* Vis *foliorum* refrigerans, antiputrida, antiscorbutica, febribus biliosis adversa, resol-

vens, maturans; radicis aperiens, diuretica; seminum antidysenterica.

- Tingitanus.* 8. RUMEX floribus hermaphroditis distinctis, valvulis cordatis obtusis integerrimis, foliis hastato-ovatis erosis. Linn. sp. pl. edit. 2a. 479.
Acetosa maritima foliis sinuatis & dentatis. mag. Bot. 4. & hort. 4.
HABITAT in maritimis à Cete, à Aiguemortes, Maguelone.

TRIGLOCHIN.

Cal. 3-phyllo. cor. petala calyciformia.

styl. o. caps. basi dehiscens.

Herba scaposa, à latere radicis. *inflor.* racemosa.

- Palustre.* 1. TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublineariibus. b. m. 189.
Gramen junceum spicatum, seu triglochin. mag. Bot. 119.
Juncago palustris & vulgaris. mag. hort. 107.

HEXANDRIA

POLYGYNIA.

ALISMA.

Cal. 3-phyllo. pericarpia plura.

Herba scaposa, emersa. *inflor.* paniculæ pedicellis verticillatis.

- Plantago.* 1. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. b. m. 190. *Le plantain d'eau.*
Plantago aquatica latifolia. mag. Bot. 206.
Ranunculus palustris plantaginis folio ampliore. mag. hort. 169.
* PHARM. Plantaginis aquatica herba. Vis anticalculosa. Haen. rat. medendi, p. 111.

2. ALISMA foliis cordato-oblongis, floribus hexa-gynis. *b. m.* 190. *Damasonium*
 Plantago aquatica stellata. *mag. Bot.* 206.
 Ranunculo palustri plantaginis folio affinis. *mag. hort.* 169.
 3. ALISMA foliis linear-lanceolatis, fructibus globo-squarrosois. *b. m.* 190. *Ranunculus-*
loides.
 Plantago aquatica angustifolia. *mag. Bot.* 206.
 Ranunculus palustris plantaginis folio angustiore.
mag. hort. 169.

M O N C E C I A T E T R A N D R I A.

B U X U S.

Feminei flores. *cal.* 4-phyllo. *styl.* 3. *caps.*
 3-rostris, 3-locularis. *sem.* 2.
Col. *fol.* Vide tertiae classeos ordinem
 sextum.

1. BUXUS. *b. m.* 484.

Arborescens.

* PHARM. *Buxi lignum*, oleum empyreumaticum.
 Vide classem 3^{am}.

M O N C E C I A P O L Y A N D R I A. S A G I T T A R I A.

Masculi & feminei flores. *masf.* *cal.* 3-phyllo.
stam. 20-24 *fem.* *cal.* maris. *pist.* 0.
sem. nuda plura.

Herba immersa. *fol.* emersa. *inflor.* pe-dunculo subumbellifero emerso. feminis
 infra masculos,

- Sagittifolia.* 1. SAGITTARIA foliis sagittatis acutis. *b. m.* 489.
La fleche d'eau.
Sagitta aquatica minor latifolia. *mag.* *Bot.* 228.
Ranunculus palustris folio sagittato. *mag. hort.* 169.

D I C E C I A H E X A N D R I A. R U M E X.

Masculi & feminei flores. *cal. cor. sem. caul. fol.* Vide suprà hujusce classeos secundum ordinem. *inflor.* mares, & feminæ subpaniculatæ.

- Acetosa.* 9. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *b. m.* 188. *L'oseille des prés.*
 * PHARM. *Acetosa pratensis* herba, radix, semina. Vis acetosæ rotundifoliæ.
Acetosella. 10. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *b. m.* 188.
Acetosa arvensis lanceolata. *mag.* *Bot.* 3. *hort.* 4.
 β. *Acetosa lanceolata angustifolia.* *mag.* *Bot.* 3. *hort.* 4.

D I C E C I A E N N E A N D R I A. H Y D R O C H A R I S.

Masculi & feminei flores. *mas.* *spatha* 2-phylla. *cal.* 3-fidus *filamenta* serie triplici, intermediis tribus *styliferis*.

Fem. *cal.* 3-fidus. *styli.* 6. *caps.* 6-locularis polysperma infera.

Herba scaposa immersa. *fol.* natans. *inflor.*

emersa : flosculo scapum terminanti.
fulc. stipulæ ad basin scapi.

1. HYDROCHARIS. h. m. 508.

Morsustane.

Nymphaea alba minor. mag. Bot. 188. hort. 148.

2. *Nymphaea alba minima. mag. Bot. 188. hort. 148.*

Obs. Totum habet nymphæ habitum ; ab illa differt stipulis , è quarum axillis prodeunt scapi.

D I C E C I A

MONADELPHIA.

J U N I P E R U S.

Feminei flores. cal. 3-partitus. styl. 3. bacca
3-sperma , tuberculis calycinis 3. inæ-
qualis.

*Frutex. fol. incerta. inflor. femina axil-
laris solitaria sessilis.*

1. JUNIPERUS foliis patentibus ternis mucronatis , *Oxycedrus.*
baccâ brevioribus. h. m. 509. *Le cade.*

*Juniperus major baccâ rufescente. mag. Bot. 228.
hort. 107.*

2. JUNIPERUS foliis ternis oblitteratis imbricatis *Phænicea.*
obtusis. h. m. 509. *Le cedre.*

Sabina major montpeliensium. mag. Bot. 228.

*Juniperus folio cupressi major , fructu flavescente.
mag. Bot. 56. hort. 509.*

* PHARM. *Sandaraca resina* convenit virtutibus cum sandaraca juniperi vulgaris arboris , ipsâ tamen rarer , pretiosior , & dum comburitur fragrantior. *Geofr. mat. med.... Pharm. olibani seu thuris resina. Vis vulneraria , antipleuritica , ophtalmica , anticatarrhalis , antiephelica. Da-
tur intus à scrup. i ad drach. i aut drach. ii.*

3. JUNIPERUS foliis ternis undique imbricatis ob- *Lycia.*
tusis ovatis. h. m. 509.

Sabina. 4. JUNIPERUS foliis oppositis erectis decurrentibus, oppositionibus pyxidatis. *b. m. 509. Le sabinier, la sabine.*

* PHARM. *Sabinae* herba, aqua stillatitia, oleum stillatum; vis emmenagoga! antidystocica, diuretica, antelmintica, extus resolvens, abstergens, antiephelica.. *folia* in infusa ad usque drach. *fl. eadem* in substantia ad usque drach. i in vini albi cyatho.. *aqua* ab unc. *fl. ad unc. ii...* *oleum* ad gutt. ii, iii, iv.

Communis. 5. JUNIPERUS foliis ternis patentibus mucronatis baccâ longioribus. *h. m. 510. Le genevrier vulgaire, le genevrier en arbre.*

Juniperus vulgaris arbor. mag. Bot. 145. hort. 107.

* PHARM. *Juniperi* lignum, baccæ, aqua stillatitia, oleum empereumaticum, oleum essentiale, extractum. Vis pellens, calefaciens diuretica *urina*, *urina violacea*, anticalculosâ, stomachica, carminativa, alexiteria, extus resolvens, mundificans, antitinealis.. *baccæ* ad drach. i... *aqua* ab unc. iv ad unc. vi... *oleum essentiale* ad gutt. i. ii. anthelminticum, maximè diureticum... extractum ad drach. i... *oleum empereumaticum* ad gutt. i. ii. anthelminticum, maximè resolvens... *juniperi arboris* resina seu sandaraca, mastiches viribus analogâ, anticatarrhalis, antiulcerosa, rhagadibus manuum pedumque adversa.

D I Ø C I A

P A L M Æ.

P H Ø N I X.

Maf. *cal.* 3-partitus. *stam.* 3.

Fem. *cal.* maris. *pist.* i. *drupa* ovata.

Arbor. *fol.* sparsa pinnata: foliolis complicatis. *inflor.* maf. spadice racemoso... fem. *inflor.* maris.

I. PHœNIX frondibus pinnatis, foliolis complicatis. *Dactyliferus.*

b. m. 544. Le dattier.

* PHARM. *Dactyli fructus.* Vis subastrigens, edulcorans, antitussiculosa, antiraucedinosa, antidysurica.. coquuntur n°. x in aquæ lib. iv ad quartæ partis consumptionem.

HABITAT à *Frontignan*, ubi floret quolibet anno;
& à la rue des *Etuves*.



Classis VI^a.

TETRAPETALI
R E G U L A R E S.

*DIANDRIA** *TRIGYNIA.*

BUFONIA.

A. *SILIQUOSÆ.*

LEPIDIUM. 5.

SISYMBRIUM. 9.

B. *CAPSULARES.*

LYTHRUM. 3.

*TETRANDRIA** *MONOGYNIA.*

CARDAMINE. 4.

LEPIDIUM. 6.

EVONYMUS.

CORNUS.

* *TETRAGYNIA.*

POLAMOGETON.

SAGINA.

TILLÆA.

*OCTANDRIA** *MONOGYNIA.*

RUTA.

EPILOBIUM.

* *DIGYNIA.*

MÆRHINGIA.

* TETRAGYNIA.

PARIS.

I C O S A N D R I A

* POLYGYNIA.

TORMENTILLA.

P O L Y A N D R I A

* MONOGYNIA.

CAPPARIS.

ACTÆA.

CHELIDONIUM.

PAPAVER.

** POLYGYNIA.

CLEMATIS.

THALICTRUM.

T E T R A D Y N A M I A

* SILICULOSA.

MYAGRUM.

DRABA.

LEPIDIUM.

THLASPI.

COCHLEARIA.

ALYSSUM.

CLYPEOLA.

BISCUTELLA.

LUNARIA.

** SILIQUOSÆ.

DENTARIA.

CARDAMINE.

144 *TETRAPETALI REGULARES.*

SISYMBRIUM.

ERYSUM.

CHEIRANTHUS.

HESPERIS.

ARABIS.

TURRITIS.

BRASSICA.

SINAPIS.

RAPHANUS.

BUNIAS.



TETRAPETALI

TETRAPETALI

REGULARES.

DIANDRIA

T R I G Y N I A.

BUFONIA.

Cal. 4-phyllo. caps. 1-loocularis, 2-sperma, 2-valvis.

Herba stricta. fol. subulata opposita connata.

1. BUFONIA. *b. m. 59. La buffon.*

Tenuifolia.

Polygonum angustissimo & gramineo folio. *mag. Bot. 211.*

Herniaria angustissimo & gramineo folio. *mag. hort. 97. icon. 96.*

L E P I D I U M.

Silic. caul. fol. Vide decimum hujusce classeos ordinem.

5. LEPIDIUM floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus serratis lanceolatis, superioribus linearibus integerrimis. *b. m. 315. La passerage sauvage*

Iberis.

Iberis latiore folio. *mag. Bot. 139.*

Lepidium gramineo folio, sive iberis. *mag. hort. 115.*

* PHARM. *Iberis radix, folia. Vis lepidii vulgaris.*

S I S Y M B R I U M.

Siliq. cal. cor. fol. Vide decimum hujusce classeos ordinem.

- Loëselii.* 9. SISYMBRIUM foliis pinnato-hastatis acutis hirtis, caule hispido. *Linn. sifl. 1133. cent. 51.*
Erysimum angustifolium majus. *mag. Bot. 93. hort. 75.*

L Y T H R U M.

Cal. caps. Vide class. undecimæ hexand. monog...inflor. Vide hexandr. digyniam.

- Thymifolium.* 3. LYTHRUM floribus diandris tetrapetalis, foliis alternis linearibus, alternis. *b. m. 228.*
Gratiola minima, vel hyssopifolia minor. *mag. Bot. 123.*
Salicaria minima tenuifolia. *mag. hort. 176.*
Abundat in pratalis & herbidis omnibus circa stagna, entre Lattes & Perauls.

T E T R A N D R I A

M O N O G Y N I A.

C A R D A M I N E.

Siliq. stigm. cal. fol. Vide decimum ejusdem classeos ordinem.

- Hirsuta.* 4. CARDAMINE foliis pinnatis, floribus tetrandris. *b. m. 324.*
Nasturtium aquaticum minus. *mag. Bot. 183.*
Cardamine quarta Dalechampii. *mag. hort. 42.*

L E P I D I U M.

Siliq. caul. fol. Vide ejusdem classeos decimum ordinem.

6. LEPIDIUM scapo nudo simplicissimo , floribus *Nudicaule*,
tetrandris. *b. m. 314.*
Nasturtium minimum vernum , foliis circa radi-
cem. *mag. Bot. 187. icon. 186. hort. 142.*

E V O N Y M U S.

Cal. 4-partitus patens. *cor.* infera. *bacc.*

4-gona lobata capsularis 4-locularis,
4-valvis , colorata. *sem.* calyprata
arillata.

Arbor. ramis 4-gonis. *fol.* opposita pe-
tiolata.

1. EVONYMUS. *b. m. 113.* *Le fusain.* *Europaeus.*
2. Foliis obtuse serratis , capsularum angulis obtusis. *Tenuifolius,*
b. m. 113.
Evonymus vulgaris granis rubentibus. *mag. Bot.*
93. hort. 76.
2. Foliis argutè acutèque serratis , capsularum an- *Latifolius,*
gulis acutis. *b. m. 113.*
Evonymus latifolius. *mag. hort. 76.*
HABITAT γ ad lèvam in colle elato à *Lamoisson.*

C O R N U S.

Cal. 4-dentatus deciduus. *cor.* supera.
drup. nucleo 2-loculari.

Arbor. ramis teretibus. *fol.* opposita pe-
tiolata.

1. CORNUS umbellis oppositis sessilibus , bracteis *M.s.*
quaternis. *Le cornouiller.*

Cornus umbellis involucrum æquantibus. *hort. 172.*

Cornus hortensis mas. *mag. Bot. 79. hort. 63.*

* PHARM. *Corni maris fructus.* Vis refrigerans ,
adstringens.

2. CORNUS umbellis terminalibus nudis. *Sanguinea,*
Cornus cymis nudis. *b. m. 172.*

Cornus femina. *mag. Bot. 79. hort. 63.*

TETRANDRIA

TETRAGYNI A.

POTAMOGETON.

Cal. o. styl. o. sem. 4-sessilia.

Herba immersa, axillis stoloniferis. inflor. emersa spicata axillaris.

Natans. 1. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *b. m. 75.*

Densum. 2. POTAMOGETON foliis ovatis acuminatis oppositis confertis, caulis dichotomis. *b. m. 76.*
Potamogeton minus foliis densis mucronatis non ferratis. *mag. Bot. app. 304.*

Crispum. 3. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undulatis ferratis. *b. m. 76.*
Potamogeton foliis crispis, seu lactuca ranarum. *mag. Bot. 213. hort. 164.*

Setaceum. 4. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis acuminatis. *b. m. 76.*
Potamogeton angustifolium racemosum. *mag. Bot. 213. hort. 164.*

Pusillum. 5. POTAMOGETON foliis linearibus oppositis, alternisque distinctis, basi patentibus, caule tereti. *b. m. 76.*
Potamogeton minimum capillaceum. *mag. Bot. 213.*

OBS. Hanc vidimus speciem in fossulis aquâ plenis, ascendendo ad montem lupi.

SAGINA.

Cal. 4-phyllo. caps. 4-valvis, 4-locularis polysperma.

Herba. fol. opposita. inflor. axillaris, pendunculata, aut terminalis.

1. SAGINA ramis procumbentibus. *b. m. 77.* *Procumbens.*
Alpine littoralis graminea. mag. Bot. 290. hort. 11.
2. SAGINA caule erecto unifloro. *b. m. 77.* *Erecta.*
Alpine verna glabra. mag. Bot. 14. hort. 11.

T I L L Æ A.

Cal. 4-phyllus. caps. 4, polyspermæ.
Herba. fol. linearis integerrima succulenta.

OBS. Variat calycibus 3-phyllis aut 5-phyllis; corollis tripetalis pentapetalisve capsulisque totidem.

1. TILLÆA erecta, floribus lateralibus, foliis obtusis. *b. m. 77.* *Rubra.*

Sedum annum stellatum rubrum. mag. Bot. 238.
hort. 163.

2. TILLÆA procumbens, floribus glomeratis axillaribus. *b. m. 77.* *Muscosa.*

Polygonum muscosum minimum. mag. Bot. 211.
Herniaria muscosa minima. mag. hort. 97.

O C T A N D R I A

M O N O G Y N I A.

R U T A.

Cal. 4-partitus. cor. petala concava. germ. punctis 8-melliferis. caps. 4-fida, 4-loricularis polysperma...Datur monopetala.
Suffruticulus. fol. composita, pinnata, carnofa.

1. RUTA foliis decompositis. *b. m. 205. La rue des Gravolens.*
jardins.

Ruta sylvestris major. mag. Bot. 227. hort. 176.
Ruta hortensis. mag. hort. 176. latifolia. ibid.

* PHARM. *Ruta hortensis herba, aqua, syrpus.*
Vis resolvens, pellens, alexiteria, antihelmintica, carminativa, emmenagogica, sudorifera,

antihysterica , antiepileptica , ophtalmica , anti-
tumacacica... *folia* ad pug. i; ii. in infuso ,
decocto , pulverata ad drach. i... *aqua* ab unc. i.
ad unc. iv.

E P I L O B I U M.

Cal. 4-fidus superus. *caps.* oblonga infera
4-locularis. *sém.* papposa.

Herba. *fol.* mollis , incerta , simplex.

* *Staminibus declinatis.*

Angustifo- 1. *EPILOBIUM* foliis sparsis linear-lanceolatis. *b. m.*
tium. 193.

Chamænerion alterum angustifolium. *mag. hort.* 53.

2. *EPILOBIUM* latifolium vulgare. *mag. hort.* 53.

** *Staminibus erectis , petalis bifidis.*

Hirsutum. 2. *EPILOBIUM* foliis oppositis lanceolatis serratis.
b. m. 193.

Lysimachia siliquosa hirsuta magno flore violaceo.
mag. Bot. 172.

Chamænerion villosum magno flore. *mag. hort.* 53.

Montanum. 3. *EPILOBIUM* foliis oppositis ovatis dentatis. *b. m.*
194.

Chamænerion glabrum majus. *mag. hort.* 54.

Tetragonum. 4. *EPILOBIUM* foliis lanceolato-linearibus , imis
oppositis , caule tetragono. *b. m.* 194.

Lysimachia siliquosa glabra minor. *mag. Bot.* 172.

Chamænerion glabrum minus. *mag. hort.* 54.

O C T A N D R I A

D I G Y N I A.

M Ø R H I N G I A.

Cal. 4-phyllus. *caps.* 1-locularis 4-valvis.

Herba, debilis , subdichotoma. *inflor.* pe-

dunculo longissimo ex dichotomia caulis solitario unifloro.

1. MŒRHINGIA. *b. m.* 197. *La moërhing.* *Muscosa.*
Alsine tenuifolia muscosa. mag. Bot. 13. hort. 11.

OCTANDRIA TETRAGYNTIA.

P A R I S.

Cal. 4-phyllo. *pcor.* petala subulata angustiora. *bacc.* 4-locularis.

Herba simplicissima. *fol.* uni - verticillata.

1. PARIS. *b. m.* 400. *Le raisin de renard.* *Quadrifolia.*
Solanis aliquatenus affinis herba paris. mag. hort.
187.

ICOSANDRIA POLYYNTIA.

TORMENTILLA.

Cal. 8-fidus. *sem.* 8. mutica subrotunda nuda *receptaculo* exsucco affixa.

Herba. *fol.* ternata. *inflor.* oppositifolia pedunculata solitaria.

1. TORMENTILLA caule erecto. *b. m.* 249. *La Ereda.. tormentille.*

Tomentilla sylvestris. mag. hort. 197.

* PHARM. *Tomentilla* radix. Vis adstringens! anti diarrhoea, antileucorrhœa, ischæma.. ab unc. ff. ad unc. 1. in aquæ lib. 3 aut 4.. in substantia à drach. ff. ad drach. 1.

POLYANDRIA
M O N O G Y N I A.
CAPPARIS.

Cal. 4-phillus coriaceus. stam. longa. caps.
 intus carnosa 1-locularis pedunculata.
Fruticulus, ramis virgatis. fulc. spinæ stip-
puliformes.

- Spinosa.* 1. CAPPARIS aculeata. *b. m. 251. Le caprier.*
 Capparis spinosa folio acuto, fructu minore. *mag.*
Bot. 48. hort. 41.
 * PHARM. *Capparidis radicis cortex, flores aceto*
conditi. Vis diuretica emmenagoga, aperiens,
splenica, tonica. Cortex radicis in substantia
ad drach. 1. in lib. 1. decocti aut infusi ad
drach. 1.

ACTÆA.

Cal. 4-phillus. bacc. 1-locularis. sem. ge-
mino ordine semi-orbicularia.
Herba, simplex. fol. bipinnata. inflor. spi-
cato-racemosa.

- Christopho-*
nina. 1. ACTÆA racemo ovato, fructibus baccatis. *b. m.*
251. L'herbe de S. Christophe.
 Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ra-
 mosæ. *mag. hort. 54.*
 * PHARM. *Actææ radix. Vis subvenenata, sudorifera,*
pellens in asthenia virginica heroïca ex
clariss. Linnaeo, cautè exhibenda.

CHELIDONIUM.

Cal. 2-phillus. siliqua 1-locularis linearis.
Herba. fol. incerta. lâtesc. crocea.

1. CHELIDONIUM pedunculis umbellatis. *b. m. 252.* *Majus.*

La grande chelidoine, ou l'éclaire.

Chelidonium majus vulgare. mag. Bot. 62. hort. 54.

* PHARM. *Chelidonii majoris radix, herba, aqua, extractum. Vis diuretica diaphoretica, hepatica, antiauriginosa †, antihydropica, antiædematosa, antiherpetica, antiverrucosa, antileucomatica, cataractæ incipienti adversa, abstergens. Radicis siccæ pulvis à drach. ff. ad drach. I. recentis ad unc. I. in vini lib. II. infusæ, aut in f. q. aquæ decoctæ datur cyathus.. succus ad gutt. III vel IV in liquoris appropriati cyatho exhibetur.*

2. CHELIDONIUM pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, caule glabro. *b. m. 252.* *Glaucium.*

Le pavot cornu.

Papaver corniculatum luteum. *mag. Bot. 198.*
hort. 153.

3. CHELIDONIUM pedunculis unifloris, foliis sessilibus pinnatifidis, caule hispido. *b. m. 252.* *Corniculatum.*

Papaver corniculatum phæniceum hirsutum. *mag.*
Bot. 198. hort. 153.

4. CHELIDONIUM pedunculis unifloris, foliis linearibus pinnatifidis, caule lœvi. *b. m. 252.* *Hybridum.*

Papaver corniculatum violaceum. *mag. Bot. 198.*
hort. 153.

P A P A V E R.

Cal. 2-phyllo. caps. 1-locularis sub stigmate persistente, poris dehiscens.

Herba. inflor. pedunculis ante florescentiam cernuis: vigente florescentiâ rectis: ipsâ absolutâ strictis.

* *Capsulis hispidis.*

1. PAPAVER capsulis subglobosis torosis, caule folioso multifloro. *b. m. 253.* *Hybridum.*

Argemone capitulo breviore. mag. Bot. 26.

Papaver argemone dictum capitulo rotundo hirsuto torulis canulato. *mag. hort.* 153.

Argemone. 2. PAPAVER capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro. *b. m.* 252.

Argemone capitulo longiore. *mag. Bot.* 26.

Papaver argemone dictum capitulo longiore tenuiore hirsuto. *mag. hort.* 153.

Alpinum. 3. PAPAVER capsulâ hispidâ, scapo unifloro nudo hispido, foliis pinnatis, bipinnatisque. *b. m.* 253.

** *Capulis glabris.*

Dubium. 4. PAPAVER capsulis oblongis glabris, caule multifloro setis adpresso, foliis pinnatifidis incisis.

Linn. sp. pl. 1196.

Argemone capitulo longiori glabro. *mag. Bot.* 26.

Papaver argemone dictum capitulo longiori glabro. *mag. hort.* 153.

HABITAT in arvis, à *Prades*, & à la source du *Lés*, au *Capouladou*, à *S. Loup*.

Rhaea. 5. PAPAVER capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. *b. m.* 253.

Le pavot rouge, le coquelicoq.

Papaver erraticum majus. *mag. Bot.* 198. *hort.* 163. & varietates.

* PHARM. *Papaveris rhaedis* flores, aqua stillatitia, syrpus, conserva, tinctura, capitula. Vis subanodina, demulcens, diaphoretica, anticatharralis, antipleuritica, tussi contumaci, anginæ adversa... flores ad manip. 1, in aquæ lib. vi... aqua ab unc. iii ad vi... conserva ab unc. fl. ad 1.... extractum à drach. fl. ad drach. i... syrpus ad unc. 1... capitula n°. vi. in aquæ lib. iv.. tinctura à drach. 1. ad drach. ii.

Somniferum. 6. PAPAVER capsulis calycibusque glabris, foliis incisis amplexicaulibus. *b. m.* 253. *Le pavot blanc, le pavot noir.*

Papaver hortense semine nigro & albo. *mag. Bot.* 197: *hort.* 152.

* PHARM. *Papaveris albi, nigri*, semina, capitula, syrpus, qui diacodium, laudanum nostras.

Vis hypnotica, antispasmodica: anodina, cardiaca, aphrodisiaca, exhilarans, profluviis, vomitui, agrypnia, motibus quibus assuevit natura, non naturalibus adversa... *syrupus ab unc. fl, ad unc. i... capitula, quæ capsulæ, n°. i, ii, in aquæ cyatho incocta.... laudanum nostras à gran. iv ad vi, vii.*

POLYANDRIA POLYGYNIA.

CLEMATIS.

Cal. o. sem. plura compressa in setam plumosam terminata.

Suffruticulus farmentosus. fol. opposita impari-pinnata.

* Scandentes.

1. CLEMATIS foliis pinnatis, foliolis cordatis scandentes. *Vitalba.*
b. m. 262. L'herbe aux gueux.
Clematis sylvestris latifolia. *mag. Bot. 70. hort. 59.*
clematitis.
- * PHARM. *Clematitis folia. Vis caustica, vesicans, antiulcerosa.*
2. CLEMATIS foliis inferioribus pinnatis laciniatis, summis simplicibus integerrimis lanceolatis. *b. m. 262. floribus 8-gynis.*
Clematis sive flammula scandens tenuifolia. *mag. Bot. 70.*
Clematitis sive flammula repens. *mag. hort. 59.*

* Erectæ.

3. CLEMATIS foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto. *b. m. 263.*
Clematis sive flammula surrecta. *mag. hort. 59.*

T H A L I C T R U M.

Cal. o. sem. plura nuda.

Herba stricta striata. fol. alterna impari-subtripinnata.

Fætidum. 1. THALICTRUM caule paniculato ramosissimo folioso. *h. m. 263.*

Thalictrum minimum fætidissimum. *mag. hort. 193.*

Minus. 2. THALICTRUM foliis sexpartitis, floribus cernuis. *h. m. 263.*

Thalictrum minus. *mag. Bot. 249. hort. 193. vulgo ruta pratensis.*

Angustifolium. 3. THALICTRUM foliolis lanceolato-linearibus integrerrimis. *h. m. 263.*

Flavum. 4. THALICTRUM caule folioso sulcato fistuloso, paniculâ multipli erectâ. *h. m. 263. Le thalitron.*

Thalictrum pratense maximum Monspeliensium asperioribus foliis. *mag. Bot. 249.*

Thalictrum majus siliquâ angulosâ aut striatâ. *mag. hort. 193.*

Thalictrum pratense maximum asperioribus & rugosioribus foliis. *mag. hort. 193.*

Thalictrum majus siliquâ semiinis striatâ, foliis rugosis trifidis. *morif. umb.*

* PHARM. *Thalictri* radix, folia, semina. Vis radicis eadem ac *rhei*, si dosis detur tripla. Vis succi ac seminum adstringens.. *succus* ab unc. 1. ad 11... *semina* ad drach. 1... Copiosè ad margines pratorum habitat à *Lattes*.

T E T R A D Y N A M I A

S I L I C U L O S A.

NOTA. Rad. napiformis. *fol. alterna. inflor. racemosa. cal. 4-phyllus.*

M Y A G R U M.

Silic. valvulis concavis, *stylo* conico terminata: loculo sub-1-spermo.

Herba. scabra stricta. *fol.* simplex sca-
briuscula.

1. MYAGRUM siliculis biarticulatis dispermis, foliis extrorsum sinuatis. *b. m.* 311. denticulatis.
Rapistrum monospermum. *mag. Bot.* 219.
2. MYAGRUM siliculis cordatis subfessilibus, foliis amplexi-caulibus. *b. m.* 311.
Myagrodes latifolium monospermum. *mag. hort.* 139.
3. MYAGRUM siliculis ovatis pedunculatis polyspermis. *b. m.* 311. *La camelina.*
Myagrum sativum. *mag. Bot.* 180. *hort.* 139.
4. MYAGRUM siliculis globosis compressis punctato-rugosis. *b. m.* 312.
Myagro affinis herba, capitulis rotundis. *mag. Bot.* 180.
Rapistrum arvense folio auriculato acuto. *mag. hort.* 171.
5. MYAGRUM siliculis lentiformibus obovatis glabris, foliis lanceolatis serratis. *b. m.* 312.
Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo. *mag. Bot.* 251.
Cochlearia perennis saxatilis minima. *mag. hort.* 59.

D R A B A.

Silic. integra ovali-oblonga: valvulis planiusculis dissepimento parallelis. *styl.* o.

Herba. *fol.* laeviuscula simplex.

1. DRABA scapo ramoso, foliis linear-lanceolatis dentatis. *b. m.* 313.
Bursa pastoris minor loculo oblongo. *mag. Bot.* 43.
Thlaspi alysson dictum polygonifoliò caule nudo, *mag. hort.* 194.

- Muralis.* 2. DRABA caule ramoso, foliis cordatis dentatis
amplexicaulibus. *b. m.* 313.
Borsa pastoris major loculo oblongo. *mag. Bot.* 43.
Thlaspi alysson dictum veronicæ folio. *mag. hort.*
^{194.}
- Nemorosa.* 3. DRABA caule ramoso, foliis ovatis sessilibus den-
tatis. *b. m.* 314.
- Incana.* 4. DRABA foliis caulinis numerosis incanis, silicu-
lis obliquis. *b. m.* 314.

L E P I D I U M.

Silic. cordata emarginata polysperma :
valvulis acutè carinatis contrariis.

Herba, lævis. *fol.* lævis, incerta.

- Procumbens.* 1. LEPIDIUM foliis pinnatifidis, extremo majore,
scapo nudo caulis prostratis racemiferis. *b. m.*
^{314.}

Nasturtium pumilum supinum vernum. *mag. Bot.*
^{185.} *icon.* 184. *hort.* 142.

- Petraeum.* 2. LEPIDIUM foliis pinnatis integerrimis, petalis
emarginatis calyce minoribus. *b. m.* 315.
Nasturtium pumilum vernum. *mag. Bot.* 183. *hort.*
^{142.}

- Latifolium.* 3. LEPIDIUM foliis ovato-lanceolatis ferratis. *b. m.*
^{315.} *La passerage.*

Lepidium latifolium. *mag. Bot.* 153. *hort.* 115.

* PHARM. *Lepidii vulgaris herba*, radix. Vis aperiens, incidens, diuretica stomachica, antiscorbutica, antihypochondriaca, antischiatica †, rubefaciens.. *folia* dantur in prisana, in decocto.. *folia* sicca ad drach. ff. in vini albi cyatho.

- Sativum.* 4. LEPIDIUM floribus tetrodynamis, foliis oblongis
multifidis. *b. m.* 315. *Le nasitord*, *le cresson*
alenois.

Nasturtium vulgare. *mag. hort.* 142. *latifolium.*
ibid. *angustifolium.* *ibid.* & *crispum.* *ibid.*

* PHARM. *Nasturtii hortensis herba*, semina. Vis aperiens, incidens, diuretica, antiscorbutica, antiasthmatica, mundificans, antitinealis... *folia*

ad manip. I. in juscule, laeti incocta in phytisi
optima... *succus* ad unc. II. vel unc. III.

T H L A S P I.

Silic. emarginata obcordata polysperma:
valvulis navicularibus marginato-cari-
natis.

Suffruticulus & herba. *fol.* incerta sim-
plex.

1. THLASPI siliculis ellipticis, foliis lanceolato-linea- *Saxatile.*
ribus integerrimis. 315.
Thlaspi parvum saxatile flore rubente. *mag.* *Bot.* 252. *hort.* 194.
HABITAT, non in descensu montis *Capouladou*,
sed in ingressu & sabelosis declivibus vallis
dictæ *las Cembrettes*, ubi nudicaule etiam ob-
servavimus.
2. THLASPI siliculis subrotundis, foliis amplexicau- *Perfoliatum.*
libus cordatis subserratis. *b. m.* 316.
Thlaspi arvense perfoliatum majus. *mag.* *Bot.* 25.
hort. 193.
3. THLASPI siliculis subrotundis pilosis, foliis cau- *Hirtum.*
linis sagittatis hirsutis. *b. m.* 646.
Thlaspi villosum capsulis hirsutis. *mag.* *Bot.* 250.
hort. 193.
4. THLASPI siliculis subrotundis, foliis sagittatis *Campestre.*
dentatis incanis. *b. m.* 317. *Le thlaspi ordinaire.*
5. Thlaspi arvense vaccariae incano folio minus.
mag. *Bot.* 251. *hort.* 193.
* PHARM. *Thlaspeos* semina. Vis pellens, uterina,
incidens, antirheumatismalis sialagoga. Dantur
à scrup. I. ad scrup. II.
5. THLASPI siliculis orbiculatis, foliis radicalibus *Montanum.*
cuneiformibus integerrimis. *b. m.* 317.
Thlaspi alpinum bellidis cæruleæ folio. *mag.* *Bot.*
app. 305. *hort.* 193.
6. THLASPI siliculis obcordatis, foliis radicalibus *Bursa pasto-*
pinnatifidis. *b. m.* 317. *La boursette, le tabouret.* *ris.*

Bursa pastoris major folio sinuato. *mag. Bot. 43.*
hort. 36.

* PHARM. *Bursa pastoris* herba. Extus & intus, vis vulneraria, refrigerans, adstringens, anti-diarrhoica, antigenorrhoica, ischæma, anti-hæmaturica, antimenorrhagica... *folia recentia* ad man. 1... *succus depuratus* ab unc. iv. ad unc. vi.. *folia sicca* pulverata ad drach. i.

C O C H L E A R I A.

Silic. cordata emarginata turgida scabra:
 valvulis gibbis obtusis.

Herba, & fol. incerta.

Draba. 1. COCHLEARIA foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis. *b. m. 318. Autre passerage.*

Draba umbellata vel *draba major* capitulis donata. *mag. Bot. 86.*

Lepidium humile incanum arvense. *mag. hort.*
^{115.}

Coronopus. 2. COCHLEARIA foliis pinnatifidis, caule prostrato. *b. m. 318. La corne de cerf.*

Coronopus Ruellii, sive *nasturtium verrucosum.* *mag. Bot. 80.*

Nasturtium sylvestre capsulis cristatis. *mag. hort.*
^{143.}

Armoracia. 3. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis. *b. m. 318. Le grand raifort sauvage.*

Cochlearia folio cubitali. *mag. hort. 60.*

* PHARM. *Armoracia seu raphani rusticani radix*, syrpus, aqua stillatitia, vis antiscorbutica, diuretica! antihydropica, antirheumatica, anticalculosa, pectoralis, antiraucedinosa, orexica. *Radix* ab unc. i. pro qualibet pinta... aqua ad unc. iv.

A L Y S S U M.

Silic. emarginata : *filamenta* quædam
introrsum denticulo notata.

Suffruticulus & herba. *fol.* scabra sim-
plex.

1. ALYSSUM ramis senilibus spiniformibus nudis. *Spinosum.*
b. m. 320.
Thlaspi fruticosum spinosum narbonense. *mag.*
Bot. 251, *hort.* 194.
2. ALYSSUM caule erecto herbaceo, siliculis sub-
sessilibus ovalibus compresso-planis, petalis acu-
minatis. *b. m.* 320. *Clypeatum.*
Lunaria leucoii folio, siliquâ oblongâ majori. *mag.*
hort. 123.
3. ALYSSUM staminibus quatuor dentatis, duobus
squamâ longitudinali, calycibus persistentibus.
b. m. 321. *Calycinum.*
4. Alysson incanum serpyllifolio minus. *Tour.* 217.
4. ALYSSUM staminibus terminalibus setis interpo-
sis. *b. m.* 321. *Campestre.*
Thlaspi alyssum dictum campestre minus. *mag.* *Bot.*
251, *hort.* 194.
5. Thlaspi alyssum dictum minus, capsulis majori-
bus rotundis non foliatis. *mag.* *Bot.* 251.
Alysson incanum serpyllifolio fructu nudo. *Tour.*
217.
Thlaspi alysson dictum minus, capsulis rotundis
non foliatis. *mag.* *Bot.* 251. *absque synonymia*
Bauhini.

C L Y P E O L A.

Silic. orbiculata, emarginata, integra,
compresso-plana decidua.

Herba rigida. *fol.* integerima scabrius-
cula.

162 T E T R A P E T A L I

- Jonthlaspi.* 1. CLYPEOLA siliculis unilocularibus monospermis.
b. m. 322.
Thlaspi clypeatum serpyllifolio. *mag. Bot. 252.*
Lunaria minima serpyllifolia. *mag. hort. 124.*
- Maritima.* 2. CLYPEOLA perennis, siliculis bilocularibus ova-
tis dispermis. *b. m. 322.*
Thlaspi narbonense centunculi angusto folio. *mag.*
Bot. 251.

B I S C U T E L L A.

Silic. compresso-plana rotundata, suprà
infràque 2-loba margine carinato. *cal.*
foliola basi gibba.

Herba rigida. *fol.* scabra. *inflor.* paniculæ
ramis divaricatis.

- Didyma.* 1. BISCUTELLA siliculis orbiculato-didymis à stylo
divergentibus. *b. m. 322.* *La lunetiere.*
Thlaspi parvum hieracifolium, sive lunaria lutea
monspeliaca. *mag. Bot. 252.*
Lunaria lutea Dalechampii. *mag. hort. 24.*

T E T R A D Y N A M I A

S I L I Q U O S Æ.

D E N T A R I A.

Siliq. elasticè dissiliens: valvulis revolu-
tis: *stigma* emarginatum. *cal.* longi-
tudinaliter connivens.

Herba simplicissima. *fol.* digitata.

- Pentaphyllos* 1. DENTARIA foliis summis digitatis. *b. m. 323.*
La dentaire.
Dentaria heptaphyllos & pentaphyllos. *mag. hort.*
61.

C A R D A M I N E.

Siliq. linearis subcylindrica : valvulis elasticè diffilientibus revolutis. *fligm.* integrum. *cal.* subhians.

Herba debilis. *fol.* composita pinnata.

1. CARDAMINE foliis radicalibus pinnatis, foliolis subrotundis, caulinis linearibus. *Linn. sif. nat.* *Pratensis.*
1131. *b. m.* 324.
Cardamine pratensis magno flore. *Tour.* 224.
2. CARDAMINE foliis pinnatis exstipulatis, foliolis obtusis lanceolatis, floribus corollatis. *Linn. sif.* *Paryiflora.*
1131. *b. m.* 324. β .
Nasturtium pratense parvo flore. *mag. Bot.* 183.
Cardamine pratensis parvo flore. *Tour.* 224.
3. CARDAMINE foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *Amara.*
b. m. 324.
Cardamine, sive nasturtium aquaticum majus & elatius. *mag. hort.* 43.
4. CARDAMINE foliis inferioribus ovatis integris, *Resedifolia,* intermediis ternatis, summis pinnatis. *b. m.* 325.

S I S Y M B R I U M.

Siliq. dehiscens : valvulis rectis. *cal.* & *cor.* patens.

Herba debilis. *inflor.* *fol.* incerta.

* *Siliquis declinatis brevibus.*

1. SISYMBRIUM siliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis subcordatis. *b. m.* 325. *Le cresson d'eau.* *Nasturtium,* *Nasturtium aquaticum supinum.* *mag. Bot.* 183.
- * PHARM. *Nasturtii aquatrici herba*, succus, syrups. Vis diuretica, deobstruens, antiscorbutica, pectoralis, laeti subincocta.. *herba* ad manip. i. in juscule... *aqua* ab unc. iv, ad viii.. *syrups* ab unc. ss. ad. i.

Sylvestre. 2. SISYMBRIUM siliquis declinatis, foliis pinnatis; foliolis lanceolatis ferratis. *b. m. 325. allion. pedem. tab. 7.*

OBS. Variat foliolis summis linearibus integerrimis.

Amphibium. 3. SISYMBRIUM siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ferratis. *b. m. 325.*

Aquaticum. 3. Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisis. *mag. Bot. 219. cardamine. mag. hort. 43.*

Tenuifolium. 4. SISYMBRIUM foliis integerrimis, bipinnatifidis; summis integris. *Linn. sist. 1132. cent. 50. La roquette sauvage.*

Eruca tenuifolia perennis luteo flore. *mag. Bot. 91. hort. 74.*

Sinapi erucæ folio. *Baub. pin. 99.*

HABITAT copiosè circa urbem, in muris antiquis, & locis sterilibus.

* *Siliquis axillaribus sessilibus.*

Polyceratum. 5. SISYMBRIUM siliquis axillaribus subulatis aggregatis, foliis repando-dentatis. *b. m. 326.*
Erysimum polyceratum, sive corniculatum. *mag. Bot. 92. hort. 75.*

Murale. 6. SISYMBRIUM foliis lyratis denticulatis, siliquis sessilibus. *b. m. 326.*

Eruca sylvestris minor lutea bursæ pastoris folio. *mag. Bot. 91. hort. 74.*

* *Foliis bipinnatis.*

Asperum. 7. SISYMBRIUM siliquis scabris, foliis pinnatifidis: pinnis linear - lanceolatis subdentatis, corollis calyce longioribus. *b. m. 326.*
Sisymbrium monspessulanum siliquâ hirsutâ asperâ. *mag. Bot. 242.*

Sinapi monspessulanum siliquâ asperâ hirsutâ. *mag. hort. 184.*

Erio. 8. SISYMBRIUM foliis pinnato - hastatis: extimo hastato. *b. m. 326.*

Erysimum latifolium majus glabrum. *mag. Bot. 92. hort. 75.*

E R Y S I M U M.

*Siliq. columnaris exactè tetraëdra. cal.
connivens.*

Herba debilis. fol. incerta.

1. ERYSIMUM siliquis spicæ adpressis. *b. m. 327. Officinale.*
Le velar, ou tortelle.

Erytimum vulgare. mag. Bot. 92. hort. 75.

* PHARM. *Erysimi herba, syrpus. Vis incidens,
expectorans, abstergens, antiasthmatica, anti-
raucedinosa, antiischurica.. herba ad man. i.
seu ii. in infuso.. syrpus ad unc. i.*

2. ERYSIMUM foliis lyratis, extimo subrotundo. *Barbarea.*
b. m. 327. L'herbe de Ste. Barbe.

*Eruca latifolia lutea, sive barbarea. mag. Bot. 98.
hort. 74.*

* PHARM. *Barbarea herba, semina. Vis vulnera-
ria, abstergens, antiscorbutica, diuretica.*

3. ERYSIMUM foliis cordatis petiolatis. *b. m. 328. Alliaria.*
L'allaire, alliaria. mag. Bot. 8.

Hesperis allium redolens. mag. hort. 97.

* PHARM. *Alliaria herba, succus. Vis diuretica,
incidens, antiasthmatica, antiulcerosa, antigen-
granodæa.*

C H E I R A N T H U S.

*Germen utrinque denticulo glanduloso.
cal. connivens foliolis 2 basi gibbis op-
positis. sem. plana.*

*Suffruticulus & herba. fol. (sæpius)
mollis.*

1. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis glabris, *Cheiri.*
ramis angulatis. *b. m. 329. Le violier jaune.*

Leucoium luteum vulgare. mag. Bot. 154.

* PHARM. *Cheiri herba, flores, conserva, oleum,
succus, semina. Vis anodina, antirheumatista.*

lis, nervina, antiapoplectica, pellens, uterina, subabortiva *ex Geoffr.* flores & folia ad man. i. in vini lib. i... semina à drach. i. ad drach. ii.

- Incanus.* 2. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. *b. m.* 329. *Le violier des jardins.*
Leucoium incanum majus. mag. hort. 115.
- Annuus.* 3. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis, siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo. *b. m.* 329.
Leucoium incanum minus. mag. hort. 115.
- Triflisis.* 4. CHEIRANTHUS foliis linearibus subsinuatis, floribus sessilibus petalis undatis, caule suffruticoso. *b. m.* 329. *fruticulosus.* n°. 5.
Leucoium minus breviori folio, obsoleto flore.
Barr. icon. 999. n°. 2.
- Sinuatus.* 5. CHEIRANTHUS B. siliquis muricatis, foliis tomentosis, radicalibus subsinuatis. *Linn. sist. nat.* 1134.
Leucoium maritimum sinuato folio. pin. 201. mag.
Bot. 154. hort. 116.
HABITAT in toto trætu maritimo; à *Perauls*, *Maguelone*, *Cete*, *Agde*.
Siliquæ longæ cylindricaæ tomentosæ crassæ, punctis prominulis scabæ.
- Littoreus.* 6. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis subdentatis subtomentosis subcarnosis, petalis emarginatis, siliquis tomentosis. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 925.
Leucoium maritimum angustifolium. mag. Bot.
154. hort. 116.
HABITAT cum priori & copiosè circa *Maguelone* & *Perauls*.

H E S P E R I S.

Petala obliquè flexa. glandula inter stam.
breviora. è siliqua stricta. stigm. basi bifurcâ apice connivente. calyx clausus.
Herba rigidiuscula. fol. simplex scabra.

1. HESPERIS caule ramosissimo diffuso, foliis lanceolatis serratis scabris, siliquis sessilibus. *b. m.*

330.

- Hesperis sylvestris parvo flore. *mag. Bot. 127.*
hort. 97.

2. HESPERIS caule erecto ramoso, foliis cordatis *Verna.*
amplexicaulibus serratis. *b. m. 330.*

Draba siliquosa floribus violaceis. *mag. Bot. 87.*

Leucoium maritimum latifolium alterum. *mag. hort.*
116.

HABITAT in summo cacumine montis Lupi copiosè, & ibi nudicaulem sèpe obseruavimus, altitudinis sesquipalmaris aut etiam vix bipollicaris.

3. HESPERIS caule simplici erecto, foliis subhastatis dentatis, petalis obtusis. *Linn. sp. pl. edit.* *Inodora.*

2^a. 927.

Hesperis sylvestris inodora. *Tour. 222.* & pannonica inodora. *Bauh. hist. 2. 878.*

HABITAT copiosè à l'Esperou. *Caulis cubitalis,* raro ramosus. *Folia sèpe vix denticulata.*

A R A B I S.

Glandulæ 4 nectariferæ intra foliola calycis, squamæ instar reflexæ. stigma simplex.

Herba scabra. fol. simplex scabra.

1. ARABIS foliis amplexicaulibus dentatis. *b. m. 331.* *Alpina.*

2. Draba alba siliquosa. *mag. Bot. 87.*

Leucoium vernum perenne album. *mag. hort. 116.*

2. ARABIS foliis petiolatis lanceolatis subintegerim ciliatis. *b. m. 331.* *Thaliana.*

Bursæ pastoris similis siliquosa major. *mag. Bot. 43.*

Turritis vulgaris ramosa. *mag. hort. 201.*

3. ARABIS foliis amplexicaulibus, siliquis decurvatis planis linearibus. *b. m. 331.* *Turrita.*

Turritis vulgatior. *mag. Bot. 272. hort. 201.*

Leucoium hesperidis folio. *mag. hort. 117.*

168 T E T R A P E T A L Y
T U R R I T I S.

*Siliq. longissima angulata. cal. connivens.
petala erecta.*

*Herba scabra simplicissima. inflor. racemo
coarctato longissimo, strictissimo.*

- Hirsuta.* 1. TURRITIS foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. *b. m. 331. La tourrette.*
Turritis minor, barbarea muralis. *mag. Bot. 172.
hort. 201.*

B R A S S I C A.

*Cal. connivens erexitus. sem. globosa :
glandulæ 2 inter stamina breviora &
pistillum; 2 inter longiora & calycem.*
Herba. fol. incerta.

NOTA. Ita affinis sequenti ac arabis hesperidi.

* *Stylo obtusifculo.*

- Napus.* 1. BRASSICA radice caulescente fusiformi. *332. Le
navet.*

Napus sativa. mag. Bot. 181. hort. 141.

* PHARM. *Napi radix, succus, semina. Vis radi-
cis flatulenta, pectoralis, tussi inveteratae, phytisi,
asthamati adversa, extus resolvens, anodina.*
*Seminum vis incidens, aperiens, diuretica, dia-
phoretica.*

- Rapa.* 2. BRASSICA radice caulescente orbiculari depresso
carnosa. *b. m. 332. La rave.*

Rapum sylvestre non bulbosum. mag. Bot. 219.

Rapa sativa. mag. hort. 171. oblonga & rotunda.

* PHARM. *Rapa radix, syrpus, semina. Vis
flatulenta, aphrodisiaca, pectoralis, asthamati,
tussi contumaci, phytisi adversa, antiaphtosa;
extus antitalgica, antiperennionica.*

- Oleracea.* 3. BRASSICA radice caulescente tereti carnosa. *b. m.
333. Le chou.*

Brassica & ejus varietates. mag. Hort. 34.

* PHARM. *Brassicae rubrae* folia, succus, semina.
Vis flatulenta, alkalescens, antiscorbutica,
abstergens, pectoralis, tussi, raucedini, ce-
phalalgiae crapulosae adversa.

** *Erucæ siliquis stylo ensiformi.*

4. BRASSICA foliis dentato-pinnatifidis, caule hispi- *Erucastrum*.
do, siliquis laevibus. b. m. 333.
Eruca sylvestris major lutea, caule aspero. *Tour.* 227.
5. BRASSICA foliis lyratis, caule hirsuto, foliis gla- *Eruca*.
bris. b. m. 333. *La roquette.*
Eruca latifolia sativa alba. mag. *hort.* 74.
- * PHARM. *Eruca* herba, semina. Vis stomachi-
ca, diuretica, antiscorbutica, aphrodisiaca an-
tiapoplegica, paralysi linguæ adversa, attrahens,
rubefaciens.

S I N A P I S.

Cal. horizontaliter patens. cor. unguis
rectæ. glandulæ 2 inter stamina bre-
viora & pistillum, interque longiora
& calycem 2. *siliqua* dehiscens.

Herba scabra. fol. scabriuscula.

1. SINAPIS siliquis multangulis toroso turgidis ro- *Arvensis*.
stro longioribus. b. m. 333. *La moutarde.*
Rapistrum flore luteo. mag. *Bot.* 219.
Sinapi arvense præcox semine nigro. mag. *hort.* 184.
2. SINAPIS siliquis tetragonis glabris. b. m. 333. *Nigra*.
Autre moutarde.
Sinapi siliquâ latiusculâ glabrâ, semine rufo, sive
vulgare. mag. *Bot.* 241.
Sinapi rapi folio. mag. *hort.* 185.
- * PHARM. *Sinapeos* semina, oleum, expressum.
Vis diuretica, aphrodisiaca, antihydropica,
antiparalytica, antisoporosa, sternutatoria, sia-
lagoga, diaphoretica, stomachica, anticachec-
tica, attrahens, subepispaistica.
3. SINAPIS siliquis hispidis rostro obliquo longissi- *Alba*.
mo. b. m. 334.

Sinapi apii folio. *mag. hort.* 185.

* PHARM. *Sinapi albi* semina, oleum expressum.
Vis prioris succedanea.

R A P H A N U S.

Cal. clausus. siliq. torosa subarticulata teres. *glandulæ melliferæ* ut in prioribus.
Herba scabra. fol. pinnata scabra.

Sativus. 1. RAPHANUS siliquis teretibus toroso-bilocularibus. *b. m.* 334. *Le raifort. Le radi.*

Raphanus minor oblongus. *mag. hort.* 171.

2. *Raphanus major* orbicularis. *mag. hort.* 171.

3. *Raphanus niger*. *mag. hort.* 171.

* PHARM. *Raphani* radix, succus, semina. Vis ruetatrix, attenuans, diuretica, antiischurica, asthmati convulsivo, raucedini adversa, subemetica.

Raphani-
strum. 2. RAPHANUS siliquis teretibus articulatis lèvibus, unilocularibus. *b. m.* 334. *Le raifort sauvage.*

Rapistrum flore albo, siliquâ articulatâ. *mag. Bot.*

219.

Raphanistrum flore albo striato, siliquâ articulatâ. *mag. hort.* 171.

B U N I A S.

Silicula tetraëdra, decidua, angulis inæqualibus acuminatis muricata.

Herba. fol. incerta, simplex.

Erucago. 1. BUNIAS siliquis tetragonis : angulis bicristatis. *b. m.* 335. *La masse au bedeau.*

Erucago monspeliaca siliquâ quadrangulâ echinatâ. *mag. Bot.* 91.

Erucago segetum. *mag. hort.* 75.

Cakile. 2. BUNIAS siliquis ovatis tetragono-ancipitibus, foliis pinnatifidis carnosis. *b. m.* 75.

Eruca maritima italica siliquâ hastæ cuspidi simili. *mag. Bot.* 92.

Erucago maritima. *mag. hort.* 74.

Classis VII.

TETRAPETALI
IRREGULARES.

TETRANDRIA

DIGYNIA.

HYPECOUM.

DODECANDRIA

TRIGYNIA.

EUPHORBIA.

TETRADYNAMIA.

IBERIS.

DIADELPHIA

OCTANDRIA.

POLYGALA.

DIADELPHIA

DECANDRIA.

SPARTIUM.

GENISTA.

ONONIS.

ANTHYLLIS.

LUPINUS.

ROBINIA.


COLUTEA.

PHASEOLUS.

PISUM.

OROBUS,

172 TETRAPETALI IRREGULARES.
LATHYRUS.
VICIA.
CICER.
ERVUM.
CYTISUS.
GLYCYRRHIZA.
CORONILLA.
ORNITHOPUS.
HYPOCREPIS.
SCORPIURUS.
HEDYSARUM.
ASTRAGALUS.
BISSERULA.
PSORALEA.
TRIFOLIUM.
LOTUS.
TRIGONELLA.
MEDICAGO.



TETRAPETALI IRREGULARES.

TECTRANDRIA DIGYNIA.

HYPECOUM.

Cal. 2 - phyllus. *petala* 2 - opposita exte-
riora latiora 3 - fida. *siliq.* compressa
articulata.

Herba. fol. glauca pinnata : foliolis in-
cisis.

1. HYPECOUM siliquis arcuatis compressis. *b. m.* 74. *Procumbens:*
Hypecoüm siliquosum. *mag. Bot.* 134.
Hypecoüm siliquis articulatis incurvis. *mag. hort.*

2. ^{101.} HYPECOUM siliquis cernuis teretibus cylindri- *Pendula:*
 cis. *b. m.* 75.

DODECANDRIA

TRIGYNTIA.

EUPHORBIA.

Cal. 1 - phyllus ventricosus. *petala* peltata.
caps. 3 - cocca.

Herba. fol. sparsa simplex. *laetesc.* alba
 glutinosa acris.

* *Dichotomæ, umbellâ 2-fidâ aut nullâ.*

Chamæsyce. 1. EUPHORBIA dichotoma, foliis crenulatis subrotundis, floribus solitariis axillaribus, caulis procumbentibus. *b. m. 231.*

Tithymalus exiguus glaber nummulariæ folio. *mag. hort. 197.*

Chamæsice. *mag. Bot. 62.*

Peplos. 2. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis semicordatis, floribus solitariis axillaribus, caulis procumbentibus. *b. m. 231.*

Peplus maritima folio rubro & albo. *mag. Bot. 200.*

Tithymalus maritimus folio obtuso aurito rubro & viridi. *mag. hort. 197.*

Peploides. 3. EUPHORBIA cymosa, foliis integerrimis obliquè cordatis acuminatis, floribus axillaribus solitariis, germinibus ovatis acutis. Peplus minor. *mag. Bot. 200.*

Tithymalus annuus supinus folio rotundiore acuminato. *Tour. 87. mag. hort. 197.*

HABITAT in arvis. Caulis vix palmaris erectus apice multifidus; rami patentes in cymam; capsula obsoletè trigonæ acutæ.

** *Umbellâ trifidâ.*

Peplos. 4. EUPHORBIA umbellâ trifidâ, dichotomâ, involucellis ovatis, foliis integerrimis obversè ovatis petiolatis. *b. m. 232.*

Peplus, sive esula rotunda. *mag. Bot. 200.*

Tithymalus foliis rotundis non crenatis. *mag. hort. 197.*

Obs. A priori diversissima, caule, foliis, & præsertim capsulis trigonis obtusifulis; angulis fulco exaratis.

Exigua. 5. EUPHORBIA umbellâ trifidâ, dichotomâ, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *b. m. 232.*

Tithymalus, sive esula exigua. *mag. Bot. 306. hort. 197.*

2. *Tithymalus exiguus saxatilis. mag. Bot. 259. icon. Retusa.*
258.

Tithymalus angustifolius saxatilis. mag. hort. 197.

*** *Umbellâ quadrifidâ.*

6. EUPHORBIA umbellâ quadrifidâ, dichotomâ, *Lathyrus.*
foliis oppositis integerrimis. *b. m. 252. L'épurge.*

Tithymalus cataputia dictus. mag. hort. 197.

* PHARM. *Cataputiae minoris semina.* Vis intus
corrodens, draistica, anginizans, tormina hy-
percatharsim excitans; extus antiverrucalis. Ro-
bustis semina à x-xx, exoleta, cauta.. *succus*
lacteus cum sale tartari digestus inspissatus,
Scammonii smyrnensis succedaneus ex Chomelio.

**** *Umbellâ quinquefidâ.*

7. EUPHORBIA umbellâ quinquefidâ, bifidâ, in-
volucellis subovatis, foliis lanceolatis obtusis in-
tegerrimis. *b. m. 232.* *Dulcis.*

Tithymalus montanus non acris. mag. Bot. 306.
Obs. Folia euphorbiæ verrucosæ; capsulæ tuberculatæ.

8. EUPHORBIA umbellâ sub 5-fidâ, bifidâ, invo-
lucellis cordato-reniformibus, foliis sursum im-
bricatis carnosis. *b. m. 233.* *Paralias.*

Tithymalus maritimus. mag. Bot. 255. hort. 196.

9. EUPHORBIA umbellâ 5-fidâ, dichotomâ, invo-
lucellis cordato-acutis, foliis linear-lanceolatis,
ramis floriferis. *b. m. 233.* *Segetalis.*

Tithymalus amygdaloïdes angustifolius. mag. Bot.
256.

8. *Tithymalus lini folio acuto. mag. Bot. 86. hort.*
196.

* PHARM. *Tithymali amygdaloïdis radix.* Præce-
denti analoga. *Radix in juscule à drach. ff. ad*
drach. i. adversùs febres intermittentes.

10. EUPHORBIA umbellâ 5-fidâ, trifidâ, dichoto-
mâ, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus
ferratis. *b. m. 233.* *Helioscopia.*

Tithymalus helioscopius. mag. Bot. 256. hort. 197.

- Serrata.* 11. EUPHORBIA umbellâ 5-fidâ , trifidâ , dichotomâ , involucellis diphyllis reniformibus , foliis amplexicaulibus cordatis serratis. *b. m.* 233.
Tithymalus characias folio ferrato. *mag. Bot.* 254.
hort. 196.

- Verrucosa.* 12. EUPHORBIA umbellâ quinquefidâ , subtrifidâ , bifidâ , involucellis ovatis , foliis lanceolatis serrulatis villosis , capsulis verrucosis. *b. m.* 233.
Euphorbia , *striata* , foliis lanceolatis serrulatis glabris. *Linn. sist. nat.* 1049.
Tithymalus myrsinites fructu verrucæ simili. *mag. Bot.* 255. *hort.* 196.

- Platiphyllos* 13. EUPHORBIA umbellâ 5 - fidâ , subquadrifidâ , dichotomâ , involucellis primariis tetraphyllis , foliis lanceolatis ferratis sessilibus. *b. m.* 233.

- Pilosa.* 14. EUPHORBIA umbellâ 5-fidâ , trifidâ , bifidâ , involucellis ovatis , petalis integris , foliis lanceolatis subpilosis apice serrulatis. *b. m.* 234.
Tithymalus characias pratensis incanus. *mag. Bot.* 255. *hort.* 196.

* * * * *Umbellâ multifidâ.*

- Efula.* 15. EUPHORBIA umbellâ multifidâ , dichotomâ , involucellis subcordatis , petalis subbicornibus , ramis sterilibus , foliis uniformibus. *b. m.* 234.
La grande éfule.

Tithymalus foliis pini fortè Dioscoridis. *mag. Bot.* 256. *hort.* 196.

Tithymalus lithospermi majoris folio. *mag. Bot.* 305. *hort.* 196.

* PHARM. *Efula majoris* radicis cortex , semina , extractum. Vis subsequentis.

- Cyparissias.* 16. EUPHORBIA umbellâ multifidâ , dichotomâ , involucellis subcordatis , ramis sterilibus , foliis setaceis , caulinis lanceolatis. *b. m.* 234. *La petite éfule.*

Tithymalus cyparissias. *mag. Bot.* 256. *hort.* 196.

* PHARM. *Efula minoris* radicis cortex , semina , extractum. Vis corrodens , draistica , inflammatoria ; cortex correctus hydropicis , cacheoticis , febribus

febribus intermittentibus, quartanæ proficuus.
Datur à scrup. 1 ad drach. 1, in substantia; ad
drach. 2, in infuso.. extractum à scrup. 1. ad
drach. fl. semina n^o. x aut xii. robustis: exo-
levit: cautè usurpanda.

17. EUPHORBIA umbellâ suboctofidâ, bifidâ, in-
volucellis subovatis, foliis spathulatis patent-
bus carnosis mucronatis, apice scabris. *b. m. 234.*
Tithymalus myrsinites latifolius. mag. hort. 196. *Myrsinites.*
18. EUPHORBIA umbellâ multifidâ, dichotomâ, in-
volucellis petiolatis orbiculatis, foliis obtusis.
b. m. 234.
Tithymalus characias amygdaloïdes. mag. Bot. 254.
hort. 196. *Amygdaloï-
des.*
19. EUPHORBIA umbellâ multifidâ, dichotomâ, in-
volucellis perfoliatis subcordatis, foliis lan-
ceolatis integerrimis. *b. m. 235.*
Tithymalus characias rubens germanicus. mag.
Bot. 254. hort. 196. *Sylvatica.*
20. EUPHORBIA umbellâ multifidâ, bifidâ, invo-
lucellis perfoliatis emarginatis, foliis integerri-
mis, caule frutescente. *b. m. 235.*
Tithymalus characias rubens peregrinus. mag. Bot.
254. hort. 196. *Characias.*

TETRADYNA MIA.

IBERIS.

*Cal. 4-phillus. petala 2 exteriora vici-
na majora. silicula emarginata poly-
sperma.*

*Herba. fol. incerta. inflor. racemoso-
corymbosa.*

1. IBERIS foliis lanceolato-linearibus carnosis inte-
gerrimis ciliatis, ramulis senescentibus suffruti-
cosis apice nudiusculis.
Thlaspi saxatile vermiculato folio acuto. Bayh. pin. *Sexatilis.*
107. *Tour. 213.* *M*

HABITAT in saxosis, au mont S. Loup, & circa
Lamalou, Fougeres. Vix 2 - pollicaris. Ramuli
diffusi. Siliculae suborbiculatae magnæ emarginatae.

- Umbellata.* 2. IBERIS foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus
serratis, superioribus integerrimis. *b. m.* 319.
Thlaspi umbellatum creticum iberidis folio. *mag.*
hort. 194.
- Amara.* 3. IBERIS foliis lanceolatis acutis subdentatis, flo-
ribus racemosis. *b. m.* 319.
Thlaspi umbellatum arvense iberidis folio. *mag.*
app. 305. *hort.* 194.
- Nudicaulis.* 4. IBERIS foliis sinuatis, scapo nudo simplici. *b. m.*
319.
Bursa pastoris minor foliis incisis. *mag.* *Bot.* 43.
hort. 37.
- Pinnata.* 5. IBERIS foliis linearibus pinnatifidis. *b. m.* 319.
Thlaspi alterum umbellatum nasturtii folio mons-
peliacum. *mag.* *Bot.* 250. *hort.* 194.

DIADELPHIA

O C T A N D R I A.

POLYGALA.

Cal. 5 - phyllus : foliolis 2 alæformibus
coloratis. *legum.* obcordatum bilocu-
lare.

Herba. *fol.* sparsa integerrima. *inflor.*
racemosa terminalis.

- Vulgaris.* 1. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caulis
herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis
linearibus lanceolatis. *b. m.* 355.
Polygala major. *mag.* *Bot.* 207. *hort.* 162.
2. Polygala vulgaris. *mag.* *Bot.* 207. *hort.* 162.
3. Polygala vulgaris flore albo. *mag.* *hort.* 162.
* PHARM. *Polygalæ herba.* Vis resolvens, expec-

torans, antipleuritica, antiperipneumonica, & polygalæ virginianæ (quæ in phlogosi membranacea specifica est ex *Linnæo*) succedanea, sed debilior. Datur pro potu ordinario pleuriticis, peripneumonicis polygalæ manipulus cum radicis altheæ unc. ss. & liquiritiæ drach. ii, in aquæ ferventis pinta leviter infusus.

2. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus acutis. *b. m.* *Monspeliaca.*
355.
Polygala acutioribus foliis monspeliaca. *mag. Bot.*
207. hort. 162.
3. Polygala annua erecta angustifolia, floribus coloris obsoleti, carneis lineis virgatis. *mag. Bot.*
208. hort. 162.
4. Polygala floribus purpurascensibus monspeliaca. *mag. hort. 162.*
5. Polygala floribus cæruleis. *mag. hort. 162.*

DIADELPHIA

D E C A N D R I A.

S P A R T I U M.

Stigma longitudinale, supra villosum.
filamenta adhærentia carinæ & germini. cal. deorsum prominens.

Frutex. fol. inflor. & fulc. incerta.

* *Foliis simplicibus.*

1. SPARTIUM ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. *b. m. 355. Le genêt d'Espagne.* *Junceum.*

Genista juncea. mag. Bot. 105. hort. 84.

* PHARM. *Genistæ hispanicæ folia, rami, summitates, cineres. Vis genistæ vulgaris.*

2. SPARTIUM ramis angulatis, racemis lateraliibus, foliis lanceolatis. *b. m. 355.* *Morospera num.*

- Scorpius.* 3. SPARTIUM ramis spinosis patentibus, foliis ova-
tis. *b. m. 355.* *Le genêt épineux.*
Genista-spartium majus spinosum, flore luteo.
mag. Bot. 106. hort. 84.

* * *Foliis ternatis.*

- Complicatum.* 4. SPARTIUM foliis ternatis, foliolis involutis, cau-
libus inermibus glabris, leguminibus scabris.
b. m. 355.

Cytisus foliis incanis angustis quasi complicatis.
mag. Bot. 84. hort. 67.

- Scoparium.* 5. SPARTIUM foliis ternatis simplicibusque, ramis
inerribus angulatis. *b. m. 356.* *Le genêt à
balais.*

Cytisus scoparius vulgaris. *mag. hort. 67.*

* PHARM. Genistæ vulgaris folia, rami, summi-
tates, cineres. Vis diuretica hydragoga, anti-
hydropica, aperiens. Datur herba aquæ aut vino
decocta, semina ad drach. 1 fl.. cineres in vino
albo infundantur.

- Spinosum.* 6. SPARTIUM foliis ternatis, ramis angulatis spi-
nosi. *b. m. 356.*

Acacia trifolia. *mag. Bot. 1.*

Cytisus spinosus. *mag. hort. 67.*

G E N I S T A.

Cal. 2-labiatus : $\frac{2}{3}$. *vexillum* oblongum
à pistillo staminibusque deorsum re-
flexum.

Caul. incerta. *fol.* simplex integerrima.
inflor. & *fulc.* incerta.

* *Inermes.*

- Gandicans.* 1. GENISTA foliis ternatis subtus villosis, pedun-
culis lateralibus subquinquefloris foliatis, legu-
minibus hirsutis. *Linn. amæn. Acad. 4. 284. sp.*
plant. edit. 2a. 997.

- Cytisus , monspessulanus , floribus lateralibus , foliis hirsutis , caule striato. *b. m.* 375.
2. GENISTA ramis ancipitibus articulatis , foliis Sagittalis. ovato-lanceolatis. *b. m.* 356.
- Genistella herbacea , sive chamæspartium. *mag.* hort. 84.
3. GENISTA foliis lanceolatis , ramis striatis teretibus erectis. *b. m.* 357. *Le genêt.*
Genista tinctoria germanica. *mag. Bot.* 106. *hort.* 85.
* PHARM. *Genistæ tinctoriae.* Vis spartii primi & quinti.
4. GENISTA foliis lanceolatis obtusis , caule tuberculato-decumbente. *b. m.* 357. *Pilosa.*
Genista pilosa. *mag. Bot.* 106.
Genista ramosa foliis hyperici. *mag. hort.* 84.

* * * *Spinæ laterales.*

5. GENISTA spinis decompositis , ramis floriferis Hispanica. inermibus , foliis linearibus pilosis. *b. m.* 357.
Genistella spinosa monspeliaca. *mag. Bot.* 106.
Genista-spartium montis ventosi. *mag. hort.* 85.
6. GENISTA spinis compositis , ramis floriferis inermibus , foliis lanceolatis. *b. m.* 357. Germanica.
Genista spinosa minor germanica. *mag. hort.* 84.
7. GENISTA spinis simplicibus , ramis stoloniferis inermibus , foliis lanceolatis. *Linn. sist. nat.* 1157. *Anglica.*
Genista-spartium minus anglicum. *Tour.* 645.
HABITAT à l'Esperou , à Banahu.
8. GENISTA spinis terminalibus , ramis teretibus striatis , foliis lanceolatis simplicibus pubescens-tibus. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 999. Purgans.
Genista , seu spartium purgans. *Baub. hist.* 1. p. 404.
Tour. 644.
HABITAT à l'Esperou. Rami conferti. Folia lanceolata obtusa , seu obversè ovata.

O N O N I S.

Cal. 5-partitus : laciniis linearibus. *vexillum striatum. legum. turgidum sessile.*

*Caul. inflor. fol. incerta. fulcr. stipulæ
geminæ adnatæ vaginanti-amplexi-
caules.*

* *Floribus sessilibus.*

Spinosa. 1. ONONIS floribus racemosis solitariis, foliis ternatis, ramis spiniformibus. h. m. 358. *L'arrête-bœuf.*

Ononis spinosa flore purpureo. mag. Bot. 20. hort. 16.

* PHARM. *Ononidis radix*, hujus cortex, aqua. Vis diuretica! incidens, deobstruens, emmenagogæ, antisarcocelica, seu potius antihydrocelica, abstergens, antiscorbutica. *Radix vel cortex illius*, in substantia ad drach. 1. in decocto ad drach. ff.

Arvensis. 2. ONONIS floribus racemosis geminatis, foliis ternatis, ramis inermibus. h. m. 359.

Minutissima. 3. ONONIS floribus sessilibus lateralibus, foliis omnibus ternatis petiolatis, stipulis calycibusque setaceis. h. m. 359.

Ononis pusilla glabra fruticans trifoliis affinis. mag. Bot. 22. hort. 18.

** *Floribus pedunculatis.*

Natrix. 4. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis. h. m. 359.

Ononis viscosa spinis carens lutea major. mag. Bot. 20. hort. 18.

Viscosa. 5. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis simplicibus ternatisque. h. m. 360.

Ononis spinis carens viscosa latifolia lutea annua. mag. Bot. 21. hort. 18.

Cherleri. 6. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis, stipulis dentatis. h. m. 360.

Ononis minima hirsuta Cherleri. mag. Bot. 20.

ANTHYLLIS.

Cal. ventricosus. *legum.* subrotundum
tectum.

Herba. *fol.* *inflor.* *fulcr.* incerta.

1. ANTHYLLIS foliis quaterno-pinnatis, floribus *Tetraphylla.*
lateralibus. *b. m.* 361.
Lotus pentaphyllos vesicaria. *mag.* *Bot.* 166.
Loto affinis vel lotus pentaphyllos vesicaria. *mag.*
hort. 123.
2. ANTHYLLIS foliis pinnatis: impari majore, *Vulneraria.*
capitulis duplicatis. *b. m.* 361. *La vulnéraire des*
paysans.
Loto affinis vulneraria pratenis. *mag.* *Bot.* 166,
hort. 123.
HABITAT copiosè circa Nemausum; *au Capouladou;*
à Montferrier.
* PHARM. *Vulnerarie herba.* Vis vulneraria. Inu-
sitata.
3. ANTHYLLIS foliis pinnatis æqualibus, capitulo *Montana.*
terminali. *b. m.* 361.
Astragalus villosus floribus globosis. *mag.* *Bot.* 34.
Barba Jovis pumila villoso flore globoſo purpu-
reo. *mag.* *hort.* 31.

LUPINUS.

Cal. 2-labiatus. *antheræ alternæ 5 oblon-*
gæ, 5 subrotundæ. legum. coriaceum.
Herba. *fol.* *digitata.* *inflor.* subverticil-
lata.

1. LUPINUS calycibus semiverticillatis appendicu- *Varius.*
latis, labio superiore bifido, inferiore subtri-
dentato. *b. m.* 362. *Le lupin.*
Lupinus sylvestris purpureo flore, semine rotundo
vario. *mag.* *Bot.* 167. *hort.* 124.
2. Lupinus sylvestris purpureo flore, semine rotundo
vario minore. *mag.* *Bot.* 301. *hort.* 124.

- Hirsutus.* 2. LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis, labio superiore & inferiore integris. *b. m.* 362.
Lupinus flore purpurascente latifolius hirsutus. *mag.*
Bot. 167. *hort.* 124.
 Abundat in loco dicto *la Garrigue de Perauls*, ad dexteram.
- Luteus.* 3. LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis, labio superiore bipartito, inferiore tridentato. *b. m.* 362.
Lupinus luteo flore, semine compresso vario. *mag.*
Bot. 167.
Lupinus sylvestris flore luteo. *mag. hort.* 124.

R O B I N I A.

Cal. 4-dentatus: denticulo supremo emarginato. *vexillum* patens reflexum subrotundum. *legum.* 1-loculare polyspermum.

Arbor. *fol.* pinnata. *fulcr.* aculei stipuliformes.

- Pseudoacacia* 1. ROBINIA pedunculis racemosis, foliis imparipinnatis. *b. m.* 363.
Glycyrrhiza arbor. *mag. hort.* 89.

C O L U T E A.

Cal. 2-labiatus. *legum.* inflatum supra basin dehiscens.

Frutex. *inflor.* axillaris racemosa.

- Arborescens.* 1. COLUTEA foliolis obcordatis. *b. m.* 364. *Le baguenaudier.*
Colutea vesicaria. *mag. Bot.* 72. *hort.* 60.

P H A S E O L U S.

Stigma pubescens. *carina* cum staminibus styloque spiraliter tortis.

Herba, volubilis. *fol.* ternata : foliolis lateralibus obliquè ovatis extrorsum latioribus.

1. PHASEOLUS caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis. *h. m.* 364. *Le haricot.*
Phaseolus major, sive Smilax hortensis. *mag. hort.* 158.

Idem fructu pallido, fructu nigro, aut variegato.
mag. hort. 158.

2. PHASEOLUS caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce brevioribus, leguminibus pendulis. *h. m.* 364. *Coccineus.*
Phaseolus puniceo flore. *mag. hort.* 158.

P I S U M.

Cal. laciniæ superiores 2 breviores. *stylus* triangulus suprà carinatus & villosus.

Herba, volubilis. *fol.* incerta. *fulcr.* cirrhus ad apicem foliorum.

1. PISUM stipulis infernè rotundatis crenatis, petiolis teretibus, pedunculis multifloris. *h. m.* 366. *Sativum.*
Le pois.

Pisum umbellatum. *mag. Hort.* 160.

2. Pisum majus quadratum. *mag. hort.* 160.

2. PISUM petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis unifloris. *h. m.* 366. *Ochrus.*

Ochrus folio integro capreolos emitente. *mag. Bot.* 188. *hort.* 145.

O R O B U S.

Cal. basi obtusus : laciniis superioribus profundioribus, brevioribus. *stylus* linearis suprà villosum.

Herba. *fol.* abruptè-pinnata nuda.

Vernus.

1. OROBUS foliis pinnatis ovatis, stipulis semi-sagittatis integerrimis, caule simplici. *b. m.* 366.
L'orobe.

Orobus sylvaticus purpureus vernus. *mag. hort.*
151.

Tuberosus.

2. OROBUS foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semi-sagittatis integerrimis, caule simplici. *b. m.* 366.
Orobus sylvestris angustifolius asphodeli radice.
mag. Bot. 303. *hort.* 151.

Niger.

3. OROBUS caule ramoso, foliis sexjugis ovato-oblongis, stipulis subulatis. *b. m.* 366.
Orobus sylvaticus foliis viciae. *mag. Bot.* 196.
hort. 151.

Pyrenaicus.

4. OROBUS caule ramoso, foliis bijugis, trijugis, quadrijugisve lanceolatis nervosis, stipulis sub-spinosis. *b. m.* 366.
Obs. Stipulae magnae; foliola in petiolum planum decurrentia.

L A T H Y R U S.

Cal. laciniæ superiores 2 breviores. *stylus* planus, supernè latior, suprà villosus.

Herba, scandens, triquetra. *f. l.* unijuga. *fulc.* cirrus ad apicem petioli communis.

* *Pedunculis unifloris.*

Nissolia.

1. LATHYRUS pedunculis unifloris, foliis simplicibus, stipulis subulatis. *b. m.* 367.
Lathyrus sylvestris minor. *mag. Bot.* 150.
Lathyrus angustifolius erectus folio singulari sine capreolis. *mag. hort.* 113. *icon.* 112.

Aphaca.

2. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, stipulis sagittato-cordatis. *b. m.* 367.
Vicia lutea foliis convolvuli minoris. *mag. Bot.* 278.

Aphaca lobelii. *mag. hort.* 19.

Amphicarpos

3. LATHYRUS pedunculis unifloris calyce longioribus, cirrhis diphyllis simplicissimis. *b. m.* 368.

Viciae similis supra infraque terram fructus gerens.

mag. Bot. 276. hort. 204.

4. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis dorso canaliculatis. *b. m. 368.* *Ciceria.*
- Lathyrus sativus flore purpureo. *mag. Bot. 150.*
hort. 112.
5. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis, dorso 2-marginatis. *368. La gesse.* *Sativus.*
- Lathyrus sylvestris flore fructuque albo. *mag. Bot. 150. hort. 119.*
6. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis setaceo-linearibus. *b. m. 368.* *Setifolius.*
- Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *mag. Bot. 151. hort. 113.*
- OBS. *Caulis debilis subsimplex; stipulae lineares appendiculatae; pedunculi stipulis triplo longiores.*
7. LATHYRUS pedunculis unifloris cirrho terminatis, cirrhis diphyllis, foliolis linearibus. *b. m. 369,* seminibus angulatis. *Angulatus.*
- Lathyrus angustifolius humilior. *mag. Bot. 150.*
hort. 112.
- OBS. *Caulis erectus ramosus. Petioli stipulis æquales. Stipulae lanceolatae.*
- ** *Pedunculis bifloris.*
8. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis linearis-lanceolatis, leguminibus hirsutis, seminibus scabris. *b. m. 369.* *Hirsutus.*
- Lathyrus angustifolius siliqua hirsuta. *mag. hort. 112.*
9. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, leguminibus glabris, stipulis bipartitis. *b. m. 369.* *Annuus.*
- Lathyrus hispanicus flore luteo. *Tour. inst. 395.*
- Lathyrus luteus latifolius. *mag. Bot. 150. hort. 112.*
- HABITAT ad mare, præsertim à Maguelone;
& in locis à Magnolio citatis non vidi.

*** *Pedunculis multifloris.*

- Tuberosus.* 10. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ovalibus, internodiis nudis. b. m. 369.
Lathyrus arvensis repens tuberosus. mag. Bot. 151. hort. 113.
- Pratensis.* 11. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, cirrhis simplicissimis. b. m. 369.
Lathyrus sylvestris luteus dumetorum. mag. Bot. 151. hort. 113.
- Latifolius.* 12. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, petiolis membranaceis. b. m. 370.
Lathyrus latifolius. mag. Bot. 151. hort. 112.
- Heterophyl-*
lus. 13. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, 4-phyllisque, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. b. m. 370.
Lathyrus major narbonensis angustifolius. mag. Bot. 151. hort. 112.

V I C I A.

Stylus sub stigmate barbatus. *glandula* inter stamina 9 coalita & germen.
Herba, angulata scandens. *fol.* conjugata. *fulcr.* cirrus ad apicem petioli communis.

NOTA. Hinc patet affinitas inter genera lathyri, viciæ, & ervi.

* *Floribus racemosis.*

- Dumetorum.* 1. VICIA pedunculis multifloris, foliolis reflexis mucronatis ovatis, stipulis subdentatis. b. m. 370.
Vicia sepium perennis. mag. Bot. 307. hort. 204.
- Sylvatica.* 2. VICIA pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. b. m. 371.

3. *VICIA* pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integratis. *b. m.* 371. *Craeca.*
- Vicia perennis dumetorum multiflora. mag. Bot. 277. hort. 204.*
4. *VICIA* pedunculis multifloris, floribus imbricatis secundis, caule hirsuto, stipulis denticulatis.... *Gerard. gallop. icon. pag. 496.* *Incana.*
- Vicia perennis incana multiflora. mag. Bot. 277. hort. 204. Tour. 397.*
- HABITAT in pratis prope stagna, à *Perauls*, *Lat-tes*, & à *Cete*. *Caulis* perennis, pilis argenteis tectus. *Racemi* axillares foliis duplo breviores. *Petioli* planiusculi, sulcati, foliolis utrinque 10-14 ovalibus hirsutie albicantibus. *Stipulae* semisagittatae basi denticulis tribus æqualibus.
5. *VICIA* pedunculis multifloris, floribus distantibus, foliolis linearibus, stipulis infernè denticulatis. *b. m.* 371. *Onobrychioëdes.*
- Vicia sive cracca foliis & siliquis longioribus. mag. Bot. 277.*
- Viciae parvum genus folio longo. mag. hort. 205.*
6. *VICIA* pedunculis multifloris, petiolis sulcatis subdodecaphyllis, foliolis lanceolatis glabris. *b. m.* 371. *Biennis.*
- Vicia perennis multiflora majori flore cæruleo & albo. mag. Bot. 307. hort. 204.*
- ** *Floribus axillaribus subfessilibus.*
7. *VICIA* leguminibus fessilibus subbinatis erectis, foliolis retusis, stipulis maculâ notatis. *b. m.* 371. *La vesse. Sativa.*
- Vicia sativa vulgaris. mag. Bot. 276. hort. 204.*
8. *Vicia sylvestris vulgaris femine parvo & nigro frugum. mag. Bot. 276. hort. 206. Tour. inst. 397.* *Lathyroïdes.*
8. *VICIA* leguminibus solitariis fessilibus erectis glabris, foliolis senis, inferioribus obcordatis. *b. m.* 371.
- Vicia, sive craccae minimum genus cum siliquis glabris. mag. Bot. 277. hort. 205.*

- Lutea.* 9. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis foliariis pentaspermis, corollæ vexillis glabris. *h. m. 372.*
Vicia luteo flore sylvestris. mag. Bot. 276. hort. 204.
- Hybrida.* 10. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis pentaspermis, corollæ vexillis villosis. *h. m. 372.*
- Peregrina.* 11. VICIA leguminibus sessilibus pendulis glabris tetraspermis, foliolis linearibus emarginatis. *h. m. 372.*
Vicia angustifolia purpuro-violacea, siliquâ latâ glabrâ. mag. Bot. 276. hort. 204.
- Sepium.* 12. VICIA leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis, exterioribus decrescentibus. *h. m. 372.*
- Narbonensis.* 13. VICIA leguminibus subfessilibus solitariis erectis villosis, foliis senis subovatis, stipulis denticulatis. *h. m. 373.*
Faba sylvestris fructu rotundo atro. mag. Bot. 96.
- Faba.* 14. VICIA caule erecto, petiolis cirrho destitutis. *h. m. 373. La feve.*
Faba major recentiorum. mag. hort. 76.
 * PHARM. *Faba semina, farina, stipites combusti. Vis nutriens, flatulenta, resolvens, maturans, tumoribus glandularum, scroti, mammarum adversa. Cineres genistæ cineribus succedanei.*

C I C E R.

Cal. 5 - partitus : laciniis 4 - superioribus vexillo incumbentibus. *legum.* 1 - loculare, rhombeum, 2 - spermum, turgidum.

Herba, erecta. *fol.* impari-pinnata. *fulc.* filum terminans pedunculos.

- Arietinum.* 1. CICER foliolis serratis ovatis, basi integerrimis, stipulis dentatis. *h. m. 373. Le pois chiche.*
Cicer sativum. mag. Bot. 65. hort. 55.
 2. *Cicer arietinum fructu nigro. mag. hort. 55.*

E R V U M.

Cal. 5-partitus æqualis. *legum.* 1-loculare teretiusculum, nodosum.

Herba, angulata, scandens. *fol.* conjugata. *fulc.* cirrhus terminans petiolos.

Obs. Manifestè differt à viciis, proportione & numero flosculorum qui minimi paucissimique, 2-4 in eodem pedunculo.

1. ERVUM germinibus compressis convexis orbiculatis. *h. m.* 374. *La lentille.* *Lens.*

Lens vulgaris. *mag.* *Bot.* 152.

Lens major. *mag.* *hort.* 114. & *minor.* *ibid.*

2. ERVUM pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. *h. m.* 374. *Tetraspermum.*

Vicia multifolia cum latis siliquis. *mag.* *Bot.* 152. *hort.* 114.

3. ERVUM pedunculis multifloris, seminibus globosis nudis. *h. m.* 374. *Hirsutum,*

Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *mag.* *Bot.* 277. *hort.* 114.

4. ERVUM germinibus undato-plicatis. *h. m.* 374. *Ervilia.* *Les ers.*

Orobus receptus herbariorum. *mag.* *Bot.* 196.

Ervum multis, sive *orobus.* *mag.* *hort.* 75.

* PHARM. *Ervi semina*, *orobi farina.* Vis resolvens, maturans.

5. ERVUM pedunculis subbifloris cirrhosis, petiolis acuminatis, foliolis obtusis. *h. m.* 374. *Solonierse.*

Vicia minima præcox Parisiensem. *Tour. inst.* 397.

C Y T I S U S.

Cal. 2-labiatus $\frac{2}{3}$. *legum.* basi attenuatum, pedicellatum 1-loculare polyspermum.

Fruticulus. *fol.* ternata: foliolis æquilibus.

192 T E T R A P E T A L I

- Nigricans.* 1. CYTISUS racemis simplicibus erectis , foliolis ovato-oblongis. *b. m.* 375.
- Sessilifolius.* 2. CYTISUS racemis erectis , calycibus bracteâ triplici auctis , foliis floralibus sessilibus. *b. m.* 375. *Cytisus glaber siliquâ latâ. mag. Bot. 84. hort. 67.*
- Supinus.* 3. CYTISUS floribus capitatis , ramis decumbentibus. *b. m.* 375. *Cytisus foliis subrufâ lanugine hirsutis. mag. hort. 67.*
- Argenteus.* 4. CYTISUS floribus pedunculatis subsessilibusque , foliis tomentosis conduplicatis , caule fruticoso. *b. m.* 376. *Trifolium argenteum floribus luteis. mag. Bot. 267.*
- Cytisus humilis angustifolius argenteus. mag. hort. 67.*

G L Y C Y R R H I Z A.

Cal. 2-labiatus $\frac{2}{3}$. *legum.* ovatum compressum , sub 1-spermum.

Suffrutex , glutinosus. *rad.* horizontalis stolonifera. *fol.* pinnata impari petiolato.

- Glabra.* 1. GLYCYRRHIZA leguminibus glabris. *b. m.* 377. *La réglisse.* Glycyrrhiza glabra & germanica , radice repente. *mag. Bot. 110.* Glycyrrhiza siliquosa vel germanica. *mag. hort. 89.*
- * PHARM. *Liquiritiae radix* , trochisci. Vis edulcorans , bechica , antinephritica , antidyssurica , rheumatismo , tussi adversa.

C O R O N I L L A.

Cal. 2-labiatus $\frac{2}{3}$. superioribus denticulis connatis. *vexillum* vix alis longius. *legum.* isthmis interceptum articulatum rectum.

Frutex.

Frutex. inflor. capitata: capitulis depresso-dimidiatis axillaribus.

1. **CORONILLA** pedunculis subtrifloris, corollarum *Emerus.*
unguis calyce duplo longioribus, caule angulato. *b. m. 377.*
Colutea siliquosa, vel *scorpioides major*. *mag. Bot. 76. hort. 60.*
 2. **CORONILLA** foliolis quinatis ternatisque linearilanceolatis subcarnosis obtusis. *b. m. 377.*
Colutea caule genistæ fungoso. *mag. Bot. 72. hort. 60.* *Juncea.*
 3. **CORONILLA** foliolis subnovenis, stipulis suborbiculatis. *b. m. 377.* *Valentina.*
Polygala valentina. *mag. Bot. 303.*
Colutea minima, sive *coronilla*. *mag. hort. 60.*
 4. **CORONILLA** foliolis suborbiculatis, stipulis ovatis, pedunculis complanatis. *b. m. 378.* *Glauca.*
Coronilla scorpioides coronata. *mag. Bot. 72. hort. 60.*
Coronilla scorpioides maritima glauco folio. *mag. hort. 60.*
 5. **CORONILLA** procumbens, foliis lanceolatis novenis, stipulâ oppositifoliâ emarginatâ. *b. m. 378.* *Minima.*
Ferrum equinum gallicum. *mag. Bot. 97.*
 6. **CORONILLA** herbacea, leguminibus erectis teretibus torotis numerosis, foliolis plurimis glabris. *b. m. 378.* *Varia.*
Securidaca dumetorum major, flore vario, siliquis articulatis. *mag. Bot. 235.*
Colutea dumetorum flore vario, siliquis articulatis. *mag. hort. 60.*
 7. **CORONILLA** herbacea leguminibus falcato-glabratis, foliolis plurimis. *b. m. 378.* *Securidacea.*
Securidaca lutea major. *mag. Bot. 399. hort. 182.*
- OBS. Ultimæ duæ species, licet herbaceæ, perennant & sempervirent,

ORNITHOPUS.

Legum. articulatum teres arcuatum.

Herba. inflor. axillaris : pedunculis digito-subquinquefloris.

Perpusillus. 1. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis. *b. m. 379.*

Ornithopodium radice tuberculis nodosâ. *mag. hort. 150.*

Compressus. 2. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus compressis rugosis, pedunculis folio terminatis. *b. m. 379. Le pied d'oiseau.*

Ornithopodium affinis hirsuta scorpioïdes. *mag. Bot. 194. hort. 150.*

Scorpioïdes. 3. ORNITHOPUS foliis inferioribus simplicibus, summis ternatis impari maximo, stipulâ oppositifoliâ emarginatâ. *b. m. 379.*

Scorpioïdes an cratæ telephium. *mag. Bot. 232.*

Scorpioïdi affinis portulacæ folio. *mag. hort. 181.*

H I P P O C R E P I S.

Legum. subarticulatum, curvum, compressum : alterâ futurâ pluries emarginatum.

Herba. fol. impari-pinnata : petiolis basi aphyllis.

Unifiliosa. 1. HIPPOCREPIS leguminibus solitariis subfessilibus. *b. m. 380.*

Ferrum equinum siliquâ singulare. *mag. Bot. 96. hort. 77.*

Multifiliosa. 2. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis confertis, margine interiore sinuatis. *b. m. 380.*

Ferrum equinum siliquâ multiplici. *mag. Bot. 96. hort. 77.*

Comosa. 3. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis confertis, margine exteriore repandis. *b. m. 380.*

*Ferrum equinum germanicum siliquis in summi-
tate. mar. Bot. 96. hort. 77.*

Obs. Hippocrepis 2 & 3 quandoque perennant, & sunt
suffruticulæ.

S C O R P I U R U S.

Legum. subarticulatum, isthmis interce-
ptum, revolutum, teres.

Herba. fol. simplicissima integerrima at-
tenuato-petiolata.

1. SCORPIURUS pedunculis unifloris, leguminibus *Vermiculata,*
tectis undique squarnis obtusis. b. m. 381.

Scorpioides siliquâ crassâ Boëlii. mag. hort. 181.

2. SCORPIURUS pedunculis subquadrifloris, legu-*Subvillosa,*
minibus extrorsum spinis confertis acutis. b. m.
381.

Scorpioïdes repens buplevri folio. mag. Bot. 233.
hort. 181.

3. SCORPIURUS pedunculis subtrifloris, legumini-*Sulcata,*
bus extrorsum spinis distinctis acutis. b. m. 381.

H E D Y S A R U M.

Cor. carina transversè obtusa (seu subtriangu-
laris) *legum.* subrotundum, 1-1per-
num compressum.

Herba. fol. pinnata. fulcr. spinulæ supra
legumen.

1. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis corollarum alis calyce bre-
vioribus. b. m. ,82. *Le Jainfoin.* *Onobrychis.*

Onobrychis folio viciæ, fructu echinato, major.
mag. Bot. 191. hort. 147.

* PHARM. Onobrychis folia, sudorifica, theam
odore referentia, ideo succedaneæ.

2. HEDYSARUM foliis pinnatis, pedunculis subtri-*Caput galli.*
floris, floribus alternis sessilibus subspicatis. b.
m. 382.

*Onobrychis fructu echinato minor. mag. Bot. 191.
hort. 147.*

Humile. 3. *HEDYSARUM* foliis pinnatis, leguminibus articulatis asperis, corollæ alis obsoletis, spicis hirsutis, caulis depresso. *b. m. 383.*

*Onobrychis semine clypeato aspero, minor. mag.
Bot. 191. hort. 147.*

A S T R A G A L U S.

Legum. 2-loculare, gibbum, rotundatum.

*Herba. inflor. & fol. ut in priori. fulc.
stipulæ adnatæ.*

* *Caulibus foliosis.*

Glycyphillo. 1. *ASTRAGALUS* caulescens, prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliolis ovalibus pedunculo longioribus. *b. m. 384.*

*Astragalus luteus perennis procumbens vulgaris.
mag. hort. 27.*

Hamosus. 2. *ASTRAGALUS* caulescens procumbens, leguminibus subulatis glabris recurvatis. *b. m. 384.*
*Securidaca lutea minor corniculis recurvis. mag.
Bot. 235.*

*Astragalus luteus annuus monspeliacus procumbens.
mag. hort. 26.*

Sesameus. 3. *ASTRAGALUS* caulescens, diffusus, capitulis lateralibus sessilibus pedunculatisque, erectis, subulatis, acumine reflexis. *b. m. 385.*

Ornithopodio affinis stellâ leguminosâ, siliquis cauli adhærentibus. mag. Bot. 194. hort.

Astragalus annuus siliquis in stellæ modum dispositis. mag. hort. 26.

4. *Ornithopodio affinis hirsutâ stellâ leguminosâ, siliquis pediculo insidentibus. mag. Bot. 194.*

** *Scapo nudo, absque caule folioso.*

Monspessulanus. 4. *ASTRAGALUS acaulis, scapis declinatis longitudine foliorum, leguminibus subulatis teretibus subarcuatis glabris. b. m. 385.*

- Astragalus monspessulanus. *mag.* *Bot.* 33. *hort.* 26.
& flore albo. *ibid.*
5. ASTRAGALUS acaulos, scapis declinatis longitudine foliorum, foliis tomentosis, leguminibus subulatis subarcuatis incanis. *h. m.* 385. *Incanus.*
- Astragalus incanus siliquâ incurvâ. *mag.* *Bot.* 33.
icon. 32. *hort.* 26.
6. ASTRAGALUS subacaulos, scapis folio longioribus, floribus laxè spicatis erectis. *h. m.* 385. *Montanus.*

B I S S E R R U L A.

Legum. 2-loculare, lineare, planum, utrinque dentatum, dissepimento contrario.

Herba. *fol.* impari-pinnata. *inflor.* capitulis dimidiatis.

1. BISSERRULA. *h. m.* 386.

Pelecinus.

P S O R A L E A.

Cal. punctis callosis adspersus. *legum.* ovato-subulatum, punctis callosis adspersum, monospermum.

Herba. *fol.* ternata. *fulcr.* bracteæ involucrantes, trifidæ.

1. PSORALEA foliis omnibus ternatis, pedunculis spicatis folio longioribus. *h. m.* 387. *Le trefle bitumineux.* *Bituminosa.*

Trifolium asphaltes, sive bitumen redolens. *mag.* *Bot.* 260. *hort.* 163.

* PHARM. *Trifolii bituminosi* succus, semina. Vis succi intus anticarcinomatosa *ex Fabr. ab aqua pendente.* Oleum expressum extus antiparalyticum, *ex Sylvio Deleboë.*

T R I F O L I U M.

Legum. vix calyce longius, non dehis-
cens, deciduum, 1.-f.-2.-spermum.

Herba. sol. ternata. fulc. stipulæ adnatæ
vaginantes.

* *Melilotota, leguminibus nudis polyspermis,*
foliolo impari petiolato.

Melilotus
officinalis.

1. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis di-
spermis caule erecto. h. m. 388. *Le mélilot.*

Melilotus officinarum luteo flore. mag. Bot. 175.

Melilotus officinarum Germaniae. mag. hort. 132.

Altissimum.

β. *Melilotus major candida. mag. Bot. 175. hort. 133.*

* PHARM. *Meliloti (alba, lutea) flores, herba.*

Vis extus resolvens, emolliens, anodina.

Melilotus
italica.

2. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disper-
mis rugosis obtusis, caule erecto, foliolis inte-
gris. h. m. 388.

Melilotus italica, folliculis rotundis. mag. hort. 131.

β. *Melilotus angustifolia, repens folliculis rotundis.*
mag. Bot. 175.

** *Lotoïdea leguminibus testis polyspermis,*
foliolis sessilibus.

Alpinum. 3. TRIFOLIUM scapo nudo, leguminibus disper-
mis pendulis, foliolis lanceolatis. h. m. 388.

Anonis humilior radice amplâ & dulci. Tour. inst.
408.

*** *Lagopoda, calycibus villosis, foliolis*
sessilibus.

Subterra-
neum.

4. TRIFOLIUM capitulis villosis quinquefloris, in-
volucro centrali reflexo rigido fructum invol-
vente. h. m. 389.

*Trifolium subterraneum, sive folliculos sub ter-
ram condens. mag. Bot. 265.*

- Trifolium subterraneum tricoccum. *mag. hort.* 169.
5. TRIFOLIUM capitulis villosis hemisphaericis terminalibus solitariis, calycibus omnibus fertilibus. *b. m.* 389.
- Trifolium glomerulus personatae Cherleri. *mag. Bot.* 266. *hort.* 169.
6. TRIFOLIUM capitulis sessilibus globosis, calycibus striatis æqualibus patulis. *b. m.* 389. *Glomeratum.*
- Trifolium parvum rectum, flore glomerato cum unguiculis. *mag. Bot.* 267. *hort.* 199. *Tour.*
7. TRIFOLIUM spicis subglobosis, calycibus setis rigidis obvallatis, caule erecto. *b. m.* 389. *Lappaceum.*
- Trifolium capitulo glomerato rigido. *mag. Bot.* 267. *hort.* 199.
8. TRIFOLIUM spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis setaceis æqualibus, foliolis lanceolato-linearibus. *b. m.* 389. *Angustifolium.*
- Trifolium montanum angustifolium spicatum. *mag. Bot.* 261. *hort.* 198.
9. TRIFOLIUM spicis villosis, calycibus patentibus, caule diffuso, foliolis cuneiformibus. *b. m.* 389. *Stellatum.*
- Trifolium stellatum purpureum monspessulanum. *mag. Bot.* 262. *hort.* 199.
10. TRIFOLIUM capitulis sessilibus ovatis, calycibus villosis inæqualibus. *b. m.* 391. *Scabrum.*
- Trifolium cuius caules ex geniculis glomerulos oblongos proferunt. *mag. Bot.* 266. *hort.* 199.
11. Trifolium capitulo spumoso aspero minus. *mag. Bot.* 267.
11. TRIFOLIUM capitulis terminalibus, corollarum vexillis subulatis, caule erecto, foliolis lanceolatis ferratis. *b. m.* 391. *Montanum.*
- Trifolium montanum album. *mag. Bot.* 261. *hort.* 198.
12. TRIFOLIUM spicis ovatis, calycibus inflatis glabris s-dentatis, involucris universalibus pentaphyllis. *b. m.* 392. *Spumosum.*
- Trifolium capitulo spumoso lœvi. *Tour.* 404. *Binh. predr.* 405.

200 T E T R A P E T A L I

- Resupinatum.* 13. TRIFOLIUM spicis subovatis, calycibus inflatis dorso gibbis, caulis prostratis. *b. m. 392.*
Trifolium pratense folliculatum. *mag. Bot. 263.*
hort. 198.
- Fragiferum.* 14. TRIFOLIUM capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulis repentibus. *b. m. 392.*
Trifolium fragiferum frisicum. *mag. Bot. 265. hort. 198.*
- *** Lupulina, vexillis corollæ inflatis.
- Agrarium.* 15. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *b. m. 392.*
Trifolium pratense luteum capitulo lupuli, sive agrarium. *mag. Bot. 262. hort. 198.*
- Spadiceum.* 16. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. *b. m. 393. n°. 23. montanum.*

L O T U S.

Cal. tubulosus. *legum.* cylindricum strictum polyspermum. *alæ* sursum longitudinaliter connientes.

Frutex, & herba. *fulcr.* stipulæ liberæ foliis simillimæ.

* *Leguminibus rarioribus, nec capitulum constituentibus.*

- Maritima.* 1. LOTUS leguminibus solitariis membranaceo-quadrangularibus, bracteis lanceolatis. *b. m. 393.*
Lotus maritima siliquosa folio pingui glabro. *mag. Bot. 165. hort. 122.*
- Conjugata.* 2. LOTUS leguminibus conjugatis membranaceo-quadrangularibus, bracteis oblongo-ovatis. *b. m. 394.*

3. LOTUS leguminibus solitariis quadrangulis, *Siliquosa.*
caulibus procumbentibus, foliis hirsutis. *b. m.*
394.
Lotus pratensis siliquosa lutea. *mag. Bot. 165.*
Lotus siliquosa lutea monspeliensis. *mag. hort.*
- 122.*
4. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus strictis
erectis, caule erecto, pedunculis alternis. *b. m.* *Angustifolia.*
- 394.*
Lotus pentaphyllos minor hirsutus siliquâ angustif-
simâ. *mag. Bot. 164. hort. 122.*
5. LOTUS leguminibus arcuatis subquinatis com-
pressis, caulibus diffusis. *b. m. 394.* *Ornithopo-
dioïdes.*
Lotus siliquis ornithopodii. *mag. hort. 123.*
HABITAT in luco gramuntio, & in satis circum-
positis.
6. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus stric-
tis erectis, caule erecto, pedunculis alternis. *Angustissi-
mus.*
Linn. sif. n.t. 1179.
Lotus pentaphyllos minor hirsuta, siliquâ angus-
tissimâ. *mag. Bot. 164. hort. 122.*
HABITAT in luco gramuntio, & copiosius in luco
ad dexteram ultra pagum *Perauls*, ubi crescit
gentiana pumila.
- ** *Leguminibus multifloris in capitulum.*
7. LOTUS capitulis hirsutis, caule erecto hirto,
leguminibus ovatis. *b. m. 395. Le lotier ou trefle
hémorroïdal.* *Hirsuta.*
Lotus pentaphyllos siliquosus villosus. *mag. Bot.
165. hort. 123.*
- * PHARM. *Trifolii hæmorrhoidalis* herba. Vis extus
& intus antihæmorrhoidalis, extus abstergens,
in suppuratis circa anum pustulis, excoriationi-
bus, rhagadibus egregia.
8. LOTUS capitulis subglobosis, caule erecto an-
gulato frutescente, leguminibus rectis glabris. *Reñæ.*
b. m. 395.
Lotus siliquosus glaber flore rotundo. *mag. Bot.
166.*

Lotus villosus altissimus flore glomerato. mag. hort.

123.

Corniculata. 9. *LOTUS capitulis depresso, caulis decumbentibus, leguminibus cylindricis. b. m. 395.*

Lotus corniculata glabra & hirsuta minor. mag. Bot. 164.

Lotus sive melilotus pentaphyllos minor glabra. mag. hort. 122.

¶. *Lotus pentaphyllos hirsutie candicans. mag. Bot. 165. hort. 122.*

¶. *Lotus pentaphyllos tenuissimis glabris foliis. mag. Bot. 164. hort. 122.*

* *PHARM. Trifolii corniculati herba. Vis vulneraria, abstergens.*

Dorygnium. 10. *LOTUS capitulis ebraeatis, foliis stipulisque lanceolato-linearibus. b. m. 395.*

Trifolium album angustifolium, floribus veluti in capitulum cong. stis. b. m. mag. Bot. 267.

Lotus polyceratos frutescens incana, siliculis subrotundis erectis. mag. hort. 123.

T R I G O N E L L A.

Vexillum & alæ subæquales patentes, formâ corollæ tripetalæ; carina minima.

Herba; fol. ternata. inflor. axillaris, incerta.

Polyceratia. 1. *TRIGONELLA leguminibus pedunculatis sessilibusque congestis erectis rectis parallelis linearibus. b. m. 396.*

Fænum græcum sylvestre alterum polyceration. mag. Bot. 99. hort. 80.

Monspeliaca. 2. *TRIGONELLA leguminibus congestis sessilibus arcuatis divaricatis inclinatis brevibus. b. m. 396.*

Fænugræcum 3. *TRIGONELLA leguminibus sessilibus strictis erectiusculis solitariis subfalcatis acuminatis. b. m. 396. Le fenugrec.*

Fænugræcum sativum. mag. hort. 80.

β. Fænugræcum sylvestre. mag. Bot. 99. hort. 80.

* PHARM. *Fænugræci* femina. Vis emolliens, analgesica, resolvens, maturans, ophtalmica, anti-acredinosa.

M E D I C A G O.

Legum. spirale compressum polyspermum.
carina à vexillo deflectens.

Herba. fol. ternata. inflor. incerta.

1. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule glabro erecto. b. m. *La liserne.* 398.

2. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus luniatis, caule prostrato. b. m. 398.
Trifolium sylvestre luteum siliquâ cornutâ. mag. Bot. 271. hort. 200.

Idem flore albo aut violaceo. mag. hort. 200.

3. MEDICAGO spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente. b. m. 398.
Trifolium pratense luteum. mag. Bot. 262.

Melilotus capsulis reni similibus in capitulum congestis. mag. hort. 133.

4. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus cochleatis spinosis, caule procumbente tomentoso. b. m. 398.

Trifolium cochleatum marinum tomentosum. mag. Bot. 779. hort. 199.

5. MEDICAGO leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. b. m. 398.

α. Leguminibus solitariis cochleatis inermibus compressis planis, stipulis ciliatis, caule diffuso.

Trifolium cochleatum vel scutellatum fructu latiore, folio minori obtuso. mag. Bot. 267. hort. 199.

β. Leguminibus subternatis cochleatis globosis inermibus, stipulis denticulatis.

Trifolium cochleatum fructu latiore. mag. Bot. 269. hort. 199.

γ. Leguminibus cochleatis inermibus subcylindricis, extremitatibus complanatis.

204 TETRAPETALI IRREGULARES.

- Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu compresso oblongo. *mag. hort.* 199. *mag. Bot.* 268.
6. Trifolium cochleatum turbinatum fructu compresso oblongo minore. *mag. Bot.* 268. *hort.* 199.
- Intertexta.* 1. Leguminibus cochleatis subsolitariis sphæricis, aculeatis, aculeis divaricatis incurvis longis. Trifolium cochleatum polycarpon. *mag. Bot.* 268? *hort.* 199.
- Medica polycarpon folio obtuso crenato. *Tour.* 410. & non crenato. *ibid.*?
- Arabica.* 1. Leguminibus subternatis echinatis, foliis cordatis. Trifolium cochleatum folio cordato maculato. *mag. Bot.* 268. *hort.* 199.
- Coronata.* 2. Leguminibus subbinatis compressis spinosis, stipulis subulatis integerrimis. Medicago folliculis coronæ similibus. *mag. Bot.* 269. *hort.* 200. In hac flores minimi; legumina minima, spinis brevioribus erectiusculis.
- Ciliaris.* 3. Leguminibus congestis globosis hispidis, stipulis ciliatis. Trifolium fructu cochleato ciliari. *mag. Bot.* 269. *hort.* 199.
- Hirsuta.* 3. Leguminibus solitariis globosis brevissimè echinatis, stipulis ferratis. Trifolium arvense echinatum. *mag. Bot.* 269. *hort.* 200.
- Rigidula.* 1. Leguminibus cochleatis spinosis, foliolis inferioribus cuneiformibus retusis, superioribus subrotundis. Trifolium cochleatum fructu compresso spinis horrido. *mag. Bot.* 268. *hort.* 199.
- Aciniata.* 2. Leguminibus spinosis, foliis linear-pinnatifidis. Trifolium fructu echinato, foliis eleganter dissecatis. *mag. Bot.* 271. *icon.* 270. *hort.* 199.
- Minima.* 1. Leguminibus cochleatis subternatis, spinulis uncinatis, stipulis integris. Medicago echinata minima. *Tour.* 410. HABITAT λ in saxosis circa Lacolombiere & La valette. Pedunculi saepius filo terminati.

Classis VIII.

PENTAPETALI
REGULARES.

*TRIANDRIA**TRIGYNIA.*

POLYCARPON.

PENTANDRIA
MONOGYNIA.

RIBES.

HEDERA.

VITIS.

PENTANDRIA
DIGYNIA.

* *SUMBUMBELLATI.*

ERYNGIUM.

HYDROCOTYLE.

SANICULA.

** *UMBELLATI, involucro gemino,*

BUPLEVRUM.

PEUCEDANUM.

BUNIUM.

LASERPITIUM.

SIUM.

SISON.

FERULA:

CRITHMUM,

CACHRYS.

206 PENTAPETALI
LIGUSTICUM.
ANGELICA.

*** UMBELLATI, *involucro nullo.*
THAPSIA.
PASTINACA.
ANETHUM.
CARUM.
PIMPINELLA.
APIUM.
ÆGOPODIUM.

PENTANDRIA
TRIGYNIA.

RHUS.
TAMARIX.
CORRIGIOLA.
ALSINE.
LINUM. 9.

PENTANDRIA
TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

PENTANDRIA
PENTAGYNIA.
SPERGULA. 4.
LINUM.
DROSERA.
STATICE.

HEXANDRIA
MONOGYNIA,
FRANKENIA.

H E X A N D R I A

D I G Y N I A,

V E L E Z I A.

D E C A N D R I A

M O N O G Y N I A.

M E L I A.

T R I B U L U S.

P Y R O L A.

D E C A N D R I A

D I G Y N I A.

S A X I F R A G A.

G Y P S O P H I L A.

S A P O N A R I A.

D I A N T H U S.

D E C A N D R I A

T R I G Y N I A.

C U C U B A L U S.

S I L E N E.

S T E L L A R I A.

A R E N A R I A.

D E C A N D R I A

P E N T A G Y N I A.

S E D U M.

O X A L I S.

A G R O S T E M M A.

L Y C H N I S.

C E R A S T I U M.

S P E R G U L A,

208 *P E N T A P E T A L I*
D E C A N D R I A
 DECAGYNIA.
PHYTOLACCA.

D O D E C A N D R I A
 M O N O G Y N I A .
P O R T U L A C A .
D O D E C A N D R I A
 D I G Y N I A .
A G R I M O N I A .

I C O S A N D R I A
 M O N O G Y N I A .
M Y R T U S .
P U N I C A .
A M Y G D A L U S .
P R U N U S .

I C O S A N D R I A
 D I G Y N I A .
C R A T Æ G U S .

I C O S A N D R I A
 T R I G Y N I A .
S O R B U S .

I C O S A N D R I A
 P E N T A G Y N I A .
M E S P I L U S .
P Y R U S .

I C O S A N D R I A
 P O L Y G Y N I A .
R O S A .
R U B U S .

E R A G A R I A .

FRAGARIA.

POTENTILLA.

GEUM.

SPYRÆA.

*POLYANDRIA**MONOGYNIA.*

CISTUS.

TILIA.

*POLYANDRIA**DIGYNIA.*

PÆONIA.

*POLYANDRIA**PENTAGYNIA.*

AQUILEGIA.

NIGELLA.

*POLYANDRIA**POLYGYNIA.*

RANUNCULUS.

HELLEBORUS.

CALTHA.

*MONADELPHIA**PENTANDRIA.*

GERANIUM. 1. 2. 3.

*MONADELPHIA**DECANDRIA.*

GERANIUM.

*POLYADELPHIA**ICOSANDRIA.*

CITRUS.

HYPERICUM,

*SYNGENESIA**MONOGAMIA.*

JASIONE.

*GYNANDRIA**PENTANDRIA.*

PASSIFLORA.


*MONOCIA**MONADELPHIA.*CROTON. *mas.**DICIA**DECANDRIA.*

LYCHNIS. 3.

CUCUBALUS. 4.

*POLYGAMIA**MONOCIA.*

ACER.



PENTAPETALI REGULARES.

TRIANDRIA TRIGYNIA.

POLYCARPON.

Cal. 5-phyllus : foliolis carinatis. *cor.* petala minima. *caps.* 1-locularis, trivalvis.

Herba. fol. verticillata. *inflor.* terminalis cymoso-dichotoma.

i. POLYCARPON foliis quaternis ovatis, paniculâ dichotomâ. *h. m.* 58. *Tetraphyllum*

Anthyllis marina incana alsinefolia Narbonensium.
mag. Bot. 22.

Herniaria alsinefolio. *mag. hort.* 96.

Obs. Apud nos raro incana, særissime glabra, viridis.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

RIBES.

Cor. supera. *bacc.* polysperma. *styl.* 2-fidus.
petala, staminaque calyci inserta.

Frutex, rigidus. *inflor.* racemosa axillaris nutans. *fulc.* incerta.

* *Ribesia inermia.*

Alpinum. 1. RIBES inerme , racemis erectis , bracteis flore longioribus. *b. m.* 114.

Grossularia non spinosa. *mag. Bot.* 123.

Grossularia vulgaris fructu dulci. *mag. hort.* 94.

Nigrum. 2. RIBES inerme , racemis pilosis , floribus oblongis. *b. m.* 114. *Le cassis, ou groselier noir.*

Grossularia non spinosa fructu nigro. *mag. hort.* 94.

* PHARM. *Ribium nigrorum* herba , baccæ , syrpus. Vis antihysterica , diuretica , morsui viperarum , animalium rabiosorum , & dysenteriae febrili adversa.

Rubrum. 3. RIBES inerme , racemis glabris pendulis , floribus planiusculis. *b. m.* 114. *Le groselier rouge.*

Grossularia multiplici acino , sive non spinosa hortensis rubra , sive ribes officinarum. *mag. hort.* 94.

β. Grossularia hortensis majori fructu rubro. *mag. hort.* 94.

* PHARM. *Ribium rubrorum* herba , baccæ , syrpus , conditum. Vis refrigerans , antiphlogistica , sitim , æstum sedans , antisceptica.

** *Grossulariæ aculeataæ.*

Uvæ crispæ. 4. RIBES racemis aculeatis , baccis glabris , petioli bracteâ monophyllâ. *b. m.* 114.

Grossularia simplici acino , vel spinosa sylvestris. *mag. Bot.* 123. *hort.* 94.

* PHARM. *Uvæ crispæ* baccæ. Vis fructuum immaturorum refrigerans , adstringens , antidiarrhoïca , antihæmorrhagica.

H E D E R A.

Cor. supera. *stylus* simplex. *bacc.* 5-sperma calyce cincta.

Frutex , volubilis. *inflor.* glomerata terminalis. *fulc.* aculei sparsi flexiles conferti.

1. HEDERA foliis ovatis lobatisque. h. m. 115. *Helix.*
Le lierre.

Hedera corymbosa communis. mag. Bot. 124.

Hedera arborea. mag. hort. 94.

* PHARM. *Hederæ arboreæ lignum, folia, resina, baccæ. Vis vulneraria acris, adstringens, sophisticans, in ulceribus.*

V I T I S.

*Cor. infera: petalis apice cohærentibus,
 styl. o. bacc. 5-sperma.*

*Frutex, farmentosus. inflor. racemosa op-
 positifolia. fulc. cirrus è basi racemi.*

1. VITIS foliis lobatis sinuatis nudis. h. m. 115. *La Vinifera.*
vigne.

Vitis vinifera. mag. Bot. 279. hort. 206.

2. Vitis labrusca. *mag. Bot. 281.*

* PHARM. *Vitis folia, aqua, uvæ, agrestæ syru-
 pus, passulæ, vinum, aqua vitæ, spiritus vini,
 acetum, oxycratum, tremor tartari, sal tartari.
 Vitis aqua ophtalmica.. folia adstringentia, anti-
 diarrhoïca ad drach. i in substantia.. uve subbla-
 xantes, lubricantes, demulcentes.. agrestæ sy-
 rupus refrigerans, antiphlogisticus.. passulæ be-
 chicæ, antiacredinosaæ, pectori, renibus, vesicæ
 dicataæ.. vinum cardiacum, stomachicum, robo-
 rans, resolvens, vulnerarium. Aqua vite, spi-
 ritus vini, vis eadem, sed fortior; acetæ oxycrati
 vis refrigerans, adstringens, antisceptica, anti-
 pestilentialis; tremoris tartari vis refrigerans,
 antiphlogistica; salis tartari vis acris resolvens,
 aperiens, antiædematosa, antihydropica.*

2. VITIS foliis quinatis, foliolis multifidis. h. m. 116. *Laciniata.*
Vitis foliis laciniatis. mag. hort. 206.

PENTANDRIA

DIGYNIA.

ERYNGIUM.

Receptaculum paleaceum.

Herba, rigida. fol. composita. inflor. capitata terminalis.

Maritimum. 1. ERYNGIUM involucris foliaceis ovatis longitudo
capituli: h. m. 130. *Le panicaut de mer.*

Eryngium maritimum. mag. Bot. 92. hort. 75.

* PHARM. *Eryngii maritimi radix recens, condita, folia. Vis subsequentis.*

Campestre. 2. ERYNGIUM involucris subulatis capitulo lon-
gioribus. h. m. 130. *Le chardon roliand.*

Eryngium vulgare. mag. Bot. 93. hort. 75.

* PHARM. *Eryngii radix recens, condita, folia, semina. Vis incidens, aperiens, diuretica, emmenagogia, aphrodisiaca. Datur radix recens ad unc. 1, in qualibet decocti libra.. condita pa-
riter ad unc. 1.*

HYDROCOTYLE.

*Umbella subsimplex: involucro 4-phyllo.
petala integra. sem. semi-orbiculata,
compressa.*

*Herba, radicans. fol. orbiculata, lobata,
peltata.*

Vulgaris. 1. HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbellis quinquefloris. h. m. 131. *L'écuelle d'eau.*

Ranunculus aquaticus cotyledonis folio. mag. Bot. 218.

Ranunculoïdes cotyledonis folio. mag. hort. 171.

S A N I C U L A.

Flores disci abortientes. sem. muricata.
Herba, simplicissima subnuda. fol. subdigitata. inflor. subcapitata.

1. SANICULA foliis palmato-digitatis, foliolis quinque incisis ovali-lanceolatis. h. m. 130. *La sanicle.* Sanicula officinarum. mag. Bot. 229. hort. 178.

* PHARM. *Sanicula* herba, succus, aqua. Vis resolvens, adstringens, vulneraria, abstergens, haemorrhagiis, leucorrhææ, ulceribus oris & viscerum adversa. Folia ad manip. i.. succus ad unc. ii. iii.. aqua ab unc. iv, ad unc. vi.

* Umbellati, *involucro gemino.*

B U P L E V R U M.

Involucra umbellulæ majora 5 - phyllæ.
fructus subrotundus compressus striatus.
Frutex & herba. fol. integerrima simplissima.

* *Herbacea.*

1. BUPLEVRUM involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. h. m. 132. *La percefeuille annuelle.* Rotundifolium.

Perfoliata vulgaris arvensis. mag. Bot. 200.
Buplevrum perfoliatum annum rotundifolium, mag. hort. 36.

* PHARM. *Perfoliata vulgaris* herba. Vis vulneraria, subastrigens, antiherniosa? antiscrophulosa?

2. BUPLEVRUM involucellis pentaphyllis acutis, universali triphylio, flosculo centrali altiore, ramis divaricatis. h. m. 132. Odontites.

Perfoliata minor angustifolia buplevri folio. mag., Bot. 200.

Buplevrum angustifolium annum minimum. mag.
hort. 36.

β . Buplevrum annum angustifolium. mag. Bot. 42.
hort. 36.

Rigidum. 3. BUPLEVRUM caule subnudo dichotomo, invo-
lucris minimis acutis. h. m. 133.

Buplevrum folio rigido. mag. Bot. 42. hort. 36.

Tenuissimum. 4. BUPLEVRUM umbellis simplicibus, alternis pen-
taphyllis subtrifloris. h. m. 133.
Buplevrum angustissimo folio. mag. Bot. 42. hort.
36.

** *Frutescentia.*

Fraticosum. 5. BUPLEVRUM foliis obovatis integerrimis. h. m.
133.

Seseli æthiopicum salicis folio. mag. Bot. 240.

Buplevrum arborescens salicis folio. mag. hort. 36.

P E U C E D A N U M.

Involuta brevissima. flores disci abortivi.
fructus ovatus utrinque striatus, alâ
cinctus.

Herba. fol. decomposita : foliolis divisis.

Officinale. 1. PEUCEDANUM foliis quinques tripartitis fili-
formibus linearibus. h. m. 138. *Le fenouil de porc.*

Peucedanum germanicum. mag. Bot. 201.

Peucedanum minus germanicum. mag. hort. 156.

β . Peucedanum majus italicum. mag. hort. 156.

* PHARM. *Peucedani radix*, succus. Vis aperiens,
expectorans, antihysterica, nervina.

Silva. 2. PEUCEDANUM foliolis pinnatifidis, laciniis ova-
tis oppositis. h. m. 139.

Seseli pratense Monspeliensem. mag. Bot. 239.

Ligusticum, quod angelica pratensis apii folio.
mag. hort. 117.

* PHARM. *Seselos pratensis herba*, succus, aqua,
semina. Vis diuretica, anticalculosa, carminati-
va.. *succus* ad unc. II. III.. *semina* ad drach. I.

B U N I U M.

Involucella setacea. *umbella* conferta,
fructus. ovati.

Herba. *rad.* bulbosa solida. *fol.* linearidecomposita.

1. BUNIUM. *b. m.* 137. *Bulbocasta-*
num.
Bulbocastanum majus folio apii. *mag.* *Bot.* 41. *hort.* 36.

L A S E R P I T I U M.

Involucra brevissima. *fructus* oblongus :
angulis 8 membranaceis.

Herba. *fol.* 2 - seu - 3 - pinnata : foliolis
integris.

1. LASERPITIUM foliolis cordatis inciso - ferratis. *Latifolium.*
Linn. sp. 248.
Laserpitium foliis latioribus lobatis. *Tour. inst.* 324.
mag. hort. 112.
* PHARM. *Gentianæ albae* seu *thaumæ radix*. Vis
resolvens , diuretica , emmenagogæ , stomacho-
chica .
HABITAT in descensu montis *Capouladou* , à *La-*
malou in cacumine montium , & à *l'Esperou*.
2. LASERPITIUM foliolis cuneiformibus furcatis. *Gallicum.*
b. m. 140.
Laserpitium gallicum. *mag. Bot.* 300. *hort.* 111.
3. LASERPITIUM foliolis lanceolato - ovatis integer-
rimis attenuato - petiolatis. *b. m.* 140. *L'iveche* ,
ou seleri de montagne.
Siler montanum officinarum. *mag. Bot.* 241. *hort.*
184.
* PHARM. *Sileris montani* , seu *seseleos* semina.
Vis incidens , carminativa , diuretica , emmena-
goga , colicæ lochiali adversa. Dantur in sub-
stantia ad drach. fl.

Chironium. 4. LASERPITIUM foliolis obliquè cordatis, petiolis hirsutis. *b. m.* 184.

Panax costinum. mag. Bot. 197.

Pastinaca sylvestris altissima. mag. hort. 154.

Trilobum. 5. LASERPITIUM foliolis trilobis incisis. *Linn. sp.*
^{249.}

Libanotis latifolia aquilegiæ folio. mag. Bot. app.
^{301.}

Ligusticum, quod angelica montana perennis aquilegiæ folio. mag. hort. 117.

Angelica montana perennis aquilegiæ folio. Tour.
inst. 313.

HABITAT cum laserpitio latisolio, & à la Serane,
à la Combe de Leques.

S I U M.

Involucra polyphylla. fructus subovatus
striatus.

Herba, immersa & emersa. fol. pinnata:
foliolis oppositis sessilibus.

Berula. 1. SIUM foliis pinnatis, foliolis auriculatis, umbellis lateralibus pedunculatis. *La berle.*

Sion, sive apium palustre foliis oblongis. Bauh.
pin. 154. *Tour.* 309. *mag. Bot.* 242. *mag. hort.*
^{186.}

Sion umbelliferum berula Monspeliensium. Bauh.
hist. 3. 179.

* PHARM. *Berule sive si herba. Vis antiscorbutica, incidens, diuretica, emmenagoga, extus resolvens. Datur in juseulis, apozematibus .. succus depuratus ad unc. III vel IV.*

HABITAT in rivulis juxta Lattes, & Pascales,
necnon juxta Ledum amnem. Maio & Augusto
floret. *Caulis erectus fistulosus, altitudinis ferè*
humanæ. *Folia pinnata: foliolis utrinque 4, 6,*
7, inæqualiter ferratis, basi utrinque auriculatis. Foliorum inferiorum par secundum ita
distat à primo pari, ut interrupta pinnularum

series & secundum par deficere videantur. *Foliolum impar* & *soliola involucri* saepius trifida. *Umbellæ oppositis foliæ*, pedunculo sesquipolliticari folium subæquante.

2. SIUM foliis pinnatis, umbellis lateralibus sessilibus. *b. m.* 142. *Nodiflorum.*
SIUM aquaticum procumbens ad alas floridum.
Tour. 308.
SIUM aquaticum repens. *mag. hort.* 186.
* PHARM. Cum priori confunditur.
3. SIUM foliis pinnatis, umbellâ terminali. *b. m.* *Latifolium.*
142.
4. SIUM foliolis linear-i-lanceolatis serratis decurrentibus, connatis. *Linn. sp.* 252. *Falcaria.*
Ammi perenne repens. *Tour. inst.* 305. *mag. hort.* 13.
HABITAT in rivulis & circumjacentibus locis,
à Alais, Uzez.

S I S O N.

Umbella depauperata. involucra sub4-phylla. fructus ovatus striatus.

Herba. fol. subbipinnata: foliolis sessilibus integerimis.

1. SISON foliis pinnatis, umbellis erectis. *b. m.* 143. *Anomum.*
Sison amomum officinis nostris. *mag. Bot.* 242.
Sison, sive amomum officinarum. *mag. hort.* 185.
* PHARM. *Sisonis seu amomi semina, aqua. Vis incidens, calefaciens, carminativa, anticolicalis.. aqua ab unc. iv, ad vi.*
2. SISON foliolis capillaribus verticillatis. *b. m.* 143. *Verticillatum.*
Daucus pratensis Dalechampii, millefolii folio.
Bauh. hist. 3. part. 2. 9.

F E R U L A.

Involucrum universale deciduum. fructus ovalis compresso-planus, striis utrinque tribus.

Herba. fol. decomposita : foliolis integerimis.

Communis. 1. FERULA foliolis linearibus longissimis simplicibus. *b. m.* 140.

Ferula femina Plinii. *mag. Bot.* 97. *hort.* 77.

C R I T H M U M.

Involucr. reflexum, brevissimum. *fructus* ovali-compressus.

Herba, rigida. *fol.* carnosa, 2-pinnata, foliolis simplicissimis : petiolis comprefsis subancipitibus.

Maritimum. 1. CRITHMUM foliolis lanceolatis carnosis. *b. m.* 139.

Crithmum seu *fæniculum* marinum minus. *mag. Bot.* 80.

Fæniculum maritimum minus. *mag. hort.* 80.

C A C H R Y S.

Involucra longa linear-i-lanceolata. *fructus* subsphæricus angulatus : cortice suberofo.

Herba. fol. 2-pinnata : foliolis linearibus longis multifidis.

Libanotis. 1. CACHRYS foliis pinnatis, foliolis acutis multifidis. *b. m.* 139.

Libanotis cachryophoros quibusdam flore luteo. *mag. Bot.* 154.

Cachrys semine fungoso lævi, foliis færulaceis. *mag. hort.* 36.

L I G U S T I C U M.

Involucra membranacea. *fructus* oblongus utrinque 5-sulcatus.

Herba. fol. 2-pinnata : foliolis oppositis sessilibus basi integris.

1. **LIGUSTICUM** foliis multiplicibus : foliolis superne incisis. h. m. 141. *L'iveche.* *Levisticum.*

Ligusticum vulgare foliis apii. mag. hort. 117.

* PHARM. *L'ivisci* radix, herba, succus, semina, oleum stillatitium. Vis alexiteria, carminativa, emmenagoga, pellens, antiauriginosa, antihysterica.. radix pulverata à drach. fl. ad drach. 1.. semina à scrup. 1. ad drach. fl.. succus ad unc. III.

OBS. Confer, *apium pyrenaicum thapsiae facie.* *Tour.*

2. **LIGUSTICUM** foliis multiplicato-pinnatis, foliolis pinnatum incisis. *Linn. sp. pl. 250.* *Peloponnesicum.*

Cicutaria latifolia fætida. *Tour. inst. 322. mag. hort. 56.*

HABITAT à l'*Esperou*, au prétipice de la Fereze.

A N G E L I C A.

Fructus subrotundus angulatus solidus, fulcis utrinque tribus.

Herba. fol. 2-pinnata : foliolis latiusculis oppositis simplicibus sessilibus. inflor. umbella universalis hemisphærica: umbellæ partiales globosæ.

1. **ANGELICA** foliorum impari lobato. h. m. 142. *L'angélique.* *Archangelica.*

Angelica sativa. mag. hort. 15. & archangelica dicta. *ibid.*

* PHARM. *Angelica sativæ* radix, folia, semina, aqua. Vis alexiteria resolvens, sudorifera, carminativa, stomachica, emmenagoga, antihysterica. *Radix* in substantia ad drach. 1. in decocto, seu prisana, ad unc. 1.

2. **ANGELICA** foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ferratis. *Linn. sp. pl. 250.* *Sylvestris.*

222 P E N T A P E T A L I

Imperatoria pratinis major. *Tour. inf.* 317.

Angelica sylvestris major. *mag. hort.* 15.

* PHARM. *Angelice sylvestris* radix, folia. Vis eadem, sed debilior, prioris, male succedanea, antiepileptica.

HABITAT à l'Esperou, à Banahu.

* Umbellati *involutio nullo.*

T H A P S I A.

Fructus oblongus magnus convexus, emarginatus, membranâ cinctus.

Herba. fol. 2-pinnata: foliolis pinnatifidis.

Villosa. 1. THAPSIA foliolis dentatis basi coadunatis. *b. m.* 148.

Thapsia quorumdam hirsuta & aspera cicutæ folio, flore luteo, semine lato. *mag. Bot.* 249. *hort.* 193.

Festuca. 2. THAPSIA foliolis multifidis basi angustatis. *b. m.* 148.

Asclepium. 3. THAPSIA foliis multifidis setaceis. *b. m.* 148.

P A S T I N A C A.

Fructus ellipticus compresso-planus.

Herba. fol. pinnata: foliolis oppositis suborbiculatis incisis.

Sativa. 1. PASTINACA foliis simpliciter pinnatis. *b. m.* 149.
Le panais.

Pastinaca sylvestris latifolia. *mag. Bot.* 199. *hort.* 154.

2. *Pastinaca sativa latifolia.* *mag. hort.* 154.

* PHARM. *Pastinaca sativa, & sylvestris* radix, semina. Vis nutriendi, flatulenta, aphrodisiaca, febrifuga. Semina ad drac. III, in vini albi ciathis duobus, ad unum coquendo reductis pro una dosi. radix ad man. II: coque & infunde

in vini adibi unc. xvi. cola & exprime pro tripli dosi.

2. PASTINACA foliis decompositis pinnatis. h. m. *Opopanax.*

149.

Panax costinum. mag. Bot. 197.

Pastinaca sylvestris altissima. mag. hort. 154.

* PHARM. *Opoponacis gummi. Vis nervina, anti-paralytica, incidens, antiasthmatica, antitussiculosa, eccoprotica, deobstruens, emmenagogue, extus resolvens. Datur intus à drach. ff. ad drach. i.*

A N E T H U M.

Fructus subovatus compressus striatus, marginatus.

Herba. fol. 2-pinnata: foliolis filiformibus teretiusculis.

1. ANETHUM fructibus ovatis. h. m. 150. *Le Fæniculum. fenouil.*

Fæniculum vulgare minus acriori & nigriori semine. mag. Bot. 98. hort. 80.

2. Idem foliis longioribus. *mag. hort. 80.*

3. *Fæniculum dulce. mag. hort. 80.*

* PHARM. *Feniculi radix, herba, succus, aqua, semina, oleum stillatitium. Vis resolvens, aperiens, diuretica, sudorifera, expectorans, stomachica, carminativa, galactophora, opthalmica, febrifuga.. succus ad unc. iii. iv.. radix ab unc. ff, ad unc. i.. semina à drach. ff, ad drach. i.. oleum ad guttas vi.*

C A R U M.

Petala cordata emarginata. fructus ovato-oblongus striatus gibbus.

Herba. fol. 2-pinnata: foliolis tenuibus incisis.

1. CARUM. h. m. 150. *mag. hort. 45. Le carvi. Carvi.*

* PHARM. *Carvi* radix, semina, oleum stillatum. Vis incidens, resolvens, diuretica, emmenagogia, stomachica, carminativa, anticolicalis, febrifuga.. *semina* à scrup. i. ad drach. i. in substantia ad drach. i. ad drach. i. ss. in infuso.. *oleum* à gutt. iii ad vi.

PIMPINELLA.

Fructus ovato-oblongus, seu apice angustior.

Herba. *inflor.* umbellis ante florescentiam nutantibus: vigente florescentiâ erectis. *fol.* pinnata.

Saxifraga.

1. PIMPINELLA foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus. *h. m.* 150. *La bouquetine.*

2. Pimpinella saxifraga major altera. *mag. Bot.* 204. *Saxifraga magna. mag. hort.* 178. & major altera. *ibid.* 179.

2. Pimpinella saxifraga minor. *mag. Bot.* 204. *Saxifraga parva. mag. hort.* 179.

3. Saxifraga major in Alpibus flore rubente. *mag. hort.* 179.

* PHARM. *Pimpinellæ saxifragæ* radix, herba, semina, aqua. Vis incidens diuretica, emmenagogia, sudorifera, stomachica, masticatoria, cosmetica.

OBS. ♂ Foliola gerit suborbiculata; ♀ foliola trifida, lobo medio tripartito, lobulis quadrifidis; ♂, foliola semibiloba circumferrata.

APIUM.

Petala inflexa. *fructus* striati ovati minimi.

Herba. fol. 2-pinnata: foliolis petiolatis.

OBS. Cari & apii umbellæ universales folio involucriformi sèpius donantur.

t. APIUM

- * APIUM foliolis caulinis linearibus. h. m. 151. *Le persil.* *Petroselinum*
Apium hortense, seu *petroselinum vulgò.* *mag.*
hort. 20.
- * PHARM. *Petroselini* radix, herba, semina, succus. Vis aperiens, emmenagoga, resolvens, laetifuga, contusioni, pediculis adversa, dia-phoretica. *Radix* ab unc. ss. ad unc. 1.
2. APIUM foliolis caulinis cuneiformibus. h. m. 151. *Graveolens.*
Le céleri.
- Apium palustre*, seu *officinarum.* *mag.* *Bot.* 24. *hort.* 20.
3. *Apium palustre minus*, cauliculis procumbentibus, ad alas floridum. *Tour. inst.* 305.
4. *Apium dulce*, *celeri Italorum.* *mag.* *hort.* 20.
- * PHARM. *Apii* radix, herba, succus, semina. Vis aperiens, resolvens, sudorifera, diuretica, emmenagoga, febrifuga, laetifuga, carminativa, antihysterica, noxia apoplecticas, epilepticas, vertiginolis, caliginosis, cautè danda.

Æ G O P O D I U M.

Fructus ovato-oblongus striatus. *petala* cordata.

Herba. *fol.* petiolata: petiolo triquetro; radicalis 2-ternata foliolis sessilibus; caulina ternata foliolis petiolatis.

1. ÆGOPodium foliis caulinis ternatis. h. m. 152. *Podagraria.*
L'herbe à gerard.

Ligusticum quod *angelica sylvestris minor*, sive *erratica.* *mag.* *hort.* 117.

P E N T A N D R I A

T R I G Y N I A.

R H U S.

Cal. 5-partitus. *bacc.* 1-sperma.

Frutex. *fol.* alterna impari-pinnata,

- Vioraria.* 1. RHUS foliis pinnatis obtusiusculè ferratis ovalibus
subtus villosis. *b. m.* 154. *Le sumac.*
Rhus folio ulmi. *mag. Bot.* 222.
Sumach Arabum Rauwolf. *mag. hort.* 190.
* PHARM. *Rhus*, seu *sumach* folia, semina, flores.
Vis adstringens, refrigerans, antihæmorrhagica,
antidiarrhoïca, cautè usurpanda. Datur racemus
seminum in aquæ pinta. *Folia* ad manip. 1, in
aquæ pinta.. *semina* ad unc. ff.

T A M A R I X.

Cal. 5-partitus. *caps.* 1-locularis trivalvis.
sem. papposa.

Frutex. *fol.* imbricata minima. *inflor.*
racemi longissimi erecti teretes terminales.

- Gallica.* 1. TAMARIX floribus pentandris. *b. m.* 155. *Le tamarisc.*
Tamariscus narbonensis. *mag. Bot.* 248.
Tamarix major, sive arborea narbonensis. *mag. hort.* 192.
* PHARM. *Tamarisci radicis*, *ligni cortex*, *folia*,
sal lixivial. Vis aperiens, resolvens, splenica.
Cortex radicis, *ligni*, ad unc. 1.. *sal à scrup.* 1.
ad drach. 1.

C O R R I G I O L A.

Cal. 5-phyllus. *sem.* 1 triquetrum.

Herba. *fol.* sparsa integerrima. *inflor.* glomerata sparsa.

- Littoralis.* 1. CORRIGIOLA foliis lanceolatis sessilibus. *b. m.*
155.
Polygonifolia per terram sparsa, flore scorpioïdes.
mag. Bot. 210.
Herniaria supina scorpioïdes. *mag. hort.* 196.

A L S I N E.

Cal. 5-phyllus. petala 2-partita. caps.
1-locularis trivalvis.

Herba articulata debilis. fol. opposita petiolata integerrima. inflor. pedunculo axillari 1-floro.

1. ALSINE foliis ovato-cordatis. *b. m. 156. La Mediz. morgeline.*

Alsine vulgaris, sive morsus gallinæ. mag. Bot. 12.

Alsine media. mag. hort. 10.

Obs. Variat staminibus 3, 7, 10, pistillisque totidem.

L I N U M.

Cal. caps. sem. caul. fol. inflor. Vide infra Pentandr. pentagyniam. stylis 3.

9. LINUM calycibus acutis, foliis alternis linearis lanceolatis. *b. m. 159. Panicula ramis bifloris.* *Trigynum,*
Linum sylvestre minus flore luteo. mag. Bot. 160.
hort. 121.

P E N T A N D R I A

T E T R A G Y N I A.

P A R N A S S I A.

Cal. 5-partitus. nectaria 5-cordata, ciliata, apicibus glandulofis. caps. 4-valvis, 1-locularis, ovato-4-gona.

Herba simplicissima 4-gona. fol. radicalis petiolata: caulinæ solitaria. inflor. terminalis solitaria.

1. PARNASSIA foliis cordatis: caulinæ amplexicauli. *b. m. 157. Palustris,*

Ranunculoïdes quod parnassia palustris. mag. hort.
170.

P E N T A N D R I A

P E N T A G Y N I A.

S P E R G U L A.

Cal. caps. caul. inflor. Vide infrà Decandr.
pentagyniam. *fol.* verticillata integerrima.

Pentandra. 4. SPERGULA foliis verticillatis, floribus pentan-

dris. *b. m.* 224.

Al sine spergulae facie minima. mag. Bot. 14.
hort. 11.

L I N U M.

Cal. 5-phyllus: foliolo altero sæpius inæ-

quali. *caps.* 5-valvis, 10-locularis.

Herba. *fol.* incerta, sessilis integerrima.
inflor. suppaniculata terminalis.

* *Alternifolia.*

Ustatissimum 1. LINUM calycibus, capsulisque mucronatis, peta-

lis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule sub-

solitario. *b. m.* 158. *Le lin.*

Linum angustifolium. mag. Bot. 160.

Linum sativum. mag. hort. 121.

Linum arvense. mag. hort. 121.

* PHARM. *Lini sativi* femina, oleum expressum.
Vis relaxans, emolliens, demulcens, anodina,
antidysurica, anticolicalis, antitussiculosa. Semen
pro potionibus, ptisanis infunditur, decoquitur
pro clysteribus. Oleum datur ad unc. I. II. III. IV.

Perenne. 2. LINUM calycibus capsulisque obtusis, foliis al-

ternis lanceolatis integerrimis. 158.

Linum perenne majus cœruleum capitulo majore.
mag. hort. 121.

3. LINUM calycibus acuminatis, foliis lanceolatis
sparsis, strictis acuminatis, caule tereti basi
ramoso. *b. m. 158.* *Narbonense.*
- Linum sylvestre angustifolium, cæruleo ampio flore.
mag. Bot. 161. hort. 121.
4. LINUM calycibus acuminatis, foliis sparsis linea-
ribus setaceis retrorsum scabris. *b. m. 158.* *Tenuifolium.*
- Linum sylvestre angustifolium, floribus dilutè pur-
purascens vel carneis. *mag. Bot. 160. hort.*
121.
5. Linum sylvestre floribus albis. *mag. Bot. 160. hort.*
121.
5. LINUM calycibus subserrato-scabris lanceolatis,
paniculæ ramis dichotomis. *b. m. 159.* *Flavum.*
6. LINUM calycibus foliisque lanceolatis strictis mu-
cronatis, margine scabris. *b. m. 159.* paniculâ
conglobatâ. *Stritum.*
- Linum foliis asperis umbellatum luteum. *mag. Bot.*
164. hort. 121.
7. LINUM foliorum basi utrinque puncto glandu-
loso. *b. m. 159.* *Campanula-*
Linum sylvestre luteum foliis subrotundis. *mag. Bot.*
163. hort. 121. *tum.*
8. LINUM calycibus ovatis acutis muticis, foliis lan-
ceolatis, inferioribus oppositis. *b. m. 159.* *Maritimum.*
- Linum maritimum luteum. *mag. Bot. 160. nar-*
bonense. hort. 121.

** *Oppositifolia.*

10. LINUM foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule
dichotomo, corollis acutis. *b. m. 160.* *Catharticum.*
- Linum minimum, vel alsine verna glabra flosculis
exiguis albis. *mag. Bot. 161.*
- Linum pratense flosculis exiguis. *mag. hort. 122.*
- * PHARM. *Lini cathartici* herba. Vis cathartica,
subemetica, subhydragoga. Datur herba man.
i. infusum supra cineres calidos in vini albi cya-
tho, scopo purgandi. *folia* recentia ad drach. i
vel ii, vel exsiccata ad drach. i; cum cremore

D R O S E R A.

Cal. 5 - fidus. *caps.* 1 - locularis : apice
5-valvi , polysperma.

Herba. fulc. glandulæ petiolatæ confertæ
glutinosæ supra folia.

Rotundifolia 1. DROSERA scapis radicatis , foliis orbiculatis. *b.*
m. 160. *Le rossolis.*

Ros solis folio rotundo. *mag. hort.* 174.

* PHARM. *Roris solis* herba , syrupus. Vis aliis
suspecta corrosiva , aliis probata , pectoralis ,
asthamati , tussi inveteratæ , ulceri pulmonum
adversa. Datur *pulverata* ad drach. 1... *infusa*
ad usque drach. 11.. *syrupus* ad unc 1.

S T A T I C E.

Cal. 1-phyllus integer , plicatus , infun-
dibuliformis. *sém.* 1.

Herba : *scapus* rigidus paniculato-ramo-
sus : *fol.* radicalis rigida.

Armeria. 1. STATICE scapo simplici capitato. *b. m.* 157. *Le*
statice ou gazon d'Olympe.

Caryophyllus montanus major flore globoſo. *mag.*
Bot. 54.

Statice Lugdunensium. *mag. hort.* 189.

β. *Caryophyllus montanus* minor , flore globoſo.
mag. Bot. 54.

Statice montana minor. *mag. hort.* 189.

* PHARM. *Statices* herba. Vis vulneraria , antiul-
cerosa , adstringens , ischæma.

Limonium. 2. STATICE scapo paniculato tereti , foliis lævibus.
b. m. 157.

Limonium maritimum majus. *mag. Bot.* 155. *hort.*

119.

Oleasolia. β. Foliis lanceolatis.

- Limonium maritimum minus oleo folio. *mag. Bot.*
155. hort. 119.
2. Foliis obovatis. *Bellidifolia:*
- Limonium maritimum parvum bellidis minoris
 folio. *mag. Bot. 155. hort. 119.*
3. Ramis frutescentibus perennantibus. *Suffruticosa-*
sum.
- Limonium fruticosum. *mag. Bot. app. 301.*
- Limonium fruticosum glabrum. *mag. hort. 119.*
- Limonium maritimum minimum. *mag. hort. 119.*
- * PHARM. *Behen rubri* radix. Vis corroborans,
 antihaemorragica. *Linn.*
5. STATICE scapo paniculato tereti, foliis levibus. *Echioides:*
b. m. 157.
- Limonium minus annum bullatis foliis. *mag. Bot.*
157. icon. 156. hort. 119.
4. STATICE scapo nudo paniculato, foliis obversè *Cordata:*
 ovatis emarginatis. *Linn. sp. pl. 275.*
- Limonium maritimum minus foliolis cordatis. *mag.*
Bot. 156. hort. 119.
- HABITAT ad mare ultra montem Cetium, &
 ultra Maguelone.
5. STATICE scapo paniculato prostrato, ramis ste-
 rilibus retroflexis nudis, foliis cuneiformibus. *Reticulata:*
Linn. sp. pl. 275.
- Limonium supinum reticulatum. *mag. Bot. 156.*
hort. 119.
- HABITAT in paludosis circa Perauls.

HEXANDRIA

MONGYNIA.

FRANKENIA.

Cal. infundibul. 5-fidus. *stigma* 6-parti-
 tum. *caps.* 1-locularis trivalvis.

Herba rigescens procumbens. *inflor.* soli-
 taria axillaris sessilis.

Lav. 1. FRANKENIA foliis linearibus basi ciliatis quaternis. *b. m.* 185.

Polygonum alterum pusillo vermiculato folio. *mag.*
Bot. 210.

Anthyllis perennis supina flore purpurascente. *mag.*
hort. 18.

Obs. Occurrit saepius foliis quaternis, oppositisve.

Pulverulenta 2. FRANKENIA foliis obovatis retutis subtus pulv-
erulentis. *b. m.* 185.

Anthyllis marina Narbonensium altera. *mag.* *Bot.*
22.

Anthyllis maritima chamæsyce similis. *mag.* *hort.* 18.

HEXANDRIA

DIGYNIA.

VELEZIA.

Cal. tubulosus 5-dentatus. *petala* exigua.
caps. 1-locularis. *semina* serie simplici.
Herba, stricta articulata subdichotoma.
fol. opposita subulata connata.

Rigida. 1. VELEZIA. *b. m.* 185.

Lychnis minima rigida Cherleri. *mag.* *Bot.* 171.
hort. 126.

DECANDRIA

MONOGYNA.

MELIA.

Cal. 5 - dentatus. *neclar.* cylindricum
coloratum, longitudine calycis: ore
10-dentato. *drupa* nucleo 5-loculari
angulato.

Arbor. fol. alterna impari-2-pinnata :
foliclis petiolatis.

1. MELIA foliis bipinnatis. b. m. 207.
Azedarach. mag. hort. 30.

Azedarach.

T R I B U L U S.

Cal. 5-partitus. *capsulæ* 5 gibbæ spinosæ
polyspermæ. *styl.* o.

Herba prostrata. fol. abruptè pinnata op-
posita, alternatim trijuga sexjugaque.

1. TRIBULUS foliolis sexjugatis subæqualibus. b. *Terrestris.*
m. 207.

Tribulus terrestris. mag. Bot. 260.

Tribulus terrestris ciceris folio, fructu aculeato.
mag. hort. 198.

P Y R O L A.

Cal. 5-partitus. *antheræ* sursum 2-cornes.
caps. 5-locularis, angulis dehiscens.

Herba, subscaposa : fol. subradicalis pe-
tiolata; petiolo quolibet ex ala squamæ
membranaceæ prodeunte.

1. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillo de- *Rotundifolia*
clinato. b. m. 208. *La pyrole.*

Pyrola rotundifolia major. mag. hort. 166.

* PHARM. *Pyrolæ* herba. Vis corroborans, vulne-
raria, adstringens, ischæma, antileucorrhœica.
Datur in substantia ad drach. 1. in infusi aut
decocti unc. XII, ad pugil. 1.

2. PYROLA floribus racemosis dispersis, staminibus *Minor.*
pistillisque rectis. Linn. sp. pl. 397.

Pyrola rotundifolia minor. Tour. inst. 256.

HABITAT à l'Esperou, à Lamalou.

3. PYROLA racemo unilaterali. Linn. sp. pl. 397. *Secunda.*
Pyrola folio mucronato ferrato. Tour. inst. 256.

HABITAT cum priori. Folia acuminata argutè
ferrata.

DECANDRIA

DIGYNIA.

SAXIFRAGA.

Cal. 5-fidus. *caps.* 2-rostris, 1-locularis;
inter apices dehiscens.

Herba. *fol.* alterna incerta. *inflor.* terminalis pedunculata.

* *Foliis indivisis, caule subnudo.*

Cotyledon. 1. SAXIFRAGA foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineoserratis, caule paniculato. *b. m.* 209.

Bryoïdes. 2. SAXIFRAGA foliis ciliatis reflexis, caule nudiusculo unifloro. *Linn. sp.* 400.

Saxifraga pyrenaica minima lutea musco similis.
Tour. inst. 253.

HABITAT à l'Esperou, à l'Aigual.

Cæsiæ. 3. SAXIFRAGA foliis linearibus subtus punctatis aggregatis recurvatis, caule nudo multifloro. *Linn. sp.* 400.

Saxifraga alpina minima foliis cæsiis deorsum incurvis. *T. Seguier. Veron.* 449. *tab.* 9. *fig.* 2.

HABITAT à l'Espinouse au delà de Lamalou. Folia minima in rosulas densè aggesta. Altitudo vix sesquiuncialis.

Stellaris. 4. SAXIFRAGA foliis serratis, caule nudo ramoso, petalis acuminatis. *Linn. sp.* 400.

Saxifraga sedi folio pyrenaica ferrata. *Tour. inst.* 259.

HABITAT cum prioribus. Altitudo palmaris. Folia basi integra, interdum obtusa.

** *Foliis indivisis, caule folioso.*

5. SAXIFRAGA foliis caulinis linearis-subulatis sparsis nudis inerimibus, caulis decumbentibus. *Aizoïdes;*
Linn. sp. pl. 401. h. m. 209.
Sedum alpinum flore pallido. mag. Bot. 235. hort. 182.
6. SAXIFRAGA foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis. *Rotundifolia;*
Geum rotundifolium majus. mag. hort. 187.

*** *Foliis lobatis, caule erecto.*

7. SAXIFRAGA foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. *Granulata;*
** PHARM. *Saxifrage alba* radix, herba. Vis diuretica. Datur radix ad unc. fl. infusa in vini albi unc. XII.. folia ad man. I. decocta in aquæ pinta.*
8. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. *Tridactylites;*
Sedum tridactylites tectorum. mag. Bot. 238. hort. 88.
- * PHARM. *Paronychia* herba. Vis antiauriginosa ex *Boylæo*, antiscrophulosa ex *Rajo*. Datur infusa in cerevisia aut vino albo.
9. SAXIFRAGA foliis aggregatis radicatis linearibus integris, trifidisque, caule erecto subnudo subbifloro. *Cespitosæ;*
bifloro. h. m. 210.
Sedum tridactylites alpinum minus. mag. Bot. 238. hort. 88.

*** *Foliis lobatis, caulis procumbentibus.*

10. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus integris trifidisque, stolonibus procumbentibus, caule nudiusculo erecto. *Hypnoïdes;*
Geum alpinum folio trifido. mag. hort. 88.
11. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus apice dentatis, caule ascendente subvilloso. *Ascendens;*
Geum alpinum folio dentato. mag. hort. 88.

GYPSOPHILA.

Cal. 1-phillus campanulatus angulatus :
angulis coloratis. *petala* ovata sessilia.
caps. globosa 1-locularis.

Herba, articulata. *fol.* opposita sublinea-
ris, basi connata.

Aggregata. 1. GYPSOPHILA foliis mucronatis recurvatis, flo-
ribus aggregatis. *b. m.* 211.

Caryophyllus saxatilis ericæ folio, umbellatis co-
rumbis. *mag. Bot.* 53. *icon.* 52.

Alsine ericoïdes umbellatis corymbis. *mag. hort.*
11.

Festigiata. 2. GYPSOPHILA foliis lanceolatis linearibus obso-
letè triquetris lœvibus obtusis secundis. *b. m.*
212.

Rigida. 3. GYPSOPHILA foliis linearis lanceolatis planis,
caule dichotomo, pedunculis bifloris, petalis
emarginatis. *b. m.* 212.

Saxifraga. 4. GYPSOPHILA foliis linearibus, calycibus angu-
latis, squamis sæpius duabus, corollis crenatis.
b. m. 212.

HABITAT inter saxa ad lœvam à Grabels.

SAPONARIA.

Cal. 1-phillus, altero latere sæpius de-
hiscens. *petala* unguiculata. *caps.* oblona-
ga 1-locularis.

Herba, articulata. *fol.* latiuscula opposita
basi connata.

Officinalis. 1. SAPONARIA calycibus cylindricis, foliis ovato-
lanceolatis. *b. m.* 211. *La savonaire.*

Saponaria major lœvis. *mag. Bot.* 229.

Lychnis sylvestris quæ saponaria vulgò. *mag. hort.*
126.

* PHARM. *Saponaria* herba, semina. *Vis herba*

antiherpetica, antiscabiosa, diuretica, sudorifera, emmenagogia, antivenerea. *Seminum* anti-epileptica. *Folia* intus in decocto & extus ad lotium. *Semina* pulverata ad drach. 1.

2. SAPONARIA calycibus pyramidatis quinqueangularibus, foliis ovatis acuminatis sessilibus. *b. m. 211.* *Vaccaria.*
- Lychnis segetum rubra foliis perfoliatæ. *mag. Bot. 169. hort. 125.*
3. SAPONARIA calycibus cylindricis villosis, caulis dichotomis procumbentibus. *b. m. 211.* *Ocymoïdes.*
Lychnis vel ocymoïdes repens montanum. *mag. Bot. 172. hort. 126.*

D I A N T H U S.

Cal. 1-phylloides cylindricus. *petala* unguiculata. *caps.* cylindrica 1-locularis.

Herba, articulata. *fol.* subulata enervia. *fulc.* squamæ ad basim calycis singuli, oppositæ.

* *Floribus aggregatis.*

1. DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis ovato-subulatis tubum æquantibus, foliis lanceolatis. *b. m. 313.* *Barbatus.*
2. DIANTHUS floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubum subæquantibus, foliis linearibus. *b. m. 213.* *Carthusianorum.*
3. DIANTHUS floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus. *b. m. 213.* *Prolifer.*
Caryophyllus sylvestris prolifer. *mag. Bot. 52. hort. 46.*
4. DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis lanceolatis villosis tubum æquantibus. *b. m. 213.* *Armeria.*
Caryophyllus sylvestris barbatus. *mag. Bot. 52. hort. 47.*

** *Floribus solitariis, pluribus in eodem caule.*

Caryophyllus 5. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. *b. m. 214.*
L'œillet.

Caryophyllus hortensis flore majore simplici. *mag. hort. 47.*

* PHARM. *Caryophylli* flores, syrpus, aqua. Vis cardiaca, sudorifera alexiteria. *Syrpus ad unc. i.* aut ii.

Deltoides. 6. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *b. m. 214.*

Caryophyllus sylvestris vulgatissimus. *mag. Bot. 52.*

Caryophyllus sive betonica coronaria, corollâ pureâ insignis. *mag. hort. 46.*

Plumarius. 7. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis multifidis fauce pubescentibus. *b. m. 214.* caule debili.

Caryophyllus sylvestris flore tenuissimè dissecto. *mag. Bot. 52. hort. 46.*

Monspeliacus 8. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis longitudine tubi, corollis multifidis, caule erecto. *Linn. sist. nat. 1029.*

HABITAT cum priori, à l'Esperou, à l'Aignal. Facies dianthi plumarii; corollæ faux sœpius glabra, interdum pubescens. An satis à priori distinctus?

*** *Caule unifloro herbaceo.*

Arenarius. 9. DIANTHUS caulibus subunifloris, squamis calycinis ovatis obtusis multifidis, petalis, foliis linearibus. *b. m. 214.*

Caryophyllus sylvestris humilis flore unico. *mag. hort. 46.*

Virginicus. 10. DIANTHUS caulibus subunifloris, corollis crenatis, squamis calycinis brevissimis, foliis sublatis. *Linn. sist. nat. 1031.*

Caryophillus sylvestris repens multiflorus. mag. Bot.

52.

HABITAT in descensu montis *Capouladou*, & à
las *Cambrettes*. Circa *Monspelium* pariter col-
legerat *Burserus*; in monte ventoso vedit D.
Vicari; & circa *Narbonam* D. *Solier*. Folia
radicalia conferta imbricata. *Cauliculi* vix pal-
mares aut breviores; foliorum oppositionibus
3-4.

D E C A N D R I A

TRIGYNIA.

C U C U B A L U S.

Cal. inflatus. *petala* bifida unguiculata.
caps. 3-locularis.

Herba, articulata. *fol.* radicalis, à cau-
lina diversa, latior.

1. CUCUBALUS calycibus campanulatis, petalis *Baccifer*,
distantibus, fructu colorato, ramis divaricatis.
b. m. 215.
Alsine scandens baccifera. mag. Bot. 15.
Solanis aliquatenus affinis. mag. hort. 187.
2. CUCUBALUS calycibus subglobosis glabris reti-
culato-venosis, capsulis 3-locularibus, corollis
subnudis. *b. m. 215.* *Behem*
- Lychnis sylvestris quæ behen album vulgò. mag.
Bot. 168. hort. 127.
3. Eadem flore incarnato, aut rubro. mag. hort.
127.
3. CUCUBALUS floribus spicatis alternis secundis *Reflexus*,
subsessilibus, corollis obtusis nudis. *b. m. 215.*
Lychnis sylvestris albâ spicâ reflexâ. mag. Bot. 171.
icon. 170. hort. 126.

SILENE.

Cal. ventricosus. *petala* bifida unguiculata, coronata ad faucem. *caps.* 3-lo-
cularis.

Herba. *fol.* opposita connata subæqualis.

* *Floribus lateralibus solitariis.*

- Quinque-* 1. SILENE petalis integerrimis subrotundis, fructi-
vulnera. bus erectis alterniis. *b. m.* 216.
Lychnis sylvestris lanuginosâ minor. *Tour. inst.*
336. *hort. mag.* 126. *Bot.* 169.

** *Floribus lateralibus confertis.*

- Nutans.* 2. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus secun-
dis cernuis, caule recurvato. *b. m.* 216.
Lychnis viscosa montana alba latifolia. *mag. Bot.*
168. *hort.* 126.

*** *Floribus ex dichotomia caulis.*

- Conoïdea.* 3. SILENE calycibus fructuum globosis acuminatis,
striis triginta foliis glabris. *b. m.* 216.
Lychnis sylvestris latifolia calycibus turgidis stria-
tis. *mag. Bot.* 169. *hort.* 126.

- Behen.* 4. SILENE calycibus ovatis glabris venoso-reticula-
tis, capsulis trilocularibus. *b. m.* 216.

- Muscipula.* 5. SILENE petalis bifidis, caule dichotomo, floribus
axillaribus sessilibus, foliis glabris. *b. m.* 217.
Lychnis sylvestris viscosa rubra altera. *mag. Bot.*
169. *hort.* 125.

- Armeria.* 6. SILENE floribus fasciculatis fastigiatis, foliis su-
perioribus cordatis glabris. *b. m.* 217.
Lychnis viscosa purpurea latifolia lœvis. *mag. Bot.*
169. *hort.* 125.

- Inaperta.* 7. SILENE caule paniculato dichotomo, calycibus
lœvibus, petalis brevissimis emarginatis, foliis
glabris lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 419.

Lychnis

Lychnis sylvestris minima flore muscoso. mag. Bot.

171. *hort.* 127. *Tour.* 337.

HABITAT in luco Gramuntio & à Perauls.

8. *SILENE floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis. b. m. 217.* *Rupestris.*

Caryophylli minima species flore albo. mag. Bot.

54.

Lychnis alpina glabra pumila. mag. hort. 127.

9. *SILENE caudiculis unifloris, pedunculis lengthidine caulis. b. m. 217.* *Saxifraga,*

Caryophyllum saxifragus. mag. Bot. 53.

Lychnis saxifraga perennis angustifolia. mag. hort.

127.

S T E L L A R I A.

Cal. 5 - phyllus patens. petala 2-partita.

caps. 1-locularis polysperma.

*Herba, articulata. fol. incerta, simplex,
opposita.*

1. *STELLARIA foliis cordatis petiolatis, pedunculis ramosis. b. m. 218.* *Nemorum,*

Alpine altissima nemorum. mag. hort. 10.

2. *STELLARIA foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo, floribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis. b. m. 218.* *Dichotoma.*

3. *STELLARIA foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. b. m. 218.* *Graminea.*

*Alpine pratensis gramineo folio angustiore. mag.
hort. 11.*

4. *STELLARIA foliis oblongis, pedunculis subbifloris. Linn. sp. pl. 423.* *Crassipes.*

HABITAT à l'Esperou, à l'Hort de Diou, & à l'Aigual.

A R E N A R I A.

Cal. 5 - phyllus patens. petala integra.

caps. 1-locularis polysperma.

*Herba, articulata. fol. opposita sessilis
basi connata.*

Q

- Grandiflora.* 1. ARENARIA foliis subulatis strictis, radicalibus confertis imbricatis, caulis unifloris. *Linn. sif. 1034.*
Al sine uniflora & grandiflora, foliis acuminatis, & petalis integris. Allion. stirp. pedem. specim. 1°. tab. 10. fig. 1.
- HABITAT à l'Esperou, & à l'Espinouse ultra Lamalou. Hanc semel tantum anno 1761 collegi in via quā itur ad lucam gramuntium. Vix biuncialis; oppositionibus foliorum sāpius binis, aut unicā.
- Trinervia.* 2. ARENARIA foliis ovatis acutis nervosis subpetiolatis. *b. m. 218.*
Al sine planxaginis folio. mag. Bot. 13. hort. 10.
- HABITAT frequens in descensu montis Capouladou.
- Serpullifolia.* 3. ARENARIA foliis subovatis acutis sessilibus, collis calyce brevioribus. *b. m. 218.*
Al sine minor multicaulis. mag. Bot. 13. hort. 11.
- Rubra.* 4. ARENARIA foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *b. m. 218.*
- Cimpstris.* α. Folii internodio longioribus.
Al sine spergulae facie minor, seu spergula minor flore subcæruleo. mag. Bot. 13. hort. 10.
- Marina.* β. Folii internodis æqualibus.
Al sine spergulae facie media. mag. Bot. 13. hort. 10.
OBS. Pedunculi terminales racemosi bifidi, flosculis alternis secundis.
- Saxatilis.* 5. ARENARIA foliis subulatis, caulis paniculatis, calycum foliolis ovatis. *b. m. 219.*
Caryophyllus saxatilis foliis tenuissimis, pulchro flore albo. mag. Bot. 53.
Al sine saxatilis laricis folio major & majori flore. mag. hort. 11.
- Al sine saxatilis laricis folio minor & minori flore. mag. hort. 11. icon. 10.*
- Tenuifolia.* 6. ARENARIA foliis subulatis, caule paniculato, pedunculis simplicibus, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus. *b. m. 219.*
Al sine tenuifolia. mag. Bot. 13. hort. 11.
- Laricifolia.* 7. ARENARIA foliis fetaceis, caule supernè nudiusculo, calycibus subhirsutis. *b. m. 219.*

3. ARENARIA foliis ovatis nervosis sessilibus acutis. *Multicaulis.*
Linn. sifst. nat. 1034.
- Arenaria foliis ovatis ciliatis acutis. *b. m. 219.* *Ciliata.*
9. ARENARIA foliis subulatis subtus hispidis. *Linn.* *Hispidia.*
sp. 425.
- HABITAT à l'Esperou.

D E C A N D R I A

P E N T A G Y N I A.

S E D U M.

Cal. 5-fidus. squamæ nectariferæ 5 ad basim germinis. caps. 5.

Herba. fol. succulenta sessilis.

* *Planifolia.*

1. SEDUM foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto. *b. m. 220. L'orpin.* *Telephium,*

Telephium vulgare. mag. Bot. app. 305. hort. 192.

* PHARM. *Fabæ crassæ seu telephii radix, folia. Vis refrigerans, antiphlogistica, anodina, vulneraria, excoriationi, paronychia, phymosi, haemorrhoidibus adversa. Extus usurpatur, rarissime intus.*

2. SEDUM foliis planis, caule ramoso, floribus paniculatis. *b. m. 221.* *Cepaea,*

Sedis affinis. mag. hort. 183.

ABUNDAT in salicetis juxta amnem à Lamalou:

* * *Teretifolia.*

3. SEDUM foliis ovatis oppositis obtusis carnosis, caule infimo, floribus sparsis. *b. m. 221.* *Dasyphyllum*

*Sedum minus folio circinnato. mag. Bot. 236.
hort. 182.*

4. SEDUM foliis subulatis sparsis basi solutis, inferioribus recurvatis. *Linn. sp. pl. edit. 2^a. 618.* *Reflexum,*

Sedum minus luteum folio acuto. *mag.* *Bot.* 235.
hort. 182.

β. Sedum minus luteum flore se circumflectente.
mag. *Bot.* 235. *hort.* 182.

Album. 5. SEDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis patentibus, cymâ ramosâ. Sedum minus teretifolium album. *mag.* *Bot.* 236. *hort.* 182.

* PHARM. *Vermicularis* seu *crassulæ minoris* herba.
Vis sempervivi.

'Acre. 6. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis. *Le pain d'oiseau, ou vermiculaire brûlante.*

Sedum parvum acre flore luteo. *mag.* *Bot.* 236.
hort. 182.

* PHARM. *Illecebræ minoris* seu *sedi minoris* herba.
Vis vomitoria, antiscorbutica, antihydropica,
antiquartanaria, cautè intus danda. Datur suc-
cus lacti mixtus intus ab unc. 1. ad unc. 11..
foliorum ad man. 1. in lib. 1. cerevisiae ad me-
dictatis consumptionem decoctorum: dosis est
unc. 111, quolibet mane aut alternis diebus te-
pidè haustæ.

Sexangulare. 7. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis. *b. m.* 222.

Sedum luteum minimum non acre. *mag.* *Bot.* 236.
hort. 182.

Villosum. 8. SEDUM caule erecto, foliis planiusculis, pedun-
culisque subpilosis. *Linn. sp. pl.* 432.

Sedum palustre subhirsutum purpureum. *Tour.*
inst. 263.

HABITAT à l'*Espéra* juxta rivulos, observante
D. Arnaud.

O X A L I S.

Cal. 5-phyllo. *petala* unguibus connexa.
caps. 5-gona, angulis dehiscens.

Herba, radicans. *fol.* ternata. *inflor.* axil-
laris subumbellata.

Corniculata. 1. OXALIS caule ramoso diffuso, pedunculis um-
belliferis. *b. m.* 222. *Le pain à coucou.*

Trifolium acetosum corniculatum. mag. Bot. 271.

Oxys lutea. mag. hort. 151.

* PHARM. *Oxalis seu acetosella herba. Vis acetosae hortensis.*

A G R O S T E M M A.

Cal. tubulosus coriaceus. petala unguiculata : limbo obtuso indiviso. caps. 1-locularis.

Herba, articulata. inflor. terminalis pendunculata solitaria.

1. AGROSTEMMA hirsuta, calycibus corollam superantibus, petalis nudis integris. b. m. 222. *Cithago.*
Lychnis segetum major. mag. Bot. 169. hort. 125.
- QBS. Rarissimè apud nos occurrit cum floribus calyces æquantibus.

L Y C H N I S.

Cal. oblongus membranaceus. petala limbo bifido. caps. 3-locularis.

Herba, articulata. inflor. terminalis dichotoma.

1. LYCHNIS floribus fasciculatis fastigiatis. b. m. *Chalcedonica,* 223.
Lychnis hirsuta flore coccineo major. mag. hort. 125.
2. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu subrotundo. *Flos cuculi.*
b. m. 223.
Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici. mag. Bot. 53.
Lychnis pratensis flore laciniato simplici. mag. hort. 125.

C E R A S T I U M.

Cal. 5-phyllo. petala 2-fida. caps. 1-locularis apice dehiscens.

Herba, articulata. *fol.* opposita sessilis.
inflor. terminalis incerta.

* *Capsulis oblongis.*

- Viscosum.* 1. CERASTIUM erectum, villoso-viscosum. *b. m.*
223.

Al sine hirsuta altera viscosa. *mag. Bot. 15. hort. II.*

- Arvense.* 2. CERASTIUM foliis linear-lanceolatis obtusis gla-
bris, corollis calyce majoribus. *b. m. 224.*

- Semidecan-
dium.* 3. CERASTIUM floribus pentandris, petalis emar-
ginatis. *Linn. sp. pl. 438.*

Al sine hirsuta. *mag. Bot. 15.*

Myosotis arvensis hirsuta parvo flore. *Tour. 245.*

HABITAT juxta sepes, circa urbem à la Peissine,
Lavanet, & in arvis repens; stamina alterna
s sterilia.

** *Capsulis subrotundis.*

- Repens.* 4. CERASTIUM foliis lanceolatis, pedunculis ra-
mosis, capsulis subrotundis. *b. m. 224.*

Lychnis incana repens. *mag. hort. 127.*

- Tomentosum.* 5. CERASTIUM foliis oblongis tomentosis, pedun-
culis ramosis, capsulis globosis. *b. m. 224.*

6. Caryophyllus holosteus tomentosus angustifolius.
mag. Bot. 54.

- Latifolium.* 6. CERASTIUM foliis ovatis subtomentosis, ramis
unifloris, capsulis globosis. *b. m. 224.*

S P E R G U L A.

Cal. 5-phyllo. *petala* integra. *caps.* ovata
1-locularis 5-valvis.

Herba, articulata. *fol.* sublinearis inte-
gerrima.

- Nodosa.* 1. SPERGULA foliis oppositis subulatis lăvibus,
caulibus simplicibus. *b. m. 225.*

Al sine spergulae facie minima seminibus nudis.
Tour. inf. 244.

1. *Alsine palustris* foliis tenuissimis, sive *saxifraga palustris alsinifolia*. *Tour. inst.* 244.
2. *SPERGULA* foliis oppositis linearibus laevibus, pedunculis solitariis longissimis. *b. m.* 225. *Saginoïdes,*
3. *SPERGULA* foliis verticillatis, floribus decandris. *Arvensis.*
Linn. sp. pl. 440.
Alsine spergula major. *mag. hort.* 10.
HABITAT à l'Esperou in herbidis.

D E C A N D R I A

D E C A G Y N I A.

P H Y T O L A C C A.

Cal. o. petala calyciformia. *bacc.* supera,
10 locularis, 10-sperma.

Herba. fol. alterna integerrima. *inflo.*
racemosa oppositifolia.

1. *PHYTOLACCA* floribus decandris. *b. m.* 225. *Americana.*
Solanis annumerandum *solanum racemosum* *indicum.* *mag. hort.* 187.
- * *PHARM.* *Phytolacca seu solani racemosi* folia. Extus vis anodina, anticarcinomatosa.
- OBS. Passim circa Narbonam sponte crescentem observavit
D. Solier, Medicinæ studiosus.

D O D E C A N D R I A

M O N O G Y N I A.

P O R T U L A C A.

Cal. 2-fidus. caps. 1-locularis circumscissa.
Herba. fol. sessilis alterna succulenta nitens.

1. *PORTULACA* foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *b. m.* 227. *Le pourpier.* *Oleracea.*

248 *PENTAPETALI*

- Portulaca angustifolia sylvestris. *mag.* *Bot.* 272.
hort. 163.
- β. Portulaca latifolia sativa. *mag.* *hort.* 163. & flore
 flavo. *ibid.*
- * PHARM. *Portulaceæ sativæ & sylvestris* herba, succus, aqua, syrupus. Vis refrigerans, deimulgans, antiscorbutica, anthelmintica, ischæma. *Aqua* ad unc. III, IV.. *succus* dosi eadem.. *syrupus* ad unc. I vel II.

DODECANDRIA
DIGYNIA.

AGRIMONIA.

Cal. 5-fidus altero obvallatus. *sem.* 2, in calyce indurato hispido.

Herba. *fol.* interrupte - pinnata. *inflor.* racemosa terminalis.

Eupatorium. I. AGRIMONIA foliis caulinis pinnatis, fructibus hispidis. *b. m.* 229. *L'aigremoine.*

Eupatorium veterum, seu agrimonia. *mag.* *Bot.* 93. *hort.* 75.

* PHARM. *Agrimonia* radix, herba, aqua. Vis adstringens, roborans, vulneraria, antihaemorragica, antihaematurica, anticalculosa, in obstipationibus viscerum proficua. Datur pulverata ad drach. I. recens ad usque man. I. pro qualibet liquidi libra.. *succus* ad unc. III vel IV.

ICOSANDRIA

MONGYNTA.

MYRTUS.

Cal. 5-fidus superus. *bacc.* 3-locularis 1-sperma.

Frutex. fol. opposita subsecunda punc-tato-pellucida.

- I. MYRTUS floribus solitariis, involucro diphyllo. *Communis.*
h. m. 238. *Le myrte.*

Myrtus communis italicica. mag. hort. 140.

- β. *Myrtus latifolia romana. mag. hort. 140.*

- γ. *Myrtus baccis albis. mag. hort. 140.*

- δ. *Myrtus minor vulgaris. mag. hort. 140.*

* PHARM. *Myrti folia, baccæ, syrupus, oleum infusum. Vis corroborans adstringens, antidiarrhoïca, antileucorrhœïca. Syrupus baccarum seu myrtillorum ab unc. ss. ad unc. i. foliæ, baccæ, extus & intus usurpantur.*

P U N I C A.

Cal. 5-fidus superus coloratus carnosus.
pomum multiloculare polyspermum.

Arbor. ramis oppositis primò foliiferis. *fol.*
sparsa integerrima.

- I. PUNICA. h. m. 238. *Le grenadier.*

Granatum.

Malus punica sylvestris. mag. Bot. 173.

- β. *Malus punica sativa. mag. hort. 130.*

- γ. *Malus punica fructu dulci. mag. hort. 130.*

- δ. *Malus fructu vinoſo media inter acidam & dulcem. mag. hort. 130.*

* PHARM. *Balaustia, malicorium, granatorum se-mina, syrupus florum, corticis. Vis adstringens, anthelmintica, antidiarrhoïca, antileucorrhœïca, seminum, syrapi, refrigerans, subadstringens. Balaustiorum, & malicorii dosis in substantia ad usque drach. i. in decocto ad unc. ss. seminum succus, syrupus ab unc. i, ad unc. ii.*

OBS. Variat calycibus 6, 7 vel 8-fidis, corollisque 6, 7 vel 8-petalis.

A M Y G D A L U S.

Cal. 5-fidus inferus. *drupa* nucleo poris pertuso.

Arbor. ramis sparsis primò floriferis. *inflor.* gemma 1-flora ad latus gemmæ foliiferæ.

Perfice. 1. AMYGDALUS foliorum serraturis omnibus acutis. *b. m.* 239. *Le pécher.*

Perfice molli carne, viridis & alba. *mag. hort.* 156.

β. Perfice succo quasi sanguineo. *mag. hort.* 156.

γ. Perfice molli carne fructu ex rubro & viridi variegato. *mag. hort.* 156.

δ. Perfice carne durâ, albâ aut rubrâ. *mag. hort.* 156.

* PHARM. *Perfice* folia, flores, syrpus, fructus, amygdalæ, oleum expressum. Vis laxans, debstruens, hydragoga, anthelmintica. *Folia* ad man. I. *flores* ad pug. II. III. *syrpus* ad unc. I. *amygdalæ* & oleum succedanea amygdalarum amararum.

Communis. 2. AMYGDALUS foliis petiolatis, serraturis infimis glandulosis. *b. m.* 239. *L'amandier.*

Amygdalus sativa dulcis putamine duro. *mag. hort.* 13.

β. Amygdalus sativa dulcis putamine molli. *mag. hort.* 13.

γ. Amygdalus amara. *mag. hort.* 13.

* PHARM. *Amygdalæ dulces*, oleum expressum. Vis nutrita, relaxans, obtundens, antiphlogistica, antifebrilis, anodina, antitussiculosa.. *oleum expressum* ab unc. I. ad IV.. *amygdalæ* n°. XII pro emulsione.

* γ. *Amygdalæ amarae* oleum expressum. Vis anodina, diuretica, carminativa, anthelmintica. *Oleum anticophosicum*, oleo dulcium sublimile.

P R U N U S.

Cal. 5-fidus inferus. *drupa* nucleo integro, futuris prominulis.

Arbor.

OBS. 1 & 2 (*laurocerasus*. *Tour.*) foliis sempervirentibus perennantibus, racemis axillaribus à cæteris distinguuntur; 3 (*mahaleb*) gemmis primò corymbiferis, dein foliiferis; 4 (*armeniaca* *T.*) gemmis primò floriferis ad latus geminæ foliiferæ; 5 & 6 (*cerasus* & *prunus*) gemmis 2-floriferis sparsis.

1. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervirentibus biglandulosis. *b. m. 239.* *Le laurier cerise.*
Laurocerasus. mag. hort. 113.
2. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervirentibus eglandulosis. *b. m. 239.*
3. PRUNUS floribus corymbosis, foliis ovatis. *b. m. 239. Le malagné.*
Cerasus sylvestris amara. mag. Bot. 58. hort. 50.
4. PRUNUS floribus sessilibus, foliis subcordatis. *Armeniaca.*
b. m. 240. L'abricotier.
Armeniaca fructu majore. mag. hort. 22.
- β. Armeniaca fructu minore. *mag. hort. 22.*
- γ. Armeniaca fructu majore, nucleo dulci. *mag. hort. 22.*
5. PRUNUS pedunculis simplicibus, foliis ovato-lanceolatis. *b. m. 240. Le cerisier.*
Cerasus sativa. mag. Bot. 58. hort. 50.
- β. Cerasus sativa fructu rotundo rubro & acido. *mag. hort. 50.*
- γ. Cerasus flore pleno. *mag. hort. 50.*
- δ. Cerasus fructu aquoso. *mag. hort. 50.*
- ε. Cerasus major ac sylvestris fructu subdulci nigro, colore insiciente. *mag. hort. 50.*
- * PHARM. *Cerasorum rubrorum fructus, gummi. Vis refrigerans, antifebrilis. Cerasorum nigrorum fructus, aqua, spiritus. Vis nervina, anti-spasmodica, subanodina, antiparalytica. Aqua ad unc. III. IV.*
6. PRUNUS pedunculis simplicibus, foliis lanceolato-ovatis. *b. m. 240. Le prunier.*
Prunus fructu magno dulci atrocæruleo. mag. hort. 165.
- §. Prunus fructu rotundo dulci atropurpureo. *mag. hort. 165.*

✓. *Prunus sylvestris major.* mag. hort. 165.

* PHARM. *Pruni fructus.* Vis laxans, refrigerans, humectans, lubricans, eccoprotica.

Spinosa. 7. PRUNUS foliis lanceolatis. h. m. 240. *Le prunellier.*

Prunus sylvestris. mag. Bot. 213. hort. 165.

* PHARM. *Acaciæ nostratis seu acaciæ germanicæ cortex, folia, flores, fructus, syrpus, succus.* Vis fructuum immaturorum & succi inspissati refrigerans, subadstringens, antihæmorrhagica, antidiarrhoïca.. *corticis adstringens.. fructuum maturorum & florum laxans.. succi inspissati dosis ad drach. 1.*

I C O S A N D R I A

D I G Y N I A.

C R A T Æ G U S.

Cal. superus 5-fidus. *bacc.* 2-sperma infera.

Arbor. *inflor.* gemmæ floriferæ primordiales corymbosæ interjectis foliolis.

Aria. 1. CRATÆGUS foliis ovatis inæqualiter serratis subtus tomentosis. h. m. 240. *Le drouiller.*

Mespilus alni effigie lanato folio major. mag. hort. 135.

Terminalis. 2. CRATÆGUS foliis cordatis septemangulis, lobis infimis divaricatis. h. m. 241.

Mespilus apii folio sylvestris non spinosa, sive sorbus terminalis. mag. Bot. 176. hort. 135.

* PHARM. *Sorbi terminalis fructus, rob.* Vis eadem ac sorbi, antidiarrhoïca, antidysenterica. Dosis unc. fl.

Oxyacantha. 3. CRATÆGUS foliis obtusis bis trifidis serratis. h. m. 241. *L'aubepin.*

Mespilus apii folio sylvestris spinosa, sive oxyacantha. mag. Bot. 176. hort. 135.

* PHARM. *Oxyacanthæ*, spine albae acutæ fructus.
Vis subadstringens.

4. CRATÆGUS foliis obtusis bis trifidis subdentalis. h. m. 241. *Lazzerolier.*
Mespilus apii folio laciniato. mag. Bot. 176. hort.
135.

I C O S A N D R I A

T R I G Y N I A.

S O R B U S.

Cal. superus 5-fidus. *bacc.* infera triflisperma.

Arbor. *fol.* impari-pinnata : foliolis basi integerrimis.

1. SORBUS foliis utrinque glabris. h. m. 241. *Le Aucuparia.*
sorbier sauvage.
* PHARM. *Sorbi aucuparie* fructus. Vis subfle-
- quentis.
2. SORBUS foliis subtus tomentosis. h. m. 241. *Le Domestica.*
sorbier.

Sorbus sativa. mag. Bot. 245. hort. 188.

* PHARM. *Sorbi* fructus. Vis adstringens, anti-

diarrhoïca, antidiysenterica.

I C O S A N D R I A

P E N T A G Y N I A.

M E S P I L U S.

Cal. superus 5-fidus. *bacc.* infera 5-sper-

ma.

Arbor. *fol.* simplex alterna integra. *in-*

flor. gemma solitaria 1-flora.

Germanica. 1. MESPILUS inermis, foliis lanceolatis integerimis subtus tomentosis, calycibus acuminatis.
b. m. 242. *Le nefflier.*

Mespilus germanica folio laurino non ferrato. *mag. hort.* 135.

* PHARM. *Mespili vulgaris* baccæ. Vis adstringens.

Amelanchier. 2. MESPILUS inermis, foliis ovalibus serratis, caulinis hirsutis. *b. m. 242.*

Alni effigie lanato folio minor. *mag. Bot.* 12.

Mespilus alni effigie lanato folio minor. *mag. hort.* 135.

P Y R U S.

Cal. superus 5-fidus. *pomum* inferum 5-loculare polyspermum.

Arbor. *fol.* simplex alterna integra. *inflor.* gemma primò florifera.

Communis. 1. PYRUS foliis serratis, floribus corymbosis, pomis basi productis. *b. m. 242. Le poirier.*

Pyrus sylvestris. *mag. Bot.* 215. *hort.* 167.

β. Pyrus sativa. *mag. hort.* 167.

Malus. 2. PYRUS foliis serratis, umbellis sessilibus, pomis basi concavis. *b. m. 243. Le pommier.*

Malus renetica. *mag. hort.* 129.

β. Malus pumila, quæ potius frutex quam arbor. *mag. hort.* 129.

γ. Malus sapido fructu striis rubris picto appiola. *mag. hort.* 129.

δ. Malus pyromela. *mag. hort.* 129.

* PHARM. *Mali fructus.* Vis fructuum recentium, refrigerans, flatulenta. Putridorum ophtalmica.

Cydonia. 3. PYRUS foliis integerimis, floribus solitariis, pomis ovatis. *b. m. 243. Le coignassier.*

Malus cotonea sylvestris. *mag. Bot.* 173.

Malus citonia major. *mag. hort.* 129. & minor. *ibid.*

* PHARM. *Cydoniae fructus*, condita, syrpus, semina. Vis refrigerans, corroborans, adstringens,

antidiarrhoica , antidyssenteria , antemetica ,
ischæma.. *seminum* ophtalmica.

ICOSANDRIA

P O L Y G Y N I A.

R O S A.

Cal. urceolatus 5-fidus , carnosus , collo coarctatus. *sem.* plurima hispida , interiori calycis latere affixa.

Fruticulus. *fol.* alterna impari-pinnata.
fulc. stipulæ geminæ adnatæ.

* *Germinibus subglobosis.*

1. ROSA aculeata , foliis odoratis subtus rubiginosis. *Eglanteria.*
b. m. 245.

Rosa sylvestris foliis odoratis. *mag. Bot. 223.*

Rosa foliis odoratis , sive eglanteria dicta. *mag.*
hort. 174.

2. ROSA germinibus globosis aculeatis , pedunculis hispidis , caule aculeis sparsis , petiolis aculeatis , foliis tomentosis. *b. m. 245.* *Villosa.*

Rosa pomo spinoso , folio hirsuto. *mag. Bot.*
223.

* *Germinibus ovatis.*

3. ROSA inermis , germinibus ovatis , pedunculis petiolisque hispidis. *Monspeliana.*

Rosa spinis carens altera. *Clusii hist. 115.*

Rosa sine spinis colore minore. *Bauh. pin. 482. Tour.*
inst. 638.

Rosa sine spinis colore penè fæcum vini. *Bauh.*
hist. 2. 35.

HABITAT à l'Esperon , & derriere le puy de S. Loup.

Folia pinnata foliolis utrinque 4-7 ellipticis ,
duplicatè & acutè ferratis , petiolatis. *Petiolus*

communis valde teres, debilis, pilis rigidis raris scaber. Pedunculi uniflori folio duplo breviores, pilis rigidis confertis subcapitatis hispidae. Foliola calycis longissima subulato-linearia indivisa.

OBS. Differt manifestè à rosa spinis cavente minima alpina Burjeri; seu à rosa inermi calycis foliolis indivisis. Haller. Stirp. helvæt. pag. 19. n°. 422. quæ est (Cimpinellifolia) germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis obtusis. Linn. Sist. nat. 1062. A.

Sempervirens. 4. ROSA germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule petiolisque aculeatis. Linn. sp. pl. & sist. nat. 1062.

Rosa arvensis candida. Bauh. pin. 482.

Rosa sylvestris folio glabro, flore plenè albo. Bauh. sist. 2. 44. mag. Bot. 225. Tour. 638.

HABITAT in sepibus circa Lacolombiere, le Terrail, & in saxosis circa Lavalette, citra & ultra amnem. Pedunculi 2-5-flori subumbellati.

Carina. 5. ROSA germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. h. m. 246. Le kinorodon.

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato. mag. Bot. 222. hort. 172.

* PHARM. Rosarum rubrarum flores, aqua, conserva, syrpus. Vis corroborans, adstringens, antidiarrhoica, antileucorrhœica, ophtalmica. flores ad man. 1.. conserva ad drach. 1. II.. syrpus ab unc. fl. ad unc. 1.

* Rosarum albarum flores, aqua. Vis analeptica, antileucorrhœica, ophtalmica.

* Rosarum sylvestrium flores, succus, syrpus, aqua pallidarum, cynosbati fructus, conserva. Bedaguar. Vis florum, succi, syrpi, aquæ, eccoprotica. Cynosbati & bedaguaris, adstringens, antidiarrhoica, antileucorrhœica. Succus ad unc. II. III. IV.. syrpus ad unc. 1. II.. cynosbati fructus ad man. 1. in ptisana.. conserva à drach. II ad unc. fl.

6. ROSA germinibus ovatis, pedunculis caule petiolisque aculeatissimis. *b. m. 246.* *Spinosissima.*
Rosa spinosissima pumila flore rubro. mag. Bot. 223. mag. hort. 174.
8. ROSA pumila spinosissima, foliis pimpinellæ glabra, bris, flore albo. *mag. Bot. 223.*
Rosa campestris spinosissima flore albo odoro. mag. hort. 174.
- OBS. Rara hodie in locis à Magnolio designatis circa Gramuntium. Sed copiosè oritur in squalidis, &c sepibus ad lavam à *la Tiffine* & *Lamousson*. Germinat quandoque sub globosa.
7. ROSA germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis. *Linn. sp. pl. edit. 2^a. 704. b. m. Goüan. centifolia.* *Gallica.*
Rosa rubra milesia. mag. Bot. 222. hort. 173.

R U B U S.

Cal. 5-fidus. bacc. composita acinis monospermis coalitis. fruticulus. fol. digitata: foliolis 3-5.

* *Fruticosi.*

1. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *b. m. 246. Le framboisier.*
Rubus idæus spinosus. mag. hort. 175.
8. RUBUS idæus lævis. *mag. hort. 175.*
- * PHARM. *Rubi idæi radix, folia, summitates, baccæ, syrupus. Vis adstringens, vulneraria, gargarismica, antianginosa; baccarum, syrapi, opthalmica, refrigerans, antipolydyspnsica.*
2. RUBUS foliis ternatis nudis, caule aculeato tereti. *Cæsius.*
b. m. 246. Le ronce rampant.
Rubus repens fructu cælio. mag. Bot. 222. hort. 175.
3. RUBUS foliis quinatis, digitatis, ternatisque, *Fruticosus*, caule petiolisque aculeatis. *b. m. 246.*

- Rubus vulgaris, seu fructu nigro. *mag. Bot.* 226.
hort. 175.
- β. Rubus vulgaris sine spinis. *mag. hort.* 175.
- γ. Rubus vulgaris flore albo. *mag. hort.* 175.
- * PHARM. *Rubi* radix, folia, summitates, baccæ, syrupus. Vis superioris, seu rubi idæi.

* *Herbacei.*

- Saxutilis.* 4. RUBUS foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. *b. m.* 247. suffruticosis.
 Rubus faxatilis alpinus. *mag. Bot. app.* 304. *hort.* 175.

F R A G A R I A.

Cal. 10-fidus: laciniis 5 alternis angustioribus. *receptaculum* semen ovatum baccatum deciduum.

Herba. fol. digitato-ternata. fulc. stipulæ membranaceæ.

- Vesca.* 1. FRAGARIA flagellis reptans. *b. m.* 247. *La fraise.*
Fragaria vulgaris. mag. Bot. 99. *hort.* 80.
 β. Eadem fructu albo. *mag. hort.* 80.
 γ. Eadem fructu parvi pruni magnitudine. *mag. hort.* 80.
 * PHARM. *Fragariae* radix, folia, fructus, syrupus, aqua. Vis fructuum refrigerans, nutritiens, antianginosa; radicis diuretica, deobstruens, antiauriginosa. *Radix ad unc.* 1.

- Sterilis.* 2. FRAGARIA caule decumbente repente. *b. m.* 247.
Fragaria sterilis. mag. hort. 80.

P O T E N T I L L A.

Cal. 10-fidus: laciniis 5 alternis angustio-

ribus. *sem.* mutica subrotunda, nuda;
receptaculo parvo exsucco affixa.

Herba. fol. composita, fulcraque incerta.

O B S. Genus medium inter *rosas*, *rubos*, *fragarias*,
& agrimoniam. species enim pinnatæ ut *rosa*, aliæ
ut *rubi*, plures ut *fragaria*, aliæ etiam ut *agrimoniae*.
Fulcræ quoque in arvernis diversa.

* *Pinnatæ.*

1. POTENTILLA foliis pinnatis serratis, caule re- *Anserina*.
pente. *b. m.* 248. *L'argentine.*
Pentaphylloides argenteum alatum, seu potentilla.
mag. hort. 154.
- * PHARM. Anserinæ herba, succus, semina. Vis
adstringens, antileucorrhœica, antihermiofa,
ischæma. *Succus ab unc. iv ad unc. vi.*
2. POTENTILLA foliis pinnatis alternis, foliolis *Rupestris.*
quinis ovatis crenatis, caule erecto. *b. m.* 248.
Pentaphylloides erectum. *mag. hort.* 154.

* *Foliis quinatis.*

3. POTENTILLA foliis digitatis, foliolis lanceolatis *Retz.*
serratis utrinque subpilosis, caule erecto. *b. m.*
248.
Pentaphyllum rectum majus. *mag. hort.* 154.
HABITAT in cacumine montium, *au Capouladou*,
las Cambrettas.
4. POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus in- *Argentea*.
cisis subtus tomentosis, caule erecto. *b. m.* 248.
Quinquefolium rectum foliis profundè dissectis
subtus argenteis. *mag. Bot.* 216.
Pentaphyllum erectum foliis profundè dissectis sub-
tus argenteis, flore luteo. *mag. hort.* 154.
5. POTENTILLA foliis septenis, quinatisque cu- *Hirta*.
neiformibus incisis pilosis, caule adscendente.
b. m. 249.
Quinquefolium montanum rectum luteum. *mag.*
Bot. 216, *hirsutum.*

Pentaphyllum montanum erectum. mag. hort. 154.
Obs. Non solum in locis in horto monspeliensi designatis, sed etiam abunde crescit in luco ultra pagum Peraults, ubi Centuria pumila.

Alba. 6. POTENTILLA foliis digitatis apice conniventis ferratis, caulis filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis. h. m. 249.

Reptans. 7. POTENTILLA foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris. h. m. 249. *La quintefeuille.* Quinquefolium majus repens luteum. mag. Bot. 215.

Pentaphyllum, sive quinquefolium vulgare repens. mag. hort. 155.

* PHARM. *Quinquefolii* radix, herba. Vis vulneraria, adstringens, antidyssenterica. Radix ad unc. 1.

Caulescens. 8. POTENTILLA foliis quinatis apice conniventis ferratis, caulis multifloris erectis, receptaculis hirsutis. Linn. cent. 2^a. pag. 155. aman. Acad. tom. 4 pag. 316. sif. nat. 1064.

8. Quinquefolium album majus alterum. Bauh. pin. 325. prodr. 139.

7. Quinquefolium album majus. Bauh. prodr. 139. pin. 325.

HABITAT à l'Esperou. Facies potentillæ albæ, & cum ipsa facile confunditur.

Verna. 9. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acutè ferratis retusis, caulinis ternatis, caule declinato. Linn. sif. nat. sp. pl. edit. 2^a. 712.

Quinquefolium minus repens luteum. mag. Bot. 215.

8. Pentaphyllum minus molli lanugine pubescens. mag. hort. 155.

Pentaphyllum minus repens lanuginosum luteum. Bauh. pin.

HABITAT ad lœvam in pratorum marginibus, à Selleneuve, & ultra pontem ad dexteram; nec non in pratulis à l'Esperou; secus amnem au Capouladou.

G E U M .

Cal. 10-fidus : laciniis 5 alternis angustioribus. *sem.* plura , aristâ villosâ geniculatâ.

Herba. *fol.* pinnato-lyrata. *fulcr.* stipulæ liberæ.

1. GEUM floribus erectis , fructu globoso , aristis uncinatis nudis , foliis lyratis. *b. m.* 250. *La benoite.*

Caryophyllata vulgaris. *mag.* *Bot.* 52. *hort.* 45.

* PHARM. *Caryophyllatæ* radix , herba. Vis plantæ recentis sudorifera , epicarpica , anticatarhalis , antivariolosa ; *exsiccatæ* adstringens , antidysenterica , antidiarrhoïca , ischæma. *Radix* resens ad unc. i. *exsiccata* ad drach. i. ii. *folia* ad man. i. *succus* ad unc. iii.

2. GEUM floribus mutantibus , fructu oblongo , aristis plumosis. *b. m.* 250. *Rivale.*

Caryophyllata aquatica nutante flore. *mag.* *hort.* 45.

Frequens occurrit à l'Esperou , à la barraque de Michel.

3. GEUM flore erecto solitario , fructu oblongo , aristis plumosis. *b. m.* 250. *Montanum.*

Caryophyllata alpina lutea. *mag.* *Bot.* 52. *hort.* 45. Copiosè crescit circa Mearviel.

S P I R Æ A.

Cal. 5-fidus. *caps.* plures congestæ polyspermæ.

Herba. *fol.* interruptè pinnata. *inflor.* terminalis cymosa.

1. SPIRÆA foliolis uniformibus serratis. *b. m.* 245. *Filipendula.* *La filipendule.*

Filipendula vulgaris. *mag.* *Bot.* 97. *hort.* 78.

6. *Filipendula minor.* mag. Bot. 98. hort. 78.

* PHARM. *Filipendulae radix, herba. Vis vulneraria, adstringens, antileucorrhœica, antidysenterica, antiherniosa. Radix pulverata ad drach. 1.*

Ulmaria. 2. *SPIRÆA* foliolo impari majore lobato, floribus cymosis. b. m. 245. *La Reine des prés.*

Ulmaria. mag. hort. mons 206.

* PHARM. *Ulmariae radix, herba, aqua, extractum. Vis adstringens, antidysenterica, antihenniosa, sudorifera. radix ad unc. 1.. aqua ab unc. iv ad vi.. extractum ad drach. 1.*

POLYANDRIA MONOGYNIA. CISTUS.

Cal. 5-phyllo: foliolis 2 alternis minoribus. *caps.* 1-5-10 locularis.

Trutex, &c *herba. fol. inflor. & fulcr. incerta.*

* *Exstipulatæ fruticosæ.*

Laurifolia. 1. *CISTUS arborescens, foliis ovatis petiolatis trinerviis suprà glabris: petiolis basi connatis.* b. m. 254.

Cistus ledon foliis laurini. mag. Bot. 67. hort. 57.

Ladanifera. 2. *CISTUS arborescens, foliis lanceolatis suprà lèvibus, petiolis basi coalitis vaginantibus.* b. m. 255.

Cistus ladanifera hispanica incana. mag. Bot. 67. hort. 57.

* PHARM. *Ladani gummi. Vis intus corroborans, stomachica, paregorica, anticatarrhalis, adstringens, antidysenterica. Extus resolvens, antiulcerosa. Datur intus ad drach. 1.*

3. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis sessilibus utrinque villosis trinerviis, alis nudis. b. m. 255.
Cistus ladanifera Monspeliensium. mag. Bot. 67. hort. 57.
4. CISTUS arborescens, caule foliisque oblongis tomentosis incanis sessilibus supra aveniis, alis nudis. b. m. 255. Albida.
- Cistus mas quartus monspeliensis folio oblongo albido. mag. Bot. 66. hort. 57.
5. CISTUS arborescens, foliis ovatis petiolatis utrinque hirsutis, alis nudis. b. m. 255. Salvifolia.
- Cistus femina monspeliaca flore albo. mag. Bot. 67. hort. 57.
6. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis repandis hirsutis, alis nudis. b. m. 255. Crispata.
- Cistus mas supinus undulatis & fimbriatis foliis. mag. Bot. 66. hort. 57.

* Exstipulatæ suffruticosæ.

7. CISTUS suffruticosus, procumbens exstipulatus, Fumana. foliis linearibus sparsis, pedunculis unifloris. b. m. 255.
Cistus humilis, sive chamæcistus ericæ folio luteus humilior. mag. Bot. 69. hort. 58.
8. CISTUS suffruticosus adscendens exstipulatus, Lævipes. foliis alternis linearibus glabris, pedunculis ramosis. b. m. 546.
Cistus humilis, sive chamæcistus ericæ folio luteus erectior. mag. Bot. 69. hort. 58.
9. CISTUS suffruticosus exstipulatus procumbens, Canus. foliis oppositis villosis subtus tomentolis. b. m. 256.
Cistus humilis, sive chamæcistus foliis myrti minoris incanis. mag. Bot. 59. hort. 58.
10. CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus, Oelandicus. foliis oppositis oblongis utrinque glabris, petiolis ciliatis, petalis emarginatis. Linn. sist. nat. 1078.
Helianthemum serpyllifolio, flore minore aureo odorato. Tour. R iv

Helianthemum flore parvo luteo. *Banh. hif.* 2. 17.
Cistus humilis, sive *chamæcistus* *serrulifolio* ni-
 gricante & hirsuto, flore aureo odorato. *mag.*
Bot. 68.

HABITAT à *Grabels*, au mont *S. Loup*, au *Capou-*
ladou, à *Montferrier*. *Radix* crassa, *cauliculi* pa-
 mares teretes diffusi, rubentes, pubescentes,
 supernè nudiusculi. *Folia* infernè pilis rari-
 mis testa, ciliata: superiora angustiora. *Pedun-*
culi 4-6-flori, flosculis alternis, pedicellatis,
 subcorymbosis. *Calyces* minimi pilis albidis con-
 fertis hispidi.

*** *Exstipulatæ herbaceæ.*

Tuberaria. 11. *CISTUS exstipulatus* perennis, foliis radicalibus
 ovatis trinerviis tomentosis: caulinis glabris lan-
 ceolatis: summis alternis. *b. m.* 256.

Cistus folio *plantaginis* major. *mag. Bot. app.* 293.
b. rt. 57.

Guttatus. 12. *CISTUS* *herbaceus*, *exstipulatus*, foliis oppositis
 trinerviis, racemis ebraeatis. *b. m.* 256.

Cistus *plantaginis* folio, minor. *mag. Bot.* 69.
b. rt. 57.

**** *Stipulatæ herbaceæ.*

Ledifolius. 13. *CISTUS* *herbaceus* *erectus* *glaber* *stipulatus*,
 floribus solitariis subsessilibus, folio ternato op-
 positum. *b. m.* 256.

Cistus annuus foliis ledi. *mag. Bot.* 70. flore
 luteo. *mag. b. rt.* 58.

***** *Stipulatæ suffruticosæ.*

Nummularia-
rius. 14. *CISTUS* *suffruticosus* *stipulatus*, foliis in-
 ferioribus orbiculatis, superioribus ovatis. *b. m.*
256

Cistus humilis, vel *chamæcistus nummulariae* folio
 luteus. *mag. Bot.* 294. *b. rt.* 58.

Serpullifolius 15. *CISTUS* *suffruticosus* *stipulatus*, foliis oblongis,
 calycibus levibus. *b. m.* 256.

- Cistus humilis, vel chamæcistus repens serpyllifolio
lateus. *mag. Bot. app. 293.*
16. CISTUS suffruticosus stipulatus procumbens, *Thymisclius.*
foliis ovalibus linearibus oppositis congestis. *b.*
m. 257.
- Cistus humilis, sive chamæcistus folio thymi inca-
no. *mag. Bot. 68.*
- Cistus humilis, sive helianthemum folio thymi
incano. *mag. hort. 59.*
17. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis linearibus
subtus bisulcatis incanis, calycibus levibus.
b. m. 257. *Pilosus.*
- Cistus humilis, sive helianthemum folio sampuci,
capitulis valde hirsutis. *mag. Bot. 68. hort. 58.*
18. Cistus humilis, sive helianthemum flore albo,
folio angusto hirsuto. *mag. Bot. 68. hort. 58.*
18. CISTUS suffruticosus procumbens, stipulis lan-
ceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis. *b.*
m. 257. *Helianthe-
mum.*
- Cistus humilis, sive chamæcistus flore luteo vulga-
ris. *mag. Bot. 67. hort. 58.*
- * PHARM. *Helianthemi* herba. Vis adstringens,
vulneraria, antidiarrhoica, symphyto analoga.
19. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis ovatis,
calycibus hispidis. *b. m. 257.* *Hirtus.*
- Cistus humilis foliis minoribus & incanis. *mag.*
Bot. 68. hort. 58.

T I L I A.

Cal. 5-partitus deciduus. *bacc.* sicca glo-
bosa, 2-locularis, 5-locularis, 5-valvis,
basi dehiscens.

Arbor. gemmæ primò foliiferæ. *fulcr.* sti-
pula lanceolata membranacea è cuius
medio pedunculus racemiferus.

1. TILIA floribus nectario destitutis. *b. m. 254.* *Le Europæa.*
tilleul.

Tilia vulgaris platyphyllos. *mag. Bot. 254.*

- Tilia fæmina folio majore. *mag. hort.* 196.
 8. Tilia fæmina folio minore. *mag. hort.* 196.

* PHARM. *Tiliae* flores, aqua, conserva. Vis anodina, cephalica, antiepileptica, antivertiginosa, antihysterica, extus antitenesmodæa. *Flores* ad pug. I, infusi in aquæ bullientis cyathis duobus.. *aqua* ab unc. IV ad unc. VI.. *conservæ* ab unc. II. ad unc. I.

POLYANDRIA

DIGYNIA.

PÆONIA.

Cal. 5-phyllus. *styli* o. *capſ.* polyspermæ.
sém. colorata.

Herba. rad. tuberosa fasciculata. fol. 2-ternata : foliolis obliquè lobatis.

Officinalis. 1. PÆONIA. *b. m.* 258. *La pivoine.*

Pæonia communis vel fæmina. *mag. Bot.* 197.

Pæonia folio nigricante splendido quæ mas. *mag. hort.* 151.

2. *Pæonia* flore rubro pleno majore. *mag. hort.* 152.

2. *Pæonia* flore rubro aut albo pleno minore. *mag. hort.* 152.

* PHARM. *Pæoniae maris* radix, flores, syrups, conserva, aqua. Vis subalstringens, anodyna, emmenagogæ, antispasmodica †, antiepileptica †, antihysterica †, antiparalytica †. *Radix* siccæ in substantia à drach. I. ad drach. II; *recens* ad usque unc. I, in juscuso aut ptisana.. *conservæ* ab unc. II. ad unc. I.. *aqua* ab unc. IV. ad unc. VI.. *syrups* ab unc. II. ad unc. II.

* *Pæonia fæmina* radix, flores, conserva, syrups, aqua. Vis pæoniæ maris, sed debilior.

HABITAT in sylvulis circa montem, *au Puy de St. Loup*, *au Capouladou*.

POLYANDRIA
PENTAGYNIA.

AQUILEGIA.

Cal. o. nectaria 5 infernè cornuta, inter petala. *caps.* 5 distinctæ.

Herba. fol. ternata, 2-ternata. inflor. subcorymbosa.

1. AQUILEGIA nectariis incurvis. *b. m. 260. Vulgaris.*
L'ancolie.
Aquilegia sylvestris. mag. Bot. 25.
Aquilegia flore simplici. mag. hort. 21.
2. AQUILEGIA hortensis multiplex, flore albo; carneo; rubente; mixto. *mag. hort. 21.*
- * PHARM. *Aquilegia radix, herba, flores, semina.* Vis aperiens, emmenagoga, diuretica, sudorifica, antiscorbutica, antiauriginosa, antidystocica, cautè usurpanda. *Radix pulverata ad drach. 1.. semina in substantia ad drach. 1.. in infuso ad drach. 11.*
2. AQUILEGIA caule subnudo subunifloro, foliis *Viscosa,* *ternatis, foliolis subtrilobis petiolatis.*
Aquilegia viscosa. mag. Bot. 24. hort. 21.
Aquilegia hirsuta flore viscoso. Tour. inst. 428.
HABITAT circa Meyrueis, & au Vigan. Altitudo sesquipalmaris. Folia radicalia ternata: foliolis petiolatis, ad basim usque 3-partitis, latiniis trilobis. Folia caulina (raro duo) ternata, foliolis lanceolatis integerrimis: intermedio majore longius petiolato. Variat quandoque medicaulis & uniflora.. tota planta pilis glutinosis vestita.

N I G E L L A.

Cal. o. neclaria, 5, trifida intra corollam. *caps.* 5, connexæ.

Herba. fol. pinnato-multifida : foliolis sublinearibus.

Damascena. 1. NIGELLA foliolis involucro folioso cinctis. *b. m.* 260. *La nieille.*

Nigella arvensis cornuta. *mag. Bot.* 187. *hort.* 143.

* PHARM. *Nigellæ sylvestris* semina, oleum. Vis aperiens, emmenagogæ, diuretica, apophlegmatizans, expectorans, anticatarhalis, anticoryzalis. *Semina* torrefacta & probè exsiccata, ad drach. 1.

Arvensis. 2. NIGELLA pistillis quinis, petalis integris turbinateis. *b. m.* 260.

Nigella arvensis cornuta. *Bauh. pin.* 145.

P O L Y A N D R I A

P O L Y G Y N I A.

R A N U N C U L U S.

Cal. 3-seu 5-phyllus. petala intra ungues ; poro mellifero nudo, in aliis marginie cylindraceo cincto, in pluribus squamulâ clauso.

Herba. fol. incerta. *inflor.* pedunculis solitariis sparsis.

* *Foliis simplicibus.*

Flammula. 1. RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *b. m.* 264.

Ranunculus longifolius palustris minor. *mag. Bot.* 218. *hort.* 169.

8. Ranunculus palustris folio ferrato. *Tour. inf.* 292.
2. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *Linguz.*
b. m. 265.
- Ranunculus longifolius palustris major. *mag. hort.*
169.
3. RANUNCULUS foliis ovatis acuminatis amplexicaulibus, caule subunifloro, radice fasciculata. *Amplexicaulis.*
b. m. 265.
- Ranunculus montanus folio plantaginis. *mag. Bot.*
app. 304.
8. Ranunculus montanus gramineo folio. *mag. Bot.*
218. hort. 169.
4. RANUNCULUS foliis cordatis angulatis petiolatis, calycibus 3-phyllo. *b. m. 265.* *Ficaria.*
- Chelidonia rotundifolia major. *mag. Bot. 62.*
- Ranunculus latifolius. *mag. hort. 169.*
8. Chelidonia rotundifolia minor. *mag. Bot. 62.*
- Ranunculus rotundifolius minor. *mag. hort. 169.*
- * PHARM. *Chelidonii minoris radix, herba. Vis cosmetica, antihæmorrhoidalis.*
- ** *Foliis dissectis & divisis.*
5. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis incisis, caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *b. m. 265.* *Auricomus.*
- HABITAT à l'Esperou. Folia caulina digitato-tripartita, rariū quinquepartita. Laciniæ longissimæ angustissimæ.
6. RANUNCULUS foliis inferioribus palmatis, summis digitatis, fructibus oblongis. *b. m. 265.* *Sceleratus.*
- Ranunculus palustris apii folio levis. *mag. Bot. 217. hort. 168.*
8. Ranunculus rectus foliis pallidioribus. *mag. Bot. 217. hort. 168.*
7. RANUNCULUS foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *b. m. 265.* *Illyricus.*
- Ranunculus lanuginosus angustifolius, grumosâ radice, major. *mag. Bot. 218. hort. 170.*
8. RANUNCULUS foliis omnibus quinatis, foliolis lanceolatis inciso-serratis. *Linn. sp. pl. 551.* *Aconitifolius.*

Ranunculus alpinus flore albo. *Baub. hist.* 3. app. 859.

Ranunculus montanus aconiti folio albus, flore majore. *Baub. pin.* 182. *Tour.* 290.

8. *Ranunculus alpinus* simplici flore. *Baub. hist.* 3. app. 859.

Ranunculus montanus aconiti folio albus, flore minore. *Baub. pin.* 182. *Tour.* 290.

9. *Ranunculus albus* flore denso. *Baub. hist.* 3. app. 869.
Ranunculus montanus folio aconiti, flore albo multiplici. *Baub. pin.* 182. *Tour.* 290.

HABITAT à l'Esperou. Hanc debemus pulchram speciem DD. Arnaud & Clapiers, studiosis Medicinæ, indefessis Botanicis.

Monspeliacus 9. *RANUNCULUS* foliis tripartitis crenatis, caule simplici villoso subnudo unifloro. *b. m.* 266.

Ranunculus saxatilis magno flore. *mag. Bot.* 217.

Parviflorus. 10. *RANUNCULUS* foliis radicalibus & caulinis inferioribus trilobis crenatis, summis trifidis dentatis, caule bifloro erecto.

Ranunculus arvensis parvus folio trifido. *Baub. pin.* 179. *mag. Bot.* 217. *Tour.* 289.

Ranunculus saxatilis minimus hirsutus. *Baub. prodr.* 96.

Ranunculus minimus apulus. *Column. eph.* 314. *icon.* 316. optima.

HABITAT à Gramont & in luco ultra Perauls. *Radix* fibrosa tenuissima. *Caulis* 3-4-uncialis debilis hirsutus rectus. *Folia* omnia vix digitii indicis unguem lata; inferiora petiolo unciali tenuissimo instructa; *caulina* summa profundiùs tripartita, magisque dentata. *Flores* duo terminalis parvi, quorum alter ex axilla folii caulinī summi, & petiolo breviori adnectitur, alter terminalis & longius pedunculatus. *Calyces* villosi petalis duplo minores.

Variat caule unifolio unifloro, foliisque radicalibus subcordatis duplicato crenatis, nec lobatis, & folio caulinō lanceolato linearī integerrimo.

Bulbosus. 11. *RANUNCULUS* calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, folijs compositis. *b. m.* 266.

- Ranunculus bulbosus. *mag. Bot.* 216.
- Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotundâ. *mag. hort.* 167.
12. Ranunculus bulbosus flore pleno. *mag. hort.* 168.
12. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis fulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis. *b. m.* 266. *Repens.*
- Ranunculus pratensis repens hirsutus. *mag. Bot.* 216. *hort.*
13. Ranunculus pratensis repens hirsutus, maculatus & non maculatus. *mag. hort.* 168.
12. Ranunculus saxatilis foliis subrotundis. *mag. Bot.* 217. *Bauh. prodr.* 96.
13. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito - multiſidis, summis linearibus. *b. m.* 266. *Acris.*
- Ranunculus pratensis erectus acris. *mag. Bot.* 216. *hort.* 167. & maculatus. *Tour.* 289.
14. RANUNCULUS foliis tripartitis acutè sinuatis tomentosis. *b. m.* 266. *Lanuginosus.*
- Ranunculus magnus valde hirsutus. *mag. Bot.* 216. *hort.* 168.
13. Ranunculus villosissimus monspeliacus. *Bauh. prod.* 96. *mag. Bot.* 169.
15. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis fulcatis, caule erecto, foliis compositis. *b. m.* 266. *Chærophyllos*
- Ranunculus chærophyllos asphodeli radice. *mag.* *Bot.* 218 *hort.* 170.
- OBS. Variat folio uno radicali lanceolato integerrimo, aut subcordato; caule nudo, aut unifolio, folio linearis.
16. RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. *b. m.* 267. *Arvensis.*
- Ranunculus arvensis echinatus. *mag. Bot.* 217. *hort.* 168.
17. RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis simplicibus palmatis incisis. *b. m.* 267. *Muricatus.*
- Ranunculus palustris echinatus. *mag. Bot.* 217. *hort.* 168.
18. RANUNCULUS foliis filiformi ramosis, calycibus appendiculatis. *b. m.* 267. *Felaceus.*

- Ranunculus coronopifolius capite alopecuti, ceratophyllos seminibus falcatis in spicam adacatis. mag. Bot. 213. hort. 178.
- Aquatalis.* 19. RANUNCULUS foliis submersis capillaceis, emersis peltatis. b. m. 267.
Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo. mag. Bot. 219. hort. 178.
3. Millefolium aquaticum foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo. mag. Bot. 177.
Ranunculus aquaticus albus fluitans peucedani foliis. mag. hort. 178.
2. Millefolium marattiiphylon fluitans ranunculo, sive polyanthemo aquatili albo affine. mag. Bot. 178.
Ranunculus aquaticus omnino tenuifolius. mag. hort. 169.

HELEBORUS.

Cal. o. cor. persistens. nectaria tubulata inter petala. *caps.* polyspermæ erectiæ sculæ.

Herba. fol. pedata petiolata.

- Viridis.* 1. HELLEBORUS caule folioso multifloro. b. m. 547.
L'hellebore verd.

Helleborus niger hortensis flore viridi. mag. hort. 96.

HABITAT à l'Esperou. Folia alia pedata, alia digitata.

- Fætidus.* 2. HELLEBORUS caule folioso multifloro, foliis pedatis. b. m. 547. *L'hellebore puant.*

Helleborus niger fætidus. mag. Bot. 126. hort. 96.

CALTHA.

Cal. o. nectaria. o. *caps.* polyspermæ.

Herba. fol. radicalis petiolata, caulina amplexicaulis.

- Populago.* 1. CALTHA. b. m. 547. *Le souci d'eau.*

Caltha palustris flore simplici. mag. hort. 38.

MONADELPHIA

MONADELPHIA

PENTANDRIA.

GERANIUM.

Cal. styl. caps. caul. fulc. Vide infrà Monadelph. decandriam.

1. GERANIUM pedunculis axillaribus multifloris, foliis oppositis pinnatis incisis obtusis, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris. *h. m. 341.* *Cicutarium,*
Geranium cicutæ folio minus & supinum. *mag.*
Bot. 109. hort. 85.
2. Geranium cicutæ folio inodorum album. *Tvur.*
269. mag. hort. 85.
3. Geranium petræum cicutæ folio, radice crassâ, fetidum. *mag. Bot. 109. icon. 108. hort. 86.....*
folia sèpius duplicato & interruptè pinnata.
4. GERANIUM pedunculis axillaribus multifloris, foliis cordatis oppositis sublobatis, calycibus pentaphyllis. *h. m. 341.* *Melacoides,*
Geranium folio althææ. *mag. Bot. 108. hort. 85.*
5. GERANIUM pedunculis axillaribus multifloris, foliis oppositis pinnatis acutis sinuatis, calycibus pentaphyllis. *h. m. 341. Le bec de grue.* *Crinum,*
Geranium maximum acu longissimâ. *mag. Bot. 108.*
Geranium latifolium acu longissimâ. *mag. hort. 85.*
6. Geranium maximum angustifolium acu longissimâ. *mag. hort. 85.*

MONADELPHIA

DECANDRIA.

GERANIUM.

Cal. 5 - phyllus. styl. 1. stygm. 5. caps.
5 - cocca rostrata contorta.

Herba. fol. incerta. fulc. stipulæ solitæ
oppositæ. bracteæ involucriformes.

- Nodosum.* 4. GERANIUM pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis, caulinis trilobis integris ferratis, summis subsessilibus. *b. m. 342.*
Geranium nodosum. mag. hort. 86.
- Pratense.* 5. GERANIUM pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis peltatis multipartitis rugosis laciniatis acutis, petalis integris. *b. m. 342.*
Geranium batrachioïdes, gratia Dei Germanorum. mag. hort. 87.
- Robertianum.* 6. GERANIUM pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis, calycibus pilosis decem-angulatis. *b. m. 342. L'herbe à robert.*
Geranium robertianum murale. mag. Bot. 108.
Geranium robertianum murale caulibus rubentibus. mag. hort. 87.
- β. Geranium robertianum murale, caulibus viridibus.
mag. hort. 87.
- * PHARM. *Geranii robertiani* herba. Vis adstringens, vulneraria, ischæma, antidiarrhoïca, resolvens ? subanodina ? ulceri vulvæ, mammæ adversa.
- Molle.* 7. GERANIUM pedunculis axillaribus; superioribus oppositifoliis, foliis inferioribus oppositis, summis alternis, caule ramoso diffuso, calycibus muticis. *b. m. 342.*
Geranium columbinum minus, majori flore, & foliis florum bifidis. mag. Bot. 107. hort. 86. & majus flore minore cæruleo. ibid.
- Lucidum.* 8. GERANIUM pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis quinquelobis rotundatis, calycibus pyramidatis angulatis. *b. m. 342.*
Geranium lucidum saxatile. mag. Bot. 108. hort. 86.
- Columbinum.* 9. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis oppositis quinque-partito-multifidis angulatis, laciniis acutis, capsulis glabris, calycibus aristatis. *b. m. 343.*
Geranium columbinum tenuius laciniatum. Bauh. prodr. 138. Tour. inst. 268. mag. Bot. 107. hort. 86.
- Differentium.* 10. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinque-partito-multifidis, petalis emarginatis, capsulis hirsutis, calycibus aristatis. *b. m. 343.*

Geranium columbinum majus foliis tenuiter dif-
fectis, foliis florum bifidis. *mag. Bot.* 107. *hort.*
86... petala longitudine calycis.

11. GERANIUM pedunculis axillaribus bifloris, foliis
oppositis reniformibus, petalis integris, longitu-
dine calycis, caule prostrato. *b. m.* 343. *Rotundifo-*
lium.

Geranium folio malvæ rotundo. *mag. Bot.* 106.
hort. 86.

- * PHARM. *Geranii columbini* herba. Vis subse-
quentis.

12. GERANIUM pedunculis axillaribus unifloris, *Sanguineum.*
foliis oppositis quinquepartitis trifidis orbicula-
tis. *b. m.* 343.

Geranium sanguineum, sive hæmatodes radice
crassâ. *mag. Bot.* 107. *hort.* 86.

- * PHARM. *Sanguinarie* herba. Vis adstringens,
vulneraria, antidiarrhoïca, ischæma †.

13. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis subpel-
tatis quinquelobis inciso-serratis, caule erecto,
petalis emarginatis. *Linn. sp. pl. edit.* 2^e. 954. *Sylvaticum.*

Geranium batrachioïdes folio aconiti. *Tour.* 266.

HABITAT in sylvis à l'Esperou, Meyrueis.

POLYADELPHIA

I C O S A N D R I A.

C I T R U S.

Cal. 5-dentatus. *stam.* 20 in cylindrum
passim connata. *pist.* 1. *bacc.* 9-locu-
laris, pulpâ vesiculari.

Arbor, sempervirens. *fol. inflor.* & *fruct.*
punctato-glandulosæ.

1. CITRUS petiolis linearibus nudis. *b. m.* 401. *Le* *Medica*,
limonier citronier.

Malus citria fructu magno. *mag. hort.* 129. &
mediocri. *ibid.*

- β. *Malus limonia acida.* mag. hort. 129. & minor.
ibid.
- γ. *Malus limonia dulcis.* mag. hort. 130.
- * PHARM. *Citri, limoniorum fructus, flavedo pulpa, succus, syrupus, succi & flavedinis oleum essentiale.* Vis *flavedinis* cardiaca, stomachica, *pulpæ* refrigerans, diuretica, antiscorbutica †, antiemetica, antiraucedinosa.

Aurantium. 2. *CITRUS petiolis alatis.* h. m. 401. *L'oranger, le chinois.*

Malus aurantia major. mag. hort. 130. & sylvestris.
ibid.

β. *Malus aurantia humilis.* mag. hort. 130. *Le chinois.*

* PHARM. *Mali aurantiæ folia, aurantiorum cortex, pulpa, syrupus, naphæ seu flores, aqua.* Vis *foliorum* antiepileptica † antispasmodica; *pulpæ* citro analoga; *corticis* roborans, analeptica, anthelmintica; *corticis aurantiorum acidorum immaturi* antimenorrihagica †; aquæ *naphæ*, analeptica, antihysterica, stomachica.

H Y P E R I C U M.

Cal. 5-partitus. filam. plura in 5 phalanges. caps. totidem ac styli.

Herba, & frutex. fol. opposita sessilis. inflor. corymbosa.

* *Trigyna.*

Androsænum.

1. *HYPERICUM floribus trigynis, fructu baccato, caule fruticoso ancipiti.* h. m. 402. *La toute-saine.*

Hyandrosænum maximum frutescens. mag. Bot. 19.

Hypericum androsænum dictum. mag. hort. 101.

Quadrangulum.

2. *HYPERICUM floribus trigynis, caule herbaceo quadrato.* h. m. 403.

Aescyon. mag. Bot. 30.

Perforatum.

3. *HYPERICUM floribus trigynis, caule ancipiti,*

foliis obtusis pellucido - punctatis. *Le millepertuis.* b. m. 402.

Hypericum vulgare. mag. Bot. 135. hort. 101.

* PHARM. *Hyperici* herba , succus , summitates floridæ , oleum , semina. Vis vulneraria † , resolvens , antihaematurica , antihaemoptoïca , anthelmintica † : summitates floridæ in infuso aut decocto ad man. 1.. succus ab unc. fl. ad unc. 1.. folia , semina in substantia ad drach. 1.

4. *HYPERICUM* floribus trigynis: calycibus serrato- glandulosis , caule erecto , foliis ovalibus. b. m. 402. *Hirsutum.*

Androsænum glabrum non ramosum. mag. Bot. 20.

Hypericum elegantissimum folio lato non ramosum. mag. hort. 101.

5. *HYPERICUM* floribus trigynis , calycibus serrato- glandulosis , foliis subovatis tomentosis. b. m. 402. *Tomentosum.*

Hypericum supinum tomentosum minus & mons- peliacum. mag. Bot. 135. hort. 101.

6. *HYPERICUM* floribus trigynis , calycibus serrato- glandulosis , foliis cordatis glabris. b. m. 403. *Pulchrum.*

Hypericum minus erectum. mag. hort. 101.

7. *HYPERICUM* floribus trigynis , caulis ancipi- tibus prostratis. *Linn. sp. pl. 785.* *Humifusum.*

Hypericum minus supinum , seu supinum glabrum.

Tour. inf. 255.

HABITAT in herbidis à l'Esperou.

SYNGENESIA.

M O N O G A M I A.

JASIONE:

Cal. communis 10-phyllo. caps. 2-lo- cularis.

Herba. fol. alterna integerrima. *inflor.* longè pedunculata capitata.

Montana. 1. JASIONE. *b. m.* 466.

Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. mag. Bot.
220. hort. 172.

GYNANDRIA

PENTANDRIA.

PASSIFLORA.

Cal. 5 - phyllus. styl. 3. nectar. coronâ triplici. bacc. pedicellata, succo suauissimo turgida.

Fruticulus, farmentosus sempervirens.
fol. alterna palmata. inflor. axillaris.
fulcr. cirrus spiralis lateriflorus.

OBS. Antheræ incumbentes horizontaliter rotatiles.

Cerulea. 1. PASSIFLORA foliis palmatis integrimis. *b. m.* 476. *La grenadille.*

MONÆCIA

MONADELPHIA.

CROTON.

Mes. cal. cylindricus 5 - dentatus. stam.
10-16.

Herba. fol. alterna pulverulenta.

Tinctorium. 1. CROTON foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo. *b. m.* 495. *Le tournefèt.*

Ricinis aliquomodo similis. mag. hort. 175.

Heliotropium tricoccum. mag. Bot. 126.

* PHARM. *Lacmus succus. Vis acidum indicans, antigangrenosa.*

D I C E C I A
D E C A N D R I A.

L Y C H N I S.

Mas. *cal. petal. caul.* Vide hujusce classeos ordinem 12^{um}; rudimentum pistilli.

Fem. *cal. petal. caul. maris. styli 5.*

3. LYCHNIS floribus dioicis. *b. m. 223.*

Lychnis sylvestris alba simplex. mag. Bot. 168. Dioica. hort. 125.

C U C U B A L U S.

Mas. *cal. fol.* Vide hujusce classeos ordinem 11^{um}.
petala setacea integra. *inflor.* verticillato-paniculata coarctata...

Fem. *cal. fol. inflor. maris. styli 3. caps. 3-locularis.*

4. CUCUBALUS floribus dioicis verticillatis, petalis setaceis indivisis. *b. m. 215.* *Otiles.*
Lychnis viscosa flore musculo. mag. Bot. 168. hort. 127.

P O L Y G A M I A
M O N C E C I A.

A C E R.

Hermaph. *cal. 5-fidus. stam. 8. pist. 1. caps. 2-cocca alata. mas. cal. stam. hermaphrodit.*

*Arbor. fol. opposita lobata petiolata.
inflor. flosculi masculi & hermaphro-
diti in eodem corymbo; aut racemo-*

*Pseudo-pla-
tanus.* 1. ACER foliis 5-lobis inæqualiter serratis, floribus
racemosis. *b. m. 518. Le grand érable, ou faux
platane.*


Acer majus. mag. Bot. 3.

Acer majus multis vulgò falsò platanus. mag. hort. 3.

Platanoides. 2. ACER foliis 5-lobis acuminatis acutè dentatis
glabris, floribus corymbosis. *hort. m. 518.*
HABITAT in hortis circa urbem. Tenuissimis &
acutissimis foliis. *mag. hort. 3.*

Campestre. 3. ACER foliis lobatis obtusis emarginatis. *b. m. 518.*
Acer campestre minus. mag. Bot. 3. hort. 3.

*Monspessu-
lense.* 4. ACER foliis trilobis integerrimis. *b. m. 518.*
Acer monspessulanum. mag. Bot. 3. hort. 3.



Classis IX^a.

PENTAPETALI
IRREGULARES.

*PENTANDRIA**DIGYNIA.*

* UMBELLATI, *involucro gemino.*

AMMI.

HERACLEUM.

ECHINOPHORA.

TORDYLIUM.

CAUCALIS,

DAUCUS.

CONIUM.

ATHAMANTA.

ŒNANTHE.

** UMBELLATI, *involucro partiali tantum.*

PHELLANDRIUM.

CORIANDRUM.

SCANDIX.

CHÆROPHYLLUM.

SESELI.

*DECANDRIA**MONOGYNIA.*

CERCIS.

ANAGYRIS.

DICTAMNUS.

*POLYANDRIA**TRIGYNIA.*

DELPHINIUM.

ACONITUM.

*SYNGENESIA**MONOGAMIA.*

VIOLA.

*GYNANDRIA**DIANDRIA.*


ORCHIS.

SATYRIUM.

OPHRYS.

SERAPIAS.

CYPRIPEDIUM.



PENTAPETALI IRREGULARES.

PENTANDRIA DIGYNIA.

* Umbellati, *involucro gemino.*

A M M I.

Involucra pinnatifida, margine membranaceâ. *fructus* lævis subrotundus.

Herba. fol. inferior 2-pinnata: foliolis latiusculis; superior linearis-multifida.

- i. AMMI foliolis inferioribus lanceolatis serratis, *Majus*,
superioribus linearibus multifidis. *h. m.* 137.
Amini majus. *mag. Bot. 7. hort.* 13.

H E R A C L E U M.

Involucra decidua. *fructus* ellipticus emarginatus compressus in medio striatus, marginatus.

Herba. fol. pinnata: foliolis latiusculis pinnatifidis.

- i. HERACLEUM foliolis pinnatifidis. *h. m.* 141. *La Sphondylium verce.*
Sphondylium vulgare hirsutum. mag. hort. 188.

E C H I N O P H O R A.

Involucr. 1-phylum. *flosc.* plures arbotivi. *fructus* oblongi pedunculis immersi.

Herba, rigidissima. *fol.* pinnata: foliolis carnosis, subulatis pungentibus unisulcatis.

Maritima. 1. ECHINOPHORA foliis subulato-spinosis integerimis. *b. m.* 133.

Chritnum maritimum spinosum. *mag. Bot.* 80. *hort.* 64.

TORDYLIUM.

Involucr. simplicia-longa. *flosc.* omnes fertiles. *fructus* suborbiculatus margine crenatus.

Herba. *fol.* pinnata: foliolis oppositis sessilibus incisis scabris.

Officinale. 1. TORDYLIUM involucris partialibus longitudine petalorum, foliolis ovatis laciniatis. *b. m.* 134.

Sefeli creticum minus. *mag. Bot.* 239.

Tordylium narbonense minus. *mag. Bot.* 167.

* PHARM. Sefeli cretici radix, semina. Vis radicis incisiva, antialsthmatica, seminum emmenagogza, diuretica.

Maximum. 2. TORDYLIUM umbellâ confertâ radiatâ, foliolis lanceolatis inciso-serratis. *b. m.* 134.

Sefeli creticum majus. *mag. Bot.* 167.

Anthriscus. 3. TORDYLIUM umbellâ confertâ, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis, laciniis obtusiusculis.

134.

Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus. *mag. Bot.* 56. *hort.* 49.

Latifolium. 4. TORDYLIUM umbellâ confertâ nudiusculâ, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis inciso-serratis. *b. m.* 134.

Caucalis arvensis echinata latifolia. *mag. Bot.* 55. *hort.* 48.

OBS. Involucra & involucella sæpius pentaphylla.

Nodosum. 5. TORDYLIUM umbellis simplicibus sessilibus, seminibus exterioribus hispidis. *b. m.* 134.

Caucalis nodoso echinato semine. mag. Bot. 56.

hort. 49.

CAUCALIS.

Involucr. integra. cor. disci masculæ.

fructus setis hispidus.

Herba. fol. 2-pinnata : foliolis incisis.

1. CAUCALIS umbellis alternis, oppositifoliis, umbellâ bifidâ, umbellulis subdispermis, involucro universali diphyllo, partialibus 5-phyllis.. caucalis maritima, umbellâ bifidâ, umbellulis dispermis, involucris semine brevioribus linearibus. h. m. 135. Gerard. gallop. pag. 237. icon. 236.

Caucalis pumila maritima. mag. Bot. 56. hort. 49.

2. CAUCALIS involucris singulis pentaphyllis, petalo unico duplo majore. h. m. 135.

Caucalis arvensis echinato magno flore. mag. Bot. 56. hort. 48.

3. CAUCALIS involucro universali nullo, umbellâ universali trifidâ, involucellis triphyllis. h. m. 135.

Caucalis involucro universali lanceolato longitudine umbellæ. h. m. 135.

Caucalis dauci sylvestris folio echinato, magno fructu. mag. Bot. app. 293. hort. 48.

Echinophora tertia leptophyllum purpurea. col. ecph. 96. tab. 97.

4. CAUCALIS involucri universalis, foliolis multifidis, umbellâ universali trifidâ, umbellulis trispermis. h. m. 135.

Caucalis monspeliaca echinato magno fructu. mag. Bot. 56. hort. 48.

Echinophora altera asperior platycarpos. col. ecph. 1. 95. tab. 94.

5. CAUCALIS involucro universali nullo, involucellis pentaphyllis, umbellâ bifidâ, seminibus hispidis.

Caucalis seminum aculeis triglochidibus uncinatis, pilis verticillatis hispidis. h. m. 136.

Pumila.

Grandiflora.

Daucoïdes.

Platycarpos.

Leptophylla.

Caucalis arvensis echinata, parvo flore & fructu.
mag. Bot. 56. hort. 49.

D A U C U S.

Involucr. pinnata. *fruct.* pilis hispidus.

Herba scabra punctis prominulis. *fol.* 2-
pinnata : foliolis multifidis.

Carota. 1. DAUCUS seminibus hispidis. *b. m.* 136. *La carote.*
Pastinaca tenuifolia sylvestris *Dioscoridis.* mag. Bot.

199.

Daucus officinarum. mag. hort. 68.

β. Daucus sativus radice rubrâ. mag. hort. 68.

γ. Daucus sativus racide luteâ. mag. hort. 68.

* PHARM. *Dauci sylvestris*, & *sativi*, semina.

Vis diuretica, carminativa, emmenagoga, antihysteralgica, antihysterica.. *semina* ad drach.
ii, in infuso.

Pisnaga. 2. DAUCUS seminibus nudis. *b. m.* 136.

Gingidium umbellâ oblongâ. mag. Bot. 109. hort.
88.

OBS. Caulis quandoque scaber, sæpe lævis, ut in sequenti.

Gingidium. 3. DAUCUS involucri radiis planis, laciniis recur-

vis. *b. m.* 136.

Pastinaca tenuifolia marina foliis obscurè virenti-
bus. mag. Bot. 199.

Daucus maritimus lucidus. mag. hort. 68.

C O N I U M.

Involucra omnia polyphylla brevissima.
fructus 5-striatus subglobosus, utrin-
que crenatus.

Herba. *fol.* bipinnata : foliolis pinnati-
fidis.

Maculatum. 1. CONIUM seminibus striatis. *b. m.* 137. *La grande*
cigue.

Cicuta major. mag. hort. 56.

* PHARM. *Cicutæ radix*, herba, extractum. Vis resolvens! antischirrosa, antiscrophulosa, anticancrosoa, antiulcerosa, anticatarractalis, antigangrænosa, antipodagræca, antirheumatismalis Stoerk. extracti cicutæ dantur gran. II. manè & ferò, sensim ascendendo.

A T H A M A N T A.

Involucr. polyphylla linearia. fructus ova-
to-oblongus striatus.

Herba. fol. 2-pinnata: foliolis incertis.

1. ATHAMANTA foliis bipinnatis planis, umbellâ Libanotis.
hemisphæricâ, seminibus hirsutis. h. m. 138.
Daucus montanus apii folio. Bauh. pin. 151. prodr.
77.
HABITAT in pratis à l'Esperou, à Banahu... semina
sæpe glabra.
2. ATHAMANTA foliolis linearibus planis hirsutis, Cretensis.
petalis bipartitis, seminibus oblongis hispidis. h.
m. 138. *Le daucus de Candie.*
Ligusticum alpinum multifido longoque folio. Tour.
inst. 323.
- * PHARM. *Dauci cretici semina.* Vis dauci syl-
vestris.
3. ATHAMANTA foliolis capillaribus, seminibus Meum.
striatis glabris. h. m. 138.
Meum foliis anethi. mag. hort. 135.
* PHARM. *Meu radix.* Vis emmenagoga, diure-
tica, carminativa, antiasthmatica, antitertia-
aria.
4. ATHAMANTA foliis pinnatis inciso-angulatis. Cervaria.
Linn. sist. nat. 956.
Selinum foliis radicalibus ovatis inæqualiter ser-
ratis. Linn. b. Cliff. 92. hort. upf. 59.
Selinum pinnis pinnatis, pinnulis appendiculatis
triangulis. Hall. enum. helv. 38.
Daucus montanus apii folio major. mag. Bot. 84.
Oreoselinum apii folio majus. mag. hort. 149. Tour.
318.

HABITAT à l'Esperou, Fougeres, Lamalou, au Capouladou.

ŒNANTHE.

Involucr. simplicia. flosc. sessiles, in disco steriles. fructus calyce coronatus subovatus.

Herba. fol. radicalis 2-pinnata : caulina pinnata foliolis linearibus.

Fistulosa. 1. *ŒNANTHE stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. b. m. 144.*

Œnanthe aquatica. mag. Bot. 189. hort. 146.

2. *Œnanthe maritima crassiori & nigriori folio. mag. hort. 146.*

Pimpinel-loides. 2. *ŒNANTHE foliolis radicalibus ovatis incisis, caulinis integris, linearibus longissimis simplibusque. b. m. 144.*

Œnanthe, sive Filipendula monspessulana. mag. Bot. 188.

Œnanthe apii folio. mag. hort. 146.

3. *Œnanthe pastinacæ sylvestris folio semine atriplacis. mag. Bot. 189.*

HABITAT juxta Lattes ; & in pratis à Gramont.

** Umbellati *involucro partiali tantum.*

P H E L L A N D R I U M.

Fructus ovatus lævis coronatus & calyce & pistillo.

Herba. fol. inferior decomposita : summa 2-pinnata.

Aquaticum. 1. *PHELLANDRIUM foliorum ramificationibus di-varicatis. b. m. 145. La ciguë d'eau.*

Cicutaria palustris tenuifolia. mag. Bot. 293. hort. 56.

* PHARM. *Cicutaria palustris herba, extractum, semina,*

semina. Vis aliis adversùs schirros, cancros, gangrènam utilis credita, aliis dubia.

HABITAT copiosè in aquis aut ad margines rivulorum, à Lunel, au Caila.

C O R I A N D R U M.

Involucella dimidiata linearia. *flosc.* radii abortientes. *fructus* didymus subglobosus.

Herba. fol. decomposita: foliolis capillaceis.

1. CORIANDRUM fructibus didymis. *Linn. sist.* *Testiculatum.*
nat. 961.

Coriandrum minus testiculatum. *mag. Bot.* 78.
hort. 62.

HABITAT in satis, sous le Peiron, & à Selleneuve; involucrum universale sœpe monophyllum.

S C A N D I X.

Involucell. 5 - phylla apice incisa. *fructus* subulatus, petala integra. *flosculi* in disco saepius masculi.

Herba. fol. sub 3-pinnata.

1. SCANDIX seminibus lèvibus rostro longioribus. *Petten Venneris.*
h. m. 256.

Scandix semine rostrato vulgaris. *mag. Bot.* 232.
hort. 180.

2. SCANDIX seminibus rostratis patulis pedunculo longioribus. *Australis.*
h. m. 256.

Scandix cretica minor. *mag. Bot.* 232. *hort.* 180.

3. SCANDIX seminibus nitidis ovato-subulatis. *h. m.* *Cerefolium.*
146. *Le cerfeuil.*

Chærophillum sativum. *mag. hort.* 51.

* PHARM. *Cerefolii* herba, succus, aqua, semina. Vis incidens, aperiens, diuretica, antihydroERICA †, emmenagogæ, antiphlogistica, lactifera.

ra, antivertiginosa.. *succus* ad unc. iv pluries
in die.. *herbæ decoctum* ad unc. v. vi.

CHÆROPHYLLUM.

Involucr. reflexa concava. *petala* cordata.
fructus oblongus lævis.

Herba. fol. 2-pinnata : foliolis incisis latiusculis.

* *Flosculis omnibus hermaphroditis.*

Sylvestre. 1. CHÆROPHYLLUM flosculis omnibus hermaphroditis, caule æquali. *h. m.* 147. petiolis acipiti-triangularibus.

Myrrhis sylvestris seminibus lævibus. *mag. Bot.* 181.

Chærophillum sylvestre perenne cicutæ folio. *mag. hort.* 51.

** *Flosculis disci masculis.*

Temulum. 2. CHÆROPHYLLUM caule scabro, geniculis tumidis. *h. m.* 147.

Myrrhis annua semine striato lævi. *mag. hort.* 140.

Hirsutum. 3. CHÆROPHYLLUM caule æquali, foliolis incisis acutis. *h. m.* 147.

Myrrhis palustris latifolia alba. *mag. hort.* 140.

SESELI.

Involucell. polyphylla. *fructus* ovatus striatus.

Herba, rigida. *inflor.* globosa. *fol.* sub 3-pinnata, linearis.

Glaucum. 1. SESELI petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliolis singularibus binatisque. *h. m.* 147. Daucus glauco folio similis fæniculo tortuoso. *mag. Bot.* 85.

Seseli glauco folio. *mag. hort.* 184.

2. SESELI caule alto rigido, foliolis linearibus fasci- *Tortuosum.*
culatis. *b. m.* 147.
Seseli massiliense fæniculi folio crassiore. *mag. Bot.*
239. hort. 184.
3. SESELI petiolis rameis membranaceis ventricosis *Annum.*
emarginatis. *b. m.* 148.
4. SESELI foliis bipinnatis linearibus : petiolis basi
membranaceis, seminibus ovalibus. *Linn. sif.*
nat. 962.
Carvifolia. *Bauh. hist.* 3. p. 171.
HABITAT *au Capouladou, à Lamalou.*
5. SESELI petiolis ramiferis membranaceis oblongis *Pumilum.*
integris, foliolis binis ternatisque linearibus sub-
carnosis petioli longitudine. *Linn. sif. nat.* 962.
Daucus montanus multifido folio felini semine,
mag. Bot. 85.
Fæniculum minimum patulum. *Tour. inst.* 311.
HABITAT in saxosis *à Montferrier, à S. Loup,*
au Capouladou.
6. SESELI caule elongato, geniculis callosis, foliis *Elatum.*
duplicato-pinnatis, pinnulis lanceolato-lineari-
bus distantibus. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 375.
Daucus montanus folio fæniculi longiore. *mag.*
Bot. app. 294.
Seseli tenuiori folio majus. *mag. hort.* 184.
Fæniculum sylvestre elatius fæniculi folio longiore.
Tour. 311.
Apium montanum folio tenuiori. *Bauh. pin.* 153.
Seseli longifolium. *Linn. flor. monsp.*
HABITAT *au mont S. Loup, au Capouladou, & in*
descensu à las Cambrétas.

*DECANDRIA**M O N O G Y N I A.**C E R C I S.*

Cal. 5-dentatus infernè gibbus. *cor.* pa-
pilionacea: *alæ* vexillo longiores vexil-
T ij

liformes. *glandula* styliformis sub germine. *legum.* oblongum planum.

Arbor. *fol.* integerrima. *inflor.* gemmæ *racemiferæ* alternæ inferiores; gemmæ *foliiferæ* alternæ terminales.

Siliquastrum. 1. CERCIS foliis cordato-orbiculatis glabris. *b. m.* 203. *Le guainier.*

Siliqua sylvestris rotundifolia. *mag. hort.* 185. *Bot.* 241.

A N A G Y R I S.

Cor. papilionacea; *vexillum* rectum; *carina* alis & *vexillo* longior. *legum.* terebratulum.

Arbor. sempervirens. *fol.* ternata. *fulcr.* stipulâ oppositifoliâ bifidâ.

Fætida. 1. ANAGYRIS. *b. m.* 203. *mag. hort.* 14.

D I C T A M N U S.

Cal. 5-phyllo. *petala* patentia: 3 sursum; 2 obliquè ad latera sita. *caps.* 5, coalitæ.

Herbæ. *fol.* impari-pinnata. *fulc.* pili hispidi atri in tota planta. filamenta *glandulis* tecta.

Albus. 1. DICTAMNUS. *b. m.* 205. *La fraxinelle.*

Fraxinella. *mag. Bot.* 99.

Fraxinella sive dictamnus albus vulgo. *mag. hort.* 81.

* PHARM. *Dictamni albi* radix, folia, flores; vis suspecta, diuretica, emmenagoga, sudorifera, anthelmintica, antiepileptica, antihysterica. radix ad drach. 1, in substantia; ad usque unc. fl. in vini albi unc. vi... folia & flores in i-fuso theiformi.

POLYANDRIA

TRIGYNIA.

DELPHINIUM.

Cal. o. petalum supremum cornutum.

nectar. bifidum tubo petali cornuti.

siliq. introrsum dehiscentes.

Herba. fol. palmato-multifida. *inflor.* racemosa.

* I-Capsulares.

1. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule sub- *Consolida.*
diviso. *b. m. 258.*

Consolida regalis arvensis. mag. Bot. 73.

2. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule sim- *Ajacis.*
plici. *b. m. 258.*

Consolida regalis hortensis. Baub. pin.

Delphinium hortense. mag. hort. 68.

** Tricapsulares.

3. DELPHINIUM nectariis diphyllis, foliis palma- *Staphisagria.*
tis. *b. m. 259. La staphisaigre.*

Staphisagria. mag. Bot. 246. hort. 189.

* PHARM. *Staphisagria* semina. Vis intus vene-
nata, emetico-draistica, inflammans, ortho-
pnoica, extus antiptiriaca, antiacatica, ab-
stergens, sialagogia,

ACONITUM.

Cal. o. petalum supremum fornicatum.

nectar. 2 recurva pedunculata. *siliq.*
introrsum dehiscentes.

Herba. fol. palmata. *inflor.* racemosa.

OBS. Demonstrant cotyledones, foliatio, inflorescentia,
fructificatio, summam cum delphinio affinitatem.

Lycotonum. 1. ACONITUM foliis palmatis multifidis villosis.
b. m. 259. Le tue-loup.

Aconitum folio platani, flore luteo pallescente.
mag. hort. 4.

Napellus. 2. ACONITUM lacinis foliorum linearibus, su-
perne latioribus, linea exaratis. *b. m. 259. La-*
conit.

Aconitum magnum purpureo flore, vulgo napel-
lus. *mag. hort. 4.*

SYNGENESIA MONOGAMIA.

VIOLA.

Cal. 5-phyllus. *petalum supremum basi*
cornutum inter foliola calycis promi-
nens. faux villosa. caps. 3-valvis, uni-
locularis.

Herba, stolonifera. fulc. stipulae solutae
geminae.

* Acaules.

Odorata. 1. VIOLA acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptan-
tibus. *b. m. 467. La violette.*

Viola martia purpurea flore simplici odoro. mag.
Bot. 278. hort. 205.

* PHARM. *Viola* flores, syrpus, saccharum, folia,
semina, radix. Vis *florum* anodina, demulcens,
refrigerans, antitussiculosa, antidysurica, sub-
eccoprotica.. *foliorum* emolliens.. *seminum* diuteti-
ca, purgans.. *radicis* cathartica.. *flores* ad man. 1.
in decocto; ad drach. 1. in substantia.. *semina*
ad unc. 1 aut 1 & ss. pro emulsione.. *radix* ad
unc. II. vel III.

** *Caulescentes.*

2. VIOLA caule demum ascendentē, foliis oblongo-*Canina*
cordatis. *b. m.* 467.
Viola martia inodora sylvestris. *mag. Bot.* 278.
hort. 205.
3. VIOLA caule triquetro diffuso, foliis oblongis *Tricolor.*
incisis, stipulis dentatis. *b. m.* 467. *La pensée.*
Viola arvensis bicolor. *mag. Bot.* 278. *hort.* 205.
5. Viola bicolor hortensis repens. *mag. hort.* 205.

*GYNANDRIA**D I A N D R I A.**ORCHIS.**Nectar.* corniforme ponē florem.*Herba*, simplicissima. *fol.* vaginans. *inflor.*
spicata. *rad.* incerta.* *Bulbis indivisis.*

1. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio lanceo-*Bifolia*
lato integerrimo: cornu longissimo, petalis pa-
tentibus. *Linn. sp. sist. nat.* 1243.

Orchis alba calcari longo. *mag. hort.* 148.Orchis alba bifolia minor calcari oblongo. *Tour.*
infl. 433.HABITAT in herbidis circa *Caunelles*. Altitudo
sesquipedalis. Hanc primus Monspelii mecum
vidit D. *Vicari*, Doctor ex Avenione. Spica
pauciflora, laxa.* PHARM. *Satyrii* radix condita. Vis demulcens,
antidysenterica, sterilitati, tabi adversa, aphro-
disiaca, analeptica.

2. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii cornu longo: *Pyramidalis*
labio trifido æquali integerrimo, petalis lanceo-
latis. *b. m.* 469.

Orchis cynosorchis & testiculus canis major, flore dilutè purpurascente sive incarnato. mag. Bot. 192. hort. 148.

Coriophora. 3. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido reflexo crenato, cornu brevi, petalis conniventibus. b. m. 469.

Orchis odore hirci minor. mag. Bot. 192. hort. 149.

Morio. 4. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obtuso, petalis omnibus conniventibus. b. m. 469.

Orchis morio semina. mag. Bot. 192. hort. 148.

Mascula. 5. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis. b. m. 470.

β. Orchis morio mas foliis maculatis. mag. hort. 148.

* PHARM. *Orchidis seu salep radix.* Vis speciei primæ.

Vestulata. 6. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido, punctulis scabro: cornu obtuso, petalis distantibus. b. m. 470.

Orchis pannonica quarta. mag. Bot. 192.

Orchis militaris pratensis humilior. mag. hort. 148.

β. Orchis parvis floribus multis punctis notatis. mag. Bot. app. 303.

HABITAT copiosè in humentibus sylvosis circa S. Loup, & au Capouladou.

Militaris. 7. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinfido punctis scabro: cornu obtuso, petalis confluentibus. b. m. 470.

* * *Bulbis palmatis.*

Palmata. 8. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. b. m. 470.

Orchis palmata pratensis longis calcaribus. mag. Bot. 193. hort. 149.

Odoratissima. 9. ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu recur-

vo, labello ovato trilobo acuto, foliis linearibus. *b. m.* 471.

Orchis palmata angustifolia minor odoratissima.
mag. Bot. 193. & app. 303. hort. 149.

10. *ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu germinibus breviore: labio plano, petalis dorsibus erectis. b. m. 471.* *Maculata.*

11. *ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longiore: labio trifido, petalis duobus patentissimis. Linn. sif. 1243.* *Conopsea.*

Orchis palmata minor calcaribus oblongis. Tour.
435.

Orchis palmata angustifolia minor, flore odora-
tissimo. mag. Bot. 193? & app. 303? hort. 149?
an hæc synonymia potius pertinet ad istam,
*quam ad *orchidem odoratissimam* n°. 9?*

HABITAT à Selleneuve juxta Magnolium. Nos
ipsam vidimus au Capouladou.

*** *Bulbis fasciculatis.*

12. *ORCHIS bulbis fasciculatis filiformibus, necta-*
rii labio ovato integerrimo. b. m. 471. *Abortiva.*

S A T Y R I U M.

Nectar. scrotiforme inflato-didymum po-
nè florem.

Herba. fol. vaginans. inflor. spicata.

1. *SATYRIUM bulbis indivisis, foliis lanceolatis,*
nectarii labio trifido, intermediâ linearî obliquâ
longissimâ præmorsâ. b. m. 471. *Hircinum.*

Orchis barbata fætida. mag. Bot. 192. hort. 149.

ABUNDAT juxta fluvium Herau in descensu mon-
*tis *Capouladou*, ubi crescit ferè ad altitudinem*
humanam, observante D. Clapiers.

2. *SATYRIUM bulbis palmatis, foliis linearibus,*
nectarii labio resupinato trilobo: intermediâ
majore. Linn. sp. 944. *Nigrum.*

Orchis palmata angustifolia alpina nigro flore.

Tour. inst. 435.

HABITAT in herbidis à l'Esperou, à Lamalou, juxta amnem.

O P H R Y S.

Nectar. subtus subcarinatum.

Herba. fol. vaginans. inflo. spicata.

* *Bulbis ramosis.*

Nidus avis. 1. OPHRYS bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido. b. m. 472.

Corallorhiza. 2. OPHRYS bulbis ramosis refluosis, caule vaginato, nectarii labio trifido. Linn. sp. pl. edit. 2^a. 1339. Orobanche radice coralloïde. Bauh. pin. 88. HABITAT in sylvis à l'Esperou, à la baraque de Michel. Bulbi ramosissimi, compressi.

Spiralis. 3. OPHRYS bulbis aggregatis oblongis, caule subfolioso, floribus secundis, nectarii labio indiviso. b. m. 472.

Orchis spiralis odorata alba. mag. Bot. 193. hort. 149.

Ovata. 4. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ova-
tis oppositis nectarii labio bifido. b. m. 472.

Ophrys bifolia. mag. Bot. 191. hort. 148.

** *Bulbis rotundis.*

*Anthropo-
phora.* 5. OPHRYS bulbis subrotundis, caule folioso, nec-
tarii labio linearis tripartito: laciniâ mediâ lon-
giori bifidâ. b. m. 473.

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans.
mag. Bot. 192. app. 302.

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans,
mas, & femina. mag. hort. 148.

HABITAT copiosè in descensu montis Capouladou,
& secus fluvium Herau.

Inseclifera. 6. OPHRYS bulbis subrotundis, caule folioso, nec-
tarii labio subquinquelobo. b. m. 473.

Orchis fucum referens, colore rubiginoso. *mag.*

Bot. 192. *hort.* 149.

Orchis muscam referens minor. *mag.* *Bot.* 193. *β.* *Myodes,*
hort. 149.

Nectarii labio subtrilobo: intermedio acumi- *γ.* *Major.*
nato recurvo.

Orchis muscam referens major. *mag.* *Bot.* 193.
hort. 149.

Nectarii labio subtrilobo planiusculo: interme- *δ.* *Lutea.*
dio emarginato obtuso.

Orchis muscam referens lutea. *mag.* *Bot.* 193.
hort. 149.

Orchis araneam referens. *mag.* *hort.* 149. *ε.* *Adrachnites.*

S E R A P I A S.

Nectar. ovatum gibbum: labio ovato.

Herba. fol. caulina vix vaginans.


1. SERAPIAS bulbis fibrosis, floribus erectis brac- *Helleborine.*
teâ brevioribus. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 1344.
2. SERAPIAS bulbis subrotundis, nectarii labio tri- *Lingua.*
fido acuminato petalis longiore. *b. m.* 474.
Orchis montana italicica, flore ferrugineo nutante,
linguâ oblongâ. *mag.* *Bot.* 303. *hort.* 149.
HABITAT in herbidis juxta amnem à Montferrier,
& ibi in pinetis.
3. SERAPIAS bulbis fibrosis, floribus erectis, brac- *Longifolia.*
teâ longioribus. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 1344.
Serapias nectaria limbo obtuso longitudine peta-
lorum. *Ger. gallop.* 132.
Helleborine angustifolia praten sis. *mag.* *Bot.* 126.
hort. 95.
- β. Serapias caule paucifloro floribus distantibus, nec-
tario petalis breviore. *Ger. ibidem.*
Helleborine montana angustifolia purpurascens.
mag. *Bot.* 126. *hort.* 95.

C Y P R I P E D I U M.

Nectar. ventricosum inflatum concavum.

Herba. fol. subvaginans. inflor. subspicata, subbiflora.

Calceolus. 1. CYPRIPEDIUM radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis caulinis. h. m. 475. *Le sabot de notre Dame.*



Classis X^a.

H E X A P E T A L I
R E G U L A R E S.

*HEXANDRIA**MONOGYNIA,*

LEUCOIUM.

NARCISSUS.

PANCRATIUM.

ALLIUM.

LILIUM.

TULIPA.

ORNITHOGALUM.

SCILLA.

ANTHERICUM.

ASPARAGUS.

BERBERIS.

PEPLIS.

LYTHRUM. 2.

*HEXANDRIA**TRIGYNIA.*

COLCHICUM.

ENNEANDRIA.

BUTOMUS.

DODECANDRIA

MONOGYNIA.

LYTHRUM.

POLIANDRIA


MONOGYNIA.

ANEMONE.

POLYGAMIA

MONŒCIA.

VERATRUM.



HEXAPETALI REGULARES.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

LEUCOIUM.

Cal. spatha. *cor.* supera campanulata, apicibus incrassata: puncto viridi. *stigm.* simplex.

Herba: scapus anceps. *inflor.* nutans: pedicellis triquetris.

1. LEUCOIUM spathâ uniflorâ multiflorâque, stylo *Vernum.* filiformi *b. m.* 163. *Le perceneige.*

Leucoium bulbosum majus. *mag. hort.* 153.

Narcisso-leucoium vulgare. *mag. hort.* 142.

2. Narcisso-leucoium pratense multiflorum. *mag. hort.*

^{142.}

* PHARM. *Leucomi bulbosi*, seu *violetæ albæ radix*, flores. *Vis radicis emetica*, *resolvens*; *florum antiephelica*, *anticatarractalis*.

NARCISSUS.

Cal. spatha. *cor.* supera patens. *nectar.* infundibuliforme monophyllum, integrum. *stam.* 3 intra tubum nectarii, breviora: alterna 3 paulò longiora.

Herba: scapus ancipiti - teres. *inflor.* erecta: pedicellis triquetris.

1. NARCISSUS spathâ uniflorâ, nectario campanulato petalis dimidio breviore. *Linn. sist. nat.* 976. *Odorus.*

Narcissus major albus magno odore, floris circulo pallido. mag. Bot. 181. hort. 141.

HABITAT in pratis à *Lattes*; aux prés d'arenes.
Habitus sequentis.

Poëticus. 2. *NARCISSUS* spathâ uniflorâ, nectarii limbo rotato brevissimo. b. m. 163.

3. *Narcissus* albus circulo purpureo. mag. Bot. 181. hort. 141.

2. *Narcissus angustifolius* albus minor. mag. Bot. 180. hort. 141.

3. *Narcissus medio purpureus multiplex.* mag. Bot. 181. hort. 141.

4. *Narcissus medio purpureus minor.* mag. hort. 141.

5. *Narcissus albus circulo croceo.* mag. Bot. 181.

hort. 141.

Pseudo-narcissus. 3. *NARCISSUS* spathâ uniflorâ, nectarii limbo campanulato erecto longitudine petali. b. m. 164.

Narcissus major totus luteus, calyce prælongo.
mag. hort. 142.

Jonquilla. 4. *NARCISSUS* spathâ multiflorâ, nectario campanulato brevi, foliis subulatis. b. m. 164. *La jonquille.*

Narcissus juncifolius luteus minor. mag. Bot. 182.
hort. 142.

5. *Narcissus juncifolius luteus major.* mag. hort. 142.

2. *Narcissus juncifolius luteus minimus odore mellis.*
mag. Bot. 182. hort. 142.

3. *Narcissus juncifolius flore rotundo roseo.* mag.
hort. 142.

Tazetta. 5. *NARCISSUS* spathâ multiflorâ, nectario campanulato, foliis planis. b. m. 164. *Le narcisse.*

Narcissus medio luteus copioso flore odore gravi.
mag. Bot. 181. hort. 141.

3. *Narcissus medio luteus foliis florum longioribus,*
circulo patulo. mag. Bot. 182.

Narcissus medio luteus majoribus floribus. mag.
hort. 141.

3. *Narcissus flore sulphureo, medio luteus, odore gravi.* mag. Bot. 182. hort. 141.

2. *Narcissus pleno flore latifolius albus medio luteus*
mag. Bot. 182. hort.

PANCRATIUM.

P A N C R A T I U M.

Cal. spatha. *cor.* supera patens. *nectar.*
tubulato-campanulatum, ore 12-fido.
stam. nectarii laciniis interposita.

Herba: scapus anceps. *inflor.* aggregata
sessilis.

- I. PANCRATIUM spathâ multiflorâ, petalis planis, *Maritimum.*
foliis lingulatis. *b. m.* 165. *Le narcisse de mer.*
Narcissus maritimus. mag. Bot. 182. *hort.* 142.

A P H Y L L A N T E S.

Cal. spathæ vagæ imbricatae glumosæ.
cor. infera patens.

Herba: scapus teres. *fol.* o. *inflor.* ge-
minata sessilis.

- I. APHYLLANTES. *b. m.* 165. *Monspelienfis*
Caryophyllus cæruleus Monspeliensium. mag. Bot.
53. hort. 47.

A L L I U M.

Cal. spatha. *cor.* infera patens.

Herba. *fol.* incerta. *inflor.* terminalis um-
bellata.

* *Foliis caulinis planis, umbellis capsuli-
feris, staminibus trifidis.*

- I. ALLIUM caule planifolio umbellifero, stamini-
bus tricuspidatis, radice tunicatâ. *b. m.* 166. *Le
porreau.*

Porrum commune capitatum. mag. hort. 163.

* PHARM. *Porri* radix, syrpus, semina. Vis
intus diuretica, emmenagogia, antiasthmatica,
antiraucedinosa, anticalculosa. Extus dolori la-

teris, hæmorrhoidum, tumoribus articulorum, aurium tinnitus adversa.

- Victorialis.* 2. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbellâ globosâ, staminibus lanceolatis, corollâ longioribus. *b. m. 166.*

* PHARM. *Victorialis longæ radix. Vis allii sativi.*
HABITAT à *Lamalou*, à *l'Esperou.*

- Subhirsutum.* 3. ALLIUM caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis. *b. m. 166.*
Allium sylvestre, sive *moly angustifolium umbellatum*. *mag. Bot. 9. hort. 9.*

- Roseum.* 4. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbellâ fastigiata, staminibus corollam æquantibus, foliis lævibus. *b. m. 186.*

Allium sylvestre, sive *moly roseo ampio flore. mag. Bot. 11. tab. 10. hort. 9.*

** *Foliis caulinis planis, staminibus trifidis, umbellis bulbiferis.*

- Sativum.* 5. ALLIUM caule planifolio bulbifero, radice compositâ, staminibus tricuspidatis. *b. m. 167. L'ail.*
Allium sativum. mag. hort. 9.

* PHARM. *Allii sativi radix, aqua, syrupus, oxymel. Vis intus orexica, stomachica, antihelmintica, alexiteria, diuretica, anticalculosa, antihydropica, antihysterica, antiasthmatica, excitans; extus resolvens, maturans, antitinealis, epicarpica.*

- Scorodoprasum.* 6. ALLIUM caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis vaginis ancipitibus, staminibus tricuspidatis. *b. m. 167. La rocambole.*

Allium sylvestre monspessulanum albidum. mag. Bot. 9.

Allium sativum alterum caulis summo circumvoluto. mag. hort. 9.

*** *Foliis caulinis teretibus, staminibus trifidis, umbellis capsuliferis.*

- Sphaerocephalum.* 7. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, foliis se-

miteribus, staminibus tricuspidatis corollâ longioribus. *b. m. 167.*

Allium, sive moly montanum quintum. *mag.*
Bot. 9.

Allium spherocephalon purpurascens. *mag. hort. 10.*

8. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, umbellâ globosâ, staminibus subulatis. *b. m. 168.*

9. Allium sylvestre luteum juncifolium bicorne. *mag.*
Bot. 9. hort. 10.

10. Allium montanum bicorne flore obsoletiore. *mag.*
Bot. 9. hort. 9.

9. ALLIUM caule teretifolio subnudo umbellifero, umbellâ fastigiata, petalis truncatis, staminibus tricuspidatis. *b. m. 167.*

Allium moschatum capillaceo folio. *mag. Bot. 11.*
hort. 10.

**** *Foliis caulinis teretibus, staminibus trifidis, umbellis bulbiferis.*

10. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis. *b. m. 168.*

Allium sylvestre vinearum. *mag. Bot. 212.*

Porrum sylvestre vinearum. *mag. hort. 163.*

9. Allium sylvestre tenuifolium. *mag. Bot. app. 290.*
hort. 10... ad mare frequens.

11. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis. *b. m. 168.*

Cepa tenuifolia bicornis flore obsoleto. *Tour. 382.*

Allium bicorne proliferum flore intus albo, cum stria purpurascente externè. *mag. Bot. 8. hort. 9.*

**** *Foliis radicalibus, scapo nudo.*

12. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbellâ fastigiata. *b. m. 168.*

Allium petræum umbelliferum. *mag. Bot. app. 289.*
hort. 9.

Allium montanum radice oblongâ. *Baub. prod.*
27. 3.

- Ascalonicum* 13. ALLIUM caule nudo tereti , foliis subulatis , umbellâ globosâ , staminibus tricuspidatis. *b. m.* 168. *Les échalottes.*
Cepa ascalonica. *mag. hort.* 50.
- Ursinum.* 14. ALLIUM scapo nudo semicylindrico , foliis lan- ceolatis petiolatis , umbellâ fastigiatâ. *b. m.* 169.
Allium sylvestre latifolium. *mag. hort.* 9.
- Cepa.* 15. ALLIUM scapo nudo infernè ventricoso longiore , foliis teretibus. *b. m.* 169. *L'oignon.*
Cepa vulgaris tunicis & floribus purpurascensibus.
mag. hort. 50.
Cepa vulgaris floribus & tunicis candidis. *mag.*
hort. 50.
- * PHARM. *Cepa* radix , succus. Vis orexica , flatu- lenta , anthelmintica , diuretica , anticalculosa , aphrodisiaca , antiasthmatica , alexiteria , extus maturans , antiotalgica , anticophosica , buboni , furunculo , ambustis hæmorrhoidibus adversa..
succus ad unc. III. IV.
- Fistulosum.* 16. ALLIUM scapo nudo folia adæquante , foliis teretibus ventricosis. *b. m.* 169. *La ciboule.*
Cepa oblonga. *mag. hort.* 50.
- Schænopra- sum.* 17. ALLIUM scapo nudo adæquante folia teretia subulato-filiformia. *b. m.* 169. *Autre ciboule.*
Cepa minima sterilis. *mag. hort.* 50.

L I L I U M.

Cor. campanulata nuda infera : *petalis* basi incumbentibus lineâ longitudinali nectariferâ. *caps.* valvulis pilo cancel- lato connexis.

Herba. *fol.* sparsa. *inflor.* racemosa ter- minalis.

- Candidum.* 1. LILIUM foliis sparsis , corollis campanulatis intus glabris. *b. m.* 169. *Le lys.*
Lilium album vulgare flore erecto. *mag. hort.* 118.
 * PHARM. *Lilii albi* radix , flores , aqua , oleum.
Vis emolliens! anodina , maturans.. *florum & aquæ*

intus bechica, demulcens, antitussiculosa.. aqua
ab unc. iv. v... flores ad pug. ii. iii. in pti-
fana.

2. LILIUM foliis subverticillatis, floribus reflexis, Martagon.
corollis revolutis. b. m. 170.
Liliem flore nutante ferrugineo, mag. Bot. 155.
Lilium floribus reflexis montanum. mag. hort. 118.
6. Lilium floribus reflexis albis non punctatis. mag.
hort. 118.

T U L I P A.

Cor. campanulata nuda infera. *styl.* o.

Herba: scapus teres. *inflor.* solitaria ter-
minalis.

1. TULIPA filamentis basi barbatis, foliis lanceola-
tis. b. m. 171.
Tulipa minor lutea narbonensis. mag. Bot. 272.
hort. 200.
2. TULIPA flore erecto, foliis ovato-lanceolatis. *Gesneriana.*
b. m. 171.
Tulipa præcox. mag. hort. 200.

O R N I T H O G A L U M.

Cor. erecta, infera, nuda, persistens,
supra medium patens; *petala* extus
herbacea. *filam.* alterna basi dilatata.

Herba. *inflor.* corymbosa, racemosa.

* *Staminibus omnibus subulatis.*

1. ORNITHOGALUM scapo angulato, bracteis
binis umbellâ longioribus, pedunculis simpli-
cissimis. b. m. 171. *Luteum.*
2. ORNITHOGALUM scapo angulato, bracteis
binis ternis umbellâ longioribus, pedunculis
ramosis. b. m. 172. *Minimum.*
3. ORNITHOGALUM racemo longissimo, filamen-
to V iij *Pyrenaicum.*

tis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus
æqualibus, fructiferis scapo approximatis. b. m.
172.

* * *Filamentis alternis emarginatis.*

Umbellatum. 4. ORNITHOGALUM floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis. b. m. 172.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium.
mag. Bot. 194. hort. 150.

Narbonense. 5. ORNITHOGALUM racemo oblongo, filamentis lanceolatis membranaceis, pedunculis floribusque patentibus. b. m. 172.

Ornithogalum spicatum monspeliense lacteo flore.
mag. Bot. 194. hort. 150.

Obs. Pedunculi longi. Bracteæ pedunculis æquales, solitariæ, acuminatæ.

S C I L L A.

Cor. infera, nuda, decidua, patens,
filam. filiformia.

Herba : scapus teres. *inflor.* racemosa.

Autumnalis. 1. SCILLA radice solidâ, foliis filiformibus linearibus, floribus corymbosis, pedunculis nudis adscendentibus longitudine floris. b. m. 176.

Hyacinthus autumnalis minor. mag. Bot. 134.

Ornithogalum autumnale minus. mag. hort. 150.

Bifolia. 2. SCILLA radice solidâ, floribus erectioribus paucioribus. b. m. 174.

Ornithogalum bifolium cæruleum germanicum.
mag. hort. 150.

A N T H E R I C U M.

Cor. infera plana nuda. *caps.* ovata.

Herba. rad. funiculiformis. *inflor.* racemosa.

* *Phalangium, foliis canaliculatis.*

1. ANTHERICUM *foliis planis, caule simplicissimo. b. m. 175.* *Liliago.*

Phalangium non ramosum. mag. Bot. 201.

Phalangium parvo flore non ramosum. mag. hort. 158.

** *Narthecium, foliis ensiformibus.*

2. ANTHERICUM *foliis ensiformibus, perianthiis trilobis filamentis glabris. b. m. 175.* *Calyculatum.*

Phalangium alpinum iridis folio. mag. hort. 158.

A S P A R A G U S.

Cor. infera nuda erecta: petalis 3 internis apice reflexis. bacc. 3-locularis 2-sperma.

Herba. fol. fasciculata. inflor. pedunculi gemini axillares sublaterifolii divergentes.

1. ASPARAGUS *caule erecto herbaceo, foliis setaceis, stipulis paribus. b. m. 176.* *Lasperge. Officinalis.*

Asparagus sylvestris folio tenuissimo. mag. Bot. 30. hort. 24.

2. Asparagus maritimus crassiore folio. *mag. Bot. hort. 24.*

2. Asparagus hortensis. *mag. hort. 24.*

* PHARM. *Asparagi radix, semina. Vis aperiens, diuretica, aphrodisiaca. Radix ab unc. ff. ad unc. 1.*

2. ASPARAGUS *caule herbaceo suffruticuloso, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis æqualibus. b. m. 176.* *Acutifolius.*

Asparagus foliis acutis. mag. Bot. 31. hort. 24.

BERBERIS.

Cal. 6-phyllus. *cor.* infera. *glandulæ* 2 ad ungues. *stylus.* o. *bacc.* 2-sperma.

Frutex. *inflor.* racemosa : flosculis inferioribus verticillatis.

OBS. Filamenta ad tactum sensibilia... Variat floribus dian- dris, triandris, tetrandris.

Dumetorum. 1. BERBERIS. b. m. 184. L'épinevinette.

Berberis vulgæ quæ oxyacantha putata. mag. hort. 38.

* PHARM. *Berberidis cortex*, *baccæ maturæ*, *conditæ*, *succus*, *syrupus*, *semina*. Vis *corticis purgans*, *antiauriginosa*. *Baccarum refrigerans*, *anti-putredinosa*, *antibiliosa*, *tonica*. *Succus ad unc.* 1.

PEPLIS.

Cal. campanulatus, 12 denticulis, alter- nis 6 reflexis. *petala calyci* inserta. *caps.* 2-locularis.

Herba. *fol.* opposita sessilis. *inflor.* axil- laris solitaria sessilis.

Portula. 1. PEPLIS. Linn. sp. pl. 332.

Glaux palustris flore striato clauso, foliis portulacæ. Tenc. 38.

HABITAT in udis fossis salinis circa stagna, à Maguelone, Perauls.

HEXANDRIA

DIGYNIA.

LYTHRUM.

Cal. *cor.* *caps.* *caul.* Vide infrà Dode- cand. monogyniam. *fol.* inferior oppo- sita. *inflor.* axillaris solitaria sessilis.

2. LYTHRUM foliis summis alternis linearibus, floribus hexandris. *b. m.* 228.
Gratiola minor, sive *hyssopifolia*. *mag. Bot.* 123.
Salicaria hyssopifolia. *mag. hort.* 176.

H E X A N D R I A

T R I G Y N I A.

C O L C H I C U M.

Spatha radicata. *cor.* tubo longissimo radicato. *caps.* 3 connexæ inflatæ.

Herba. *rad.* tuberosa solida: radiculis dimidiatis palmatis. *inflor.* à latere bulbi eodem ac radiculæ.

OBS. Secundo anno *radiculae*, *folia* & *scapus* prodeunt ex opposto bulbi latere, & sic quotannis à dextro ad sinistrum, & vice versa, sedem mutant.

1. COLCHICUM foliis planis lanceolatis erectis. *b.* *Autumnale.*
m. 189. *Le tue-chien.*
Colchicum commune. *mag. Bot.* 71. *hort.* 60.
s. *Colchicum flore albo*. *mag. hort.* 60.

E N N E A N D R I A.

B U T O M U S.

Cal. o. caps. 6 polyspermæ.

Herba, immersa & emersa. *rad.* fibrosa.
inflor. terminans scapum, umbellata.

1. BUTOMUS. *b. m.* 202. *mag. hort.* 37. *Le jonc Umbellatus.*
fleuri.
Juncus cyperoides paludosus floridus. *mag. Bot.*
145.

DODECANTRIA
MONOGENIA.

LYTHRUM.

Cal. cylindricus striatus 12-dentatus, 6 alternis reflexis; petala denticulis calycinis interposita. caps. 2-locul. polysperma.

Herba 4-gona, immersa & emersa. fol. opposita integerrima.

Salicaria. 1. LYTHRUM foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. h. m. 227. *La salicaire.*

Lysimachia purpurea vulgaris spicata. mag. Bot.
^{172.}

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis. mag. hort.
^{176.}

* PHARM. *Lysimachia purpurea* herba. Vis adstringens, antidyserterica, antidiarrhoica. *comæ floridæ* ad man. 1, in decocto. *planta pulverata* ad drach. 1, vel drach. 1-ss. bis in die.

POLYANDRIA
MONOGENIA.

ANEONE.

Cal. o. semina plurima receptaculo longo affixa.

Herba. fol. incerta. inflor. pedunculata solitaria terminalis. fulc. incerta.

* Hepaticæ & pulsatillæ, flore bracteato,
caule scapoſo.

1. ANEMONE bracteis ternis approximatis calyciformibus integerrimis, foliis integerrimis trilobis. h. m. 261. *L'hépatique.*
Trifolium hepaticum, sive herba trinitatis, flore cœruleo. mag. Bot. 271.
Ranunculus tridentatus vernus flore simplici. mag. hort. 169.
Idem, flore albo; carneo; pleno. mag. hort. 169.
* PHARM. *Hepaticæ nobilis* herba, flores. Vis vulneraria, tonica, adstringens, antiherniosa, cosmetica.
2. ANEMONE bractea remota multifida, petalis rectis, foliis bipinnatis. h. m. 261. *La pulsatille.*
Pulsatilla folio crassiori & majori flore. mag. Bot. 304.
Pulsatilla purpurea cœrulea. mag. hort. 166.
* PHARM. *Pulsatillæ* herba, aqua. Vis corrosiva, sternutatoria, epicarpica, vesicatoria; aquæ antidiarrhoea, abstergens.
- ** Anemone caule folioso, seminibus caudatis.
3. ANEMONE foliis radicalibus ternato-decompositis, involucro folioso. h. m. 262. *L'anemone.*
Anemone tenuifolia flore dilutè purpurascente. mag. hort. 15.
4. ANEMONE foliis digitatis. h. m. 263. *Hortensis.*
5. ANEMONE foliis caulinis ternis connatis supradecompositis multifidis, seminibus hirsutis caudatis. Linn. sp. 539.
Pulsatilla flore albo. Tour. 284.
HABITAT in pratis à l'Esperou.
- *** Anemone flore nudo, seminibus ecaudatis.
6. ANEMONE foliis ternatis ovatis integris serratis, caule unifloro. h. m. 263. *Trifolia.*

- Nemorosa.* 7. *ANEMONE* seminibus acutis, foliolis incisis; caule unifloro. *b. m.* 263.
Ranunculus nemorosus, *anemones* flore minor. *mag. Bot.* 219.
Ranunculus nemorosus albus. *mag. app.* 304.
* *PHARM.* *Ranunculi nemorosi*, seu *albi* flores, aqua. Vis anticephalalgica, cosmetica.

POLYGAMIA

M O N O C I A.

V E R A T R U M.

Hermaphr. *cal.* o. *stam.* 6. *pist.* 3. *caps.* 3. *polyspermæ* mas. *cal.* *stam.* *hermaphroditi.* *rudimentum pistilli.*

Herba. *fol.* alterna vaginans integerrima. *inflor.* racemosa ramosa: flosculis immixtis.

Album. 1. *VERATRUM* racemo supradecomposito, corollis erectis. *b. m.* 512. *L'hellébore blanc.*

Helleborus albus flore subviridi. *mag. hort.* 68.

* *PHARM.* *Helleborei albi* radix. Vis draistica, sternutatoria, antiscabiosa, antipedicularis, antihydropocondriaca, antineaniaca, antiepileptica, anticophosica, antiquartanaria, cautè intus usurpanda. *Radix à gran.* vi ad vii.



Classis XI^a.

HEXAPETALI
IRREGULARES.

DODECANDRIA.

RESEDA.



HEXAPETALI IRREGULARES.

DODECANDRIA

RESEDA.

Cal. 1-phyllo partitus. *petala* laciniata.
styli 3-4. *caps.* ore dehiscens 1-locularis.

Herba. *inflor.* racemosa. *fol.* incerta.

- Luteola.* 1. RESEDA foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis. *b. m. La gaudie.*
- Sesamoïdes.* 2. RESEDA foliis lanceolatis integris, fructibus stellatis. *b. m. 229.*
- Alba.* 3. RESEDA foliis pinnatis, floribus tetragynis. *b. m. 124.*
- Refeda foliis calcitrapæ, flore albo. *mag. Bot. 221. hort. 172.*
- Lutea.* 4. RESEDA foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis. *b. m. 125.*
- Refeda vulgaris. *mag. Bot. 221. hort. 172.*
- Phyteuma.* 5. RESEDA foliis integris, trilobisque, calycibus maximis. *b. m. 230.*
- Resedæ affinis phyteuma. *mag. Bot. 221.*
- Reseda minor vulgaris. *mag. hort. 172.*



*Classis XII^a.***P O L Y P E T A L I****R E G U L A R E S.****O C T A N D R I A***MONOGYNIA.*

MONOTROPA.

P O L Y A N D R I A*MONOGYNIA.*

NYMPHÆA.

P O L Y A N D R I A*POLYGYNIA.*

TROLLIUS.

ADONIS.



POLYPETALI REGULARES.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

MONOTROPA.

Cal. o. petala 10 : 5 exterioribus basi excavato-melliferis extus gibbis : calyx? caps. 5-valvis polysperma.

Herba parasitica. fol. o. inflor. spicata terminans scapum.

Hypopithys. I. MONOTROPA floribus lateralibus octandris, terminali decandro.

HABITAT copiosè in luco sito ad dexteram ultra pontem à Selleneuve, observante D. Vicari.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

NYMPHÆA.

Cal. 4-f-5-phyllo. styl. o. bacc. multilocularis truncata corticosa.

Herba immersa. fol. peltata emersa. inflor. radicalis emersa : pedunculo immerso : fructificationibus immersis.

Lutea. I. NYMPHÆA calyce magno pentaphyllo. h. m. 254.
Le nenufar jaune.

Nymphaea

- Nymphaea lutea major. mag. Bot. 188. hort. 145.
 * PHARM. Nymphaea lutea radix, flores, conserva,
 syrpus, aqua, oleum. Vis florum succedanea
 floribus speciei sequentis, sed debilior. Attamen
 radix hujusce speciei alterius radici præfertur.
2. NYMPHÆA calyce quadrifido. h. m. 254. Le Alba.
nymphæa blanc.

Nymphaea alba major. mag. Bot. 188. hort. 145.
 * PHARM. Nymphaea alba radix, flores, conserva,
 syrpus, aqua, oleum. Vis refrigerans, antidy-
 surica, antiphlogistica, antigenorrhœica, anodi-
 na, soporifera. Syrupus ab unc. ss. ad unc. ii..
 aqua ab unc. iii ad vi.

POLYANDRIA

P O L Y G Y N I A.

T R O L L I U S.

*Cal. o. petala circiter 14. caps. ovatæ,
 plures 1-spermæ.*

*Herba. fol. digitato - multifida : caulina
 sessilis.*

2. TROLLIUS corollis conniventibus, nectariis lon- *Europæus.*
 gitudine staminum. Linn. sp. pl. 556.

Helleborus uniflorus petalis & siliquis pluribus.
Hall. helv.

HABITAT à l'Espinouse, Lamalou ad levam.

A D O N I S.

*Cal. 5-phyllo. sem. nuda plura corticata
 angulata.*

Herba. fol. linearis-decomposita.

1. ADONIS floribus octopetalis, fructibus semicy- *Annua.*
 lindricis. h. m. 264.

322 POLYPETALI REGULARES.

- Adonis recentiorum anemone species. *mag. Bot. s.*
Ranunculus foliis anthemidis, floribus rubicundis
splendentibus. *mag. hort. 168.*
β. Ranunculus foliis anthemidis, flore minore atro-
rubente. *mag. hort. 168.*
Vernalis. 2. ADONIS flore dodecapetalo, fructibus ovatis. *b.*
m. 264. L'hellebore d'Hypocrate.
Ranunculus fæniculaceis foliis, hellebori nigri ra-
dice. *mag. hort. 168.*



Classis XIII.

C O M P O S I T I
E X R E G U L A R I B U S.

*SYNGENESIA**POLYGAMIA AEQUALIS.*

ECHINOPS.

ARCTIUM.

SERRATULA.

CARDUUS.

CNICUS.

ONOPORDON.

CYNARA.

CARLINA.

ATTRACTYLIS.

CARTHAMUS.

BIDENS.

CACALIA.

EUPATORIUM.

STÆHELINA.

CHRYSOCOMA.

*SYNGENESIA**POLYGAMIA SUPERFLUA.*

ARTEMISIA.

GNAPHALIUM.

XERANTHEMUM.

CONYZA.

324 COMPOSITI EX REGULARIBUS.
CARPESIUM.
SENECIO. I.

S Y N G E N E S I A
POLYGAMIA NECESSARIA.


FILAGO.

MYCROPOUS.

D I C C I A

S Y N G E N E S I A.

GNAPHALIUM. I.



C O M P O S I T I

EX REGULARIBUS.

S Y N G E N E S T A

POLYGAMIA ÆQUALIS.

E C H I N O P S.

Cal. communis minimus reflexus: proprius subuniflorus imbricatus.

Herba. *inflor.* terminalis: calyculis distinctis conglobatis.

1. ECHINOPS calyculis unifloris, caule multicapitato, foliis spinosis, supra glabris. *b. m.* *420.* *Sphærocephalus.*

Echinops major. *mag. hort.* 71.. folia subtus tomentosa.

2. ECHINOPS calyculis unifloris, caule unicapitato. *Ritro.* *b. m. 420.*

Carduus sphærocephalus cæruleus minor. *mag. Bot. 50.*

Echinops minor. *mag. hort.* 71. & flore albo. *ibid.*

A R C T I U M.

Cal. communis globosus, squamis apice hamis inflexis.

Herba. *fol.* simplicissima petiolata.

1. ARCTIUM foliis cordatis inermibus. *b. m. 420.* *Lappa.* *La bardane.*

Lappa major, seu arctium Dioscoridis. *mag. Bot. 150. hort. 111.*

* PHARM. *Bardana* radix, herba, succus, semina.
Vis radicis diuretica, sudorifera, antisyphilitica,
antiarthritica, antinephritica. *Seminum* diureti-
ca, purgans. *Herba extus* abstergens, resolvens,
antiarthritica. *Radix* in pulvere ad usque drach.
i. in decocto ad usque unc. *i.. semina* à drach.
ff, ad drach. *i.. succus* ad unc. *i v.*

S E R R A T U L A.

Cal. imbricatus subcylindricus muticus.
Herba. fol. incerta. *inflor.* terminalis :
pedunculis multifloris.

Tintoria. 1. SERRATULA foliis pinnatifidis, pinnâ terminali
maximâ. *b. m. 421. La ferre:ce.*

- Serratula, mag. Bot. 239.

Jacea nemorensis, quæ serratula vulgò. mag. hort.
103.

* PHARM. *Serratulae* radix, herba. *Vis vulneraria*,
abstergens, cicatrizans, resolvens, antihaemor-
rhoïdal. *folia* ad man. *ff.* in infuso. *radix* pul-
verata ad drach. *i.*

Arvensis. 2. SERRATULA foliis dentatis spinosis. *b. m. 421.*
Carduus vinearum repens sonchi folio. mag. Bot.

49.

Cirsium arvense sonchi folio, radice repente. mag.
hort. *57.*

C A R D U U S.

Cal. ovatus imbricatus, squamis spinofis.
recept. pilosum.

Herba. rad. & fol. incerta. *inflor.* ter-
minalis.

* *Foliis decurrentibus.*

Lancolatus. 1. CARDUUS foliis decurrentibus hastato - pinnatis
spinosis, laciñiis divaricatis, calycibus ovatis
spinosis villosis, caule piloso. *b. m. 421.*

- Carduus lanceolatus sive sylvestris. mag. Bot. 49.
hort. 43.
8. Carduus lanceolatus ferocior. mag. Bot. 50. hort.
43.
- Cnicus lanceolatus validissimis aculeis munitus.
Tour. 451.
2. CARDUUS foliis spinosis semi-decurrentibus, Nutans.
floribus cernuis, squamis calycinis supernè pa-
tentibus. b. m. 422.
- Carduus nutans. mag. Bot. 49. hort. 43.
3. CARDUUS foliis sinuatis decurrentibus margine
spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis
villosis. b. m. 422. Acanthoides.
- Carduus acanthoides. mag. Bot. 49.
4. CARDUUS foliis sinuatis decurrentibus, margine
spinosis, flosculis aggregatis terminalibus nudis.
b. m. 422. muticis. Crispus.
- Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris. mag.
Bot. 49. hort. 43.
5. Carduus cirsium dictus, folio laciniato nigrius.
mag. Bot. 49.
5. CARDUUS foliis lanceolatis subrepandis decur-
rentibus, glabris inæqualiter ciliatis, pedunca-
lis alternis, calycibus inermibus. b. m. 422. Monspessu-
lanus.
- Cirsium monspeliacum folio longo glabro. mag.
Bot. 66.
- Cirsium foliis non hirsatis, floribus compactis.
mag. hort. 56.
6. CARDUUS foliis decurrentibus pinnatifidis den-
tatis: margine spinosis, floribus racemosis erec-
tis, pedunculis inermibus. Linn. sp. pl. ed. 2^a.
1151. Palustris.
- Cirsium pratense polycephalon vulgare. Tour. 448.
HABITAT juxta rivulos à l'Espresso. Caulis hunia-
næ altitudinis. Folia inferiora sesquipedalia.

** *Foliis amplexicaulibus.*

7. CARDUUS foliis amplexicaulibus hastato-pinna-
tifidis spinosis, calycibus aphyllis, spinis cana-
liculatis duplicato-spinosis. b. m. 422. Le char-
don Marie. Marianus.

Carduus albis maculis notatus vulgaris. mag. Bot.

49.

Carduus marianus, sive lacteis maculis notatus.
mag. hort. 43.

* PHARM. *Cardui Marie radix*, herba, succus,
aqua, semina. Vis diuretica sudorifera, deob-
struens, thoracica, antipleuritica, antihydro-
phobica? febrifuga, antiulcerosa, anticarcino-
matosa. *Radix & folia* in decocto.. *succus* ad
unc. iv.. *semina* pulverata aut in emulsis à drach.
i. ad drach. ii.

*** *Foliis sessilibus.*

Eriophorus. 8. *CARDUUS* foliis sessilibus bifariam pinnatifidis,
laciiniis alternis erectis, calycibus villosis globo-
sis. b. m. 423.

Carduus capite rotundo tomentoso. mag. Bot. 50.
hort. 43.

* PHARM. *Cardui eriocephali* herba, succus. Vis
anticarcinomatosa, ex *Borella*, *Tournefortio*.

Tuberosus. 9. *CARDUUS* foliis pinnatifidis spinosis sessilibus,
caule inermi, capitulis solitariis. b. m. 423.

Carduus pratensis asphodeli radice latifolius. mag.
Bot. 48.

Cirsium pratense asphodeli radice latifolium. mag.
hort. 57.

10. *Cirsium pratense* asphodeli radice, foliis tenuiis
incisis. mag. hort. 57.

Acanthus. 10. *CARDUUS* calyce glabro. Linn. sp. pl. edit.
1156.

Cirsium acaulos minori purpureo. Tour. 448.

HABITAT in elato colle, ultra pagum *Meyrueis*,
ad dexteram. Caulis interdum sesquipolligaris.

C N I C U S.

Cal. ovatus imbricatus squamis ramoso-
spinosis.

Herba. fol. incerta. inflor. terminalis.

1. CNICUS foliis lanceolatis decurrentibus individuis, calycibus pinnato-spinosis. *b. m.* 423. *Acarna.*
Chamæleon niger salmanticensis. mag. Bot. 60.
Carduus salmanticensis acarnæ foliis incanis. mag. hort. 44.

Copiosè crescit in monte Cetio.

2. CNICUS caule diffuso villoso, foliis dentato-sinuatis. *b. m.* 424. *Le chardon bénit.* *Benedictus.*
Cnicus sylvestris hirsutior, sive carduus benedictus. mag. hort. 59.

* PHARM. *Cardui benedicti* herba, succus, aqua, semina. Vis sudorifera, diuretica, antipleuritica, tonica, febrifuga, resolvens, antipestilens, anti-phlegmatorrhagica, antihemicranica, antivertiginosa, eccoprotica, subvomitoria. Datur in substantia ad drach. i.. *succus* ad unc. iii. iv. *Decocatum* ex man. ss, datur pluries in die ad unc. vi.. *extractum* ad drach. ss. *semina* in emulsis ad drach. iii.. *aqua* ab unc. iv ad vi.

ONOPORDON.

Cal. imbricatus ventricosus, squamis spinosis. recept. nudum.

Herba, lanața. fol. radicalis pinnatifida.

1. ONOPORDON calycibus squarrosois, foliis ova-to-oblongis sinuatis. *b. m.* 424. *Le pet d'âne, ou l'épine blanche.* *Acanthium.*

Acanthium. mag. Bot. 2.

Carduus tomentosus latifolius sylvestris. mag. hort.

44.

* PHARM. *Acanthii, seu spine alba radix.* Vis aperientis, diuretica, stomachica, carminativa, resolvens.

2. ONOPORDON calycibus squarrosois, squamis lanceolatis, foliis pinnatifidis lanceolatis. *b. m.* 424. *Illyricum.*

Acanthium illyricum. mag. Bot. 2.

Carduus illyricus spinosior, capitulis majoribus. mag. hort. 44.

OBS. Folia angustiora, minus incisa, magis tomentosa. Capituli majores magis echinati, mucronati.

C Y N A R A.

Cal. dilatatus imbricatus squamis canaliculatis carnosis emarginatis cum acumine.

Herba. fol. patens, incerta. *inflor.* terminalis.

- Scolymus.* 1. CYNARA foliis subspinosis pinnatis indivisisque, squamis calycinis ovatis. *b. m.* 425. *L'artichaud.*
Cynara sylvestris latifolia. *mag. Bot.* 65. *hort.* 56.
 2. Cynara hortensis foliis non aculeatis. *mag. hort.* 56.
 2. Cynara hortensis foliis aculeatis. *mag. hort.* 56.
 * PHARM. *Cynarae radix.* Vis diuretica..... Folia radicalia priora integerrima.

- Cardunculus.* 2. CYNARA foliis spinosis, omnibus pinnatifidis, squamis calycinis ovatis. *b. m.* 425.
 * PHARM. *Cardonum radix.* Vis antecedentis.

C A R L I N A.

Cal. radicatus squamis marginalibus longis coloratis.

Herba. fol. rigida.

- Acaulis.* 1. CARLINA caule unifloro, flore breviore. *b. m.* 425. *La carline.*
Carlina caulifera & acaulis. *mag. Bot. app.* 292.
Carlina acaulos magnō flore. *mag. hort.* 44.
 * PHARM. *Carlinae radix.* Vis sudorifera, stomachica, antihysterica, antiscabiosa. Datur in pulvere à scrup. 1, ad drach. 1; in infuso ad drach. 11; in decocto ad unc. fl. in aquæ lib. 11, ad tertiarie partis consumptionem.

- Lanata.* 2. CARLINA caule subunifloro longiore lanato, radio calycis purpureo. *b. m.* 426.
Carlina annua purpurea Monspeliensium. *mag. Bot.* 51. *hort.* 45.

Ces. Teta planta etiamdum floret lanata; incipiente autem fructificatione, ita sensim lanam exuit, ut perfecta fructificatione tota sit glabra.

3. CARLINA caule multifloro subdiviso, floribus *Coimbosa.* sessilibus, radio calycis sulphureo. *b. m. 426.*
4. CARLINA floribus lateralibus sessilibus paucissimis. *b. m. 426.* *Racemosa.*
Carlina sylvestris minor hispanica. mag. Bot. 51. hort. 44.

A T R A C T Y L I S.

Flosculi in radio (sæpius) 5-dentati.

Herba. inflor. terminalis. fulc. bractæ involucrantes pinnatæ.

1. ATRACTYLIS involucris cancellatis ventricosis, linearibus dentatis, calycibus ovatis, floribus flosculosis. *b. m. 426.* *Cancellata.*

C A R T H A M U S.

Cal. ovatus imbricatus, squamis apice subovato-foliaceis.

Herba. fol. incerta, rigida. inflor. terminalis nuda.

1. CARTHAMUS caule piloso supernè lanato, foliis *Lanatus.* inferioribus pinnatifidis, summis amplexicaulibus dentatis. *b. m. 427.*
Atractylis lutea. *mag. Bot. 34.*
Cnicus atractylis lutea dictus. *mag. hort. 59.*
2. CARTHAMUS foliis caulinis linearibus pinnatis *Carduncellus* longitudine plantæ. *b. m. 427.*
Carduncellus montis lupi. *mag. Bot. 51.*
Cnicus cæruleus humilis montis lupi. *mag. hort. 59.*

B I D E N S.

Cal. imbricatus. *cor.* radius flosculo uno aut altero radiante. *recept.* paleaceum. *pappus* aristis 2 erectis retrorsum scabris.

Herba. fol. & *inflor.* incerta.

3-partita. 1. BIDENS corollis flosculosis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis, foliis trifidis. *b. m.* 428.

Eupatorium dictum cannabina aquatica folio tripartito. *mag. Bot.* 296.

Cannabina aquatica folio tripartito diviso. *mag. hort.* 40.

Cernua. 2. BIDENS seminibus erectis, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis. *b. m.* 428.

Eupatorium dictum cannabina aquatica, folio non diviso. *mag. Bot.* 295.

Cannabina aquatica folio non diviso. *mag. hort.* 40.

Bipinnata. 3. BIDENS foliis bipinnatifidis incisis, calycibus involucratis, corollis semiradiatis, seminibus divergentibus. *b. m.* 428.

Cannabina aquatica foliis apii modo dissectis. *mag. hort.* 40.

HABITAT copiosè ad dexteram à *Selleneuve*, à *Gramont*, à *la Paillade*.

C A C A L I A.

Cal. cylindricus oblongus basi tantum subcalyculatus. *recept.* nudum. *pappus* pilosus.

Herba. rad. stolonifera. *fol.* radicalis petiolata suborbiculata.

Alpina. 1. CACALIA foliis reniformibus petiolatis acutis dentatis. *b. m.* 429.

Cácalia foliis cutaneis acutioribus & glabris. mag.
hort. 36.

HABITAT copiosè secus amnem à *Lamalou*. Folia
novella utrinque tomentosa, deinde lanam su-
pernè exuunt, quandoque infrà.

EUPATORIUM.

Cal. imbricatus, oblongus. *stylus* semi-
bifidus longus. *recept.* nudum. *pappus*
plumosus.

Herba. *fol.* caulina opposita ternata: ra-
mea-subalterna simplex integra.

- i. EUPATORIUM foliis oppositis ternatis sessilibus. *Cannabinum.*
b. m. 430. L'eupatoire.

Eupatorium cannabinum. mag. Bot. 93. hort. 76.

* PHARM. *Eupatorii* radix, herba, succus, ex-
tractum. *Vis radicis, herbe, vulneraria, corro-*
borans, deobstruens, antiædematosa, antica-
cheætica, antihydropica, antihydrocelica. Folia
ac summitates ad man. i. in aquæ lib. i.. folia
sicca in potu theiformi.. succus ad unc. iii.. ex-
tractum ad drach. i.

STÆHELINA.

Cal. oblongus imbricatus squamis apice
colorato-membranaceis reflexis. *recept.*
paleaceum. *pappus* plumosus.

Suffruticulus. *fol.* alterna linearis subde-
currens, integra.

- i. STÆHELINA foliis linearibus denticulatis, squa-
mis calycinis lanceolatis, pappo calycibus duplo
longiore. *b. m. 430. Gerard. gallop. icon. p. 190.*
Helichrysum sylvestre flore oblongo. mag. Bot. 125,
& app. 297.
Stæchas odorata purpurea. mag. Bot. 247.
Jacea capitata rosmarini folio. mag. hort. 102.

Dubia.

OBS. Raro apud nos calycinæ squamæ reflectuntur, saepius autem sibi invicem apprimuntur, valde coloratae; & caulis valde incanus.

C H R Y S O C O M A.

Cal. hemisphaericus imbricatus. *stylus* vix flosculis longior. *recept.* nudum. *pappus* simplex.

Herba. *fol.* linearis conferta sparsa, integrerrima.

Linosyris. 1. CHRYSOCOMA herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus levibus. *b. m.* 431.

Linaria folioso capitulo. *mag. Bot.* 159.

Conyzis aliquatenus affinis. *mag. hort.* 62.

OBS. Caulis diffusus ramosus. *Folia* glaberrima longa. *Rami* longi debiles ad apicem uniflori, vix ramosi... Occurrit etiam in sterilibus à Villeneuve.

S Y N G E N E S I A P O L Y G A M I A S U P E R F L U A.

A R T E M I S I A.

Cal. imbricatus squamis rotundatis convenientibus. *cor.* radii o. *recept.* subvillosum vel nudiusculum. *pappus* o.

Fruticulus, & *herba.* *fol.* incerta. *inflor.* racemosa subsecunda.

* *Fruticosæ erectæ.*

Abrotanum. 1. ARTEMISIA foliis ramosissimis setaceis, caule suffruticolo erecto. *b. m.* 432. *Laurone.*

Abrotanum mas angustifolium. *mag. hort.* 1.

* PHARM. *Abrotani* herba. Vis aperiens, incidentis, calefaciens, antacida, antitinealis, absinthii succedanea.

** Procumbentes ante florescentiam.

2. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caulis *Campifris.*
procumbentibus virgatis. h. m. 433.
Artemisia tenuifolia. mag. Bot. 29.
Abrotanum campestre. mag. hort. 1.
3. Abrotanum campestre caulinis rubentibus. *mag.*
hort. 1.
2. Abrotanum campestre carlinæ odore. *Baub. pin.*
136. *Tour. 459.*
1. Abrotanum humile corymbis majoribus aureis.
Tour. 459.
Abrotanum cum pulchris corymbis. *mag. hort. 1.*
3. ARTEMISIA foliis multipartitis tomentosis, race-
mis cernuis, flosculis femineis ternis. *h. m. 423.* *Maritima.*
- Absinthium seriphium Gallicum. *mag. Bot. 1. hort. 2.*
Absinthium santonicum Gallicum. *mag. Bot. app.*
289. *hort. 2.*

*** Erectæ herbaceæ, foliis compositis.

4. ARTEMISIA foliis compositis multifidis, floribus
subglobosis pendulis : receptaculo villoso. *h. m.*
433. *L'absinthe.*
Absinthium vulgare majus. mag. hort. 2.
- * PHARM. *Absinthii vulgaris seu majoris, herba,*
succus, syrpus, vinum, sal lixiviale. Vis *herbeæ,*
succi, syrupi, vini, stomachica, antacida, an-
thelmintica, deobstruens, anticachectica, febri-
fuga; salis antiemetica. Herba in pulvere à scrup.
1. ad drach. 1.. *succus ab unc. ff. ad unc. 11..*
vinum ab unc. iv ad vi.. syrpus ab unc. ff. ad
unc. 11.. sal à scrup. 1. ad drach. ff.
5. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis incisis, sub-
tus tomentosis, racemis simplicibus, floribus ova-
tis, radio quinquefloro. *h. m. 433. L'armoise.*
Artemisia vulgaris major. mag. Bot. 28. hort. 22.
- * PHARM. *Artemisia rubra, &c alba herba, aqua,*
syrpus. Vis analleptica, corroborans, antitertia-
naria, uterina, antihysterica, antidystocica,

emmenagogia, pellens. *Herba* ad man. i., in aquæ bullientis lib. fl.. infusa ad man. ii.. decocta in aquæ communis lib. iii. in pulvere ad drach. i.. aqua ad unc. iii. iv.

**** *Foliis simplicibus.*

- Dracunculus* 6. ARTEMISIA foliis linear-i - lanceolatis sessilibus glabris integerrimis. *b. m. 433.* *L'estragon.*
Abrotanum mas lini folio acriori & aromatico.
mag. hort. i.

G N A P H A L I U M.

Cal. imbricatus : squamis marginalibus rotundatis , coloratis membranaceis.
recept. nudum. *pappus* plumosus.
Herba. fol. mollis alterna. *inflor.* subracemos-a.

* *Argyrocomæ , calycibus albis.*

- Latto-album.* 2. GNAPHALIUM foliis semi-amplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis utrinque pubescentibus , floribus conglomeratis. *b. m. 434.*
Gnaphalium ad stæchadæm citrinam accedens. *mag.*
Bot. 111.
Elychrisum sylvestre latifolium capitulis conglobatis. *mag. hort.*

* * *Chrysocomæ calycibus luteis.*

- Stæchas.* 3. GNAPHALIUM foliis linearibus , caule fruticuloso ramoso , corymbo composito. *b. m. 435.* *L'immortelle.*
Elichrysum , seu stæchas citrina angustifolia. *mag.*
Bot. 124. hort. 72.
* PHARM. *Stæchadis citrina* flores. Vis exsiccans , antiarthritica.
- Sordidum.* 4. GNAPHALIUM foliis linearibus alternis , caule fruticuloso , floribus paniculatis subternis terminalibus sessilibus. *b. m. 435.*

Elichrysum

Elichrysum sylvestre angustifolium capitulis conglobatis. mag. Bot. 125. hort. 72.

*** Filaginea *calycibus cinereis*.

5. GNAPHALIUM caule ramoso diffuso, floribus *Uliginosum*, terminalibus confertis. b. m. 4. 35.
Gnaphalio vulgari similis. mag. Bot. 110.
Elichrysum aquaticum ramosum minus capitulis foliatis. mag. hort. 72.
6. GNAPHALIUM caule simplici, floribus sparsis. *Sylvaticum*. Linn. sp. 857.
Elichrysum spicatum. mag. hort. 72.
HABITAT in sterilibus, au Capouladou, l'Esperou.

XERANTHEMUM.

Cal. imbricatus radiatus: radio colorato.
recept. paleaceum. *pappus setaceus*.
Herba subsimplex incana. *fol.* integerima patens incana.

1. XERANTHEMUM foliis lanceolatis patentibus. *Annuum*. b. m. 436.
Jacea oleæ folio capitulis simplicibus. mag. Bot. 298.
Jacea incana. mag. Bot. 137.
Xeranthemum flore simplici purpureo majore. mag.
hort. 209.
Xeranthemum incanum flore albo. mag. hort. 209.
Jacea incana cyani capitulis. Baub. pin. 272.
HABITAT copidissimè in monte Cetio, ubi Maio
& Junio floret.

CONYZA.

Cal. imbricatus subrotundus. *cor.* radii trifidae. *recept.* nudum. *pappus* simplex.
Herba. *fol.* simplex. *inflor.* terminalis subcorymbosa.

- Squerrofa.* 1. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboso. *b. m.* 436.
Conyza major vulgaris. *mag. Bot.* 78. *hort.* 62.

C A R P E S I U M.

Cal. imbricatus, squamis exterioribus reflexis. *recept.* nudum. *pappus* o.
Herba. fol. simplex : summa involucriformis. *inflor.* nutans.

- Cernuum.* 1. CARPEZIUM floribus terminalibus. *Linn. sist.*
nat. 1212.

Aster annuus attico luteo similis foliis ad flores mollibus. *mag. Bot.* 32?

Asteriscus annuus foliis ad flores mollibus. *mag. hort.* 26?

Aster annuus aquaticus patulus luteus. *Tour.* 498?

HABITAT secus flavium, à Lamousson, Caunelles, Grabels, la Verune. Faciem conyzæ præ se fert. Folia tria quatuorve inæqualia calyci cuilibet subjacentia, ut in buphtalmo spinoso, involucrantia.

Obs. Synonyma *Magnolii* & *Tourn.* *huc* pertinent, *ex Linnæo*; ad bupht. 2, pertinere mihi visa sunt.

S E N E C I O.

Cal. *recept.* *papp.* *caul.* *fol.* Vide *Corollulae* omnes æquales.

- Vulgaris.* 1. SENECIO corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus 1-floribus sparsis. *b. m.* 439. *Le seneçon.*

Senecio vulgaris. *mag. Bot.* 238.

Senecio vulgaris sive erigeron. *mag. hort.* 183.

* PHARM. *Scenacionis* herba, succus, aqua. Vis emolliens, resolvens, extus doloribus articularibus aduersa. succus intus datur ad unc. II.

SYNGENESIA

POLYGAMIA NECESSARIA.

F I L A G O.

Cal. imbricatus. flosculi feminei inter squamas calycinis locati. recept. subvillosum. pappus o.

Herba. fol. mollis alterna. inflor. sessilis.

1. FILAGO floribus sessilibus terminalibus, foliis *Pygmaea.* floralibus majoribus. *b. m. 495.*
Gnaphalium umbellatum minimum. mag. Bot. 111.
Elichryso-gnaphalium roseum. mag. hort. 73.
2. FILAGO tomentosa corymbo subramoso, foliis *Muritima.* oblongis obtusis subcrenatis. *b. m. 465.*
Gnaphalium maritimum. mag. Bot. 110. hort. 89.
3. FILAGO calycibus pyramidatis pentagonis axillaribus, caule dichotomo erectiusculo. *b. m. 465.* *Germanica.*
L'herbe à cotton.
Gnaphalium vulgare majus. mag. Bot. 110.
Elichryso-gnaphalium vulgare majus. mag. hort. 73.
- * PHARM. *Gnaphalii vulgaris; seu herba impie herba. Vis vulneraria adstringens, pedis cati succedanea. Datur ad man. 1, in aquæ lib. 11. incocta.*
4. FILAGO floribus conicis terminalibus, axillarisbusque, caule erecto subdichotomo. *b. m. 465.* *Montana.*
Gnaphalium minus repens. mag. Bot. 111.
Elichryso-gnaphalium minus repens. mag. hort. 73.
5. FILAGO floribus conicis lateralibus, caule paniculato. *b. m. 465.* *Arvensis.*

M Y C R O P U S.

Recept. paleaceum. pappus o. cal. calyculatus. flosculi feminei à squamis calycinis involuti.

*Herba. fol. sparsa conferta integerrima.
inflor. sparsa sessilis.*

- Erectus.* 1. MYCROPUS caule erecto basi ramoso, calycibus edentulis solitariis. *Linn. sif. nat. 1236.*
Gnaphalium minus repens. mag. Bot. 111.
Elichryso-gnaphalium. mag. hort. 32.
Filago minor. Tour. 445.
Leontopodium verius Dioscoridis. Barr. icon. 296.
*HABITAT à la Colombiere, Selleneuve, Caunelles,
*S. George. Maio floret.**

DIE CIA SYNGENESIA. GNAPHALIUM.

*Cal. recept. papp. caul. fol. inflor. Vide
 suprà Syngenes. polygam. superfl.
 Mas. & feminei flores in distincta planta.*

- Dioicum.* 1. GNAPHALIUM caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, farmentis procumbentibus. *b. m. 435. Le pied de chat.*
 (Mas) elichrysum montanum folio rotundiore sub-purpureo. *Tour. 453.*
 Elichrysum montanum, sive pes cati. *mag. hort. 73.*
 (Femina) elichrysum montanum longiore folio & flore purpureo. *Tour. 453.*
 * PHARM. *Ggnaphalii, seu pedis cati flores, syrups, conserva. Vis vulneraria, adstringens, roborans, bechica.*



Classis XIV^a.

C O M P O S I T I
E X I R R E G U L A R I B U S.

S Y N G E N E S I A
P O L Y G A M I A Æ Q U A L I S.

TRAGOPOGON.

SCORZONERA.

PICRIS.

SONCHUS.

LACTUCA.

CHONDRILLA.

PRÆNANTHES.

LEONTODON.

HIERACIUM.

CREPIS.

ANDRYALA.

HYOSERIS.

HYPOCHÆRIS.

LAPSANA.

CATANANCHE.

CICHORIUM.

SCOLYMUS.



COMPOSITI EX IRREGULARIBUS.

SYNGENESIA POLYGAMIA AEQUALIS.

TRAGOPOGON.

Cal. simplex poliphyllus. *recept.* nudum.
pappus plumosus.

Herba. inflor. pedunculis longis unifloris
ad apicem incrassatis.

Hirsutum. 1. TRAGOPOGON calycibus corollâ brevioribus,
foliis ciliatis linear-lanceolatis strictis, caule hirto.
Tragopogon apulum humile hirsutum. *col. ecph.*
part. I. 233. *mag.* Bot. app. 306. *hort.* 198.

Tragopogon hirsutum. Baub. pin. 274. Tour. 477.
HABITAT à la Serane, à Lamalou, à l'Espinouse.

Facies tragopogonis crocifolii. Folia rigida ad
margines magis hirsuta : paginâ utrâque ferè
lævi. Biennie.

Pratense. 2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium
æquantibus, foliis integris strictis. *b. m.* 404.
La barbe de bouc.

Tragopogon pratense luteum majus. *mag.* Bot.
259. *hort.* 198.

* PHARM. *Barba birci* radix, herba. Vis diure-
tica, anticalculosa, antiherpetica, antitussi-
culosa.

Porrifolium. 3. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio lon-
gioribus, foliis integris strictis, *b. m.* 404. *Le-
sarsifi.*

Tragopogon purpuro-cæruleum porri folio, quod
artisi vulgo. *mag.* Bot. 259. *hort.* 198.

COMPOSITI EX IRREGULARIBUS. 343

- * PHARM. *Tragopogonis radix*, herba. Vis prioris.
- 4. TRAGOPOGON calycibus corollâ brevioribus
inermis, foliis lyrato-sinuatis, summis lan-
ceolatis integerrimis oppositis. b. m. 404.
Hieracium magnum dentis leonis folio, foliis
cichoraceis tomentosis. mag. hort. 98.
Chondrilla foliis cichoraceis tomentosis. mag.
Bot. 64.
- 5. TRAGOPOGON calycibus corollâ brevioribus *Picroides*.
aculeatis, foliis pinnato-hastatis. b. m. 405.
Sonchus asper laciniatus creticus. mag. Bot. 244.
hort. 187.
- 6. TRAGOPOGON calycibus corollâ brevioribus *Asperum*.
hispidis, foliis integris, caulinis oblongis. b. m.
405.
Sonchus asper folio subrotundo. mag. Bot. 244.
- 7. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio lon-
gioribus, foliis integris, radicalibus peduncu-
lisque basi villosis. b. m. 405.
Tragopogon purpuro-cæruleum crocifolium. mag.
Bot. app. 307. hort. 198.

SCORZONERA.

Cal. imbricatus : squamis margine mem-
branaceis : inferioribus cordatis. *recept.*
nudum. *pappus* plumosus.

Herba. inflor. terminalis : pedunculis
squamofisis.

- 1. SCORZONERA caule subnudo unifloro, foliis
nervosis planis. Linn. sist. nat. 1190.
Tragopogon, sive scorzonera angustifolia ger-
manica. mag. Bot. 261.
Scorzonera angustifolia prima Clusii. mag. hort.
181.
- 2. Tragopogon, sive scorzonera latifolia altera.
mag. Bot. app. 306.
- 3. Tragopogon, sive scorzonera humilis crassiore
folio. mag. Bot. app. 306. hort. 181.

- Hispanica.* 2. SCORZONERA caule ramoso, foliis amplexicaulis integris: inferioribus ferrulatis. b. m. 405. *La scorzonere des jardins.*
Tragopogon hispanicum, sive scorzonera. mag. Bot. 260.
Scorzonera latifolia sinuata. mag. hort. 161.
 * PHARM. *Scorzonera* radix, herba, florum & foliorum aqua stillatitia. Vis radicis deobstruens, antihypochondriaca, antiauriginosa, sudorifera, emmenagogica. *Aqua stillatitia* ab unc. iv ad unc. vi.
- Angustifolia.* 3. SCORZONERA foliis subulatis integris, pedunculo incrassato, caule basi villoso. b. m. 406.
- Laciniata.* 4. SCORZONERA foliis linearibus pinnatifidis. b. m. 406.
Tragopogon tenuissimè laciniatum. mag. Bot. 259.
Scorzonera coronopi folio. mag. hort. 161.
Tragopogon coronopifolium. Banh. pin. 274.
- Picroïdes.* 5. SCORZONERA foliis superioribus amplexicaulis integerrimis, inferioribus lyratis. b. m. 406.
La terregrepie.
Chondrillis affinis quædam laciniata, aut trinaciatella. mag. Bot. 64.
Sonchus lœvis angustifolius. mag. hort. 188.
 * PHARM. *Terracrepole* radix, herba. Vis refri-gerans, demulcens, lactifera, antiphlogistica.

P I C R I S.

Cal. calyculatus. *sem.* transversim sulcata.
recept. nudum. *pappus* plumosus.
Herba, aspera. *fol.* pilis punetisque pro-minulis scabra.

- Echioïdes.* 1. PICRIS perianthiis involucro maximo cinctis. b. m. 406.
Hieracium echoïdes capitulis cardui benedicti, mag. Bot. 131. hort. 98.

2. PICRIS perianthiis imbricatis nudis. *b. m.* 407. *Hieraciodes.*
Hieracium asperum majori flore in limitibus agro-
rum. *mag. Bot.* 131. *hort.* 98.

SONCHUS.

Cal. imbricatus ventricosus. *recept.* nu-
dum. *pappus* plumosus.

Herba. *fol.* incerta. *inflor.* incerta.

1. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis sub-
umbellatis, foliis basi cordatis. *b. m.* 407. *Arvensis.*
Hieracium minus sonchi folio, vel hieracium
sonchites. *mag. Bot.* 127.
Sonchus repens multis hieracium majus. *mag. hort.*
188.
Pedunculo nudo, foliis lanceolatis amplexicau- *β.* *Maritimus.*
libus indivisis retrorsum argutè dentatis. *Linn.*
sift. 1192.
2. SONCHUS pedunculis tomentosis, calycibus gla-
bris. *b. m.* 407. *Le laitron.*
Sonchus laevis laciniatus latifolius. *mag. Bot.* 244.
hort. 187.
3. Sonchus laciniatus & non laciniatus. *mag. Bot.* *Asper.*
244.
Sonchus asper non laciniatus. *mag. hort.* 186.
Sonchus laciniatus spinosus. *mag. hort.* 186.
* PHARM. *Sonchi laevis* herba. Vis scorzoneræ
nº. 5.
4. *Sonchi asperioris* herba. Vis eadem ac superioris.
5. SONCHUS pedunculis tomentosis, calycibus pilo-
sis. *b. m.* 407. *Tenerrimus.*
- Sonchus laevis in plurimas & tenuissimas laciniias
divisus. *mag. Bot.* 245. *hort.* 188.
6. SONCHUS pedunculis squamosis, floribus race-
mosis. *b. m.* 408. *Alpinus.*
7. SONCHUS pedunculo nudo, foliis lanceolatis
amplexicaulibus indivisis retrorsum argutè serra-
tis. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 1116. *sift. nat.* 1192.
Sonchus angustifolius maritimus. *mag. Bot.* 245.
hort. 188. *Tour.* 475.

HABITAT ad mare inter juncos, & in saxosis à
Selleneuve, Grabels, Caunelles.

L A C T U C A.

Cal. imbricatus cylindricus. *recept.* nu-
dum. *pappus* simplex stipitatus.

Herba. inflor. terminalis subpaniculata.

Satiæ. 1. LACTUCA foliis rotundatis, caule corymboso.
b. m. 408. *La laitue.*

Lactuca sativa. *mag. hort.* 109. & vulgaris capi-
tata. *ibid.*

$\beta.$ Lactuca rubra maculosa. *mag. hort.* 109.

$\gamma.$ Lactuca romana longa dulcis. *mag. hort.* 109.

$\delta.$ Lactuca crispa laciniata. *mag. hort.* 109.

* PHARM. *Lactuca* herba, femina. Vis refrige-
rans, anodina, diluens, lactifera, antiaphro-
disiaca

Virosa. 2. LACTUCA foliis carinâ aculeatis dentatis. *b. m.*
408.

Lactuca sylvestris odore viroso. *mag. Bot.* 148.
hort. 109.

Laciniata. $\beta.$ Lactuca sylvestris folio laciniato dorso spinoso.
mag. Bot. 148.

Lactuca sylvestris costâ spinosâ. *mag. hort.* 109.

Integrifolia. $\gamma.$ Lactuca sylvestris folio non laciniato. *mag. hort.*
109.

Saligna. 3. LACIUCA foliis hastato-linearibus sessilibus ca-
rinâ aculeatis. *b. m.* 408.

Lactuca sylvestris angusto & laciniato folio. *mag.*
Bot. 477. 298. *hort.* 109.

Perennis. 4. LACTUCA foliis linearibus dentato - pinnatis,
laciniis sursum dentatis. *b. m.* 409.

Chondrilla cærulea altera cichorii sylvestris folio.
mag. Bot. 63.

Lactuca perennis humilior flore cæruleo. *mag. hort.*
109.

CHONDRILLA.

Cal. calyculatus. *flosculi* multiplici serie.
recept. nudum. *pappus* simplex stipitatus.

Herba. rami rigidi virgati. *inflor.* axillaris aggregata.

1. CHONDRILLA. *b. m.* 409. *mag.* Bot. 62. *Juncæ.*
Lactuca perennis juncea viscosa arvensis. *mag.*
hort. 110.

PRENANTHES.

Cal. calyculatus. *flosculi* simplici serie.
recept. nudum. *pappus* simplex subsessilis.

Herba. *fol.* incerta. *inflor.* terminalis.

- OBS. Media inter lactucas, chondrillam, & sonchos.
2. PRENANTHES foliorum ramentis cauli adnatis. *Viminea.*
b. m. 409.
Chondrilla viscosa, caule foliis obducto. *mag.* Bot.
63. hort. 109.
2. PRENANTHES flosculis quinis, foliis lanceolatis *Purpurea.*
denticulatis. *b. m.* 409.
Lactuca sylvatica purpurea. *mag.* *hort.* 110.
3. PRENANTHES flosculis quinis, foliis lyrato-hastatis. *Muralis.*
b. m. 410.
Sonchus alter folio profundè laciniato sinuato heteraceo. *mag.* Bot. 244. *hort.* 187.

LEONTODON.

Cal. imbricatus squamis laxiusculis. *recept.* nudum. *pappus* plumosus.

Herba. scapus uniflorus. *fol.* radicalis, incerta.

- Taraxacum.* 1. LEONTODON calyce infernè reflexo. *b. m. 410.*
La dent de lion.
 Dens leonis vulgi, sive urinaria. *mag. Bot. 85.*
 Dens leonis latiore folio. *mag. hort. 69.*
- Rotundifolium.* 2. Dens leonis rotundiore folio. *mag. Bot. 85. hort. 69.*
- Tenuissimum.* 2. Dens leonis folio tenuissimo? *mag. Bot. 86?* *hort. 69?*
- Angustissimum.* 2. Dens leonis angustissimo folio. *mag. hort. 69.*
 * PHARM. *Taraxaci radix, herba, succus, extractum. Vis vulneraria, febrifuga, diuretica! antihypochondriaca, deobstruens, antiauriginosa.. succus ad unc. III. IV.. herba ad man. in aquæ lib. II.. radix ad unc. I, in juscule, in aquæ communis lib. II.. extractum ad drach. I.*
- Bulbosum.* 2. LEONTODON foliis oblongo-ovatis subdentatis glabris, calycibus levibus, pedunculis hirtis. *b. m. 410.*
 Chondrilla pusilla maritima bulbosa. *mag. Bot. 64. hort. 69.*
- Autumnale.* 3. LEONTODON calycibus erectis, pedunculis squamosis, foliis glabris dentatis integerrimis. *b. m. 410.*
 Hieracium chondrillæ folio, radice succisâ majus folio glabro. *mag. Bot. 127. hort. 97.*
 HABITAT frequens à Lattes. Scapus ramosus multiflorus. Folia lactucæ perennis folio simillima.
- Tuberosum.* 4. LEONTODON foliis dentatis hirsutis, calyce erecto acuto. *b. m. 411.*
 Dens leonis Monspeliensium asphodeli bulbulis. *mag. Bot. 86. hort. 69.*
- Hispidum.* 5. LEONTODON calyce toto erecto hispido, foliis dentatis integerrimis hispidis, setis furcatis. *b. m. 411.*
 Leontodon pedunculo incrassato striato. *Gerard. gall. 164.*
 Dens leonis foliis hirsutis & asperis. *mag. hort. 69.*
 Hieracium caule aphyllum hirsutum. *mag. Bot. 130.*
2. Dens leonis foliis hirsutis & asperis, saxatilis. *mag. hort. 69.*

- Hieracium dentis leonis folio, hirsutie asperum
minus laciniatum. *mag.* *Bot.* 130.
2. Dens leonis minor folio aspero. *mag.* *Bot.* 86.
6. LEONTODON calyce toto erecto leviusculo, *Hirtum.*
foliis dentatis hirtis, setis simplicissimis. *b. m.*

411.

- Hieracium hirsutum parvum, caule aphylo. *mag.*
Bot. 131.

- Dens leonis foliis minimis hirsutis & asperis. *mag.*
hort. 69.

- Hieracium pumilum saxatile radice præmorsâ. *Bauh.*
prod. 66.

HIERACIUM.

Cal. imbricatus ovatus. *recept.* nudum.
pappus simplex sessilis.

Caul. incerta. *inflor.* incerta. *fol.* etiam
incerta.

* Scapo unifloro.

1. HIERACIUM foliis dentatis viscidis hirsutis sub- *Hedypnoïdes*
asperis, scapo unifloro, calyce hirto. *b. m.* 412.
Hieracium montanum laciniatum lanuginoso folio.
mag. *Bot.* app. 298. *hort.* 98.

2. HIERACIUM foliis oblongis integris dentatis, *Alpinum.*
scapo unifloro, calyce piloso. *b. m.* 412.

3. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis, caule re-
pente, scapo unifloro. *b. m.* 412. *La piloselle.*
Pilosella major repens hirsuta. *mag.* *Bot.* 204. *hort.*

159.

- * PHARM. *Auriculae muris*, seu *pilosella* herba,
succus. Vis vulneraria adstringens, antiherniosa,
antidiarrhoica, antiherpetica, antiscabiosa.. *suc-*
cus depuratus ab unc. IV ad VI.

** Scapo multifloro.

4. HIERACIUM foliis integris ovato-oblongis, sto- *Dubium.*
lonibus repentibus, scapo multifloro. *b. m.* 412.

Pilosella folio angustiore minus piloso, minor repens. mag. hort. 159.

Przemorsum. 5. HIERACIUM foliis ovatis subdentatis, scapo ramoso, floribus superioribus primoribus. b. m. 413.

Pilosella major erecta. mag. Bot. 204.

Hieracium pilosum umbellatum luteum. mag. hort. 98.

*** *Caule folioso.*

Murorum. 6. HIERACIUM caule ramoso folioso, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minori. b. m. 413.

Hieracium murorum folio pilosissimo. mag. Bot. 131. hort. 98.

Sylvaticum. 8. Hieracium murorum angustifolium laciniatum minus. mag. Bot. 132.

Hieracium murorum laciniatum minus pilosum. mag. hort. 98.

7. Hieracium murorum minus folio non maculoso. Tour. inst. 471.

9. Hieracium murorum angustifolium non sinuatum. Tour. inst. 471.

* PHARM. *Pulmonariae Gallorum* herba, succus. Vis pulmonaria officinalis.

Umbellatum. 7. HIERACIUM foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. b. m. 413.

Hieracium fruticosum angustifolium majus. mag. Bot. 131. hort. 99.

8. Hieracium fruticosum latifolium dentatum glabrum. mag. Bot. 298. hort. 98.

Paludosum. 8. HIERACIUM caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. Linn. sp. pl. edit. 2^a. 1129.

Hieracium montanum majus latifolium. Baub. hist. 2. 1032.

Hieracium montanum latifolium glabrum majus. Tour. 471.

9. Hieracium montanum latifolium glabrum ex valle griesbachiana. Baub. hist. 2. 1033.

Hieracium montanum latifolium glabrum minus.

Tour. 471.

HABITAT in ingressu antri dicti Bramebiou, & in saxosis humidis ultra antrum.

9. HIERACIUM foliis amplexicaulibus cordatis sub-dentatis, pedunculis unifloris hirsutis, caule ramoso. Linn. sp. pl. 1129. *Amplexicaule.*

Hieracium pyrenaicum longifolium amplexicaule.

Tour. 472.

10. Hieracium pyrenaicum rotundifolium amplexicaule. Tour. 472.

HABITAT cum priori; & à Meyrueis.

10. HIERACIUM caule ramoso folioso, foliis hirtis, radicalibus lanceolato-ovatis dentatis, caulinis amplexicaulibus. Linn. sp. pl. edit. 1130. Jacquin. vind. 271. *Villosum.*

Hieracium alpinum latifolium magno flore. Bauh. pin. 128. Tour. 472.

HABITAT cum prioribus. Folia inferiora pilis longis albis vestita, lanceolata vix dentata, pedunculi incani, calyces laxi valde pilosi.

C R E P I S.

Cal. calyculatus, squamis deciduis. *recept.* nudum. *pappus* plumosus stipitatus.

Herba. *fol.* simplex aspera. *inflor.* terminalis sessilis.

1. CREPIS bracteis calyce longioribus, squamis setaceis sparsis. *b. m.* 414. *Barbata.*

Hieracium proliferum falcatum duodecimum. *mag.* Bot. 129. *hort.* 97.

2. CREPIS foliis amplexicaulibus lanceolatis, omnibus dentatis, radicalibus sinuatis. *b. m.* 414. *Rubra.*

Hieracium apulum flore suave-rubente. *mag.* *hort.* 97.

3. CREPIS foliis sagittatis dentatis, pedunculis superne turbinato-inflatis, calycibus pyramidatis angulatis. *b. m.* 414. *Pulchra.*

- Biennis.* 4. *CREPIS* foliis pinnato-hastatis scabris, basi superne dentatis, calycibus muricatis. *b. m. 414.*
Hieracium chondrillæ folio hirsutum. mag. Bot. 127. hort. 67.
- Fœtida.* 5. *CREPIS* foliis pinnatis angulatis, petiolis dentatis. *b. m. 414.*
Hieracium foliis cichorii sylvestris villosis, odore castorei. mag. Bot. 129. icon. 128. hort. 97.

A N D R Y A L A.

Cal. multipartitus rotundatus subvillosus
 subæqualis. *recept.* villosum. *pappus* simplex sessilis.

Herba. *fol.* mollis. *inflor.* subfastigiata,
 terminalis.

- Integrifolia.* 1. *ANDRYALA* foliis integerrimis. *b. m. 415.*
Sonchus villosus luteus major. mag. Bot. 245.
Hieracium villosum, sonchus lanatus Dalechampii dictus. mag. hort. 97.
- Sinuata.* 2. *ANDRYALA* foliis dentato-hastatis. *b. m. 415.*
HABITAT frequens ad margines sepium à Gramont.

H Y O S E R I S.

Cal. subæqualis. *recept.* nudum. *pappus* pilosus vel obsoletus.

Herba. *fol.* incerta. *inflor.* rigida terminalis solitaria.

* *Scapo unifloro, simplici aut ramoso.*

- Fœtida.* 1. *HYOSERIS* scapis simplicissimis unifloris, foliis pinnatifidis, seminibus nudis. *b. m. 415.*
Dens leonis tenuissimo folio. mag. Bot. 86. hort. 69.
- Radiata.* 2. *HYOSERIS* scapis unifloris, foliis glabris, lyrato-hastatis angulatis. *b. m. 415.*
Dens leonis minor foliis radiatis. mag. Bot. 295. hort. 69.
3. *HYOSERIS*

3. HYOSERIS scapo diviso nudo bifloro , peduncu- *Minima.*
lis divaricatis. *b. m.* 416.

** *Caule folioso.*

4. HYOSERIS fructibus subglobosis glabris , caule *Hedypnois.*
ramoso. *b. m.* 416.
Hieracium capitulum inclinans semine adunco.
mag. Bot. 129.
Cichoriis affinis , seu hieracium capitulum incli-
nans , semine adunco. *mag. hort.* 56.

H Y P O C H Æ R I S.

Cal. subimbricatus. *recept.* paleaceum.
pappus plumosus.

Herba. *fol.* radicalis simplex. *inflor.* pe-
dunculis flexilibus.

1. HYPOCHÆRIS caule subnudo , ramo solitario , *Maculata.*
foliis ovato - oblongis integris dentatis. *b. m.*
416.
Hieracium primum latifolium. *mag. Bot.* 131.
Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum.
mag. hort. 98.
2. HYPOCHÆRIS calycibus oblongis imbricatis , *Glabra.*
caule ramoso nudo , foliis dentato-sinuatis. *b. m.*
417.
3. HYPOCHÆRIS foliis dentato-sinuatis scabris , *Radicata.*
caule ramoso nudo , pedunculis squamosis. *b. m.*
417.
Hieracium dentis leonis folio obtuso majus. *mag.*
Bot. 130. *hort.* 98.
4. Hieracium minus dentis leonis folio subaspero.
mag. Bot. 130. *hort.*
5. Dens leonis minor folio aspero. *mag. Bot.* 86.
6. Hieracium dentis leonis folio bulbosum. *mag. Bot.*
130. *hort.* 98. *Tour.* 472.

L A P S A N A.

Cal. calyculatus. *recept.* paleaceum. *pappus* aristatus, calyculo quinqueseto.
Herba. *fol.* simplex. *inflor.* incerta.

Communis. 1. LAPSANA calycibus fructūs angulatis, pedunculis ramosissimis tenuibus. *b. m.* 417.

Soncho affinis lapsana domestica. *mag. Bot.* 245.
Cichoriis affinis lapsana domestica. *mag. hort.* 56.

* PHARM. *Lapsana vulgaris* herba. Vis intus refrigerans, emolliens, extus vulneraria, mundificans, antiherpetica.

Zacintha. 2. LAPSANA calycibus fructūs torulosis depresso obtusis sessilibus. *b. m.* 417.

Cichoriis affinis, zacintha, seu cichorium verrucosum. *mag. hort.* 56.

Stellata. 3. LAPSANA calycibus fructūs undique patentibus, radiis subulatis, foliis lanceolatis indivisis. *b. m.* 417.

Hieracium siliquā falcatā. *mag. Bot.* 129.

Cichoriis affinis, hieracium siliquā falcatā. *mag. hort.* 56.

Capillaris. 4. LAPSANA seminibus papposis, foliis radicalibus lanceolatis obtusis subdentatis, caulinis hastatis, caule filiformi. *b. m.* 418.

C A T A N A N C H E.

Cal. imbricatus scariosus. *recept.* paleaceum. *pappus* aristatus calyculo quinqueseto.

Herba. *fol.* mollis. *inflor.* scapo subnudo unifloro longissimo.

Cerulea. 1. CATANANCHE squamis calycinis inferioribus ovatis. *La cupidone.* *b. m.* 418.

Chondrilla cœrulea cyani capitulo. *mag. Bot.* 64.

- Catananche flore cyani , folio coronopi. mag.
hort. 48.
- ¶. Chondrilla sesamoïdes dicta flore completo. mag.
Bot. 64.
- Catananche flore cyani , pleno. mag. hort. 48.

C I C H O R I U M.

Cal. calyculatus. recept. paleaceum. pap-
pus. margo quinque-dentatus.

Herba. fol. simplex. inflor. sessilis sparsa
aggesta.

1. CICHORIUM caule simplici ramoso , floribus confertis : omnibus sessilibus. b. m. 419. *Linn.* *Intybus.*
sist. nat. 1197. La chicorée.
Cichorium sylvestre , seu officinarum. mag. Bot.
65. hort. 55.
- ¶. Cichorium sylvestre officinarum flore albo. mag.
hort. 55.
- * PHARM. *Cichorii herba , succus , syrupus , aqua.*
Vis deobstruens , antiauriginosa , anticacheætica ,
stomachica , antimelancholica , antihectica , an-
tihypochondriaca. Herba ad man. i , in decocti
lib. ii , aut jusculo. succus depuratus ad unc.
III - IV. syrupus simplex & compositus cum rheo
ab unc. fl. ad unc. ii.
2. CICHORIUM caule simplici , floribus sessilibus confertis solitariisque strictè pedunculatis. *Linn.* *Endivia.*
sist. nat. L'endive.
Cichorium latifolium , seu endivia vulgaris. mag.
hort. 55.
- ¶. Cichorium angustifolium , sive endivia angusti-
folia. mag. hort. 55.
- v. Cichorium crispum. mag. hort. 55.
- * PHARM. *Endivia herba. Vis prioris.*

S C O L Y M U S.


Cal. imbricatus spinosus. *recept.* paleaceum. *pappus* nullus.

Herba. fol. spinosa. *inflor.* axillaris solitaria sessilis.

Maculatus. 1. SCOLYMUS foliis margine attenuatis. *b. m.* 419.
Scolymus chrysanthemos annuus. *mag. Bot.* 233.
hort. 181.

HABITAT *au pont de Villeneuve.*

Hispanicus. 2. SCOLYMUS foliis margine incrassatis. *b. m.* 419.
L'épine jaune.
Scolymus Theophrasti. *mag. Bot.* 233. *hort.* 180.



Classis XV^a.

C O M P O S I T I
 E X R E G U L A R I B U S
 E T I R R E G U L A R I B U S.

S Y N G E N E S I A

P O L Y G A M I A S U P E R F L U A,

ERIGERON.

TUSSILAGO.

SENECIO.

ASTER.

SOLIDAGO.

INULA.

ARNICA.

DORONICUM.

BELLIS.

TAGETES.

CHRYSANTHEMUM.

MATRICARIA.

ANTHEMIS.

ACHILLÆA.

SUPHTALMUM.

358 COMPOSITI EX REGUL. ET IRREG.

SYNGENESIA

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

HELIANTHUS.


CENTAUREA.

SYNGENESIA

POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDULA.

OTHONNA.



COMPOSITI
EX REGULARIBUS
ET IRREGULARIBUS.

SYNGENESIA
POLYGAMIA SUPERFLUA.

ERIGERON.

Cor. radii lineares angustissimæ. *recep.*
nudum. *pappus* pilosus.

Herba. *rad.* incerta. *fol.* simplicissima.
inflor. incerta terminalis.

1. ERIGERON pedunculis unifloris lateralibus, ca- *Viscosum.*
lycibus squarrosis. *b. m.* 437.
Conyzas Monspeliensium odorata. *mag. Bot.*
75.
Virga aurea foliis glutinosis & graveolentibus. *mag.*
hort. 206.
* PHARM. *Virga aurea glutinosa* herba. Vis extus
antiulcerosa! antiædematosa.
2. ERIGERON ramis lateralibus multifloris, caly- *graveolens.*
cibus squarrosis. *b. m.* 437.
Conyzas minor vera. *mag. Bot.* 75.
Virga aurea annua foliis glutinosis & graveolen-
tibus. *mag. hort.* 206.
3. ERIGERON caule floribusque paniculatis, foliis *Canadense.*
linearibus ciliatis confertis. *b. m.* 437.
Virga annua virginiana Zanoni. *mag. hort.* 206.
4. ERIGERON pedunculis alternis unifloris. *b. m.* *Acre.*
438.

Conyza cærulea acris. mag. Bot. 78.

Aster arvensis cæruleus acris. mag. hort. 26.

- Siculum.* 5. ERIGERON squamis calycinis inferioribus laxis , florem superantibus. b. m. 438.

Conyza caulis rubentibus tenuioribus , flore luteo nudo. mag. Bot. 77. icon. 78. hort. 62.

- Tuberosum.* 6. ERIGERON foliis lanceolatis , ramis unifloris , caule suffruticoso. b. m. 438.

Conyza tuberosa lutea , foliis angustis & rigidis. mag. Bot. 77.

- Alpinum.* 7. ERIGERON caule subbifloro , calyce hirsuto. Linn. sp. pl. edit. 2^a. 1211.

Aster atticus cæruleus major. Tour. 481.

HABITAT in saxosis ultra Meyrueis ad dexteram , juxta amnem.

T U S S I L A G O .

Cal. squamæ æquales , discum æquantes submembranaceæ. *recept.* nudum. *apus* simplex.

Herba. rad. stolonifera. *inflor.* scapo unifloro. *fol.* simplicissima.

- Alpina.* 1. TUSSILAGO scapo subnudo unifloro , foliis cordato-orbiculatis crenatis. b. m. 438.

- Farfara.* 2. TUSSILAGO scapo imbricato unifloro , foliis subcordato - angulatis denticulatis. b. m. 439. *Le tussilage.*

Tussilago vulgaris. mag. Bot. 272. hort. 201.

* PHARM. *Tussilaginis seu farfaræ radix , herba , flores , aqua , syrpus , conserva.* Vis thorachica , antiaſthmatica , antitussiculosa , antiptysica. *Folia , flores ad man.* fl. incocta in aquæ pinta.. *syrpus* ab unc. fl. ad unc. 1.. *aqua* ab unc. vi.. *conservæ* ad unc. fl.

S E N E C I O .

Cal. cylindricus , calyculatus , squamis

apice sphacelatis. recept. nudum. *pappus* simplex.

Herba. fol. incerta, sessilis. inflor. terminalis pedunculata.

* *Radio revoluta.*

2. SENEPIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis *Viscosus.*
viscidis, squamis calycinis laxis longitudine
perianthii. *b. m.* 439.
Jacobaea prima pannonica. mag. Bot. 139. hort.
104.
3. SENEPIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis *Sylvaticus.*
denticulatis, caule erecto corymboso. *b. m.*
439.
Jacobaea senecionis folio. mag. Bot. 139. hort. 104.
- ** *Floribus radiatis, radio patente,*
foliis pinnatifidis.
4. SENEPIO corollis radiantibus, foliis utrinque *Incanus.*
tomentosis semipinnatis, laciniis subdentatis,
corymbo subrotundo. *b. m.* 440.
Jacobaea alpina minor. Barr. ic. 262. n. 1.
Jacobaea alpina pumila. Bocc. mus. 2. tab. 8.
5. SENEPIO corollis radiantibus, foliis pinnato- *Abrotanifo-*
multifidis linearibus. *b. m.* 440. *lius.*
Jacobaea foliis ferulaceis. mag. hort. 104.
Ageratum annum foliis fæniculaceis. mag. hort. 7.
OCCURRIT quandoque à Caunelles ad dexteram,
in elato colle.
6. SENEPIO corollis radiantibus, foliis pinnato- *Jacobaea.*
lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. *b. m.*
440. *La jacobée.*
Jacobaea vulgaris laciniata. mag. Bot. 138. hort.
104.
7. *Jacobaea foliis quercūs tenuifoliæ instar divisis.*
mag. hort. 104.
7. *Jacobaea vulgaris foliis instar erucæ laciniatis.*
Tour. 485.

1. Jacobæa vulgaris foliis ad raphanum accedenti-
bus. *Tour.* 485.
2. Jacobæa vulgaris latifolia palustris sive aquatica.
Tour. 485.
- * PHARM. *Jacobæa* herba. Vis extus vulneraria,
antiulcerosa.

*** *Corollis: radio patente, foliis
indivisis.*

Doria. 7. SENEPIO corollis radiantibus, floribus corym-
bosis, foliis lanceolatis. *Virga aurea major vel
doria.* *mag. Bot.* 279.

Jacobæa pratensis altissima limonii folio. *mag.
hort.* 104.

Nemorensis. 8. SENEPIO corollis radiantibus octonis, foliis lan-
ceolatis biserratis subtus villosis, caule ramoso.
b. m. 441.

Sarracenicus. 9. SENEPIO corollis radiantibus, floribus corym-
bosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis.
b. m. 441.

Virga aurea angustifolia ferrata. *mag. hort.* 205.

Doronicum. 10. SENEPIO corollis radiantibus, caule indiviso
unifloro, foliis integris, radicalibus ovatis sub-
tus villosis. *b. m.* 441.

(Incanum) foliis lanceolatis subdentatis utrinque
tomentosis.

Doronicum helveticum incanum. *Baub. pin.* 185.
prodr. 97.

(Doronicum) foliis glabris, radicalibus subtus
tomentosis. *Gerard. gallop. ic.* pag. 196.

Doronicum integro & crasso hieracii folio. *mag.
Bot.* 295. *hort.* 70.

A S T E R.

Cal. imbricatus: squamis inferioribus pa-
tulis. *cor. radii* plures 10. *recept.* nu-
dum. *pappus simplex.*

Herba. fol. alterna simplex. inflor. terminalis, incerta.

* *Integrifolii, pedunculis nudis.*

1. ASTER foliis lanceolatis hirtis, radicalibus obtusis, caule simplicissimo unifloro. *b. m. 442.* *Alpinus.*
2. ASTER foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris, ramis inaequatis, floribus corymbosif. *b. m. 442.* *Tripolium.*

Aster maritimus cæruleus palustris salicis folio. mag. hort.

Tripolium majus. mag. Bot. 271.

* *Tripolium minus. mag. Bot. 271.*

3. ASTER foliis lanceolatis obtusis scabris trinerviis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis. *b. m. 442.* *Amellus.*

Aster atticus cæruleus vulgaris. mag. hort. 24.

** *Integrifolii, pedunculis squamosis.*

4. ASTER foliis lanceolato-linearibus subcarnosis integrimis planis, floribus corymbosis fastigiatis, pedunculis foliolosis. *b. m. 442.* *Sedifolius.*

Aster atticus monspeliensis purpureus, angustioribus foliis. mag. Bot. 32.

Aster tripolii flore. mag. hort. 24.

Aster acris. Linn. sp. pl. edit. 2^a. pag. 1228.

S O L I D A G O.

Cal. imbricatus: squamis clausis. cor. radii circiter, 5.. recept. nudum. pappus simplex.

Herba. fol. simplex alterna. inflor. subracemososa.

1. SOLIDAGO caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *b. m. 444.* *La verge d'or.* *Virga aurea.*

Virga aurea latifolia vulgaris. mag. Bot. 279. hort. 205.

¶. *Virga aurea latifolia serrata. mag. hort. 205.*

* PHARM. *Virgæ aureæ majoris herba*, flores, aqua. Vis vulneraria diuretica, anticalculosa, deobstruens, antihydropica, antiulcerata. *Flores & folia ad pug. I. in aquæ cyathis II.. aqua ab unc. IV. ad unc. VI.*

Montana. 2. *SOLIDAGO* foliis lanceolatis ferratis decurrentibus, caule angulato. *b. m. 444.*

Alpina. 3. *SOLIDAGO* foliis cordatis petiolatis dentatis. *b. m. 444.*

Jacobæa tertia latifolia, prima Clusii. mag. Bot. 139. hort. 104.

I N U L A.

Recept. nudum. pappus simplex. antheræ basi in setas duas desinentes.

Herba. fol. simplex, incerta. inflor. terminalis solitaria.

Oculus Christi. 1. *INULA* foliis oblongis integris hirsutis, caule corymboso piloso, floribus confertis. *b. m. 444.*

Aster pannonicus lanuginosus luteus. mag. hort. 26.

Dysenterica. 2. *INULA* foliis oblongis, caule hirsuto paniculato, squamis calycinis setaceis. *b. m. 445.*

Conyza media asteris flore luteo. mag. Bot. 77.

Aster pratensis autumnalis, conyzæ folio. mag. hort. 26.

Pulicaria. 3. *INULA* foliis undulatis amplexicaulibus, caule prostrato. *b. m. 445. erectoque.*

Aster palustris parvo flore globoso. mag. hort. 26.

Conyza minima. mag. Bot. 77.

Salicina. 4. *INULA* foliis lanceolatis recurvis ferrato-ciliatis, floribus solitariis, ramis angulatis. *b. m. 445.*

Aster montanus luteus salicis glabro folio. mag. Bot. 32. hort. 25.

Chritmoëdes. 5. *INULA* foliis linearibus carnosis tricuspidatis, integrisque. *b. m. 445.*

Chritmum maritimum flore alteris attici. *mag.*

Bot. 80.

Aster maritimus folio tereti crassio tridentato. *mag.*

hort. 26.

6. INULA foliis lanceolatis villosis integerrimis, *Montana.*
caule unifloro. *b. m. 445.*

Aster atticus luteus montanus villosus, flore ma-
gno. *mag. Bot. 32. hort. 25.*

HABITAT frequens in pinetis à Montferrier, teste
D. Clapiers.

ARNICA.

Corollulæ radii filamentis 5 absque an-
theris. *recept. nudum. pappus simplex.*

Herba. rad. subtuberosa, stolonifera. in-
flor. solitaria terminalis.

1. ARNICA foliis ovatis integris, caulinis geminis *Montana*
oppositis. *b. m. 446. La betoine de montagne.*

Doronicum plantaginis folio alterum. *mag. hort. 70.*

* PHARM. *Arnica* herba, flores. Vis resolvens,
narcotica, errhina, vomitoria, antiechymoma-
tosa, antiepileptica.

2. ARNICA foliis alternis serratis. *b. m. 446.*

8. Doronicum radice dulci. *mag. hort. 70.*

Scorpioïdes.

DORONICUM.

Calycis squamæ duplicis ordinis æqualis,
disco longiores. *sem. radii pappo desti-*
tuta. recept. nudum. pappus simplex.

Herba. rad. subtuberosa stolonifera. inflor.
terminalis, incerta.

1. DORONICUM foliis cordatis obtusis, radicali-
bus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *b. m.*
446. Le doronic.

Pardalian-
ches.

Doronicum maximum foliis caulem amplexanti-
bus. *mag. hort. 70.*

B. Doronicum radice scorpii. *mag. hort.* 70.

* PHARM. *Doronicum* radix. Vis *arnicae*, antivertiginosa, anticolicalis, cautè usurpanda.

Plantagineum. 2. DORONICUM foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alternis. *b. m.* 446.

Doronicum folio ferè plantaginis oblongo. *Bauh. hist.* 3. pag. 18.

Bellidium. 3. DORONICUM caule nudo simplicissimo unifloro. *b. m.* 447.

Bellis sylvestris media caule carens. *mag. Bot.* 37. *hort.* 31.

B E L L I S.

Cal. hemisphæricus : squamis æqualibus.
sem. subovata. *recept.* nudum conicum.
pappus nullus.

Herba. *rad.* fibrosa. *inflor.* terminalis longè pedunculata. *fol.* simplex.

Perennis. 1. BELLIS scapo nudo simplicissimo unifloro, foliis spathulatis. *b. m.* 447. *La paquerette.*

Bellis sylvestris minor. *mag. Bot.* 37. *hort.* 31.

* PHARM. *Bellidis minoris* flores, herba, succus. Vis *vulneraria*, *eccoprotica*, resolvens. *succus* ad unc. iv.. *flores & folia* ad man. i. in aquæ lib. ii, aut in juscuso.

Annua. 2. BELLIS caule subsimplici subquadrifloro, foliis obovatis denticulatis. *b. m.* 447.

Bellis minima annua. *Tour.* 491.

T A G E T E S.

Cal. 1 - phyllus, 5 - dentatus tubulosus.
flosculi radii 5 persistentes. *recept.* nudum. *pappus* aristis 5 erectis.

Herba. *fol.* impari-pinnata : foliolis, laciniisque setulâ terminatis.

Patula. 1. TAGETES caule subdiviso diffuso. *b. m.* 447. *L'œillet d'Inde.*

Tagetes indicus minor flore simplici. *mag.* *hort.*

191.

s. Tagetes indicus minor flore multiplicato. *mag.*
hort. *191.*

2. TAGETES caule erecto subsimplici. *b.* *m.* 448. *Erecta.*
L'œillet d'Inde à grandes fleurs.

Tagetes indicus rectus maximus flore simplici. *mag.*
hort. *191.*

s. Tagetes indicus rectus flore maximo multiplicato. *mag.* *hort.* *191.*

CHRYSANTHEMUM.

Cal. hemisphæricus imbricatus : squamis marginalibus membranaceis. *recept.* nudum. *pappus* nullus.

Herba. *fol.* incerta. *inflor.* terminalis incerta.

* *Leucanthema, radio florum albo.*

1. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus oblongis, superne ferratis, inferne dentatis. *b.* *m.* 448. *La grande paquerette.* *Leucanthemum.*

Bellis sylvestris caule folioso major. *mag.* *Bot.* 36.
hort. 31.

s. Bellis montana folio obtuso crenato. *mag.* *Bot.* 36.
hort. 31.

2. Bellis montana minor. *mag.* *hort.* 31 ? *Bot.* 36 ?

3. Bellis sylvestris caule folioso hirsuto, major. *mag.*
hort. 31.

* PHARM. *Bellidis majoris* herba. Vis diuretica, vulneraria, sputo purulento adversa, antiasthmatica, extus antitinealis. Datur in decocto aquoso, cerevisiali, laet eo, & in infuso ex aqua calcis.

2. CHRYSANTHEMUM foliis imis spathulato-lanceolatis ferratis, summis linearibus ligulatis. *b.* *m.* 448. *Montanum.*

Bellis montana minor. *mag.* *hort.* 31. *mag.* *Bot.* 36.

Graminifolium.

3. *CHRYSANTHEMUM* foliis linearibus subintegerimis. *b. m.* 448.

Bellis montana gramineo folio. *mag. Bot.* 291. *hort.* 31. *tab.* 30.

- Monspeliense.* 4. *CHRYSANTHEMUM* foliis imis spalmatis, foliolis linearibus pinnatifidis. *b. m.* 448.

Bellis montana major foliis chrysanthemi creticangustioribus. *mag. Bot. app.* 306. *hort.* 31. *tab.* 30.

- Corymbosum.* 5. *CHRYSANTHEMUM* foliis pinnatis inciso-serratis, caule multifloro. *b. m.* 449.

Tanacetum montanum inodorum, minori flore. *mag. Bot.* 248.

Matricaria tanaceti folio, flore minore, semine umbilicato. *mag. hort.* 131.

- Alpinum.* 6. *CHRYSANTHEMUM* foliis pinnatifidis: laciniis parallelis integris, caulibus unifloris. *Linn. sist. nat.* 1221.

Leucanthemum alpinum foliis coronopi. *Tour.* 493.

Leucanthemum alpinum angustifolium. *Barr. ic.* 458. n. 2.

HABITAT à l'Esperou, Lamalou. Altitudo palmaris.

M A T R I C A R I A.

Cal. hemisphæricus imbricatus: marginilibus solidis, acutiusculis. *recept.* nudum. *pappus nullus.*

Herba. *rad.* ramosa. *fol.* & *inflor.* incerta.

- Parthenium.* 1. *MATRICARIA* foliis compositis planis, foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis. *b. m.* 449. *La matricaire.*

Matricaria vulgaris, seu *sativa*. *mag. hort.* 131.

- * PHARM. *Matricariae* herba, aqua, oleum stillatitium, flores. Vis emmenagogia, lactifuga, antihysterica, orexica, torminibus infantum adversa, extus antihæmiceranica. Datur in pulvere à scrup. ss. ad scrup. ii.. *succus ab unc.* i. *ad unc.* ii.. *decoctum*

2. MATRICARIA receptaculis conicis , radiis pa- *Chamomilla.*
 tentibus , seminibus nudis , squamis calycinis mar-
 gine æqualibus. *b. m. 450.* *La camomille.*
 Chamæmelum vulgare , seu leucanthemum Dio-
 scoridis. *mag. Bot. ? 60. hort. 53?*
- * PHARM. *Camomillæ nostratis* herba , flores , aqua ,
 oleum. Vis febrifuga anticolicalis , anticardial-
 gica , anticalculosa , vomitui gravidarum ad-
 versa.
3. MATRICARIA receptaculis hemisphæricis , radiis *Inodore.*
 patentibus , seminibus coronato - marginatis ,
 squamis calycinis margine obsoletis. *b. m. 450.*
 Chamæmelum vulgare , seu leucanthemum Diofco-
 ridis. *mag. Bot. 60. hort. 53.*

A N T H E M I S.

Cal. hemisphæricus subæqualis. *flosculi*
 radii plures quam 5. *recept.* paleaceum.
pappus nullus.

Herba. *rad.* ramosa. *fol.* alterna multifida , vel pinnata.

* *Radio dicolore , seu albo:*

1. ANTHEMIS erecta , foliorum apicibus subspino- *Altissima.*
 sis. *b. m. 450.*
 Chamæmelum leucanthemum hispanicum magno
 flore. *Bauh. pin. 135. mag. hort. 53.*
- Chamæmelo affine buphtalmum italicum segetum
 altissimum. *mag. Bot. 60.*
2. ANTHEMIS foliis pinnatifidis denticulatis cár- *Maritima:*
 nosis , caule ramoso. *b. m. 451.*
 Chamæmelum maritimum , cotula quibusdam.
mag. Bot. 61.
- Chamæmelum maritimum. *mag. hort. 53.*
3. ANTHEMIS receptaculis conicis , paleis fétaceis , *Cotula.*
 seminibus nulis. *b. m. 451.*

Chamæmelum fœtidum. *mag. Bot.* 61.

Chamæmelum fœtidum , sive cotula fœtida. *mag. hort.* 53.

* PHARM. *Cotula fœtida* herba , flores. Vis anti-hysterica , antiepileptica , antihydropica , caute usurpanda.

Arvensis. 4. ANTHEMIS receptaculis paleaceis conicis , paleis setaceis , seminibus coronato - marginatis. *b. m.* 451.

Chamæmelum inodorum. *mag. Bot.* 60.

Chamæmelum inodorum , sive cotula non fœtida. *mag. hort.* 53.

Pyrethrum. 5. ANTHEMIS caulis simplicibus unifloris decumbentibus , foliis pinnato - multifidis. *b. m.* 451.

* PHARM. *Pyrethri veri* radix. Vis sialagoga , errhina , antiiodontalgica , linguæ paralyfi adversa.

Alpina. 6. ANTHEMIS caulinis unifloris longissimis subnudis. *Linn. amœn. Acad. tom.* 4. *p. 330. sp. pl. ed.* 2^a. 1261. *cent.* 195. *sist. nat.* 1223.

Chamæmelum alpinum saxatile perenne , flore albo singulari , calyce nigricante. *Seguier ver.* 3. *p. 282.*

Anthemis fruticosa , foliolis linearibus carnosis , pedunculis longioribus nudis erectis unifloris. *Gerard. fl. gallop.* 209. *tab.* 208.

HABITAT copiose in saxosis à l'hort de Diou.

Alpina. 7. ANTHEMIS foliis dentato - pinnatis linearibus integerrimis , caule villoso unifloro , paleis sphaelatis , petalis ovatis. *Linn. cent.* 11. 195. *amœn. Acad. tom.* 1^v. *pag. 330. sist. nat.*

Chamæmelum alpinum perenne saxatile , flore albo singulari , calyce nigricante. *Seg. ver. tom.* 3. *p. 282.*

HABITAT à l'Esperou (D. Clapiers.) Cauliculi plures sesquipalmates simplicissimi tomentoso - incani , quandoque glabri. Folia caulina remota linearis - pinnatifida , ad basim lacinulis minimis stipuliformibus ; radicalia verò basi integerrima è medio ad apicem pinnatifida tantum , subtus incana , raro utrinque. Pedunculus uniflorus su-

pernè nudus. *Squamae calycine* margine membranaceo nigro. *Paleæ receptaculi* setaceæ apice nigræ... Huic multùm similis anthemis *Gerardi gallop.* caule fruticoso foliis linearibus carnosis. *Gallop.* tab. pag. 208. Sed istius squamæ nec ad marginem sphacelatæ, nec foliola longiora.. an eadem?

** *Radio luteo.*

8. ANTHEMIS caule ramoso, foliis pubescentibus *Valentina.*
pinnato-multifidis setaceis, calycibus villosis pe-
dunculatis. h. m. 451.

Buphtalmum cotulæ folio. mag. Bot. 41.

9. ANTHEMIS foliis bipinnatis serratis subtus to- *Tinctoria.*
mentosis, caule corymboso. h. m. 451.

Buphtalmum Dioscoridis. mag. Bot. 40.

Chrysanthemum tanaceti minoris folio. mag. hort.

55.

A C H I L L Æ A.

Cal. ovatus imbricatus. *flosculi* radii cir-
citer 5. *recept.* paleaceum. *pappus* nul-
lus.

Herba. *fol.* incerta. *inflor.* terminalis co-
rumbosa, stricta.

* *Corollis flavis.*

1. ACHILLÆA foliis setaceis dentatis: denticulis *Ageratum.*
subintegris subulatis reflexis. h. m. 452.

Ageratum foliis serratis. mag. Bot. 5. hort. 6.

2. Ptiarmica lutea suavè olens, corymbis longioribus.
Tour. 497.

2. Ageratum foliis serratis monspeliense, flore pal-
lido luteo. mag. hort. 6.

* PHARM. Agerati herba. Vis vulneraria, anthe-
mintica.

** *Corollis radio albis.*

Ptarmica. 2. ACHILLÆA foliis lanceolatis acuminatis argutè serratis. *b. m. 453.* *L'herbe à éternuer.*

Ptarmica vulgaris folio longo serrato, flore albo.
mag. hort. 165.

* PHARM. *Ptarmica* herba, flores. Vis sialagogia, errhina, sternutatoria, vulneraria, antiodontal-gica.

Millefolium. 3. ACHILLÆA foliis bipinnatis nudis: laciniis linea-ribus dentatis. *b. m. 453.* *Le millefeuille, herbe au charpentier.*

Millefolium vulgare album. *mag. Bot. 177. hort. 136.*

β. *Millefolium purpureum majus.* *mag. hort. 136.*

* PHARM. *Millefolii* herba, aqua. Vis vulneraria, adstringens, ischæma, tonica, antihaemorrhöidalis, antileucorrhœica, antidiarrhoeica. *Folia ad man. 1.. succus ad unc. III. IV.*

Nobilis. 4. ACHILLÆA foliis bipinnatis, pinnis distantibus utrinque subserratis obtusiusculis, foliolis ovatis confertis. *Linn. sif. 1225. b. m. 453.*

Millefolium nobile tragi. *mag. hort. 136.*

β. *Millefolium odoratum minus Monspeliensium.*
mag. Bot. 177. hort. 136.

B U P H T H A L M U M.

Stigma flosculorum hermaphroditicorum indivisum. *seminum* latera (præsertim radii) marginata. *recept.* paleaceum. *pappus* margo obsoletus.

Herba, rigida. *föl.* simplex. *inflor.* solitaria pedunculata.

* Asterisci. *Tour.*

Spinosum. 1. BUPHTHALMUM calycibus acutè foliosis spinosis, ramis alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis. *b. m. 455.*

EX REGULARIBUS ET IRREGUL. 373

Aster luteus foliis ad flores rigidis. *mag.* *Bot.* 31.

Asteriscus foliis ad florem rigidis. *mag.* *hort.* 26.

2. *BUPHTHALMUM* calycibus obtusè foliosis sessilibus axillaribus, foliis oblongis obtusis. *b. m.* 455.

Aster annuus attico luteo similis, foliis ad flores mollibus. *mag.* *Bot.* 32. *hort.* 26.

* *Astroïdea. Tour.*

3. *BUPHTHALMUM* foliis lanceolatis subferratis *villosum*, calycibus nudis. *b. m.* 455.

S Y N G E N E S I A

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

H E L I A N T H U S.

Cal. imbricatus subsquarrosum. *recept.* paleaceum planum. *pappus* 2-phyllosum.

Herba. *fol.* simplex opposita petiolata scabra: *ramea* alterna.

1. *HELIANTHUS* foliis inferioribus cordatis, nervis ponè basim unitis denudatis: superioribus ovatis. *b. m.* 456. *Multiflorus.*

2. *HELIANTHUS* foliis ovato-cordatis, nervis intra folium unitis. *b. m.* 456. *Le taupinambour.* *Tuberiferus.*

3. *HELIANTHUS* foliis ovatis trinerviis crenatis, squamis calycinis erectis longitudine disci. *b. m.* 456. *Annuus.*

C E N T A U R E A.

Cor. radii infundibuliformes, longiores, irregulares. *recept.* setosum. *pappus* simplex.

Herba. *fol.* alterna incerta. *inflor.* terminalis pedunculata.

* *Jaceæ , calycibus lævibus inermibus.*

Crupina. 1. CENTAUREA calycibus inermibus , squamis linearis - subulatis , foliis pinnatis serratis. b. m. 457.

Cyanus pulchro semine centaurii majoris. mag. Bot. 82.

Jacea annua foliis laciniatis serratis , purpurascens flore. mag. hort. 103.

Moschata. 2. CENTAUREA calycibus inermibus subrotundis glabris , squamis ovatis , foliis sinuatis. b. m. 457.

Cyanus odoratus turcicus. mag. hort. 66.

** *Cyani , calycinis squamis serrato-ciliatis.*

Peltinata. 3. CENTAUREA calycibus erecto-plumosis , foliis lyratis denticulatis , rameis lanceolatis integerimis. Linn. sp. pl. edit. 2^a. 1287.

Jacea montana incana mollis , capitulis hispidis. Tour. 443.

Jacea cum squamis pennatis , sive capite villoso. mag. Bot. 136. hort. 103.

HABITAT copiosè à St. Loup , au Capouladou , l'Esperou. Folia tomentosa incana.

Phrygia. 4. CENTAUREA calycibus recurvato-plumosis , foliis indivisis. Linn. sp. pl. edit. 2^a. 1287.

Jacea capite hirsuto. Baub. pin. 271.

β. Jacea alba capite hirsuto. Tour. 443.

γ. Jacea angustifolia capite hirsuto. Tour. 443.

Nigra. 5. CENTAUREA calycibus ciliatis , squamulâ ovatâ , ciliis capillaribus erectis , foliis lyrato-angulatis , floribus flosculosis. b. m. 457.

β. Jacea cum squamis cilii instar pilosis. mag. Bot. 136. hort. 103.

Pullata. 6. CENTAUREA calycibus ciliatis verticillato-foliosis , foliis lyrato-dentatis , caule foliis breviore. b. m. 457.

Jacea humilis alba hieracii folio. mag. Bot. 136. hort. 103.

7. CENTAUREA calycibus ferratis , foliis lanceolatis decurrentibus , caule simplici. *b. m.* 457. *Montana.*
Cyanus montanus latifolius. mag. Bot. 294.
Cyanus montanus latifolius , seu verbasculum cyanoides. mag. hort. 66.
8. CENTAUREA calycibus ferratis , foliis linearibus , inferioribus pinnato-dentatis , summis indivisis. *b. m.* 457. *Le bluet. Cyanus.*
Cyanus segetum. mag. Bot. 82.
9. CENTAUREA calycibus ciliatis , foliis pinnatifidis linearibus , caule paniculato. *b. m.* 459. *Paniculata.*
Jacea vel stæbe gallica & austriaca elatior. mag. Bot. 146. hort. 103.
10. CENTAUREA calycibus margine ciliatis , foliis pinnatifidis , pinnis lanceolatis. *b. m.* 459. *Scabiosa.*
Scabiosa major squamatis capitulis. mag. Bot. 304. app.
Jacea vulgaris nigra laciniata. mag. hort. 103.
11. CENTAUREA calycibus squamosis , foliis lanceolatis , radicalibus sinuato-dentatis , ramis angulatis. *b. m.* 459. *La jasée. Jacea.*
Jacea vulgaris nigra capitata squamosa. mag. Bot. 139. hort. 102.
12. Cyanus peramarus supinus capitulis squamosis semoïdis parvi. *mag. Bot. 82.*
13. Jacea nigra angustifolia lithospermifolia. *Baub. prodr. 128.*
Jacea repens latifolia squamata. mag. hort. 102.
14. Jacea repens angustifolia squamata. *mag. hort. 102.*
15. CENTAUREA calycibus squamosis , foliis tomentosis , radicalibus lanceolatis , caulinis pinnatifidis , caule simplici. *b. m.* 459. *Conifera.*
Jacea montana incana capite pini. mag. Bot. 136.
Cyanus seu centaurium majus humile , capite pini. mag. hort. 49.
16. CENTAUREA calycibus squamosis mucronatis , foliis pinnato-dentatis. *Linn. sist. nat. sp. plant. 914. Alba.*

Jacea calyculis argenteis minor. *Tour. inst.* 444.

Stæbe calyculis argenteis minor. *Baub. pin.* 273.

HABITAT à l'Esperou ad dexteram, secus amnem.

*** Stæbe, *calycinis squamis spinosis palmatis.*

Seridis. 14. CENTAUREA calycibus palmato-spinosis, foliis decurrentibus tomentosis oblongis, infimis sinuato-dentatis. *b. m.* 460.

Jacea latifolia spinosa capitulis pulchris, flore purpureo. *mag. Bot.* 137.

Aspera. 15. CENTAUREA calycinis spinis palmato-quinquefidis, foliis lanceolatis dentatis. *b. m.* 460.

Jacea cum spinosis capitulis, purpurea tenuifolia. *mag. Bot.* 138. *hort.* 103.

**** Calcitrapæ, *calycinis spinis compositis.*

Calcitrapa. 16. CENTAUREA calycibus subduplicato-spinosis, foliis sessilibus lateralibus pinnatifidis linearibus dentatis. *b. m.* 460. *La chausse-trape.*

Carduus stellatus, sive calcitrapa. *mag. hort.* 44.

Carduus stellatus foliis papaveris erratici. *mag. Bot.* 50.

* PHARM. *Calcitrapæ* herba, succus, extractum, cortex radicis, semina. Vis febrifuga, vulneraria, diuretica, antinephralgica. *Herba* in decocto, in juscule. *succus* ab unc. iv ad unc. vi.. *folia* pulverata ad drach. i.. *extractum* ad drach. ii.. *semina* ad drach. i, infusa in vino albo.. *Cortex radicis* exsiccatæ pulveratus ad drach. i, in vini albi cyatho infusus.

Solstitialis. 17. CENTAUREA calycibus duplicato-spinosis, foliis ramorum decurrentibus inermibus lanceolatis, caulinis lyrato-pinnatifidis. *b. m.* 460.

Carduus stellatus luteus folio cyani. *mag. Bot.* 50. *hort.* 44.

Melitensis. 18. CENTAUREA calycibus duplicato-spinosis subrotundis lateralibus, foliis decurrentibus lanceolatis sinuosis inermibus. *b. m.* 460.

- Jacea melitensis capitulis conglobatis. *mag.* *Bot.*
298. *hort.* 104.
- HABITAT copiosè in monte Cetio. Capitulis plu-
trum sparsis fessilibus.
19. CENTAUREA calycibus ciliato - spinosis , foliis
lyratis inermibus incanis , capitulis terminali-
bus. *b. m.* 461. *Sicula.*
- Jacea sicula cichorii folio , flore luteo , capite
spinofo. *mag.* *Bot.* 138. *hort.* 104.
20. CENTAUREA calycibus subduplicato - spinosis ,
foliis amplexicaulibus lanceolatis indivisis ser-
tatis. *b. m.* 461. *Calcitrapoi-
des.*
- Carduus stellatus foliis integris ferratis. *mag.* *hort.*
app. 293. *hort.* 44.
21. CENTAUREA calycibus ciliatis spinosis , foliis
pinnatifidis , laciniis superioribus majoribus. *b. m.*
461. *Centauroi-
des.*
22. CENTAUREA calycibus ciliatis spinosis , foliis
bipinnatifidis. *b. m.* 461. *Collina.*
- Jacea lutea capite spinofo. *mag.* *Bot.* 138. *hort.*
104.
- ***** Crocodiloidea , *spinis simplicibus.*
23. CENTAUREA calycibus setulâ reflexâ spinosis
glabris , foliis dentato - pinnatifidis ferratis. *b. m.*
461. *Salmantica.*
- Jacea intybacea , sive stæbe salmanticensis prior.
mag. *Bot.* 137.
- Jacea foliis cichoraceis villosis altissima , flore pur-
pureo. *mag.* *hort.* 103.
24. CENTAUREA calycibus setacea - spinosis , fo-
liis decurrentibus sinuatis spinosis. *b. m.* 461. *Galactites.*
- Carduus galactites. *mag.* *Bot.* 49. *hort.* 43.



S Y N G E N E S I A
P O L Y G A M I A N E C E S S A R I A.

C A L E N D U L A.

Cal. polyphyllus æqualis. *sem.* disci membranacea. *recept.* nudum. *pappus nullus.*
Herba. *fol.* simplex pinguis. *inflor.* foliaria.

- Officinalis.* 1. **CALENDULA** seminibus radii cymbiformibus echinatis, disci bicornibus. *h. m. 462.* *Le souci.*
Caltha arvensis. *mag.* *Bot.* 44.
Calendula minor arvensis. *mag.* *hort.* 38.
 2. *Calendula sativa.* *mag.* *hort.* 38.
 3. *Calendula flore luteo pleno.* *mag.* *hort.* 38.
 4. *Calendula flore luteo pleno, & prolifera.* *mag.* *hort.* 38.
 * **PHARM.** *Calendulae herba, flores, conserva, aqua, acetum.* *Vis emmenagoga sudorifera, aperiens, incidens, alexipharmacæ.* *Folia & flores.* ad unc. III. IV. *contusa & infusa in vino albo... succus ab unc. I. ad unc. IV.. extractum à drach. I, ad drach. II.. conserva à drach. II. ad unc. I.*

O T H O N N A.

Cal. i-phylloides, multifides subcylindricus. *recept.* nudum. *pappus nullus.*
Fruticulus & herba. *fol.* simplex tomentosa. *inflor.* umbellata.

* *Herbaceæ.*

- Helenitis.* 1. **OTHONNA** foliis lanceolatis integris villosis, floribus umbellatis. *h. m. 464.*

** *Fruticulose.*

2. OTHONNA foliis pinnatifidis tomentosis , laci- *Maritima*.
niis sinuatis , caule fruticoso. *h. m. 464.*
Jacobæa maritima , sive *cineraria*. *mag. hort. 104.*



*Classis XVI.***A P E T A L I .*****M O N A N D R I A***

MONOGYNIA.

HIPPURIS.

SALICORNIA.

D I A N D R I A

MONOGYNIA.

LEPIDIUM. 7.

T R I A N D R I A

MONOGYNIA.

POLYCNEUM.

SCHÆNUS.

CYPERUS.

SCIRPUS.

ERIOPHORUM.

T E T R A N D R I A

MONOGYNIA.

ALCHEMILLA.

CAMPHOROSMA.

T E T R A N D R I A

DIGYNIA.

APHANES.

HERNIARIA. 3.

*TETRANDRIA**TETRAGYNIA.*

RUPPIA.

*PENTANDRIA**MONOGYNIA.*

ILLECEBRUM.

CELOSIA.

THESIUM.

RHAMNUS. 1. frangula.

*PENTANDRIA**DIGYNIA.*

RHAMNUS. 2. ziziphus.

SALSOLA.

CHENOPODIUM.

BETA.

HERNIARIA.

ULMUS.

*PENTANDRIA**TRIGYNIA.*

RHAMNUS. 3. paliurus.

*PENTANDRIA**POLYGYNIA.*

MYOSURUS.

*HEXANDRIA**MONOGYNIA.*

JUNCUS.

O C T A N D R I A
D I G Y N I A.

CHRYSSOPLIUM.

D E C A N D R I A
D I G Y N I A.

SCLERANTHUS.

D O D E C A N D R I A
M O N O G Y N I A.

ASARUM.

T E T R A D Y N A M I A.
C A R D A M I N E. 6.

G Y N A N D R I A
P O L Y A N D R I A.

ARUM.

ZOSTERA.

M O N @ C I A
M O N A N D R I A.

ZANICHELLIA.

M O N @ C I A
D I A N D R I A.

LEMNA.

M O N O E C I A
T R I A N D R I A.

CAREX.

SPARGANIUM.

AMARANTHUS.

TYPHA.

M O N O E C I A

TETRANDRIA.

URTICA.

MORUS.

BETULA.

M O N O E C I A

PENTANDRIA.

XANTHIUM. *femina.*

AMARANTHUS. 4. 5.

M O N O E C I A

OCTANDRIA.

MYRIOPHYLLUM.

M O N O E C I A

POLYANDRIA.

CERATOPHYLLUM.

THELIGONUM.

QUERCUS.

FAGUS.

CORYLUS.

CARPINUS.

M O N O E C I A

MONADELPHIA.

CUPRESSUS.

PINUS.

CROTON. *femina.*

*DIOECIA**DIANDRIA.*NAJAS. *femina.*

SALIX.

*DIOECIA**TRIANDRIA.*

CAREX. 9.

*DIOECIA**TETRANDRIA.*

VISCUM.

MORUS. 2.

URTICA.

RHAMNUS. 4. *catharticus.**DIECIA**PENTANDRIA.*

CANNABIS.

HUMULUS.

PISTACIA.

SPINACIA.

*DIOECIA**HEXANDRIA.*

TAMUS.

SMILAX.

*DIOECIA**OCTANDRIA.*

POPULUS.

*DIOECIA**ENNEANDRIA.*

MERCURIALIS.

DIECIA

D I C E C I A

M O N A D E L P H I A.

JUNIPERUS. *mas.*

EPHEDRA.

D I C E C I A

S Y N G E N E S I A.

RUSCUS?

P O L Y G A M I A

M O N C E C I A.

CELTIS.

C O R I A R I A.

HOLCUS. *mas.*

PARIETARIA.

ATRIPLEX.

P O L Y G A M I A

D I C E C I A.

RHAMNUS. *s.* alaternus.

F R A X I N U S.

P O L Y G A M I A

T R I C E C I A.

OSYRIS.

F I C U S.



APETALI.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

HIPPURIS.

Cal. o. stigm. simplex. sem. 1.

*Herba. immersa articulata. fol. linearis
verticillata. inflor. axillaris sessilis.*

- Vulgaris.* 1. **HIPPURIS.** *b. m. 3. La pesse d'eau.*
Equisetum brevioribus foliis, palustre polyspermum. mag. Bot. 89. hort. 74.
Obs. Folia inferiora quaterna, quina, sena; summa 7-18.

SALICORNIA.

Cal. ventricosus integer. sem. 1.

*Herba. carnosa succulenta, articulata,
amphibia; fol. o. inflor. in articulis.*

- Herbacea.* 1. **SALICORNIA** patula, articulis apice compressis
emarginato-bifidis. *Linn. sp. pl. edit. 2^a. 5. Le salicor.*
Salicornia europaea annua. Goüan. hort. 2. Sauv. 7.
Salicornia articulata apice crassioribus obtusis, interno-
diis distantibus. Ger. flor. gallop. 328.
Kali geniculatum annum. mag. Bot. 147. hort. 108.

- Fruticosa.* 2. **SALICORNIA** caule erecto fruticoso. *Linn. sp.
pl. edit. 2^a. 5.*
*Salicornia europaea fruticosa β. Goüan. hort. 2.
Sauv. 7.*
Salicornia articulata subæqualibus obtusis, interno-
diis approximatis. Ger. flor. gallop. 328.
Kali geniculatum majus. mag. Bot. 147. hort. 108.

D I A N D R I A

M O N O G Y N I A.

L E P I D I U M.

Silic. caul. fol. Vide classeos 10^{um}. ordinem.

7. LEPIDIUM floribus diandris apetalis, foliis radi- *Ruderale.*
calibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus
integerrimis. *b. m.* 315.
Iberis nasturtii folio. *Bauh. pinn. mag. Bot.* 139.
Nasturtium sylvestre tenuiter incisum minori fructu.
Tour. 214.
Nasturtium sylvestre. *mag. hort.* 142.
Nasturtium sylvestre osyridis folio. *Bauh. pin.* 115.

T R I A N D R I A

M O N O G Y N I A.

P O L Y C N E M U M.

Cal. 5-phillus: foliolis 2 alternis mino-
ribus, persistens. *sem.* 1. nudum com-
pressum orbiculatum.

Herba. prostrata. *fol.* subulata alterna:
inflor. axillaris solitaria sessilis. *fulc.* 2:
stipulæ axillares oppositæ semen fo-
ventes.

1. POLYCNEUM foliis stipulisque subulatis. *b.* *Arvense.*
m. 24.
Champhoratæ congener. *mag. Bot.* 47. *hort.* 40.
Herniaria foliis longis angustis acuminatis glabris,
mag. char. 51.

S C H Æ N U S.

Glumæ. paleaceæ univalves congestæ.

sem. 1, subrotundum inter glumas calycinas.

Herba. (gramen). *fol.* graminea. *inflor.* spiculis congestis.

Mariscus. 1. SCHÆNUS culmo tereti, foliis margine dorsoque aculeatis. *b. m.* 28.

Gramen cyperoïdes altissimum, foliis & carinâ serratis. *mag. Bot.* 117. *hort.* 93.

Mucronatus. 2. SCHÆNUS culmo tereti nudo, spicis fasciculatis divaricatis, involucro subulato triphylo. *b. m.* 28.

Gramen cyperoïdes maritimum. *mag. Bot.* 118. *hort.* 93.

Nigrans. 3. SCHÆNUS culmo tereti nudo, capitulo ovato: involucri diphyllici valvula alterâ subulatâ longâ. *b. m.* 28.

Juncus lithospermii semine. *mag. Bot.* 145. *hort.* 107. *Bot. icon.* 144.

Aculeatus. 4. SCHÆNUS culmo tereti ramoso, capitulis terminalibus, involucro triphylio brevissimo rigido patente. *Linn. sif. nat.* 865.

Gramen album capitulis aculeatis italicum. *mag. Bot. app.* 297.

Gramen supinum aculeatum. *Bauh. hist.* 2. 467.

Gramen spicatum spicis in capitulum foliatum congestis. *Tour.* 519.

HABITAT in sabulosis maritimis à Manguelone, Cete.

C Y P E R U S.

Glumæ paleaceæ distichè imbricatæ. *sem. 1,* nudum.

Herba. (gramen). *fol.* graminea. *inflor.* spiculis umbellatis inæqualibus compressis.

1. CYPERUS culmo folioso triquetro , umbellâ foliosâ supradecompositâ pedunculis nudis , spiculis alternis. *h. m. 29.* *Le souchet.* *Longus.*
- Cyperus odoratus radice longâ , sive cyperus officinarum. *mag. Bot. 84. hort. 67.*
- * PHARM. *Cyperi longi radix.* Vis diuretica , emmenagogica , stomachica , ulceribus uteri , vesicæ oris adversa. *Radix in substantia ad drach. 1.*
ii. in infuso ad usque unc. fl.
2. CYPERUS culmo nudo triquetro , umbellâ triphyllâ , pedicellis simplicibus inæqualibus , spicis confertis lanceolatis. *h. m. 29.* *Flavescentia.*
- Cyperus minimus paniculâ sparsâ flavescente. *Scheuz. gram. 385.*
3. CYPERUS minor paniculâ sparsâ flavescente. *Scheuz. gram. 386. tab. 8. fig. 13.* Optima.
HABITAT β in pratis à l'Esperou. Vix biuncialis ; spiculæ ad summum ternæ , sèpius binæ.
3. CYPERUS culmo nudo triquetro , umbellâ triphyllâ , pedunculis simplicibus inæqualibus , spicis confertis lanceolatis. *h. m. 29.* *Flavescentia.*
4. CYPERUS culmo nudo triquetro , umbellâ trifidâ , pedunculis simplicibus inæqualibus , spicis confertis linearibus atris. *h. m. 29.* *Fuscus.*
- Gramen cyperoides paniculâ sparsâ minus. *mag. Bot. 118. hort. 93.*
5. CYPERUS culmo triquetro nudo , umbellâ foliosâ , radicum tuberibus ovatis ; zonis imbricatis. *Linn. sist. nat. 866.* *Esculentus.*
- Cyperus rotundus esculentus angustifolius. *Bauh. pinn. 14. theat. 222. Tour. 527.*
- HABITAT* à Lattes versùs stagna , & in fossis submarinis à Maguelone , Perauls.

S C I R P U S.

Glumæ paleaceæ undique imbricatæ. sem.
i , imberbe nudum.

Herba (gramen). fol. graminea. inflor. in-
B b iij

certa ; spiculis aliis pedunculatis , aliis sessilibus.

* *Spicâ unicâ.*

Palustris. 1. SCIRPUS culmo nudo tereti , spicâ subovatâ imbricatâ. *b. m. 30.*

Juncus palustris equiseti capitulo majore. *mag. Bot. 145.*

Juncus capitulis equiseti major. *mag. hort. 107.*

Acicularis. 2. SCIRPUS culmo nudo tereti setiformi , spicâ ovatâ terminali bivalvi seminibus nudis. *Linn. sp. pl. ed. 2^a. 71.*

Juncus minimus spicâ breviore squamosâ spadiceâ. *Scheuz. gram. t. 7. f. 19.*

HABITAT in saxosis à *Meyrueis*. Vix biuncialis. Folia arcuata , rigida , teretia , hinc sulcata pungentia , culmo breviora.

Fluitans. 3. SCIRPUS culmis teretibus alternis nudis , caule folioso flaccido. *b. m. 30.*

** *Culmo tereti polystachio.*

Lacustris. 4. SCIRPUS culmo tereti nudo , spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. *b. m. 30.*

Juncus maximus , seu scirpus major. *mag. Bot. 143. hort. 107.*

OBS. In fossis omnibus circa urbem occurrit , & caule ad basim ancipi , altitudinem humanam exsuperante.

Holoschænus. 5. SCIRPUS culmo tereti nudo , spicis subglobosis glomeratis pedunculatis , involucro diphyllo inæquali mucronato. *b. m. 30.*

Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. *mag. Bot. 143. hort. 107.*

Romanus. 6. SCIRPUS culmo tereti nudo , capitulo lateralí conglobato , bracteâ reflexâ. *b. m. 30.*

Setaceus. 7. SCIRPUS culmo nudo setaceo , spicis lateralibus subsessilibus subsolitariis. *b. m. 31.*

HABITAT in pratalis à *Gramont*.

*** Culmo triquetro, paniculâ nudâ.

8. SCIRPUS culmo triquetro nudo acuminato, pa- *Mucronatus.*
niculâ conglomeratâ nudâ. *b. m. 31.*

Juncus acutus maritimus, caule triangulo. *mag.*
Bot. 143. hort. 107.

**** Culmo triquetro, paniculâ foliaceaâ.

9. SCIRPUS culmo triquetro, paniculâ conglobatâ *Maritimus.*
foliosâ, spicularum squamis trifidis, intermediâ
subulatâ. *b. m. 31.*

Cyperus rotundus vulgaris. *mag. Bot. 83.*

Cyperus rotundus inodorus germanicus. *mag. hort.*
67.

8. Gramen cyperoïdes paniculâ sparsâ, majus. *mag.*
Bot. 118. hort. 93.

10. SCIRPUS culmo triquetro folioso, umbellâ fo-
liosâ, pedunculis nudis supradecompositis, spi-
cis confertis. *b. m. 31.* *Sylvaticus.*

Gramen cyperoïdes miliaceum. *mag. Bot. 118.*
hort. 93.

E R I O P H O R U M.

Glum. paleaceæ undique imbricatæ. sem.

i, lanâ longissimâ cinctum.

*Herba (gramen). inflor. paniculata, glo-
merata.*

1. ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus, spi- *Vaginatum.*
câ paleaceâ. *b. m. 32.*

Juncus alpinus cum cauda leporina. *Baub. hist. 2.*
514.

2. ERIOPHORUM culmis teretibus, floribus nutan- *Polypha-
tibus. b. m. 32.* *shion.*

Linum pratense. *tabern. icon. 250.*

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

ALCHEMILLA.

Cal. 8-fidus. *sem.* 1, calyce inclusum.
Herba. *inflor.* glomerato - paniculata.
fulcr. stipulæ petiolares geminæ, adnatæ.

Vulgaris. 1. ALCHEMILLA foliis lobatis, stipulis foliaceis ferratis. *b. m.* 73. *Le pied de lion.*

Alchemilla vulgaris. *mag. hort.* 8.

* PHARM. *Alchemillæ radix*, herba. Vis vulneraria, adstringens, antiherniosa, ischæma, sophisticans, mammis indurandis apta.. *succus intus ad unc. iv.. decoctum ad cyathi dosim.*

Alpina. 2. ALCHEMILLA foliis digitatis ferratis, stipulis membranaceis integerrimis. *b. m.* 73.

Alchemilla perennis argentea. *mag. hort.* 8.

CAMPHOROSMA.

Cal. 4-fidus urceolatus, denticulis 2 operatis minoribus. *caps.* 1 - sperma.

Fruticulus, prostratus. *fol.* alterna ciliata subulata.

Monspeliana. 1. CAMPHOROSMA. *b. m.* 73. *La camphrée ou camphorata.*

Camphorata hirsuta. *mag. Bot.* 47. *hort.* 39.

* PHARM. *Camphoratæ herba.* Vis vulneraria, aperiens, incidens, diuretica, sudorifera, emmenagoga, antihydropica, anticoryzalis, antiasthmatica. Datur in infuso theiformi. Decoccta datur ad usque unc. 1. in aquæ lib. iii.

TETRANDRIA

DIGYNIA.

APHANES.

Cal. 8-fidus. *sem.* 2. *nuda.*

Herba. *fol.* alterna sessilis. *inflor.* axilla-
ris glomerata sessilis.

1. APHANES. *b. m.* 74.

Alchemilla minima montana. mag. Bot. 7. *hort.* 8.

Arvensis.

HERNIARIA.

Cal. 4-fidus. *filam.* 8. 4. *sterilia petali-*
formia.

Fruticulus. *fol.* opposita linearis inte-
gerrima. *fulc.* stipulæ interfoliaceæ op-
positæ.

3. HERNIARIA caulis fruticosis, floribus qua-
drifidis. *Linn. cent. 1. amœn. Acad. 4. pag. 269.*

Herniaria fruticosa viticulis lignolis. Tour. 507.

Polygonum, sive herniaria fruticosa viticulis ligno-
lis. mag. Bot. 210. hort. 96.

Fruticosa.

TETRANDRIA

TETRAGYNTIA.

RUPPIA.

Cal. o. *sem.* 4, pedicellata.

Herba immersa. fol. alterna linearis. *fulc.*
stipulæ 2 adnatæ vaginantes, ad ba-
sin spathæformes,

*Mariima.*1. RUPPIA. *b. m. 76.*

*Grauen maritimum fluitans cornutum. mag. Bot.
119. Eaub. pinn. 3.*

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

ILLECEBRUM.

*Cal. 5-phylloides cartilagineus inferus. stigm.
simplex. caps. 5-valvis, 1-sperma.
Herba, rigida. fol. opposita sessilis inter-
gerrima.*

*Verticilla-
rum.* 1. ILLECEBRUM floribus verticillatis nudis, cauli-
bus procumbentibus. *b. m. 116.*

Cymosum. 2. ILLECEBRUM spicis cymosis secundis, caule
diffuso. *b. m. 118.*

Paronychia. 3. ILLECEBRUM floribus bracteis nitidis obvalla-
tis, caulis procumbentibus. *b. m. 118.*
Polygonum minus candicans supinum. *mag. Bot.
209.*

Herniaria minor candicans supina. *mag. hort. 96.*

Capitatum. 4. ILLECEBRUM floribus bracteis nitidis obvalla-
tis, occultatis, capitulis terminalibus, caule erec-
to. *b. m. 118.*

Herniaria minor candicans capitulis surrectis: *mag.
hort. 96.*

Polygonum minus candicans capitulis surrectis.
mag. Bot. 209.

OBS. Narbonæ pro pede cati usurpatur; *ex D. Solier.*

C E L O S I A.

*Cal. 5-phylloides; foliolis 2 interioribus.
stam. basi nectario plicato juncta. caps.
horizontaliter dehiscens.*

*Herba. inflor. spicata: apice frondoso
(sæpius) sterili.*

1. CELOSIA foliis ovato-oblongis, pedunculis tere-tibus substriatis, spicâ oblongâ. h. m. 117. La crête de coq des jardiniers.

T H E S I U M.

Cal. 1-phyllo superus, cui stam. inser-ta. sem. 1, coronatum.

Herba, rigidula. inflor. paniculato-race-mosa. fulc. bracteæ ternæ foliaceæ: alterâ longiore.

1. THESIUM calyce bracteis longiore, foliorum nervis decurrentibus. h. m. 118. *Linophyllum.*

Linaria montana flosculis albicantibus. mag. Bot. 159.

Sanamunda linariæ folio. mag. hort. 178.

2. Alchemilla linariæ folio, florum calyce luteo. Tour. 509.

R H A M N U S.

Cal. tubulosus 5-fidus: squamis stamina munientibus (petala?) bacc. 2-sperma, 2-locularis, rotundata.

Arbor. fol. simplex alterna. inflor. axilaris.

1. RHAMNUS inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. h. m. 112. *La bourgene.* *Frangula.*

Alnus nigra baccifera. mag. Bot. 290.

Frangula, sive *alnus nigra* baccifera. mag. hort. 81.

* PHARM. *Frangula* cortex medius. Vis recentis, emetica, exsiccata cathartica, antihydropica, antiscabiosa. Datur in substantia ad drach. 1. in infuso à drach. II, ad drach. III, imò IV.

P E N T A N D R I A

D I G Y N I A.

S A L S O L A.

Cal. 5-phyllus. *caps.* 1-sperma. *sem.* cochleatum.

Herba. fol. integerrima succulenta. *inflor.* axillaris.

- Tragus.* 1. SALSO LA foliis subulatis spinosis lăvibus, calycibus ovatis, caule erecto herbaceo. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 322. *Salsola kali.* *Goian. hort.* 146.
Kali spinosum cochleatum. *mag. Bot.* 146.
Kali spinosum foliis longioribus & angustioribus. *mag. hort.* 108.
- Soda.* 2. SALSO LA foliis inermibus, caule patulo herbaceo. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 322. *Goian. hort.* 146.
Kali majus cochleato semine. *mag. Bot.* 146. *hort.* 108.
- Hirsuta.* 3. SALSO LA diffusa herbacea, foliis teretibus obtusis tomentosis. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 323.
Chenopodium hirsutum. *Linn. sp. pl. edit.* 1^a. 221.
Geian. hort. 125.
Kali minus villosum. *mag. Bot.* 146. *hort.* 108.
- Fruticosa.* 4. SALSO LA erecta fruticosa, foliis filiformibus obtusifculis. *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 324.
Chenopodium fruticosum foliis linearibus teretibus carnosis. *Linn. sp. pl. edit.* 1^a. 221. & *Goian. hort.* 125.
Kali species sive vermicularis marina arborescens. *mag. Bot.* 146. *hort.* 108.

C H E N O P O D I U M.

Cal. 5-phyllus, 5-gonus. *sem.* 1, lenticulare superum.

Herba, & fruticulus. fol. simplex. inflor.
glomerato-racemosa.

* *Foliis angulosis.*

1. CHENOPODIUM foliis triangulari-sagittatis integrerimis. *b. m. 123.* *Le bon Henri.* Bonus Henricus.
Atriplex chenopodii folio triangulo. *mag. hort. 29.*
- * PHARM. *Boni Henrici* herba. Vis refrigerans, humectans, vulneraria, anodina, antihæmorrhoidalis, antipodagrifica. Datur ad man. i. ii.
2. CHENOPODIUM foliis cordato - triangularibus obtusiusculis, dentatis, racemis erectis compo- sitis subnudis, caule brevioribus. *b. m. 128.* Rubrum.
Atriplex sylvestris latifolia. *mag. Bot. 34.*
Atriplex chenopodia latifolia. *mag. hort. 28.*
* PHARM. *Atriplicis rubrae* herba. Vis prioris.
3. CHENOPODIUM foliis rhomboideo-triangulari- bus erosis posticè integris, summis oblongis, racemis erectis. *b. m. 129.* Album.
Atriplex sylvestris. *mag. Bot. 34.*
Atriplex chenopodia, folio sinuato candicante. *mag. hort. 29.*
4. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato- sinuatis, racemis ramosis nudis. *b. m. 129.* Viride.
5. CHENOPODIUM foliis subcordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis. *b. m. 129.* Hybridum.
Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio. *mag. Bot. 35.*
Atriplex daturæ folio. *mag. hort. 29.*
6. CHENOPODIUM foliis oblongis sinuatis, race- mis nudis multifidis. *b. m. 124.* Botrys.
Botrys ambrosioïdes vulgaris. *mag. Bot. 34.*
Atriplex chenopodia ambrosioïdes, folio sinuato. *mag. hort. 29.*
- * PHARM. *Botryos vulgaris* herba, semina. Vis resolvens, thoracica, antiasthmatica, antiorthopnoïca, tussi convulsivæ, phtysí, adversa, carminativa, anticolicalis. Datur in pulvere ad drach. i. in infuso aquoso, vino, hydromelico, mane & se-^o ad cyathi dosim.

** *Foliis integris.*

Vulvaria. 7. CHENOPODIUM foliis integerrimis rhombo-ovatis, floribus conglomeratis. *b. m. 125.* *L'ar-
roche puante.*

Atriplex fætida. *mag. Bot. 35.*

Atriplex chenopodia fætida. *mag. hort. 29.*

* PHARM. *Vulvaria* herba, conserva, tinctura; vis antihysterica. Datur in infuso, decocta pro cystere.

Polypermum 8. CHENOPODIUM foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis. *b. m. 125.*

Blittum erectius, sive tertium tragi. *mag. Bot. 38.*

Atriplex chenopodia betæ folio. *mag. hort. 29.*

Scoparium. 9. CHENOPODIUM foliis linear-lanceolatis planis integerrimis. *b. m. 125.*

Atriplex chenopodia lini folio. *mag. hort. 29.*

Maritimum. 10. CHENOPODIUM foliis subulatis semicylindri-
cis. *b. m. 125.*

Kali minus album semine splendente. *mag. Bot. 141. hort. 108.*

β. Kali minus foliis lucidis. *mag. Bot. 146. hort. 108.*
Kali species, sive vermicularis marina arborescens.
mag. Bot. 146. hort. 108.

B E T A.

Cal. 5 - phyllus, . basi semen reniforme
fovens.

Herba, sulcata. *inflor.* terminalis glome-
rato-racemosa.

Vulgaris. 1. BETA. *b. m. 126.* *L'a poirée.* *Bette rave.*

Beta rubra. *mag. hort. 32.*

β. Beta communis viridis. *mag. Bot. 37. hort. 32.*

* PHARM. *Betæ alba*, *rubræ*, herba, radix, suc-
cus. Vis emolliens, errhina, anticoryzalis, oph-
thalmica, anticephalalgica †, suppositoria.

H E R N I A R I A.

Cal. 5-partitus. *stam.* 5-sterilia. *caps.* 1-sperma.

Herba. *fol.* *fulc.* Vide ejusdem classeos ordinem 5^{um}.

1. HERNIARIA. *b. m.* 123. *La turquette.* *mag.* *hort.* *Glabra.*
96.

Polygonum minus glabrum. *mag.* *Bot. app.* 311.

* PHARM. *Herniarie glabrae* herba. Vis adstringens, antiherniosa, diuretica, antiscotomica, ophthalmica. *Herba* ad man. 1, incocta aut infusa in aquæ aut vini lib. 1. *pulverata* ad drach. 1.. *succus* ab unc. 11, ad unc. 1V.

2. HÉRNIARIA. *b. m.* 123. *mag.* *hort.* 96. *Hirsuta.*
Polygonum minus, sive *millagrina major.* *mag.*
Bot. 210.

U L M U S.

Cal. 5-fidus. *bacc.* exsucca compresso-membranacea.

Arbor: ramificationibus distichè patentibus. *fol.* simplex alterna. *inflor.* primordialis.

1. ULMUS foliis duplicato-serratis basi inæqualibus. *Campestris.*
b. m. 127. *L'ormeau.*

Ulmus campestris & Theophrasti. *mag.* *Bot.* 281.
hort. 207.

* PHARM. *Ulmi cortex medius.* Vis vulneraria, adstringens.

R H A M N U S.

Caul. *inflor.* *fol.* Vide ejusdem classeos ordinem 7^{um}.

Nucleus 2-locularis. *fulc.* aculei gemini stipulares.

- Ziziphus.* 2. RHAMNUS aculeis geminis subæqualibus , foliis obliquè ovatis trinerviis ferratis , pedunculis confertis , fructibus ovatis. *b. m.* 113. *Le jujubier.*
Ziziphus sativa & sylvestris. *mag.* *Bot.* 283. *hort.*
 209.
 * PHARM. *Jujubæ baccæ* , *syrupus*. Vis lubricans , edulcorans , expectorans , antitussiculosa , anti-strangurica. Coquuntur n°. XII. pro quālibet aquæ pinta.

P E N T A N D R I A

T R I G Y N I A.

R H A M N U S.

- Caul.* *inflor.* *fol.* Vide ordinem 7^{um}. *fulc.*
 Vide ordinem 9^{um}.
Nucleus trilocularis clypeiformis , mar-
 gine subero-so-membranaceo.

- Paliurus.* 3. RHAMNUS aculeis geminis inæqualibus , foliis trinerviis subserratis , pedunculis solitariis. *b. m.* 112. *Le paliure.*
Rhamnus , sive *paliurus* , folio *jujubino*. *mag.* *Bot.* 221.
Paliurus. *mag.* *hort.* 152.
 * PHARM. *Paliuri semina*. Vis diuretica , expec-
 torans.

P E N T A N D R I A

P O L Y G Y N I A.

M Y O S U R U S.

- Cal.* 5-phillus basi adnatus. *neçt.* 5 subu-
 lata petaliformia. *sem.* receptaculo te-
 reti longo affixa. *Herba*,

Herba, simplicissima. fol. linearis. *inflo-*
scapus uniflorus.

1. MYOSURUS. b. m. 161. *La queue de souri.* *Minimus.*
Holoscea affinis caudâ muris. mag. Bot. 132.
Myosuros. mag. hort. 140.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

JUNCUS.

Cal. 6-phyllus. caps. 1-loocularis, 3-valvis.
Herba. (gramen). fol. graminea. *inflo-*
glomerato-spicata, paniculata.

* *Culmis nudis.*

1. JUNCUS culmo subnudo tereti micronato, pa-
niculâ terminali, bracteâ duplice spinescâ. b. m.
183. *Le junc.*
Juncus pungens, sive juncus acutus, capitulis
forghi. mag. hort. 107.
Juncus acutus capitulis forghi. mag. Bot. 143.
2. JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo lateralî.
b. m. 184. *Conglom-*
Juncus lœvis panicula non sparsâ. mag. Bot. 142.
hort. 107.
3. JUNCUS culmo nudo stricto, paniculâ lateralî. *Effusus:*
b. m. 184.
Juncus lœvis paniculâ sparsâ major. mag. Bot. 142.
hort. 107.
4. JUNCUS culmo nudo: apice membranaceo in-
curvo, paniculâ lateralî. b. m. 184. *Inflexus:*
Juncus acumine reflexo major. mag. Bot. 142.
hort. 107.
5. JUNCUS culmo nudo, foliis setaceis, capitulis
glomeratis aphyllis. b. m. 184. *Squarrosum.*

- Gramen junceum foliis & spicâ junci. mag. Bot. 119. hort. 93.
 Junco affinis paniculâ laxâ, longioribus pediculis insidente. Scheuz. agr. 350.

** *Culmis foliosis.*

- Articulatus.* 6. JUNCUS foliis nodoso - articulatis. b. m. 183.
 Gramen junceum folio articuloſo aquaticum. mag. Bot. 119. hort. 93.
- Bufonius.* 7. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. b. m. 183.
 Gramen nemorosum caliculis paleaceis. mag. Bot. 118. hort. 93.
- Campestris.* 8. JUNCUS foliis planis subpilosis, spicis sessilibus, pedunculatisque. b. m. 184.
 Gramen exile hirsutum, cyperoides. mag. Bot. 118. hort. 93.
- Pilosus.* β. Gramen hirsutum capitulo globoso. Benth. pin. 7.
 9. JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo ramoso. Linn. sp. pl. edit. 2^a. 468.
 Juncus nemorosus latifolius major. Tour. 247.
 γ. Gramen hirsutum nemorosum angustifolium alpinum, paniculis obscurè rufescens. Scheuz. agr. 317.
- Spicatus.* 10. JUNCUS foliis planis, spicâ racemosâ nutante. b. m. 184.
- Bulbosus.* 11. JUNCUS foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. Linn. sp. pl. edit. 2^a. 466.
 Gramen junceum foliis & spicâ junci. mag. Bot. 119. hort. 98.
 Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. Tour. 247.
 HABITAT in rivulis circa urbem, à Selleneuve, Montferrier, Lattes. Culmus compressusculus. Folia subtus striata, superne canaliculata. Capsule nitentes fuscæ; paniculae inæquales.
- Niveus.* 12. JUNCUS foliis planis subpilosis, corymbis folio brevioribus, floribus fasciculatis. Linn. sp. pl. edit. 2^a. 468.
 Juncus pilosus A. Goian. b. m. 184.

*Gramen hirsutum angustifolium minus paniculis
albis.* mag. Bot. 118.

*Juncus angustifolius villosus, floribus albis panicu-
latis.* Tour. 247.

O C T A N D R I A

D Y G I N I A.

C H R Y S O S P L E N I U M.

*Cal. 4-fidus coloratus. caps. 2-rostris;
1-locularis, polysperma.*

*Herba, radicans. fol. opposita succulenta
scabriuscula.*

1. CHYSOSPLENIUM. b. m. 208. *La saxifrage Oppositiflora dorée.*

D E C A N D R I A

D Y G I N I A.

S C L E R A N T H U S.

*Cal. 1-phillus, 5-fidus, superus. sem. 2:
calyce inclusa.*

*Herba, rigida prostrata. fol. subulata:
inflor. fastigiata.*

1. SCLERANTHUS calycibus fructuum patulis. b. Annuit:
m. 211.

Polygonum angusto & acuto gramineo folio mi-
nus repens. mag. Bot. 211.

Herniaria folio opposito angustissimo minor repens.
mag. hort. 97.

2. SCLERANTHUS calycibus fructis patentissimis
spinosis, cæle subvilloso. Linn. amœn. Acad. 4.
p. 313. Polycarpes: Cc ij

Polycarpus. Dalech. sist. 444.

HABITAT à l'Esperou , à l'hort de Dion , à Banahu.

DODECANDRIA MONOGYNIA.

A S A R U M .

*Cal. 4-fidus superus. caps. coriacea 8-lo-
cularis , coronata.*

*Herba , parasitica , succulenta. fol. car-
nosa imbricata. inflor. congesta ter-
minalis.*

Hypocistis. 1. ASARUM foliis sessilibus imbricatis , floribus qua-
drifidis. b. m. 226. *L'hypociste.*

Hypocistis. mag. Bot. 135.

* PHARM. *Hypocistidis extractum. Vis acacie noſtra-
tis , adstringens , ifchæma , antidiarrhoïca , an-
tihermiosa. Intus à drach. ff. ad drach. 1.*

TETRADYNA MIA.

C A R D A M I N E.

*Silic. stigm. cal. caul. fol. Vide classeos
6^e. 10^{um}. ordinem.*

Impatiens. 6. CARDAMINE foliis pinnatis , floribus apetalis.
b. m. 324.

Cardamine foliis pinnatis incisis stipulatis , flori-
bus apetalis. *Linn. sist. 1131.*

Cardamine species quædam insipida. *mag. hert.*
42.

G Y N A N D R I A

P O L Y A N D R I A.

A R U M.

Spatha i-phylla, cucullata. *spadix* subcylindricus, supernè nudus clavatus.

Herba, scapus androgynus: *inflor.* feminae ad basim spadicis infra mares. *fol.* petiolo dilatato vaginanti submembranaceo.

* *Acaulia foliis simplicibus.*

1. ARUM acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *b. m.* 478. *Le pied de veau.* *Maculatum.*

Arum vulgare non maculatum. *mag.* *Bot.* 29. *hort.*

22.

2. *Arum maculatum* maculis candidis & nigris. *mag.* *Bot.* 29. *hort.* 22.

3. *Arum maximum* autumnale. *mag.* *hort.* 22.

* PHARM. *Ari* radix. Vis radicis *exsiccatæ* orexiaca, incidens, expectorans, antiasthmatica, deobstruens, antiauriginosa, antichlorotica, antimelancholica: *recentis* corrosiva. Datur exsiccata à drach. ss. ad drach. 1.

2. ARUM acaule, foliis cordato-oblongis, spathâ bifidâ, spadice incurvo. *b. m.* 478. *Arisatum.*

Arum latifolium alterum. *mag.* *Bot.* 27.

Arum humile arisarum dictum latifolium, pistillo brevi incurvo obtuso. *mag.* *hort.* 22.

** *Acaulia foliis compositis.*

3. ARUM foliis pedatis; primordialibus simplicibus, cæteris multifidis: foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus spatham spadice longiore. *b. m.* 477. *La serpentaire.* *Dracunculus.*

Dracunculus polyphyllus. mag. Bot. 87.

Arum polyphyllum, dracunculus, & serpentaria dictum. mag. hort. 23.

* PHARM. *Dracunculi radix, herba. Vis ari succedanea; extus, antiulcerosa, anticarcinomatosa.*

Z O S T E R A.

Spadix linearis planus: altero latere florifero: fl. alterna. sem. solitaria alterna.

Herba, immersa. fol. fasciculata linearis plana. inflor. congregata in rima longitudinali spadicis foliacei: flosculis duplii serie, alternis, pedicellatis.

Muriz. 1. ZOSTERA. b. m. 478. Le foin de mer, l'algue. Alga angustifolia vitriariorum. mag. Bot. 7. hort. 9.

M O N C E C I A

M O N A N D R I A.

Z A N I C H E L L I A.

Mas. cal. o. caul. fol. inflor. ut in feminis.

Fem. cal. 1-phyllus. pist. 4. sem. 4.

Herba, immersa, articulata. fol. capillaris; inferior alterna summa opposita. inflor. axillaris sessilis solitaria.

Palustris. 1. ZANICHELLIA. b. m. 479.

Petamogeton capillaceum capitulis ad alas trifidis. mag. Bot. 213. hort. 165.

M O N C E C I A

D I A N D R I A.

L E M N A.

Masc. *cal.* 1-phyllus.

Fem. *cal.* maris. *styl.* 1. *caps.* 1 - locularis.

Herba, natans. *rad.* perpendicularis capillaris. *fulc.* tubi ad apicem radicularum.

1. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. *b. m.* 479. *Trisulca.*
- Lemna aquatica trisulca. mag. Bot. 301. hort. 114.*
2. LEMNA foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *b. m.* 479. *La lentille d'eau.*
- Lenticula palustris minor vulgaris. mag. Bot. 152.*
- Lenticula aquatica. mag. hort. 114.*
- * PHARM. *Lenticula palustris herba. Vis extus refrigerans, antiphlogistica, antieresypelatosa, antihaemorrhoidalis.*

M O N C E C I A

T R I A N D R I A.

C A R E X.

Masc. *amentum imbricatum cylindricum. cal.* 1-phyllus.

Fem. *amentum & calyx maris. nectar.* inflatum 3-dentatum. *stigm.* 3. *sem.* 1, triquetrum, intra nectarium.

Herba. (gramen). *inflor.* spiculis alternis: flosculis sessilibus solitariis intra squamas amenti singulas.

* *Spicis androgynis.*

Leporina. 1. CAREX spicâ compositâ, spiculis ovatis sessilibus alternis approximatis androgynis nudis. *b. m.* 482.

Gramen cyperoïdes parvum aquaticum. *mag. Bot.* 118.

Vulpina. 2. CAREX spicâ supradecompositâ infernè laxiore, spiculis androgynis ovatis sessilibus glomeratis, supernè masculis. *b. m.* 482.

Muricata. 3. CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. *b. m.* 482.

** *Spicis sexu distinctis; feminineis sessilibus.*

Flava. 4. CAREX spicis confertis subsessilibus subrotundis, masculâ linearî, capsulis acutis recurvis. *b. m.* 482.

Digittata. 5. CAREX spicis linearibus erectis, masculâ breviore inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distan-
tibus. *b. m.* 482.

*** *Spicis sexu distinctis, feminineis pe-
dunculatis.*

*Pseudo-cype-
rus.* 6. CAREX spicis pendulis, pedunculis geminatis. *b. m.* 482.

Gramen cyperinum nemorosum. *mag. Bot.* 118. *? hort.* 93 *?*

Gramen spicâ subnigrâ recurvâ. *Bauh. pin.* 6 *?*

Limoso. 7. CAREX spicis ovatis pendulis, masculâ longiore erectiore, radice repente. *Linn. sp. pl. ed. 2^a.* 1386.

Cyperoïdes spicâ pendulâ breviore, squamis è spa-
diceo seu fusco rutilante viridibus. *Scheuz. gram.* *tab.* 10. *fig.* 13.

HABITAT in pratis à l'Esperou, à l'Aigual.

**** * *Spicis sexu distinctis , masculis pluribus.*

8. CAREX spicis masculis pluribus , feminineis subfles- *Acutæ.*
silibus , capsulis obtusifusculis. *b. m. 483.*
Gramen caryophyllatæ foliis , spicâ divulsâ. *mag.*
Bot. 117.
Gramen caryophyllatæ foliis , spicâ divulsâ , cype-
roïdes. *mag. hort. 93.*
9. Gramen latifolium spicâ rufâ sive caule triangu-
lo. *mag. Bot. 117.*
Gramen latifolium spicâ rufâ. *mag. hort. 93.*
9. CAREX spicis masculis pluribus , feminineis pedun-
culatis , capsulis inflatis acuminatis. *b. m. 483.* *Vesicariaz.*
Cyperoïdes polystachion spicis teretibus erectis.
Tour. 529.
8. Gramen cyperoïdes sylvarum tenuius spicatum.
Tour. 529.
HABITAT à l'Esperou , & à Lamalou juxta amnem.

S P A R G A N I U M.

Masc. *cal. 3 - phyllus.*

Fem. *cal. masculi. stigm. 2 - fidum. drupa exsucca , 2 - sperma.*

Herba immersa & emersa. inflor. (masc.)
amenta globosa alterna sessilia , è me-
dio ad apicem pedunculi. (fem.) amen-
ta globosa alterna sessilia , è medio
ad basin pedunculi.

1. SPARGANIUM foliis erectis triquetris. *b. m. 480. Ramosum.*
Le ruban d'eau.

Sparganium ramosum. mag. Bot. 245. hort. 183.

A M A R A N T H U S.

Mas. *cal. 3 - phyllus , coloratus.*

Fem. *cal.* maris. *styl.* 3. *caps.* 1 - locul.
1 - sperma, circumscissa.

Herba. *inflor.* aggesta, incerta, andro-gyna.

Tricolor. 1. AMARANTHUS capitellis seu glomerulis triandris subrotundis amplexicaulibus, foliis lanceolatis acuminatis. *b. m.* 487.

Amaranthus folio variegato femina. *mag. hort.* 13.

Melancholi-
cus. 2. AMARANTHUS glomerulis triandris axillaribus sessilibus, foliis lanceolatis acuminatis. *b. m.* 487.

Amaranthus folio obscuriore variegato, seu mas. *mag. hort.* 13.

Blittum. 3. AMARANTHUS floribus triandris glomeratis erectiusculis, foliis ovatis retusis. *b. m.* 487.

Blittum album minus. *mag. Bot.* 38.

T Y P H A.

Maf. *cal.* 3 - phyllus.

Fem. *cal.* capillaris villosus. *sem.* 1, pappo capillari insidens.

Herba immersa & emersa. *inflor.* amenta geminata cylindrica alterna : masculo terminali : femineo infra masculum.

Latifolia. 1. TYPHA foliis subensiformibus, spicâ masculâ femineâque approximatis. *b. m.* 480. *La masse d'eau, le roseau.*

Typha palustris major. *mag. Bot.* 272. *hort.* 201.

Angustifo-
lia. 2. TYPHA foliis semicylindricis, spicâ masculâ fe-
mineâque remotis. *b. m.* 480.

Typha palustris media. *mag. Bot.* 272.

Typha palustris minor. *mag. hort.* 201.

MONOCIA TETRANDRIA.

URTICA.

Mas. *cal.* 4-phyllus. *nectar.* centrale cya-thiforme.

Fem. *cal.* 2-valvis. *sem.* 1, nitidum.

Herba. *fol.* opposita. *inflor.* (mas.) pedunculata glomerata axillaris. (fem.) sesilis subgeminata axillaris..

1. URTICA foliis oppositis, amentis fructiferis globosis. *h. m.* 484. *L'ortie romaine.*

Urtica urens pilulas ferens. *mag.* *Bot.* 281. *hort.*

207.

* PHARM. *Urticae majoris* radix, herba, succus, semina. Vis radicis deobstruens, antiaurigina-
sa, herbæ, succi, adstringens, antidyfenterica,
ischæma, antihæmoptoïca, antihæmorrhoidalis;
foliorum extus stimulans. *Folia* in decocto ad
man. 1.. *succus* ab unc. II. ad unc. IV.

2. URTICA foliis oppositis ovalibus. *h. m.* 484. *Urens.*
L'ortie grecque.

Urtica urens minor. *mag.* *Bot.* 282. *hort.* 207.

* PHARM. *Urticae minoris* herba, succus, semina.
Vis prioris.

MORUS.

Mas. *cal.* 4-partitus.

Fem. *cal.* 4-phyllus. *styl.* 2. *cal.* bacca-tus. *sem.* 1.

Arbor. *fol.* simplex. *inflor.* (mas.) sparsa.
(fem.) axillaris glomerato - capitata :
pedunculis ternis, quaternis.

412 *A P E T A L I.*

Alba.

1. MORUS foliis obliquè cordatis lœvibus. *b. m. 485.*
Le meurier blanc.
Morus fructu albo. *mag. Bot. 178.* majori. *hort. 138.*
2. Morus fructu albo minori. *mag. hort. 138.*

B E T U L A.

Fem. *cal.* 1-phyllo, sub-3-fidus, 2-florus. *strobilus cylindricus.* *sem.* ovatum membranâ alatâ. Amenta feminea in distincto pedunculo.

Caul. fol. inflor. Vide classos 2^æ. Monœc. tetrandriam, (ubi mas.)

Alnus.

1. BETULA pedunculis ramosis. *b. m. 483.* *L'aulne.*
Alnus rotundifolia glutinosa viridis. mag. Bot. 11.
hort. 10.
- * PHARM. *Alni cortex, folia, juli, flores.* *Vide Monopetalos irregulares, Monœc. tetrandr.*

M O N @ C I A
P E N T A N D R I A.

X A N T H I U M.

Femina *cal.* involucrum 2-phylum, 2-florum. *drupa* sicca muricata 2-fida; *nucleo* 2-loculari.

Caul. fol. Vide class. 1^æ. ordinem 18^{um}. *inflor.* sessilis laterifolia.

Strumarium.

1. XANTHIUM caule inermi, foliis cordato-lobatis, floribus (femineis) aggregatis. *b. m. 485.*
Le petit glauberon.
Lappa minor, sive xanthium Dioscoridis. *mag. Bot. 150.* *hort. 208.*

- * PHARM. *Xanthii* herba , semina. Vide classeos 1^a. ordinem 18^{um..}. *succus* ad unc. vi.. *semina* in sub-stantia ad drach. ff.
2. XANTH!UM spinis tridentatis , foliis subfessilibus hastato-trilobis integerimis , floribus (femineis) solitariis. *b. m.* 486.
Xanthium lusitanicum validissimis aculeis muni-tum. *mag. hort.* 208. *icon.* 209.

A M A R A N T H U S.

- Maf. *cal.* 5-phyllo , coloratus.
- Fem. *cal.* maris. *styl.* 3. *capf.* *caul.* *fol.*
inflor. Vide ejusdem classeos ordinem 19^{um.}
4. AMARANTHUS racemis pentandris mutantibus *Hybridus.* compositis congestis , spiculis conjugatis. *b. m.* 487.
5. AMARANTHUS racemis pentandris simplicibus *Caudatus.* pendulis longissimis. *b. m.* 487. *L'amarante.*
Amaranthus maximus , paniculâ longâ pendulâ , semine rubello. *mag. hort.* 12.

M O N C E C I A
O C T A N D R I A.

M Y R I O P H Y L L U M.

- Maf. *cal.* 4-phyllo.
- Fem. *cal.* maris. *pist.* 4. *styl.* o. *sem.* 4.
nuda.
- Herba* immersa. *fol.* verticillata linear-i-pinnata immersa.
1. MYRIOPHYLLUM floribus masculis interruptè-
spicatis. *b. m.* 489. *Le volant d'eau.*
- Millefolium aquaticum pennatum spicatum. *mag.*
Bot. 178.

Spicatum.

- Verticillatum.* 2. *POTAMOGETON* foliis pennatis. *mag. hort.* 164.
MYRIOPHYLLUM floribus omnibus verticillatis.
b. m. 489.
Millefolium aquaticum flosculis ad foliorum nodos.
mag. Bot. 178.

M O N @ C I A P O L Y A N D R I A.

CERATOPHYLLUM.

Mas. *cal.* multipartitus. *flam.* 16-20.
 Fem. *cal.* maris. *pist.* 1. *styl.* o. *sem.* 1,
 nudum.
Herba, immersa. *fol.* verticillata, dichotoma, linearis.

- Demersum.* 1. *CERATOPHYLLUM*. *b. m.* 488. *L'hydre cernu.*
Equisetum ramosum aquis immersum. mag. Bot.
app. 292.

T H E L I G O N U M.

Mas. *cal.* 2-fidus: laciniis perpendicularibus revolutis. *flam.* 10-12.
 Fem. *cal.* maris. *pist.* 1. *caps.* coriacea 1-sperma.
Herba, prostrata. *inflor.* sessilis: masc.
 subsolitaria, flosculo femineo, folioque opposita: fem. axillaris, solitaria.

OBS. Ex singulari maris & feminæ situ, cuilibet attendenti patet, feminam non ab opposto sibi mare, sed à superiori fæcundi posse.

- Cynocrambe.* 1. *THELIGONUM*. *b. m.* 489.
 Alsine parietariæ foliis. *mag. Bot.* 15.
Cynocrambe *Dioscoridis. mag. char. pl.* 150.
Parietariæ affinis. mag. hort. 153.

Q U E R C U S.

Mas. *cal.* 5-fidus ferè. *stam.* 10-12.

Fem. *cal.* 1-phyllus integerrimus scaber.

styl. 2-5. *sem.* 1, ovatum.

Arbor. *fol.* simplex. *inflor.* mas. amenta laxa fasciculata. fem. flosculis subsolitariis sessilibus.

1. QUERCUS foliis ovato-oblongis indivisis serratisque subtus tomentosis, cortice integro. *b. m.* 491. *Le chêne verd.*

Ilex arbor. *mag.* *Bot.* 141.

Ilex folio oblongo serrato. *mag.* *hort.* 105.

β. *Ilex* folio rotundiori molli modicè sinuato, sive *smilax.* *mag.* *hort.* 105.

γ. *Ilex* folio angusto non serrato. *mag.* *hort.* 105.

δ. *Ilex* folio agrifolii. *mag.* *Bot.* 141. *hort.* 105. *Tour.* 583.

2. QUERCUS foliis oblongo-ovatis sinuato-spinosis sessilibus subtus tomentosis, glandibus pedicellatis. *b. m.* 491.

Ilex arbor foliis rotundioribus & spinosis. *mag.* *Bot.* 141.

3. QUERCUS foliis ovatis indivisis spinoso-dentatis utrinque glabris. *b. m.* 491. *Coccifera.*

Ilex aculeata cocciglandifera. *mag.* *Bot.* 140. *hort.* 105.

β. *Ilex media*, cocciferæ ilici planè suppar, folio aquifolii. *mag.* *Bot.* 141. *hort.* 105.

* PHARM. *Quercus coccifera* cortex, glandes, cypulae, folia, kermes, syrpus, succus. Vis subsequentis... *kermes* vis subastringens, roborans, analeptica, aphrodisiaca, abortui præcavendo apta. *Kermes* in substantia ad grana xv, xx.. *syrpus* ad unc. i.. *confertio* ad drach. i.

4. QUERCUS foliis deciduis oblongis superne latioribus, sinibus acutioribus, angulis obtusis. *b. m.* 491. *Le chêne.* *Robur.*

Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo. *mag.*
Bot. 215. *hort.* 167.

* PHARM. *Quercus* cortex, glandes, cupulæ, folia.
Vis adstringens, antidiarrhoïca, antitertianaria.
Glandes, cupulæ, in substantia ad drach. I. II.

F A G U S.

Mas. *cal.* 5-fidus campanulatus. *stam.* 12.

Fem. *cal.* 4-dentatus. *styl.* 3. *caps.* (antea
calyx) muricata, 4-valvis, *sem.* 2.

Arbor. fol. simplex. *inflor.* mas. amenta
bina, terna, interrupta. fem. subsolita-
ria sessilis.

Castanea. 1. FAGUS foliis lanceolatis acuminatis serratis sub-
tus nudis, amentis masculis cylindricis. *b. m.*
492. *Le châtaignier.*

Castanea sativa. *mag.* *Bot.* 55. *hort.* 46.

Castanea sylvestris. *mag.* *hort.* 46.

* PHARM. *Castanearum fructus.* Vis flatulenta,
demulcens, antiexcoriativa. Datur formâ cocho-
late, decocti lacti miscendi, cataplasmati-
satis.

HABITAT ad lœvam in luco gramuntio.

Sylvatica. 2. FAGUS foliis ovatis obsoletè serratis, amentis
masculis subglobosis. *b. m.* 492. *Le hêtre.*

Fagus Latinorum, *oxia Græcorum.* *mag.* *hort.* 76.

* PHARM. *Fagi fructus*, *cineres clavellati.* Vis
temulentans, cephalalgica.

C O R Y L U S.

Mas. *cal.* 1-phylloides, 3-fidus squamæfor-
mis, 1-florus. *stam.* 8-10.

Fem. *cal.* 2-phylloides, lacerus. *styl.* 2. *nux*
ovata.

Arbor. ramis virgatis. fol. simplex. *inflor.*
mas. amenta cylindrica subquaterna..
fem.

fem. flosculo subsolitario sessili, alterno
in gemma ovata.

- i. CORYLUS stipulis ovatis obtusis. b. m. 493. *Le Avellana.*
noisettier.

Avellana sylvestris, seu *corylus sylvestris*. mag. Bot.

^{35.} Corylus sylvestris fructu albo aut rubro. mag. hort. 63.

* PHARM. *Avellana* oleum. Vis recentis olivæ
oleo analogia.

C A R P I N U S.

Masc. cal. 1-phyllus : squama ciliata. stam.
20.

Fem. cal. maris : squama obtusa. germ. 2.
styl. singulo germini 2. nux ovata.

Arbor. fol. simplex. *inflor.* mas. amenta cy-
lindrica : flosculis solitariis.. fem. amenta
ut in mare : flosculis geminatis.

- i. CARPINUS squamis strobilorum planis. b. m. *Betulus:*
493. *Le charme.*

Carpinus. mag. Bot. 50. hort. 45.

M O N O E C I A

M O N A D E L P H I A.

C U P R E S S U S.

Mas. cal. 1 - phyllus , integer , submem-
branaceus. antheræ 4 sessiles.

Fem. cal. maris. styl. ? puncta concava:
nux angulata.

Arbor. fol. imbricata opposita persistens:
inflor. mas. amenta teretia terminalia

decidua.. sem. strobili sparsi sessiles sub-solitarii.

- Sempervi-*
rens.
1. CUPRESSUS foliis imbricatis , frondibus quadran-gulis. *b. m. 493. Le cypres.*
(*Femina*) cupressus. *mag. Bot. 81. ramis in metæ fastigium cumulatis. mag. hort. 65.*
(*Mas*) cupressus ramis expansis. *mag. hort. 65.*
* PHARM. *Cupressi cortex* , *folia* , *lignum* , *stro-bili*. Vis adstringens , febrifuga. Datur in pul-vore ad drach. i.

P I N U S.

Mas. cal. 4-phyllus. stam. plura.

Fem. cal. 1-phyllus rigidus apice crassior.
pist. 1. nux alâ membranaceâ ex-cepta.

Arbor. fol. linearis rigida è gemma tu-bulata prodiens. inflor. mas. racemi fas-ciculati terminales.. fem. strobili subglo-bosi sessiles : flosculis inter squamas sin-gulas geminatis.

- Sylvestris.* 1. PINUS foliis geminis , primordialibus solitariis glabris. *b. m. 494. Le pin sauvage.*

Pinus sylvestris vulgaris genevensis. mag. hort. 160.

Pinus maritima altera. mag. Bot. 205.

Pinus sylvestris altera maritima. mag. hort. 160.

* PHARM. *Pini turiones* , *resina* , *pix* , *terebenthina communis*. Vis antiscorbutica , diuretica , abstergens.

- Pinea.* 2. PINUS foliis geminis , primordialibus solitariis ciliatis. *b. m. 494. Le pin domestique.*

Pinus sativa. mag. Bot. 205. hort. 160.

* PHARM. *Pini nuclei mundati*. Vis demulcens , aphrodisiaca , antidysurica , antitabida.

OBS. Pinus & cupressus sunt polycotyledones.

C R O T O N.

Fem. *cal.* polyphyllus. *styl.* 3, 2-fidi. *caps.*
3-locularis. *sem.* 1.

Caul. *fol.* *inflor.* Vide classeos 8^a. ordinem 26^{um}.

1. CROTON foliis rhombeis repandis, capsulis pen-
dulis, caule herbaceo. *b. m.* 495. *Le tourneſol.* *Tinctorium.*
Heliotropium tricoccum. *mag. Bot.* 126.
Ricinis aliquo modo ſimilis. *mag. hort.* 173.
* PHARM. *Lacmus succus.* Vide classeos 8^a. ordinem
25^{um}.

D I C E C I A

D I A N D R I A.

N A J A S.

Fem. *cal.* o. *pift.* 1. *caps.* 1-locularis ovata.

Caul. *fol.* *fulc.* Vide classeos 1^a. ordinem 21^{um}.

1. NAJAS. *b. m.* 500. *La nayade.*

Mirina.

S A L I X.

Maf. *cal.* squama monophylla. *glandula*
baseos nectarifera.

Fem. *cal.* maris. *styl.* 2-fidus. *caps.* 1-locu-
laris, 2-valvis. *sem.* papposa.

Arbor : ramis virgatis. *fol.* simplex. *in-*
flor. maf. amenta cylindrica erecta al-
terna. fem. *inflor.* maris.

* *Foliis glabris ferratis.*

1. SALIX foliis ferratis ovatis acutis glabris: ferra-
turis cartilagineis, petiolis calloſo-punctatis. *b.*
m. 500. *L'ozier.* *Vitellina.*

- Amygdalina.* 2. *SALIX* foliis ferratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis trapæziformibus. *b. m.* 501.
Salix spontanea fragilis folio auriculato; & non. *mag. hort.* 177.
- Rorismarini-folia.* 3. *SALIX* foliis integerrimis lanceolato-linearibus sessilibus strictis subtus tomentosis. *b. m.* 502.
- Fragilis.* 4. *SALIX* foliis ferratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *b. m.* 502.
- Helix.* 5. *SALIX* foliis ferratis glabris lanceolato-linearibus: superioribus oppositis obliquis. *Linn. sist. nat.* 1287.
Salix humilis capitulo squamoso. *mag. Bot.* 228.
Tour. 591.
- HABITAT juxta amnem à *Lavalette*, *Montferrier*.

* * *Foliis subferratis villosis.*

- Caprea.* 6. *SALIX* foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis undatis, supernè denticulatis. *b. m.* 501. *Le saule marceau.*
Salix latifolia infernè hirsuta. *mag. Bot.* 228.
β. *Salix leucophlæos* platyphyllos. *Tour.* 591?
 * PHARM. *Salicis caprea* folia. Vis salicis albæ.
- Viminalis.* 7. *SALIX* foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *b. m.* 501.
Salix oblongo incano acuto folio. *mag. Bot.* & *hort.* 177.
Salix angustis & *longissimis* foliis subtus alblicantibus, crispis. *mag. Bot.* 228.
- Alba.* 8. *SALIX* foliis lanceolatis acuminatis serratis, utrinque pubescentibus: serraturis infimis glandulosis. *b. m.* 501. *Le saule.*
Salix vulgaris alba arborescens. *mag. hort.* 177.
Salix alba perticalis vulgaris. *mag. Bot.* 228.
 * PHARM. *Salicis albae* folia. Vis antiaphrodisiaca, antiagripnica, ischæma, antidyseenterica, anti-hæmorrhoidalnis.

DIOE CIA

TRIANDRIA.

CAREX.

Mas. *cal.* Vide ejusdem classeos ordinem 19^{um}.

Fem. *cal.* *nectar.* *stigm.* *sem.* *caul.* *inflor.*
Vide *ibid.*

Inflor. (in utroque sexu) terminalis spicata solitaria.

10. CAREX spicâ dioicâ simplici. *b. m.* 480.
(Mas.) gramen cuperoïdes minimum spicâ simplici.
Sheuz. agrost. 497. *tab.* 11.
(Femina) gramen cyperoïdes minimum spicis minoribus minus compactis. *mag. Bot.* 117. *hort.* 93. *Scheuz.* 488. *icon.* 5. *tab.* 9.
Gramen cyperoïdes spicatum minus. *Bauh. hist.* 2.
497.

Dioicae

DIOE CIA

TERTRAN DRIA.

VISCUM.

Mas. *cal.* 4-partitus : *antheræ* absque filamentis.

Fem. *cal.* 4-phyllo superus. *styl.* o. *bacc.* 1-sperma. *sem.* cordatum.

Suffrutex, parasiticus articulato-dichotomus. *fol.* opposita subcarnosa.

1. VISCUM foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *b. m.* 502. *Le guy de chêne.*

Album.

* PHARM. *Visci* lignum, fructus. Vis antispasmodica, antiepileptica, antivertiginosa, antiparalytica, antidysenterica. *Lignum pulveratum* ad drach. 2.. *infusum* ad unc. fl. in vini albi, aquæ unciis 6.

M O R U S.

Mas. *cal.* Fem. *cal.* *styl.* *sem.* *caul.* *fol.*
inflor. Vide ejusdem classeos ordinem 20^{um}.

Nigra. 2. MORUS foliis cordatis scabris. *b. m.* 485. *Le meurier noir.*

Morus fructu nigro. *mag.* *Bot.* 178. *hort.* 138.

* PHARM. *Mori nigrae* rob., syrpus simplex & compositus. Intus vis refrigerans, adstringens, gargarismica, antianginosa, febribus sitique adversa.

U R T I C A.

Mas. *cal.* *nectar.* fem. *cal.* *sem.* *caul.* *fol.*
Vide ejusdem classeos ordinem 20^{um}. *inflor.* racemosa axillaris.

Dioica. 3. URTICA foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *b. m.* 484. *L'ortie ordinaire.*

Urtica urens maxima. *mag.* *Bot.* 281.

Urtica major vulgaris. *mag.* *hort.* 207.

* PHARM. *Urticae majoris* radix herba, succus. Vis aliarum specierum.

R H A M N U S.

Mas. *cal.* 4-fidus. squamæ stamina mu-
nientes 4. (corolla?)

Fem. *cal.* maris. *bacc.* 4-sperma.

Caul. *fol.* *inflor.* Vide classeos ejusdem ordines 6. 7. 8.

Catharticus. 4. RHAMNUS spinis terminalibus, floribus quadri-
fidis dioicis. *b. m.* 112. *Le nerprun.*

- (Major) rhamnus floribus dioicis, corollarum (*calycum*) laciniis tubo longioribus. *Gerard.*
gallopr. 461. *mag. Bot.* 222. *hort.* 172.
8. (Minor) rhamnus floribus dioicis, corollatum (*calycum*) laciniis longitudine tubi. *Gerard. gallop.*
462.
Lycium gallicum. mag. Bot. 172.
Rhamnus catharticus minor. mag. hort. 172.
* PHARM. *Spinæ cervinæ*, seu *rhamni cathartici* syrups, baccæ. Vis purgans, hydragoga, anticachectica, antihydropica. *Syrupus ad unct.* 1.

D I O E C I A**P E N T A N D R I A.****C A N N A B I S.**

Mas. *cal.* 5-partitus.

Fem. *cal.* 1-phyllo, latere hians. *styl.*
2. *nux* 2-valvis intra calycem clau-
sum.

Herba. fol. digitata opposita. *inflor.* mas.
racemosa terminalis. fem. axillaris glo-
merata sessilis.

I. CANNABIS. *b. m.* 504. *Le chanvre.*

Sativa.

Cannabis mas. mag. Bot. 47. *hort.* 40.

Cannabis femina. mag. Bot. 48. *hort.* 41.

* PHARM. *Cannabis folia*, semina. Vis narcotica,
antiauriginosa, antiaphrodisiaca, antigenorrhœ-
ca, temulentans, cautè usurpanda.

R H A M N U S.

Cal. caul. fol. bacc. Vide suprà *Pentand.*
monogyn.

5. RHAMNUS inermis, floribus dioicis, foliis du-
plicato-crenatis. *Linn. sp. ed.* 2^a. 280.
D d iv

*Frangula rugosiore & ampliore folio. Tour. 612.
HABITAT à Meyrueis, circa annem, & au bois
de l'Aigual.*

H U M U L U S.

Mas. *cal.* 5 - *phyllus*.

Fem. *cal.* 1 - *phyllus*, obliquè patens. *styl.*
2. *sem.* 1, intra calycem planum.

Herba, sinistrorum volubilis, scabra. *fol.*
opposita. *fulc.* stipulæ oppositæ inter-
foliaceæ.

Lupulus. 1. HUMULUS. *b. m. 505.* *Le houblon.*

Lupulus mas & femina. mag. Bot. 167. hort. 124.

* PHARM. *Lupuli* folia, coni, succus. Vis stomachica, aperiens, diuretica, splenica, tonica, temulentans.

P I S T A C I A.

Mas. *cal.* 5 - *fidus*.

Fem. *cal.* 3 - *fidus. styl.* 3. *drupa* 1 - *sper-*
ma *ficca*.

Arbor. fol. composita. *inflor.* mas. amen-
ta axillaria subbinata ramosa. fem. pani-
culæ ramosæ sparsæ.

Narbonensis. 1. PISTACIA foliis ternatis pinnatisque suborbicu-
latis. *b. m. 503.*

Terebinthus major pistaciæ folio. *mag. Bot. 249.*
hort. 192.

Terebinthus. 2. PISTACIA foliis impari-pinnatis: foliolis ovato-
lanceolatis. *b. m. 502.* *Le therebinte.*

Terebinthus vulgaris. mag. Bot. 248. hort. 192.

* PHARM. *Terebinthi* cortex, folia, terebinthina cypria, oleum, spiritus. Vis corticis, foliorum adstringens, antidiarrhoïca, terebinthinae resolvens, abstergens, vulneraria, diuretica, econ-

protica , antiphylsica , antiulcerosa , antigenorrhœica ; *olei*, *spiritus* antiischurica. Terebinthina datur intus à drach. fl. ad drach. 1, fl... *oleum*, *spiritus* à gutt. xx ad xxx.

3. PISTACIA foliis abruptè-pinnatis. *h. m. 503.* *Le Lentiscus. lentisque.*

Lentiscus vulgaris. mag. Bot. 153. hort. 114.

* PHARM. *Lentisci* lignum , mastix. Vis ligni adstringens , gingivalis , masticis corroborans , stomachica , masticatoria , tuffumigatoria , cachexiae serosæ adversa , anticatarrhalis , antiodontalgica , antiemetica , antidiarrhoeica. *Mastix* datur intus à gran. xv. ad xx.

S P I N A C I A.

Mas. *cal.* 5 - partitus.

Fem. *cal.* 4 - fidus. *styl.* 4. *sem.* 1, intra calycem induratum.

Herba. fol. alterna simplex. *inflor.* sparsa.

1. SPINACIA. *h. m. 504. Les épinards.*

Oleracea.

Spinacia capsula seminis aculeata , sive mas. *mag. hort. 188.*

Spinacia capsula seminis non aculeata , sive femina. *mag. hort. 188.*

* PHARM. *Spinacia* herba , semina. Vis humectans , refrigerans , emolliens , eccoprotica.

D I O E C I A

H E X A N D R I A.

T A M U S.

Mas. *cal.* 6 - partitus.

Fem. *cal.* maris. *styl.* 3 - fidus. *bacc.* 3 - locularis infera. *sem.* 2.

Herba, sinistrorum volubilis, farmentosa.
inflor. racemosa.

- Racemosa.* 1. TAMUS. *b. m. 505.* *Le sceau de la Vierge.*
Bryonia laevis, sive nigra racemosa. *mag. Bot. 39.*
Tamus racemosa flore minore luteo pallescente.
mag. hort. 190.
HABITAT in descensu montis *Capouladou*; in syl-
vulis à *Meurviel*, & au mont *St. Loup*.

S M I L A X.

Mas. cal. 6 - phyllus.

*Fem. cal. maris. styl. 3. bacc. 3 - locula-
ris. sem. 1.*

Fruticulus rigidus, *infracto - flexuosus.*
inflor. racemosa. *fulc.* cirrhi gemini
petiolares divergentes, antrorum re-
trorsumque volubiles.

- Aspera.* 1. SMILAX caule aculeato angulato, foliis dentato-
aculeatis cordatis novemnerviis. *b. m. 505.*
Smilax aspera rutilo fructu. *mag. Bot. 242.*
Smilax aspera fructu rubente. *mag. hort. 186.*

D I O E C I A

O C T A N D R I A.

P O P U L U S.

- Mas. cal. monophyllus planus lacerus :*
nectar. obliquum turbinatum integrum.
(corolla?)
*Fem. cal. & nectar. maris. stigma quadri-
fidum. caps. 2 - locularis. sem. multa
papposa.*

Arbor. fol. simplex alterna nutans : petiolis à basi ad medium teretibus ; è medio ad apicem compressis.. inde motus tremulus.

1. POPULUS foliis subrotundis dentato - angulatis. *Alba.*
b. m. 506. *Le peuplier blanc*, l'aube.
Populus alba. mag. Bot. 212.
Populus alba majoribus foliis. mag. hort. 163.
 2. Populus alba minoribus foliis. mag. hort. 163.
 2. POPULUS foliis deltoïdibus acuminatis ferratis. *Nigra.*
b. m. 506. *Le peuplier noir.*
Populus nigra. mig. Bot. 212. hort. 163.
- * PHARM. *Populi oculi* (gemmæ rectius) tintura, populeum, folia. Vis gemmæ, *populei*, obtundens, emolliens, soporifera, antihæmorrhoïdal, ambustis adverfa ; tinturæ antidiarrhoïca, antidysenterica, ulceribus internis adverfa ; foliorum antiarthritica. Dosis tinturæ ad drach. ff. aut drach. 1.

D I O E C I A

E N N E A N D R I A.

M E R C U R I A L I S.

Mas. *cal.* 3-partitus. *stam.* 9-12. *antheræ* globosæ didymæ.

Fem. *cal.* maris. *styl.* 2. *caps.* 2-cocca, 2-locularis, 2-sperma.

Herba & fruticulus. *fol.* opposita. *inflor.* mas, glomerato-spicata axillaris opposita. fem. sessilis subgeminata opposita.

NOTA. Singularis Botanicorum antiquorum error, qui plantas masculas pro feminineis habuerant, & vice versa.

1. MERCURIALIS caule simplicissimo ; foliis scabris. b. m. 507. *Perennis.*

Mercurialis montana spicata, seu *femina*. *mag. Bot.* 176. *hort.* 135.

Mercurialis montana testiculata, seu *mas.* *mag. hort.* 135.

Annua. 2. *MERCURIALIS* caule brachiatō, foliis glabris. *b. m.* 507. *La mercurielle.*

Mercurialis testiculata, seu *mas.* *mag. Bot.* 176. *hort.* 135.

Mercurialis spicata, seu *femina*. *mag. Bot.* 176. *hort.* 135.

* *PHARM.* *Mercurialis* herba, mel, syrupus. Vis eccoprotica, emolliens? aperiens? antihydriatica? anticachectica? antiauriginosa? antisterilitica?

Tomentosa. 3. *MERCURIALIS* caule suffruticoso, foliis tomentosis sessilibus integerrimis. *b. m.* 507.

Phyllon testiculatum. *mag. Bot.* 203.

Mercurialis fruticosa incana testiculata. *mag. hort.* 135.

Phyllon spicatum. *mag. Bot.* 203.

Mercurialis fruticosa incana spicata. *mag. hort.* 135.

D I O E C I A

M O N A D E L P H I A.

J U N I P E R U S.

Mas. cal. 1 - phyllus. Stam. 3. caul. fol.

Vide classeos 5^a. ordinem 9^{um}. *inflor.* amenita: squamis trifloris: flosculis verticillato-ternis, subternisque ordinibus.

Oxycedrus. 1. *JUNIPERUS* foliis ternis patentibus mucronatis, baccâ brevioribus. *b. m.* 509.

Juniperus major baccâ rufescente. *mag. Bot.* 228. *hort.* 107.

Phænicæa. 2. *JUNIPERUS* foliis ternis obliteratis imbricatis obtusis. *b. m.* 509. *Le cedre.*

Sabina major Monspeliensem. *mag. Bot.* 228.

- Juniperus* folio cupreoli major, fructu flavescente.
mag. hort. 107.
- * PHARM. *Sandaraca resina*. Vis... Vide classeos 5^a. ordinem 9^{um}. *ubi femina*.
3. JUNIPERUS foliis ternis undique imbricatis ova-
 tis obtusis. *b. m.* 509. *Lyeia.*
4. JUNIPERUS foliis oppositis erectis decurrenti-
 bus, oppositionibus pyxidatis. *b. m.* 509. *Sabina.*
- * PHARM. *Sabina* herba, aqua stillatitia, oleum
 stillatum. Vis... Vide classeos 5^a. ordinem 9^{um}. *ubi
 femina*.
5. JUNIPERUS foliis ternis patentibus mucronatis
 baccâ longioribus. *b. m.* 509. *Le genevrier.*
Juniperus vulgaris fruticosa. *mag. Bot.* 145. *hort.*
 107.
- * PHARM. *Juniperi* lignum, baccæ, oleum em-
 pyreumaticum, oleum essentialie, aqua stillati-
 tia, extractum. Vis... Vide classeos 5^a. ordinem 9^{um}.
ubi femina.

E P H E D R A.

Mas. *cal.* 2-fidus. *stam.* 7. *antheræ* 4 in-
 fiores, 3 superiores.

Fem. *cal.* 2-fidus, quintuplex. *pist.* 2.
sem. 2, calyce baccato tecta.

Fruticulus articulatus, nudus, rigidus.
fol. o. *inflor.* amenta axillaria. *fulc.*
stipulæ vaginantes tubulatæ, è qua-
 rum axillis inflorescentia prodit.

1. EPHEDRA pedunculis oppositis, amentis geminis. *Distachia.*
b. m. 510. *Le raisin de mer.*
Polygonum bacciferum maritimum minus. *mag.*
Bot. 208.
- Uva marina* Monspeliensium. *mag. hort.* 207.

M O N O E C I A
S Y N G E N E S I A.

R U S C U S.

Mas. *cal.* 6-phyllus. *nectar.* centrale ova-
tum apice perforatum.

Fem. *cal.* & *nectar.* maris. *styl.* 1. *bacc.*
3-locularis, 2-sperma.

Frutex. fol. terna, apice spinosa, per-
sistens, obliqua. *inflor.* epiphylla soli-
taria subsessilis.

Aculeatus. 1. RUSCUS foliis suprafloriferis nudis. *b. m.* 511.
Le houx frelon.

Ruscus. *mag. Bot.* 226.

Ruscus myrtifolius aculeatus. *mag. bert.* 175.

* PHARM. *Rusci* radix, folia. Vis corroborans,
incidentis, diuretica, antihydropica, antiaurigino-
sa, emmenagogue, antichlorotica. *Radix* ab
unc. fl. ad unc. 1.

P O L Y G A M I A

M O N O E C I A.

C E L T I S.

Hermaph. *cal.* 5-partitus. *stam.* 5. *styl.* 2.
drupa, 1-sperma.

Masc. *cal.* 6-partitus. *stam.* 6. *flyli* rudi-
mentum.

Arbor. fol. alterna simplex. *inflor.* pe-
tiolo unifloro axillari.

1. CELTIS foliis obliquè ovatis serratis acuminatis.

b. m. 512. Le micocoulier.

Lotus arbor. mag. Bot. 167. hort. 122.

Australis.

C O R I A R I A.

Hermaph. *cal. 5-phyllo. stam. 6-10. an-*
theræ 2-partitæ. styl. 5. sem. 5. peta-
lis succulentis baccatis tecta.

Mas. *cal. stam. antheræ hermaphroditi.*

Frutex tetragonus; ramis oppositis. in-
flor. racemosa: racemis oppositis sub-
ternatis: intermedio rameo, termina-
li, hermaphrodito: lateralibus sessili-
bus, masculis. fulc. squama ad basin
singuli pedicelli.

1. CORIARIA foliis ovato-oblongis trinerviis. *b. m. Myrtifolia.*
508.

Rhus myrtifolia Monspeliensium. mag. Bot. 222.
hort. 172.

OBS. Variat racemis omnibus, hermaphroditis,
 aut masculis.

H O L C U S.

Mas... *cal. gluma uniflora, 2-valvis.*
stam. 3.

Herba (gramen). inflor. Vide classeos 3^æ. ordi-
nem 3^{um}. ubi hermaph.

1. HOLCUS glumis glabris, floribus hermaphrodi- *Halepensis.*
 tis muticis, femineo aristato. *b. m. 513.*

2. HOLCUS glumis villosis bisfloris, hermaphrodito *Lanatus.*
 mutico masculo, aristâ recurvâ. *b. m. 513.*

Gramen paniculatum pratense molle. mag. Bot.
112.

3. HOLCUS glumis trifloris muticis glabris, her- *Odoratus.*
 maphrodito diandro. *b. m. 513.*

- Mollis.* 4. HOLCUS glumis bifloris nudiusculis, hermaphrodito mutico, masculo aristâ geniculatâ. *b. m. 514.*

P A R I E T A R I A.

Hermaph. *cal.* 2-phyllus. *stam.* 4, tactu sensibilia. *styl.* 1. *sem.* 1, superum, elongatum.

Fem. *cal. styl. sem.* ut in hermaphrodito.
Herba. *fol.* hispida, simplex. *inflor.* glomerata axillaris.

- Officinalis.* 1. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. *b. m. 516.*
La pariétaire.

Parietaria officinarum & Dioscoridis. *mag. Bot. 199. hort. 153.*

* PHARM. *Parietariae herba.* Vis emolliens, obtundens, diuretica, antiischurica, antidysurica, antinephralgica, antihydropica, anticalculosa, bechica.

A T R I P L E X.

Hermaph. *cal.* 5-phyllus. *stam.* 5. *styl.* 2-partitus. *sem.* 1, depresso.

Fem. *cal.* 2-phyllus. *styl.* & *sem.* ut in hermaphrodito.

Fruticulus & herba. *fol.* simplex. *inflor.* glomerato-spicata.

- Portulacoïdes.* 1. ATRIPLEX caule fruticoso, foliis obovatis. *b. m. 517.*

Halimus seu portulaca marina. *mag. Bot. 124.*

Atriplex maritima angustissimo folio. *mag. hort. 28.*

- Hortensis.* 2. ATRIPLEX caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *b. m. 517.* *L'arroche, bonne-Dame.*
Atriplex hortensis alba, seu pallidè virens. *mag. hort. 28.*

* PHARM.

- * PHARM. *Atriplicis sativæ* herba , semina. Vis *herbæ* , eadem ac *chenopodii rubri* , & boni *Henrici.* . *seminum* purgans , emetica , antirachitica.
3. ATRIPLEX caule herbaceo , foliis deltoideo-lanceolatis , obtusè dentatis , subtus argenteis. *b.*
m. 517.
Atriplex maritima laciniata. *mag.* *Bot.* 35.
4. ATRIPLEX caule herbaceo , valvulis feminineis *Hastata.*
magnis deltoïdibus sinuatis. *b. m.* 517.
Atriplex sylvestris folio hastato , seu deltoideo. *mag.*
Bot. 34. *hort.* 28.
Atriplex monspessulana cum pulchris involucris.
mag. *Bot.* 35 ? *hort.* 28 ?
5. ATRIPLEX caule herbaceo patulo , foliis subdeltoideo-lanceolatis , calycibus seminum disco dentatis. *b. m.* 518.
Atriplex oblongo angusto folio. *mag.* *Bot.* 35. *hort.* 28.
Atriplex monspessulana cum pulchris involucris.
mag. *Bot.* 35. *hort.* 28.
- NOTA. Synonymia 2^a. *Magnoliæ* ad hanc potius pertinere videtur , quam ad superiorem speciem.

P O L Y G A M I A

D I C C I A.

R H A M N U S.

Hermaph. *cal.* 5-fidus. *stam.* 5. *stygm.* 3^o
fidum. *bacc.* 3-sperma.

Maf. *cal.* *stam.* hermaphroditæ.

Caul. *fol.* *inflor.* Vide ejusdem classicos ordines
6, 7, 8, 25.

5. RHAMNUS spinis geminis deciduis , foliis lanceolatis ferrato-spinosis. *L' alaterne.* *Alaternus.*

Phylica elatior. *mag.* *Bot.* 203.

Alaternus. *mag.* *hort.* 7.

6. Alaternus , sive phylica humilior. *mag.* *hort.* 8. *mag.*
Bot. 203. E e

v. Alaternus monspeliacus foliis profundè incisis. mag.
hort. 8.

HABITAT ubique circa Monspelium. v., frequens
in saxosis à Villeneuve, Miraval, Frontignan.

F R A X I N U S.

Hermaph. cal. 4-partitus. stam. 2. pist. 1.
sem. 1, lanceolatum.

Fem. cal. pist. & sem. hermaphroditi.

Arbor. fol. opposita pinnata : rachi su-
pernè sulcata. inflor. racemosa, pri-
mordialis.

Excelsior. 1. FRAXINUS foliolis serratis, floribus apetalis. h.
m. 520. Le frêne.

Fraxinus. mag. Bot. 99. vulgatior. hort. 81.

* PHARM. Fraxini lignum, cortex, aqua, folia,
semina. Vis lignii, corticis, foliorum, adstringens,
antihæmorrhagica, febrifuga ; semen.

P O L Y G A M I A

T R I C E C I A.

O S Y R I S.

Hermaphr. cal. 3-fidus : squamæ 3, singulæ
inter singulam calycis laciniam. stam.

3, calyci inserta. styl. 1. bacc. 1-sperma.

Maf. cal. & stam. hermaphroditi.

Fem. cal. styl. & bacca hermaphroditi.

Frutex, ramis virgatis angulatis. fol. in-
tegerrima alterna sessilis.

Alba. 1. OSYRIS. h. m. 502.

Casia poëtica Monspeliacum. mag. Bot. 54.

F I C U S.

Mas. *cal.* 5-partitus. *stam.* 3.

Fem. *cal.* 3-partitus. *pist.* 1. *sem.* 1.

Arbor. inflor. aggregata in calyce turbinato communi fructiformi sparso sub-solitario sessili : ore minimo patulo, squamis imbricatis tecto.

OBS. Tricoccia consistit in arboribus hermaphroditis ; aliis masculiferis , & aliis androgynis : calycibus nempe basi feminiferis , apice verd masculiferis.


1. FICUS folis palmatis. b. m. 521. *Le figuier.* *Communis.*

Ficus communis. mag. Bot. 97. hort. 77.

2. Caprificus. mag. Bot. 97.

Ficus sylvestris. mag. hort. 76.

* PHARM. *Caricæ pingue.* Vis nutriendis , obtundens , lubricans , impinguans , hepatica , diuretica , antitussiculosa , buboni , furunculo adversa. Dantur intus n°. vi decocta in aquæ pinta.



Classis XVII^a.

CRYPTANTHEMI.

F I L I C E S.

EQUISETUM.

OPHIOGLOSSUM.

OSMUNDA.

ACROSTICHUM.

PTERIS.

ASPLENIUM.

POLYPODIUM.

ADIANTUM.

MARSILEA.

M U S C I.

LYCOPODIUM.

SPHAGNUM.

FONTINALIS.

POLYTRICHUM.

MNIUM.

BRYUM.

HYPNUM.

A L G Ā.

JUNGERMANNIA.

MARCHANTIA.

TARGIONIA.

LICHEN.

CHARA.

TREMELLA.

FUCUS.

ULVA.

CONFerva.

F U N G I.

AGARICUS.

BOLETUS.

PHALLUS.

CLATHRUS.

CLAVARIA.

PEZIZA.

LYCOPERDON.

MUCOR.



CRYPTANTHEMI.

F I L I C E S.

E Q U I S E T U M.

Caul. articulata. *fol.* verticillata articulata. *inflor.* terminalis spicata : flosculis peltatis verticillatis ; polline viridi.

Arvense. 1. EQUISETUM scapo fructificante nudo , sterili frondoso. *b. m.* 522. *La queue de cheval.*

Equisetum arvense longioribus setis. *mag. Bot.* 89, *hort.* 73.

* PHARM. *Equiseti* herba. Vis adstringens ! anti-diarihoïca antidyfenterica , antibæmorïhoïca , ischæma , antihæmaturica ! antimenorrhagica. *Pulvis* ad drach. 1.. *succus* ad unc. 11.. *aqua stillatitia* ad cochlear. 111.. *herba* ad man. 1, in aquæ lib. iv.

Palustre. 2. EQUISETUM caule angulato , frondibus simpli-cibus. *b. m.* 522.

Fluviale. 3. EQUISETUM caule striato , frondibus subsim-plicibus. *b. m.* 522.

Equisetum majus aquaticum. *mag. Bot.* 89. *Læ préle.*

Equisetum palustre longioribus setis. *mag. hort.* 72. OBS. Ad altitudinem cubitalem ex crescit in pratis , à *Mont-ferrier* , *Lattes*.

Hyemale. 4. EQUISETUM caule nudo scabro basi subramoso. *b. m.* 522.

Equisetum foliis nudum non ramosum. *pin.* 116. *mag. hort.* 73.

O P H I O G L O S S U M.

Fol. frondosa petiolata integerrima. *in-flor.* spicata pedunculata è basi fron-

dis, articulata: articulis distichis transversim dehiscentibus.

1. OPHIOGLOSSUM fronde ovatâ. *b. m. 523.* *La Vulgarum.*
langue de serpent. mag. Bot. 191. hort. 148.

O S M U N D A.

Fol. petiolata pinnatifida, vel bipinnata.
inflor. spicata, fructificationibus globosis; vel sessilis frondis discum tegens.

* *Scapis insidentibus cauli, ad basin frondis.*

1. OSMUNDA spicâ caulinâ solitariâ, fronde pinnatifidâ solitariâ. *b. m. 523.* *Lunaria.*
Lunaria racemosa minor vel vulgaris. *mag. hort. 123.*

** *Fronde ipsâ fructificationes ferente.*

2. OSMUNDA fronde bipinnatâ apice racemiferâ. *Regalis.*
Linn. sif. 1319. La fougere fleurie.
Osmunda vulgaris & palustris. *Tour. 547.*
* PHARM. *Filicis floride radix. Vis polypodii,*
filicis maris, filicis feminæ.
HABITAT à *Lamalou.* Frondes altissimæ bicubitales.

*** *Frondibus aliis fructificantibus,*
aliis foliaceis.

3. OSMUNDA frondibus lanceolatis pinnatifidis,
laciiniis confluentibus integerrimis parallelis. *b. m. 523.* *Spicans.*
Lonchitis altera polypodii folio. *Baub. hift. 3. 744.*

A C R O S T I C H U M.

Fol. frondosa petiolata, simplex vel com.
E e iv

posita. *inflor.* sessilis : fructificationibus discum totum frondis tegentibus.

* *Fronde simplici divisâ.*

- Septentrionale.* 1. ACROSTICHUM fronde nudâ linearî laciniatâ. *b. m. 524.*

** *Fronde subbipinnatâ.*

- Thelypteris.* 2. ACROSTICHUM fronde pinnatâ, pinnis pinnatifidis integerrimis. *b. m. 524.*

*** *Fronde bipinnatâ.*

- Pulchrum.* 3. ACROSTICHUM fronde bipinnatâ, pinnulis indivisis. *b. m. 525.*

Adiantum pulcherrimum. *Baub. hist. 3. 742.*

P T E R I S.

Fol. frondosa, petiolata, decomposita.
inflor. sessilis : fructificationibus in lineis marginalibus.

- Aquilina.* 1. PTERIS fronde supradecompositâ : foliolis pinnatis : pinnis lanceolatis : infimis pinnatifidis : superioribus minoribus. *b. m. 525.*

Filix major ramosa, pinnulis obtusis non dentatis. *mag. Bot. 98. bart. 78.*

A S P L E N I U M.

Fol. frondosa, petiolata simplex vel composta. *inflor.* sessilis : fructificationibus in lineolis disci frondis sparsis.

* *Fronde simplici.*

- Scolopendrium.* 1. ASPLENIUM frondibus simplicibus cordato-lingularis integerimis, stipitibus hirsutis. *b. m. 525.*
La scolopendre.

Lingua cervina officinarum. mag. Bot. 159. hort.

121.

* PHARM. *Scolopendrae* herba. Vis adstringens, exsiccans, tonica, deobstruens, diuretica. Datur ad drach. i. ii. exsiccata & decocta.

** *Fronde pinnatifida.*

2. ASPLENIUM frondibus pinnatifidis, lobis alternatis confluentibus. b. m. 526. *L'herbe dorée.* Ceterach.

Ceterach officinarum. mag. Bot. 53.

Asplenium tive ceterach. mag. hort. 34.

* PHARM. *Ceterach* herba. Vis tonica, splenica, deobstruens, expectorans, antiallasmatica, antihydropica. Dosis scolopendrae.

*** *Fronde pinnata.*

3. ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. b. m. 526. *Le politric.* Trichomanes.

Trichomanes seu polytrichum officinarum. mag. Bot. 212. hort. 163.

* PHARM. *Trichomanis* herba. Vis subastringens, thoracica, splenica.

**** *Fronde decomposita.*

4. ASPLENIUM frondibus duplicato-pinnatis: pinnis obovatis superne crenatis: foliolis inferioribus majoribus. b. m. 526. Adiantum nigrum.

Adiantum nigrum. mag. Bot. 5. hort. 6.

* PHARM. *Adianti nigri* herba. Vis adianti capilli Veneris, &c.

5. ASPLENIUM frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. b. m. 526. Ruta muraria.

Ruta muraria. mag. Bot. 227.

Adiantum album tabernæ. mag. hort. 6.

* PHARM. *Rutæ murariae* herba. Vis tonica, thoracica, antiphysica.

6. ASPLENIUM frondibus tripinnatis: foliolis alternis, pinnis lanceolatis inciso-serratis. b. m. 527. Onopteris.

POLYPODIUM.

Fol. frondosa petiolata, simplex vel composita. *inflor.* sessilis: fructificationibus in punctis subrotundis sparsis per discum frondis. Operculum reniforme peltatum planum cuilibet fructificationis puncto superimpositum.

* *Fronde pinnatifida, lobis coadunatis.*

Vulgare. 1. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis, pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamatâ. b. m. 527. *Le polypode.*

Polypodium vulgare. mag. Bot. 211. hort. 163.

* PHARM. *Polypodii radix.* Vis incdens, eccoprotica, edulcorans, thoracica, antimelancholica, antihypochondriaca. *Radix* ab unc. 1. ad unc. ii.

Cambricum. 2. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis: pinnulis lanceolatis lacero-pinnatifidis serratis. b. m. 527. *Polypodium cambroritannicum*, pinnulis ad margines laciniatis. mag. hort. 163.

** *Fronde pinnatâ simpliciter.*

Lonchitis. 3. POLYPODIUM fronde pinnatâ; pinnis lunulatis ciliato-serratis declinatis, petiolis strigosis. b. m. 527.

Fontanum. 4. POLYPODIUM fronde subpinnatâ lanceolatâ: foliolis subrotundis, stipite lœvi. Linn. sif. 1326. *Adiantum album filicis folio.* mag. hort. 6. HABITAT in rupibus humentibus, à Monpeyroux, S. Guilhen le désert.

Phegopteris. 5. POLYPODIUM frondibus subbipinnatis, foliolis infimis reflexis, paribus, pinnulâ quadrangulari coadunatis. b. m. 528.

Filix mas. 6. POLYPODIUM fronde bipinnatâ, pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. b. m. 528. *La sougere male.*

Filix mas non ramosa dentata. *mag. hort.* 78.

* PHARM. *Filicis maris radix*. Vis tonica! antihelminтика, deobstruens, antimelancholica, antirachitica, antipodagrifica. Datur ad unc. 1. in aqua pinta, decocta.

7. POLYPODIUM fronde bipinnatâ, pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *b. m. 528.* *La sougere femelle.* *Filix femina.*

* PHARM. *Filicis femine radix*. Vis prioris.

8. POLYPODIUM frondibus subbipinnatis, foliolis ovato-oblongis, pinnis obtusiusculis apice argute serratis. *b. m. 528.* *Cristatum.*

9. POLYPODIUM fronde bipinnatâ, pinnis lunulatis dentatis, stipite strigoso. *b. m. 528.* *Aculeatum.*

Filix mas aculeata major. *mag. hort.* 78.

10. POLYPODIUM fronde bipinnatâ, foliolis pinnaeque remotis lanceolatis, ferraturis acuminatis. *b. m. 528.* *Rhaeticum.*

11. POLYPODIUM fronde bipinnatâ, foliolis remotis, pinnis subrotundis incisis. *b. m. 528.* *Fragile.*

*** *Fronde supradecompositâ.*

12. POLYPODIUM fronde supradecompositâ, foliolis ternis bipinnatis. *b. m. 529.* *Dryopteris.*

A D I A N T U M.

Fol. frondosa, petiolata. *inflo.* sessilis: fructificationibus in margine replicato frondis.

1. ADIANTUM frondibus decompositis, foliolis alternis, pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *b. m. 529.* *Le capillaire.* *Capillus Veneris.*

Adiantum foliis coriandri. *mag. Bot. 4. hort. 5.*

* PHARM. *Capilli Veneris herba*. Vis diuretica, sudorifera, hepatica.

MARSILEA.

Rad. filamentosa perpendicularis immer-
sa. *fol.* natans opposita frondosa, in-
tegerrima. *inflor.* mas. sessilis conferta
fepiphylla. fem. solitaria radicibus in-
voluta.

Natans. 1. MARSILEA foliis oppositis simplicibus. *b. m.*

529.

Lenticula palustris latifolia punctata. *mag. Bot.*
app. 301. hort. 114.

MUSCI

LYCOPODIUM.

Anthera bivalvis sessilis : *calyptra*, o.
Herba, ramosa. *fol.* imbricata. *inflor.*
spicata, vel axillaris solitaria.

Clavatum. 1. LYCOPODIUM foliis sparsis filamentosis, spicis
teretibus pedunculatis geminis. *b. m. 530.*

* PHARM. *Musci clavati* herba, farina (*rectius*
pollen). Vis antieclamptica, antitrichomatica.

Alpinum. 2. LYCOPODIUM foliis quadrifariam imbricatis
acutis, surculis erectis dichotomis, spicis sessili-
bus teretibus. *b. m. 530.*

Denticula-
tum. 3. LYCOPODIUM foliis bifariis, superficialibus
imbricatis, surculis repentibus, floribus sparsis.
b. m. 530.

Muscus denticulatus minor. *mag. Bot. 178. hort.*
138.

SPHAGNUM.

Anthera operculata : ore lævi : *calyp-*
tra, o.

C R Y P T A N T H E M I . 445
Herba ramosa immersa. *inflor.* ramea terminalis.

1. SPHAGNUM ramis deflexis. *b. m.* 530. *Palustre.*
Muscus squamosus palustris candicans mollissimus.
Tour. 554.

F O N T I N A L I S.

Anthera operculata : *calyptra* sessilis,
perichaetio imbricato inclusa.

Herba ramosa immersa. *inflor.* axillaris sessilis.

1. FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis *Antipyretica*
acutis, antheris lateralibus. *b. m.* 530.
Muscus squamosus foliis acutissimis in aquis nascentes. *Tour.* 554.
Muscus saxatilis repens comâ sparsâ. *Baub. pin.* 62.
Muscus aquaticus folio expanso. *Baub. prodr.* 152.
2. FONTINALIS foliis imbricatis subulato-lanceolatis, capitulis lateralibus. *Linn. sif. nat.* 1332. *Squamosa.*
Potamogeton minus musco simile. *mag. Bot. app.*
304.
Muscus aquaticus terrestri vulgari similis. *mag. hort.* 139.
HABITAT in fossis uidis, à Lattes, à Perauls. *Julio floret.*

P O L Y T R I C H U M.

Mas. *anthera* operculata, apophysî minimaæ insidens. *calyptra* villosa.

Fem. stellata in distincto individuo.

Herba. *fol.* imbricata rigida. *inflor.* mas. terminalis filamento rigido longo; fem. terminalis sessilis.

2. POLYTRICHUM caule simplici, antherâ parallelopipedâ. *b. m.* 531. *Le perce mouffe.* *Commune.*

Muscus capillaris. mag. Bot. 179. hort. 138.

Muscus juniperifolius capitulo quadrangulo. *Vaill.*
Bot. par. 131. *tab.* 23. *fig.* 8... *muscus faxatilis*
aut *tylvestris*. mag. *hort.* 138.

* *PHARM.* *Adianti aurei* herba. *Vis bechicæ*, anti-
pleuritica, sudorifera.

Alpinum. 2. *POLYTRICHUM* caule ramosissimo, pedunculis terminalibus. *Linn. sif. nat.* 1332.

HABITAT à l'Esperou, au Vigan, à Anduze. D. D.
D. Faulet, Arnaud, Clapiers. *Muscus prostratus*;
furculis teretibus ramosis. *Calyptra* villosissimâ.

M N I U M.

Maf. anthera operculata, absque apophysi. *calyptra* lævis.

Fem. capitulum nudum pulverulentum in
distincto individuo.

Herba. fol. alterna. inflor. maf. filamento
debili radicali. fem. sessilis, terminalis.

Hygrometricum. 1. *MNIUM acaule*, antherâ nutante, calyprâ reflexâ tetragonâ. *b. m.* 531.

Musci capillaris altera species minor. mag. *Bot.*
179. *hort.* 138.

Capillare. 2. *MNIUM antheris pendulis*, foliis ovatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis. *b. m.* 531.

Muscus capillaris folio rotundiore, capsulâ oblongâ incurvâ. mag. *hort.* 138. *icon.* 139.

Muscus capillaceus major, capitulis crassioribus cylindricis nutantibus. *Tour.* 551.

Fontanum. 3. *MNIUM* caule simplici, geniculis inflexo. *b. m.* 532.

Muscus capillaceus tenuissimus, pediculo longissimo purpurascente, capitulo rotundiori. *Tour.* 551.

Serpullifolium. 4. *MNIUM* pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Linn. sp.* 1113.

Muscus polygoni folio. *Tour.* 555.

- ꝝ. (*Cuspidatum*) pedunculis aggregatis , foliis acutis serratis. *Linn. sp.* 1113.
- ꝝ. (*Undulatum*) pedunculis aggregatis , foliis oblongis undulatis. *Linn. sp.* 1113.
- HABITAT à l'*Esperou* , au *Capouladou*. ♂. Antheræ crassiores ; folia subrotunda.
5. MNIUM caule dichotomo , axillis pedunculiferas , antherâ erectâ , foliis carinatis. *Linn. sp.* 1111. *Purpureum.*
- HABITAT cum priori , & à *Lamalon*. Folia tenuissima , exsiccata purpurascens , filamenta purpurascens.

B R Y U M.

Mas. *anthera* operculata ; *calyptre* lævis.
fem. in eadem planta.

Herba. *fol.* radicalis. *inflor.* filamentum ortum è tuberculo centrali bulbiformi.

* *Antheris pedunculatis erectis.*

1. BRYUM antheris erectis sphæricis. *Linn. sp.* 1115. *Pomiforme.*
b. m. 532.
- Muscus capillaceus medius capitulis globosis. *Tour.* 551.
- HABITAT à *Gramont* , *Castelnau* , sous la citadelle.
Folia setacea longiuscula.
2. BRYUM antheris erectis obovatis , calyprâ subulatâ , surculis acaulibus , foliis ovatis muticis. *Pyriforme.* *Linn. sp.* 1116.
- Muscus capillaceus minimus , capitulis pyriformibus turgidis. *Tour.* 553.
- HABITAT copiosè cum priori , & circa urbem.
Calyprâ sèpius obliquâ.
3. BRYUM antherâ erectâ oblongâ , calypris laxis æqualibus perpendicularibus. *b. m.* 532. *Extinctorium.*
Muscus capillaris minimus cucullatus. *mag. hort.* 139. *tab.* 82.
4. BRYUM antheris erectis subulatis , surculis acaulibus. *Linn. sp.* 1116. *Subulatum.*

Muscus capillaris capsulâ longiore. *mag. hort.* 138.

HABITAT cum prioribus. *Antheræ* (cum operculo) lineas 4 longæ. *Filamentum* apice crassius. *Operculum* lineam unam longum mucronatum. *Calyptra* antherâ dimidio brevior.

Rurale. 5. *BRYUM* antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis. *Linn. sp.* 1116.

HABITAT copiosissimè supra muros, circa urbem. Folia angusta. Filamenta rufa longa. *Capsula* oblongæ obscure rufescentes.

Murale. 6. *BRYUM* antheris erectis, foliis piliferis erectiusculis, surculis simplicibus cespitosis. *b. m.* 532. HABITAT cum priori, & à *Lamalou*. Folia imbricata pilo longo albo terminata.

Heteromallum. 7. *BRYUM* antheris erectis, foliis setaceis secundis. *Linn. sp.* 1118.

Muscus capillaceus minimus plumosus elegans. *Tour.* 552.

HABITAT copiosè à *l'Esperou*, *Lamalou*, au *Vigan*.

Truncatulum. 8. *BRYUM* antheris erectis subrotundis, operculo mucronato. *Linn. sp.* 1119.

Muscus capillaceus omnium minimus. *Tour. Vaill. Bot. par.* 130. *tab.* 26. *fig.* 2.

HABITAT in saxosis juxta amnem, à *Castelnau*, *Lavalette*. *Filamentum* vix lineas 4 longum. *Capsula* valde truncata, chyatiformis.

Hypnoïdes. 9. *BRYUM* antheris erectis, caule erectiusculo, ramis lateralibus brevibus fertilibus. *Linn. sp. pl.* 1119.

HABITAT à *Lamalou*, au *Vigan*, à *l'Esperou*. Filamenta è latere ramorum. Rami alii steriles. Folia setacea. Antheræ arcuatæ.

** *Antheris nutantibus.*

Polyinatum. 10. *BRYUM* antheris subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Linn. sp. pl.* 1121.

Muscus capillaceus lanuginosus minimus. *Tour.* 552.

Muscus capillaris saxatilis sericoïdes. *mag. hort.* 139.

HABITAT ubique circa urbem, in terris, saxis, muris humidis.

11. *BRYUM*

11. BRYUM antheris pendulis, foliis lanceolato-setaceis acuminatis, pedunculis longissimis. Linn. sp. 1121.

Cespitium.

Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. Tour. 552.

HABITAT cum prioribus, & à Gramont. Pars media inferior filamentorum purpurea. Folia viridula.

*** *Antheris sessilibus.*

12. BRYUM antheris subsessilibus terminalibus, calyptre minimâ. Linn. sp. 1115.

Apocarpum.

HABITAT ad dexteram ultra pontem in saxosis, à Castelnau, Lavalette.

13. BRYUM antheris sessilibus sparsis, calyptris striatis sursùmve pilosis. Linn. sp. 1115.

Striatum.

HABITAT supra arbores, rupes, muros, à Cau-
nelles, Gramont, Castelnau, au martinet d'Alut.
Facie hypni. Antheræ oblongæ subsessiles.

H Y P N U M.

Mas. *anthera* operculata. calyptra lèvis:
fem. in eadem planta.

Herba surculi ramoso-pinnati. fol. imbri-
cata. *inflor.* filamentum axillare ortum
è tuberculo.

* *Frondibus pennatis.*

1. HYPNUM fronde simplicissimâ pinnatâ lanceo-
latâ basi pedunculiferâ. Linn. sp. 1122.

Taxifolium.

HABITAT au Vigan, à l'Esperou, Lamalou. D.
Paulet ; à Castelnau. D. Amoreux.

2. HYPNUM fronde simplicissimâ pinnatâ lanceola-
tâ, apice pedunculiferâ. Linn. sp. 1123.

Bryoëdes.

HABITAT cum priori. Muscus vix uncias 6 lon-
gus. Folia disticha ut in priori.

3. HYPNUM fronde pinnatâ ramosâ : foliolis imbri-
catis acutis complicatis compressis. Linn. sp. 1123.

*Complanat-**tum.*

Muscus terrestris squamosus supinus foliis obtusis.

Tour. 553.

HABITAT cum prioribus. Surculi prostrati. Filamenta tenuissima.

*** *Surculis vagis.*

Undulatum. 4. HYPNUM surculis ramosis, frondibus subbipinnatis, foliis undulatis complicatis. Linn. sp. pl. 1124.

HABITAT cum prioribus; à la Serane; à l'Aigual.

Crispum. 5. HYPNUM surculis ramosis, frondibus subbipinnatis, foliolis undulatis planis. Linn. sp. 1124. Muscus squamosus major linariæ folio, crispus. Tour. 554.

HABITAT cum prioribus, & à Meurviel.

Triquetrum. 6. HYPNUM ramis recurvis vagis, foliis ovatis recurvatis patulis. Linn. sp. 1124.

Muscus vulgatissimus terrestris & hortensis. mag. Bot. 178. hort. 138.

Muscus squamosus major, sive vulgaris. Tour. 553.

HABITAT ubique in humidis; à Caunelles, Mont-ferrier. Filamenta longa purpurascens. Capsulæ rubræ subglobosæ incurvæ.

Rutabulum. 7. HYPNUM ramis vagis subrepentibus, foliolis ovatis mucronatis imbricatis. Linn. sp. 1124.

HABITAT cum prioribus. Capsulæ paulò majores quam in priori.

*** *Surculis pennatis.*

Filicinum. 8. HYPNUM surculis pennatis, ramulis distantibus, foliolis imbricatis incurvis acutis secundis. Linn. sp. 1125.

HABITAT à la source du Lès, à Prades. Filamenta longa; folia tenella.

Proliferum. 9. HYPNUM surculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis, solitariisque. Linn. sp. 1125.

Muscus filicinus major. Tour. 556. tab. 326. f. c. mag. hort. 138. Bot. mons. 179.

HABITAT ubique circa urbem, à Castelnau, Gramont.

**** *Foliis reflexis.*

10. HYPNUM surculo subpinnato , foliis secundis recurvis apice subulatis. *Linn. sp. 1126.* *Cupressiforme.*
Muscus squamosus ramosus minor & crispus. Tour.
553.
HABITAT à l'Esperou , au Vigan. D. Paulet.
11. HYPNUM surculis repentibus , ramis vagis teretibus , foliis patulis acuminatis. *Linn. sp. 1127.* *Viticulosum.*
Muscus squamosus viticulis longioribus glabris. Tour. 555.
- HABITAT copiosè à Montferrier , à Meurviel. Muscus atrovirens ; ramis longis cylindricis. Filamenta oriuntur è tuberculo subovato acuminato ; squamulae quædam ad basin filamentorum.*
12. HYPNUM surculo erecto , ramis fasciculatis alternis terminalibus subdivisis , antheris subnudantibus. *Linn. sp. 1128.* *Alopecurum.*
Muscus squamosus erectus ramosus alopecuroïdes. Tour. 554. tab. 326. fig. b.
- HABITAT cum prioribus , à Lamalou. Surculi basi nudi ; stipitibus compressiusculis subrubentibus.*
- **** *Surculis confertis.*
13. HYPNUM surculo repente , ramis confertis erectis , foliis subulato - setaceis , antheris erectis oblongis. *Linn. sp. 1129.* *Sericum.*
Muscus capillaceus ramosus minor , capitulo angustissimo. Tour. 552.
- HABITAT cum priori ; & à Meurviel.*
14. HYPNUM surculis erectis ramosis incurvatis. *Linn. sp. 1130.* *Sciuroïdes.*
HABITAT à Lamalou. Viticuli erecti teretiusculi longi. Folia apice incurva. Capsulæ rectæ oblongæ.

A L G È.

JUNGERMANNIA.

Mas. *anthera* 4-valvis, filamento nudo.
 Fem. sessilis nuda: seminibus subrotundis.
Herba, surculis pennatis. *fol.* imbricata
 disticha.

* *Frondibus imbricatis.*

Complanata. 1. JUNGERMANNIA surculis repentibus: foliolis
 inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis
 æqualibus. *Linn. sp.* 1133.

HABITAT à l'Esperou, à Lamalou. D. Paulet.

Dilatata. 2. JUNGERMANNIA surculis repentibus, foliis in-
 ferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis
 apice latioribus. *Linn. sp.* 1333.

Muscus saxatilis nummulariæ folio minor. *Tour.*
 555.

Muscus squamosus nummulariæ folio minor. *Tour.*
 503. *Bot. par.*

HABITAT cum priori. Minima est.

Platyphylla. 3. JUNGERMANNIA surculis procumbentibus sub-
 tus imbricatis, foliolis cordatis acutis. *Linn. sp.*
 1134.

Muscus subrotundus foliis densissimis squamosus.
Tour. 554.

HABITAT à Castelnau, Montferrier, Lavalette
 super saxa, muros. D. Amoreux.

MARCHANTIA.

Mas. *cal.* peltatus subtus tectus corollis
 monopetalis. *antheræ* multifidæ.

Fem. *cal.* campanulatus polyspermus.

Herba. frondes planæ, nervo longitudi-
 nali subtus radicante. *inflor.* mas. fila-

mento tetragono ad apicem frondis.
fem. sparsa sessilis.

1. MARCHANTIA calyce communi decemfido. *b.* *Polymorpha.*
m. 533.
Lichen, sive hepatica fontana. *mag. hort.* 117.
- β. (Stellata) muscus saxatilis, sive lichen petræus.
mag. Bot. 179.
Lichen petræus stellatus. *mag. hort.* 117.
- * PHARM. *Hepatica fontana* herba. Vis adstringens,
vulneraria, antiphysica, hepatica. Datur ad
man. i, in juscuso.
2. MARCHANTIA calyce communi quadripartito,
laciniis tubulosis. *b. m.* 533. *Cruciate.*
3. MARCHANTIA calyce communi quinquefido
hemisphærico, perichaetio nullo. *b. m.* 533. *Hemisphæ-
rica.*
4. MARCHANTIA calyce communi quinquelocu-
lari subovato. *b. m.* 533. *Conica.*

T A R G I O N I A.

Cal. ovalis 2-fidus : rimâ longitudinali,
includens globum.

Herba. frondes planæ : basi subtus radicantes ; ad apicem subtus floriferæ,
liberæ.

1. TARGIONIA. *Linn. sist. nat.* 1338. *Hypophylla.*
Lichen petræus minimus fructu orobi. *Baub. pin.*
362.
HABITAT in rupibus humidis, à *Lamalou*, à *An-*
duse, *D. Paulet*. Frondes lanceolatæ, subtus ni-
gricantes. Calyx niger. Frondes interdum emar-
ginatæ, quandoque digitatæ.

L I C H E N.

Maf. receptaculum subrotundum planius-
culum nitidum.

Fem. farina foliis adspersa.

Rad. caul. fol. inflor. incerta. Alii vagi; alii subtus radicantes.

* *Leproſi tuberculati.*

Carpineus. 1. LICHEN leprosus cinereus, tuberculis albidis rugosus. *Linn. sif. nat.* 1340.

HABITAT in carpini truncis.

Rugosus. 2. LICHEN leprosus albicans, lineolis simplicibus, punctisque nigris confertis. *Linn. sif. nat.* 1340. HABITAT ubique, à Caunelles supra populos, fraxinos.

** *Foliacei.*

Ciliaris. 3. LICHEN foliaceus erectiusculus : laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Linn. sif. nat.* 1341.

Lichen cinereus latifolius aculeatus, umbilicis nigricantibus. *Tour.* 549.

HABITAT à l'Esperou, Lamalou, Montferrier, supra arbores.

Farinaceus. 4. LICHEN foliaceus erectus compressus ramosus farinaceus ; lateribus verrucosus. *Linn. sif. nat.* 1341.

HABITAT in truncis arborum, à Gramont, Caunes, au Capouladou. Rami angustissimi.

Prunastri. 5. LICHEN foliaceus erectiusculus lacunosus : subtus tomentosus albus. *Linn. sif. nat.* 1341.

Muscus cinereus cornua damæ referens. *Tour.* 549.

HABITAT in arboribus, prunis, pyris. Ad latera verrucosus, latiusculus, ramosus, subdichotomus.

Caperatus. 6. LICHEN pallidè viridis rugosus margine undulatus. *Linn. sif. nat.* 1341.

Muscus crustæ modo arboribus nascens. *mag. Bot.* 178.

HABITAT copiosè supra arbores, saxa, à Castelnau, & juxta amnem à Lavalette, à Gramont. Margines crenulati obtusi.

7. LICHEN foliaceus laciniatus obtusus glaber, supra lacunosis : subtus tomentosus. h. m. 533. *La pulmonaire de chêne.* *Pulmonaria rius.*

Muscus pulmonarius. mag. Bot. 179. hort. 139.

* PHARM. *Pulmonariae arboreæ herba.* Vis adstringens, ischæma, antiauriginosa, thoracica, anti-tussiculosa. Datur in pulvere ad drach. 1. in infuso & decocto.

8. LICHEN foliaceus decumbens furfuraceus, laniis acutis, subtus lacunosis atris. h. m. 534. *Furfuraceus.*

** *Scyphiferi.*

9. LICHEN scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus integris. Linn. sp. pl. ed. 2^a. 1620. *Cornutus.*

Muscus fistulosus corniculatus. Barr. icon. 1286. tab. 1227. f. 1.

HABITAT in fagetis à l'Esperou, à l'hort de Diou.
Vix semiuncialis, simplex, subulatus.

10. LICHEN scyphifer simplex crenulatus, tuberculatus fuscis. h. m. 534. *Pyxidatus.*

Fungus terrestris pyxidatus. mag. hort. tab. 83. pag. 82.

Lichen pyxidatus major. Tour. 549. tab. 325. fig. D.

* PHARM. *Musci pyxidati herba.* Vis antispasmodica, tussi convallivæ adversa.

11. LICHEN scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico. Linn. sif. nat. 1342. *Fimbriatus.*

Lichen pyxidatus minor. Tour. 549.

Muscus pyxoides saxatilis. Bauh. hist. 3. 767. Bauh. pinn. 361. prod. 151.

HABITAT copiosè juxta amnem ad dexteram, à Lavalette. D. Amoreux.

** *Fruticulosi.*

12. LICHEN fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. h. m. 534. *Rangiferinus.*

Muscus terrestris coralloïdes corniculis rufescentsibus. mag. Bot. 179.

Roccella.

13. LICHEN fruticulosus solidus aphyllus subramosus, tuberculis alternis. *Linn. sif. nat.* 1343.
L'orzeille.

Alga tinctoria. *mag. Bot. app.* 289. *hort.* 9.

Fucus cornu cervi f divisura. Tour. 568?

Fucus verrucosus tinctorius. Baub. hist. 3. 797.
Tour. 568.

Lichen græcus polypoïdes tinctorius saxatilis. *Tour. cor.* 40.

HABITAT in saxosis maritimis & scopolis; au *La-zareth*, à *Cette*.

**** *Filamentosi.*

Plicatus.

14. LICHEN filamentosus pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis. *b. m.* 534. *L'usnée commune.*

Muscus arboreus usnea officinarum. mag. Bot. 179.
hort. 139.

* PHARM. *Musci quercini herba. Vis adstringens, ischæma, tussi infantum convulsivæ adversa.*

Barbatus.

15. LICHEN filamentosus pendulus subarticulatus, ramis patentibus. *b. m.* 534.

Muscus capillaceus longissimus. mag. Bot. 180. *hort.* 139.

Floridus.

16. LICHEN filamentosus ramosus erectus, scutellis radiatis. *Linn. sif. nat.* 1343.

Lichen cinereus capillaceo folio minor. Tour. 550.

Muscus arboreus cum orbiculis. Baub. pin. 361.

Muscus arboreus peltatus & scutellatus. Baub. hist. 3. 764.

HABITAT cum prioribus in sylvulis circa *Viols*, *St. Loup*, au *Capouladou*.

C H A R A.

Cal. 2-phyllus: anthera globosa. *stigm.* 3. *sem.* 1. subrotundum.

Herba, immersa. *fol.* verticillata linearis
scabra subarticulata.

1. CHARA caulis lœvibus , frondibus interne
dentatis. b. m. 535. *Le lustre d'eau.*
Equisetum fætidum sub aqua repens. mag. Bot. S9.
hort. 74.
Obs. Folia siccitate se contorquent , strepent.

T R E M E L L A .

Fructificationes vix manifestæ ; corpus
gelatinosum vagum.

1. TREMELLA plicata undulata. b. m. 535. *Noſtac.*
Muscus fugax membranaceus pinguis. *mag. Bot.*
180. hort. 139.
Noſtac ciniflonum. Tour. Bot. par. 2. pag. 463.
* PHARM. *Noſtac* herba vis adstringens , antiul-
cerosa , antiherpetica.
2. TREMELLA sessilis membranacea auriformis ci-
nerea. b. m. 535. *L'oreille de Judas.*
Agaricus auriculæ formâ. Tour. 562.
* PHARM. *Auricula Judeæ* vis refrigerans , exſic-
cans , adstringens , antiinflammatoria , antian-
ginosa , ophthalmica. Datur ad unc. fl. in de-
cocto.
3. TREMELLA tuberculosa solida rugosa. b. m. 535. *Ferrueofiz.*
4. TREMELLA sparsa. b. m. 535. *Hemisphaeri-
cuz.*

F U C U S .

Mas. vesiculæ villis intertextæ.

Fem. vesiculæ adspersæ granis immersis ,
apice prominulis. *sem. solitaria.*

Herba immersa coriacea incerta eradicata
sessilis.

* *Dichotomi frondescentes.*

1. FUCUS fronde dichotomâ integrâ , caule medium *Vesiculosus.*
filum transcurrente , vesiculis verrucosis termi-
nalibus. b. m. 536.
Fucus marinus , seu quercus marina vesiculas ha-
bens. *Tour. 566.*

Fucus marinus, seu *quercus marina*, foliorum extremis tumidis. *Tour.* 566.

* * *Dichotomi caulescentes.*

Nodosus.

2. *FUCUS* caule compresso dichotomo, medio ramorum in vesiculam dilatato. *Linn. sp.* 1159.
Fucus marinus nodosus. Tour. 566.
HABITAT in mari ultra montem Cetium. Adhæret scopulis.

* * * *Ramosi foliis distinctis.*

Nutans.

3. *FUCUS* caule tereti ramosissimo, foliis lanceolatis ferratis, fructificationibus globosis pedunculatis subaristatis. *b. m.* 536.
Fucus folliculaceus ferrato folio. mag. Bot. 296.
Fucus folliculaceus linariae folio. Tour. 568.

* * * * *Ramosi, fronde unitâ.*

Siliquosus.

4. *FUCUS* caule tereti ramosissimo, pedunculis alternis, vesiculis oblongis acuminatis. *b. m.* 536.
Fucus fruticosus caudice verrucoso. mag. Bot. 100.

* * * * * *Fructificationibus non vesicariis.*

Cartilagineus.

5. *FUCUS* caule teretiusculo compresso, frondibus supradecompositis pinnatis, laciniis linearibus coloratis. *b. m.* 536.
Fucus latus fæniculaceus, seu coralloïdes lentâ fæniculacea. mag. Bot. 100. *Baub. hist.* 3. 797.

Pavoninus.

6. *FUCUS* fronde lessili reniformi, decussatim striata. *b. m.* 537.

Palmarius.

7. *FUCUS* frondibus planis palmatis. *b. m.* 537.

Fastigiatus.

8. *FUCUS* dichotomus ramosissimus teres uniformis fastigiatus. *b. m.* 537.

Filum.

9. *FUCUS* filiformis simplex subfragilis opacus. *b. m.* 537.

Alga nigro capillaceo folio. *Baub. pin.* 364. *Tour.* 569.

Ericoides.

10. *FUCUS* filiformis ramosissimus hirsutus, *Linn. sp. pl. edit.* 2^a. 1631.

Erica marina quibusdani. *Baup. bid.* 3. 799.

Fucus folliculaceus tamarisco similis, maritimus.

Baup. pinax.

Fucus foliis ericæ. mag. Bot. 100.

HABITAT cum prioribus, in scopolis marinis ultra montem Cetium.

U L V A.

Fructificationes in membrana diaphana.

Herba immersa subdiaphana eradicata sessilis.

1. ULVA tubulosa simplex. *b. m.* 537. *Le boyau de chat.* *Int. flavidis.*
2. ULVA palmata prolifera membranacea, ramentis infernè angustatis. *b. m.* 537. *La laitue de mer.* *Lactuca.*
3. ULVA oblonga plana undulata membranacea viridis. *Linn. sif. nat.* 1346. *Muscus maritimus lactucæ folio. mag. Bot.* 180. *Latiflava.*
Alga longissimo lato tenuique folio. *m. 12. Bot.* 10.
Fucus longissimo lato tenuique folio. Tour. 567.
HABITAT in mari, à Cette.
4. ULVA fronde dilatata subsinuatæ, centro radicata. *Linn. sif. nat.* 1346. *Umbilicata.*
Fucus umbilicus marinus dictus. Baup. pin. 364.
HABITAT cum prioribus, au Lazareth, à Cette.

C O N F E R V A.

Fructificationes tuberculosæ sparsæ inæquales.

Herba immersa capillaris eradicata sessilis aut vaga.

* *Filamentis simplicibus æqualibus.*

1. CONFERVA filamentis simplicissimis æqualibus. *Rivularis.* *b. m.* 538.

** *Filamentis ramosis æqualibus.*

- Bullosa.* 2. CONFERTA filamentis ramosis æqualibus, bul-
las aëreas includens. *b. m.* 538.
Alga viridis capillaceo folio. *mag. Bot. app.* 389.

*** *Filamentis geniculatis.*

- Aggregopila.* 3. CONFERTA filamentis geniculatis ramosissimis
è centro confertissimis globum constituentibus.
b. m. 538. *L'aggregopile de mer.*
Alcyonium decimum-quartum. *mag. Bot.* 7.

F U N G I.

A G A R I C U S.

Fungus horizontalis, subitus lamellosus.

* *Stipitati*, pileo orbiculato.

- Chantarellus.* 1. AGARICUS stipitatus, lamellis ramosis decurren-
tibus. *b. m.* 539. *La gerille.*
Fungus luteus, seu pallidus, se contorquens. *mag.*
Bot. 103. *hort.* 182.

- Integer.* 2. AGARICUS stipitatus, lamellis omnibus magni-
tudine æqualibus. *b. m.* 539.
Fungus suprè saturatè ruber esculentorum 13 ge-
neris species. *mag. Bot.* 103. *hort.* 82.

- Campestris.* 3. AGARICUS stipitatus, pileo convexo squamato
albido, lamellis rufis. *b. m.* 540. *Le champignon.*
Fungus campestris albus, infernè rubens. *mag. Bot.*
102. hort. 82.

- β. *Fungus orbicularis exalbidus pratensis.* *Bauh. pin.*
370. Tour. 557.

- Fungus albus.* *mag. Bot.* 103. *hort.* 82.. *coucoumelle.*

- β. (Georgii) stipitatus, pileo flavo convexo, lamel-
lis albis. *b. m.* 540.

- Fungus pileo lato orbiculari candidante.* *mag. Bot.*
103. hort. 82.

- δ. *Fungus eryngii.* *mag. Bot.* 103. *hort.* 82. *La bri-*
goûte.

4. AGARICUS stipitatus, pileo campaniformi albidō lacero, lamellis niveis, stipite subbulboſo subulato nudo longissimo. *b. m.* 540. *Exitiorius.*
Fungi multi ex uno pediculo pernicioſi. mag. Bot. 104. hort. 83.
Fungus ex uno pediculo multiplex. Tour. 560.
5. AGARICUS stipitatus, pileo planiusculo lactescente: margine dentato-deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Linn. ſift. nat.* 1348. *Piperatus.*
Fungus albus acris. Baub. pin. 371.
Fungus albus acris succo laetio turgens. Tour. 558.
6. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato, centro concavo, lamellis tenuiſſimis, stipite ſtriato. *Umbilicatus.*
La pivotlade.
Fungi plures simul albi ad radices arborum eſculenti. Baub. pin. 370. mag. Bot. 102. hort. 82.
Baub. hift. 3. 834.
Fungus umbilicatus parvus & multiplex. Tour. 559.
HABITAT ad radices populi, à Caunelles, Caſiel-nau. Stipites graciles æquales fulcati.
7. AGARICUS stipitatus, lamellis ſolitariis, pileo croceo convexo, lamellis flavis, volvā maxiſſ. à. *Speciosus.*
Les oronges.
Fungus planus orbiculatus aureus. Tour. 557.
Fungus luteus magnus speciosus. mag. Bot. 102.
HABITAT in sylvulis circa Montferrier, Gramont.

** *Parafitici, acaules dimidiati.*

8. AGARICUS acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Quercinus.*
b. m. 540. L'agaric de chêne.

B O L E T U S.

Fungus horizontalis, subtus porofus.

* *Parafitici, acaules.*

1. BOLETUS acaulis, fasciis dicoloribus, poris albis. *Perſicolor.*
Linn. ſift. nat. 1350.
Fungus cerasorum, imbricatim alter alteri innatcens variegatus. mag. Bot. 105. hort. 83.

Agaricus varii coloris squamosus. *Tour.* 562.

Fungus cerasorum coloris varii, perniciosi. *Benth.*
bifl. 3. 834.

HABITAT frequens à *Meurviel*, *Lavalette*, *Gramont*.

Cristatus. 2. *BOLETUS acaulis ramosissimus*, lamellis reniformibus anastomosantibus undulatis integris. *b. m.* 540.

* *Fungus intybaceus.* *mag. Bot.* 104. *hort.* 83.

Agaricus intybaceus. *Tour.* 562.

Igniarius. 3. *BOLETUS acaulis pulvinatus laevis*, poris tenuissimis. *b. m.* 541.

Agaricus pedis equini facie. *Tour.* 562.

* PHARM. *Fungi igniarii vis ischæma!* antihæmorrhagica, hæmorrhœïca, in amputationibus eximia!

* * Stipitati.

Luteus. 4. *BOLETUS stipitatus*, pileo pulvinato subviscido, poris rotundatis connexis flavissimis, stipite albidio. *b. m.* 541.

Fungus albus venenatus viscidus. *mag. Bot.* 104.

Bovinus. 5. *BOLETUS stipitatus*, pileo glabro pulvinato marginato, poris compositis acutis: porulis angulatis brevioribus. *Linn. sifl.* 1350.

Fungus variegatus sine striis, esculentorum decimi-sexti generis species secunda. *mag. Bot.* 103.

HABITAT in sylvulis circa urbem.

P H A L L U S.

Fungus suprà reticulatus, subtus laevis.

Esculentus. 1. *PHALLUS pileo ovato*, stipite nudo rugoso. *b. m.* 541.

Fungus porosus. *mag. Bot.* 101.

β. *Fungus in metam fastigiatus albus fusco tintitus.*
mag. Bot. 102. *hort.* 82.

Impudicus. 2. *PHALLUS volvatus stipitatus*, pileo celluloso. *b. m.* 542.

Fungus penis imaginem referens fætidus. *mag. Bot.* 296. *hort.* 83.

C L A T H R U S.

Fungus subrotundus cancellatus, ramis anostomosantibus.

1. CLATHRUS acaulis subrotundus, volvâ infundibuliformi maximâ. *Cancellatus.*

Fungus coralloïdes cancellatus. *mag.* *Bot.* 296.
hort. 83.

C L A V A R I A.

Fungus lævis oblongus, ramis liberis.

1. CLAVARIA ramis confertis ramosissimis inæquilibus. *b. m.* 542. *Coralloïdes.*

Fungus ramosus albidus. *mag.* *Bot.* 104.
Coralloïdes albidum. *Tour.* 562.

2. Coralloïdes flavum. *Tour.* 562.

2. Coralloïdes dilutè purpurascens. *Tour.* 562.

P E Z I Z A.

Fungus campanulatus sessilis.

1. PEZIZA turbinata cava.

Peziza, cornucopiæ, disco punctato patente. *Linn.*
sift. 1351?

Fungus niger calycis formam referens. *Baub. pin.*
375.

Lycoperdon semiorbiculare. *Tour.* 563.

Peziza fuliginosa fumum explodens. *Sauv.* 3.

HABITAT autumno in putridis lignis, à *Lavalette*,
Montferrier.

Fungus ovo gallinaceo major, cräffus, carnosus,
fuliginosus, iteratis vicibus pulvereum tenuissimum
emittens, atrum fuliginosum.

L Y C O P E R D O N.

Fungus subrotundus, seminibus farinaceis
repletus.

* *Solida, subterranea, absque radice.*

Tuber. 1. LYCOPERDON solidum muricatum, radice desitutum. *b. m. 543. La truffe.*

Tubera Matthioli. *mag. Bot. 272.*

.. * PHARM. *Boleti cervini* vis aphrodisiaca, flatulenta.

** *Pulverulenta, supra terram.*

Bovista. 2. LYCOPERDON subrotundum lacerato-dehiscent. *b. m. 543. La vesse de loup.*

Fungus rotundus orbicularis. *mag. Bot. app. 296.*

* PHARM. *Crepitans lupi* vis obstipans, absorbens, incrassans, ischæma! antihaemorrhagica! anti-hæmorrhœidica, in amputationibus optima.

Stellatum. 3. LYCOPERDON volvâ patente multifidâ coriacâ, capitulo glabro, ore dentato acuminato. *b. m. 543.*

M U C O R.

Fungus vesiculis stipitatis.

* *Fugaces.*

Mucedo. 1. MUCOR stipitatus, capsulâ globosâ. *Linn. sif. 1352.*

HABITAT in pane putrescente.

Glaucus. 2. MUCOR stipitatus capitulo subrotundo aggregato. *Linn. sif. 1352.*

HABITAT in pomis, pyris putridis.

Crustaceus. 3. MUCOR stipitatus, spicis digitatis. *Linn. sif. 1352.*

HABITAT in carnibus corruptis, cadaveribus avium putridis.

Erysiphe. 4. MUCOR albus, capitulis fuscis sessilibus. *Linn. sif. 1352.*

HABITAT infra folia arborum, humuli, passifloræ præsertim.

APPENDIX.

NOVA GENERA.

HOTTONIA.

Rad. fibrosa perpendicularis. *caul.* horizontalis, immersa, teres, radicans. *fol.* alterna, sessilis, pinnata: pinnulis linearibus integerrimis. *inflor.* pedunculis emersis: flosculis verticillato-racemosis. *fulc.* bracteæ subulatæ involucriformes.

PINGUICULA.

Rad. fibrosa fasciculata. *caul.* herbacea simplicissima. *fol.* radicalis sessilis integerrima pinguis nitens succulenta. *inflor.* scaposa radicalis solitaria. *fulc.* nulla.

PEPLIS.

Rad. ramosa perpendicularis. *caul.* herbaea ramosa repens: articulis radicantibus. *fol.* opposita simplex integerrima sessilis. *inflor.* axillaris subsolitaria sessilis. *fulc.* nulla.

CARPEZIUM.

Rad. ramosa perpendicularis. *caul.* herbaea ramosa. *fol.* alterna sessilis simplex subintegerrima. *inflor.* terminalis ramea solitaria nutans. *fulc.* nulla.

H Y P N U M.

Rad.? *caul.* (muscus) herbacea. *fol.* sparsa
sessilis simplex integerrima. *inflor.* axilla-
ris, filamento unifloro: mas. & fem. in ea-
dem planta. *fulc.* nulla.

J U N G E R M A N N I A.

Rad.? *caul.* (alga) herbacea ramosa. *fol.* al-
terna distichè imbricata, sessilis simplex
integerrima. *inflor.* terminalis: filamento
solitario unifloro. *fulc.* nulla.

T A R G I O N I A.

Rad. fibrosa infernè ad basim frondis. *caul.*
(alga) herbacea obliqua: frondibus sublan-
ceolatis subintegerrimis. *fol.* o. *inflor.* sub-
sessilis solitaria infernè ad apicem frondis.
fulc. nulla.

P E Z I Z A.

Rad.? *caul.* (fungus) simplicissima sessilis. *fol.*
o. *inflor....* *fulc....*

M U C O R.

Rad.? *caul.* (fungus) simplex aut ramosa
stipitata. *inflor....* *fol...* *fulc....*



A P P E N D I X

Ad class. 2^{am}. pag. 36.

V A L A N T I A.

*Hermaphr. cal. o. cor. 4-partita. stam.
4. stil. 2-fidus. sem. 1. masc. cal. o.
cor. 3-f-4-partita. stam. 3-f-4. pist.
obsoletum.*

*Herba. fol. verticillata. inflor. axillaris :
masc. & hermaph. in eodem pedun-
culo.*

1. **VALANTIA** floribus masculis trifidis germini her- *Muralis.*
maphroditici glabro insidentibus. *b. m.* 516.
Cruciata minima muralis. mag. hort. 64.
Rubia quadrifolia verticillato semine. mag. Bot.
226.
2. **VALANTIA** floribus masculis trifidis, hermaphro- *Aparine.*
ditici pedunculo insidentibus. *b. m.* 516.
Aparine fructu coriandri saccharati. mag. Bot. 25.
hort. 19.
3. **VALANTIA** floribus masculis quadrifidis, pedun- *Cruciata.*
culis diphyllis. *b. m.* 516.
Cruciata hirsuta. mag. hort. 64.
HABITAT copiosè in pratis à l'Esperou.

Ad pag. 92.

H Y S S O P U S.

*Coroll. labium inferius lacinulâ interme-
diâ crenatâ. stam. recta distantia.*

*Herba, fruticescens. inflor. spicata uni-
lateralis.*

Officinalis.

1. HYSSOPUS spicis secundis. *b. m. 274.*
Hyssopus officinarum cærulea spicata. *mag. hort.*
^{102.}
2. Hyssopus rubro flore. *mag. hort. ib.*
HABITAT ultra pagum Meyrueis seclus amnem ad dexteram.

Ad pag. 223. post Pastinacam.

S M Y R N I U M.

*Fructus oblongus, striatus. petal. acuminate carinata.**Herba. fol. composita: caulinæ summæ vagina inflata subglobosa.**Olfatrum.* 1. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis serratis. *b. m. 149.*Smyrnium Dioscoridis. *mag. Bot. 242. hort. 186.**Ad pag. 334. post Chrysocomam.*

S A N T O L I N A.

*Recept. paleaceum. pappus brevissimus.
cal. hemisphæricus imbricatus.**Herba fruticulosa. fol. simplex inflor. pedunculi terminales, longissimi, simplissimi.**Chamaesyce-
riffus.* 1. SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis quadri-
fariam dentatis *b. m. La garderobe.*
Abrotanum femina foliis teretibus. *mag. Bot. 289.*
hort. 2.
HABITAT circa Nemausum in via regia, ubi collegerat Magnolius, & copiosius à la Tourmagne æstate præteritâ vidimus cum flore.

Ad pag. 13. post Gentianum n°. II.

12. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus, *Filiformis*, caule dichotomo filiformi. *Linn. sp. pl. édit. 2^a.* p. 335.
Centaurium minimum purpureum ramosum. mag. Bot. 57. hort. 49.
Gentiana corollis quadrifilis, peduncalis ternis, foliis linearibus. Sauv. 132.
HABITAT copiosissimè in pratulis à Gramont cum gratiola, & cum gentiana pumili à Perauls, nec non pratulis stagno subjacentibus.

Ad pag. 62. post Salviam n°. 5.

6. SALVIA foliis oblongis erosis lanatis, verticillis lanatis, bracteis recurvatis subspinolis. *Linn. sp. pl. 39.*
Sclarea vulgaris lanuginosa latissimo folio. Tour. 179.
 s. Sclarea laciniatis foliis. *Tour. 179.*
Aethiopis laciniatis foliis. Barr. ic. 188.
HABITAT secus amnem ultra pagum dictum Meyrueis.

Ad pag. 67.

1. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus *Officinalis*. pinnatis. *Linn. sp. pl. pag. 44.*
Valeriana sylvestris major. Tour. 126. mag. hort. 201.
 * PHARM. *Valeriana sylvestris radix. Vis valeria-næ hortensis. pag. 67. n°. 1.*
HABITAT copiosè à l'Esperou in loco dicto la grotte de Bramabooii.
2. VALERIANA floribus triandris, foliis lanceolatis *Tuberosa*. integerimis : caulinis basi pinnatis. *Linn. sp. pl. ed. 2^a. p. 46.*
Valeriana floribus triandris, foliis inferioribus integris, aliis pinnatifidis. Gerard. gallop. 218.
Nardus montana radice olivari. Bauh. pin. 165.
- s. Nardus montana radice oblonga. *Bauh. pin. 165.*
HABITAT copiosè in monte Serane, quâ parte

septentrio em spectat , & Maio floret. Odor florū suavissimus.

Ad pag. 89.

- Alpecuros.* 2. BETONICA spicā basi foliosā , corollā galeā bifidā. *Jacquin* , *wind.* 251. *Linn. sp. pl. ed.* 2^a. 811.

Betonica alpina latifolia major villosa flore luteo.
Tour. 203. *mag. hort.* 32.

HABITAT copiosè in pratis montis *Esperou* , à l' *Agual* , & à l' *hort de Diou* . Julio floret.

Ad pag. 122.

- Littoralis.* 11. POA paniculā coarctatā secundā muticā , foliis convolutis rigidis , caule humifuso.

Poa paniculā spicatā secundā muticā , foliis convolutis brevibus pungentibus. *Gerard. fl. gallop.* 91.

Gramen caninum maritimum spicatum. *Baub. pin.* 2. *prod.* 4. *Tour.* 518. *mag. Bot.* 112. *hort.* 90.

HABITAT in maritimis arenosis à *Villeneuve* , *Mauguio* . Panicula matura , purpurascens. Folia brevia , rigida , ad margines & vaginas villosa , parum sibi invicem remota.

Ad pag. 124.

- Decumbens.* 7. FESTUCA paniculā erectā , spiculis subovatis muticis , calyce floscalī majore , culmo decumbente. *Linn. sp. pl. ed.* 2^a. 110.

Gramen montanum locustis muticis tumentibus pilosum. *Scheuz. gram.* 70.

HABITAT à l' *Esperou* , eundo à loco la croix de fer ad pagum *Meyrueis* , au château de Pourquarès.

Ad pag. 160.

- Alpestre.* 7. THLASPI siliculis obcordatis , foliis subdentatis , caulinis amplexicaulibus , petalis longitudine calycis , caule simplici. *Linn. sp. pl. ed.* 2^a. p. 903. Thlaspi perfoliatum minus. *Tour.* 212.

HABITAT in umbrosis humentibus, à l'Esperou, eundo à Meyrueis, ubi festuca decumbens. Caulis pedalis rigidus simplicissimus.

Ad pag. 164.

10. SISYMBRIUM foliis runcinatis flaccidis: foliolis linearibus integerimis, pedunculis laxis. Linn. sp. ed. 2^a. 920. b. m. Goëtan. p. 327.
11. HABITAT in sylvulis à S. Guilhen le désert.
11. SISYMBRIUM siliquis subovatis, foliis inferioribus lyratis, superioribus bipinnatifidis amplexicaulibus, stylis filiformibus. Linn. sp. pl. ed. 2^a. p. 916.
- Alysson foliis multiformibus pinnatis, floribus racemosis luteis. Allion. ped. 40. tab. 7.
- HABITAT copiosè in saxosis & præruptis locis viâ quâ itur ad pagum St. Guilhen juxta fluvium Herau. Altitudo sesquipedalis. Foliola caulina filiformia. Petioli sagittato-amplexicaules. Maior floret.

Ad pag. 170. Polygamia dioecia.

F R A X I N U S.

Hermaph. cal. stam. pist. sem. vide p. 434.
Fem. cal. pist. sem. ut in hermaphrodito.
Arbor. petal. 4. fol. pinnata: rachi æquali.

2. FRAXINUS foliolis ferratis, floribus corollatis. *Ornus.*
b. m. 521.
- * PHARM. *Munna calabrina.* Vis eccoprotica †, hydragoga, thoracica, obvolvens, asthmati humidio adversa. Usus intus ab unc. i. ad unc. iii.
HABITAT à l'Esperou, eundo ad pagum Meyrueis, in toto tractu.
Mirum certè pretiosissimam hanc fraxini speciem, quæ si decenter excoleretur, magni foret Occitanis emolumenti, primos etiam Botanicos latuisse qui montem Calcarem conscenderunt.

Ad pag. 244.

Annuum. 9. SEDUM caule erecto solitario annuo, foliis ovatis sessilibus gibbis alternis, cymâ recurvâ. Linn. sp. pl. ed. 2^a. p. 620.

HABITAT cum sedo villoso copiosè in muris humidis circa Meyrueis.

Ad pag. 245.

Acetosella. 2. OXALIS scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamosâ articulatâ. Linn. sp. ed. 2^a. p. 620.

♂. Oxys flore subcæruleo. Tour. 88.

♀. Oxys flore purpurascente. Tour. ib.

HABITAT in sylvis omnibus à l'Esperou, à Meyrueis.

Capsulæ subglobosæ acuminatæ. Radix filiformis, squamulis ovatis concavis subimbricatis vestita. Floret Maio.

Ad pag. 296, post n°. 2.

Gramineus. 3. RANUNCULUS foliis lanceolato-linearibus sessilibus, caule erecto, radice bulbosâ. Linn. sp. pl. ed. 2^a. p. 773.

Ranunculus gramineo folio bulbosus. Tour. 293.

♂. Ranunculus gramineo folio multiplex. Tour. 293.

♀. Ranunculus montanus folio gramineo. Tour. ib.

HABITAT in herbidis montis Serane cum valeriana tuberosa. Maio florentem collegimus. Caulis interdum simplicissimus uniflorus.

Ad pag. 297. post n°. 10.

Incarnata. 11. ORCHIS bulbis palmatis, noctarii cornu conico, labio obsoletè trilobato ferrato, petalis dorsibus reflexis. Linn. sp. ed. 2^a. p. 1334.

Orchis palmata lutea floris labio maculato. Seg. ver. 3. p. 349. tab. 8. fig. 5. Hiller. stirp. enum. pag. 14. n^o. 332.

HABITAT in monte Serane cum pæonia, valeriana tuberosa, ranunculo gramineo, & pulsatillis. Flores sulphurei, sâpe immaculati: spica densa.

Ad pag. 408, post n^o. 1.

2. CAREX spicâ compositâ, spiculis androgynis, inferioribus remotioribus foliolo longiori instruc-tis, culmo triquetro. *Linn. sp. pl. ed. 2^a. pag. 1381.*
HABITAT ad mare à M^{aguelone}. Spica gracilis. Culmus vix palmaris.
-

ADDENDA SYNONYMA.

Ad pag. 248.

1. AGRIMONIA. *Eupatorium.*
 2. *Agrimonia quæ eupatorium odoratum. Baub. pin. 321.*
Agrimonia odorata. Tour. 301.
HABITAT à l'Esperou juxta rivulos, au château de Pourquarès.

Ad pag. 255.

3. ROSA. *Monspeliacæ.*
Rosa germinibus globosis, pedunculis subhispidis, caule inermi. Linn. sp. pl. ed. 2^a. pag. 703. n^o. 1. alpina, & pag. 1683. germinibus ovatis.
 4. ROSA. pag. 256. *Sempervirens.*
Obs. Germina primò ovata hispida; matura evadunt globosa, s^æpe glabra.

Ad pag. 35.

7. GENTIANA. *Pumila.*
Centaurium angustifolium non persoliatum. Bocc. mus. 1. tab. 76.

Ad pag. 218.

1. SIUM. *Berula.*
*Sium foliis pinnatis, umbellis axillaribus peduncu-latis, involucro universali pinnatifido. Linn. sp. pl. ed. 2^a. app. 1672. *Angustifo-lijum.**

Ad pag. 289.

Onobrychioï- 5. VICIA.

des. *Vicia perennis multiflora majori flore ex cæruleo & albo. mag. Bot. 307. hort. 204.*

Ad pag. 297.

Conopsea. 11. ORCHIS. Frequens in pratis à l'Esperou.

Ad pag. 263.

Oelandicus. 10. CISTUS. Frequens in saxosis à S. Guilben le désert & au Capouladou. Nonne potius *cistus italicus*? *Linn. sp. ed. 2. p. 740. n°. 17.*

Ad pag. 243.

Hispida. 9. ARENARIA. In præruptis montis Capouladou copiosissimam collegimus.

Ad pag. 353.

Minima. 3. HYOSERIS.

Lampsana foliis ovatis dentatis, caule nudo, floribus nutantibus. *Haller. stirp. enarr. pag. 56. n°. 996.*

Hieracium minus folio subrotundo. *Bauh. pin. 127. ex Har. Hallero.*

HABITAT in arvis omnibus à l'Esperou.

Ad pag. 182.

Purgans. 8. GENISTA. Inter inermes annumeranda.

Spartium fruticosum aphyllum, junceis aculeis, lanatis capitulis. *Leb. icon. 93. part. 2^a.*

Spartium aculeatum aphyllum. *Tabern. ic. 1108.*

HABITAT. Hâc solâ specie & spartio complicato scatet totus mons, eundo à pago dicto le Vigean ad montem dictum le cap de Coste. Frutex sesquicubitalis; rami conferti cinerascentes striati obtusiusculi; & miror cur hanc speciem aculeatam dixerint Authores citati, cum rami etiam si exsiccati nullomodo pungant, & sexcenta ob-

servanti specimina aut exsiccata aut viva ne
unum se aculeatum præbuerit. Folia quotannis
decidunt. Inflorescentia primordialis. Flores lu-
tei parvi. Folia profert dum fructificat. Legu-
mina ovata, hinc sinuata villosa pendula. Floret
Junio, ut spartium complicatum.

Ad pag. 343.

2. SCORZONERA.

HABITAT in pratis, à l'Esperou, Banahu, à l'Ai-
gual, cum orchide *conopsea*, pediculari *sylva-*
Hispanica, ubi etiam abundant sison *verticillatum*,
athamanta meum, montia fontana, orchis pal-
mata, coriophora, maculata.



APPENDIX


SISTENS SPECIES N°. 187,

*A nobis, ab anno 1762 ad hanc usque
diem, in agro Monspeliensi detectas.*

<i>Salvia ethiopis.</i>	- - - - <i>purpurea.</i>
<i>Pinguicula vulgaris.</i>	- - - - <i>acaulis.</i>
<i>Scirpus acicularis.</i>	- - - - <i>punctata.</i>
<i>Cyperus esculentus.</i>	- - - - <i>pumila.</i>
<i>Schoenanthus aculeatus.</i>	- - - - <i>spicata.</i>
<i>Phalaris aquatica.</i>	- - - - <i>filiformis.</i>
<i>Phleum arenarium.</i>	<i>Buplevrum junceum.</i>
<i>Panicum verticillatum.</i>	<i>Rhamnus alpinus.</i>
<i>Festuca maritima.</i>	<i>Laserpitium latifolium</i>
- - - - <i>decumbens.</i>	- - - - <i>trilobum.</i>
<i>Agrostis interrupta.</i>	<i>Ligusticum pelsponesiacaum.</i>
<i>Lagurus cylindricus.</i>	<i>Angelica sylvestris.</i>
<i>Poa rigida.</i>	<i>Oenanthe pimpinelloides.</i>
- - <i>littoralis.</i>	<i>Athamanta cervaria.</i>
<i>Triticum tenellum.</i>	- - - - <i>libanotis.</i>
<i>Valeriana tuberosa.</i>	<i>Sium berula.</i>
- - - - <i>officinalis.</i>	- - - <i>falcaria.</i>
<i>Galium uliginosum.</i>	<i>Coriandrum testiculatum.</i>
- - - <i>Parisense.</i>	<i>Statice reticulata.</i>
<i>Campanula hederacea.</i>	- - - <i>cordata.</i>
- - - - <i>hybrida.</i>	<i>Narcissus odorus.</i>
<i>Menianthes nymphaeoides.</i>	<i>Rumex tingitanus.</i>
<i>Hottonia palustris.</i>	<i>Peplis portula.</i>
<i>Heliotropium supinum.</i>	<i>Juncus bulbosus.</i>
<i>Pulmonaria officinalis.</i>	<i>Vaccinium uliginosum.</i>
<i>Verbascum phlomoides.</i>	<i>Daphne cneorum.</i>
<i>Lonicera nigra.</i>	<i>Polygonum convolvulus.</i>
- - - - <i>carulea.</i>	<i>Pyrola minor.</i>
<i>Herniaria fruticosa.</i>	- - - <i>secunda.</i>
<i>Gentiana ciliata.</i>	<i>Arenaria grandiflora.</i>

- - - - <i>multicaulis.</i>	<i>Sisymbrium loëselii.</i>
- - - - <i>bispida.</i>	- - - - <i>pyrenaicum.</i>
<i>Stellaria cerasoides.</i>	<i>Genista purgans.</i>
<i>Dianthus virginicus.</i>	- - - - <i>anglica.</i>
- - - - <i>monspessulanus.</i>	<i>Lathyrus annuus.</i>
<i>Sedum villosum.</i>	<i>Lotus angustissima.</i>
- - - - <i>annuum.</i>	- - - - <i>ornithopodicides.</i>
<i>Cerastium semidecandrum.</i>	<i>Medicago minima.</i>
<i>Silene inaperta.</i>	<i>Geranium sylvaticum.</i>
<i>Saxifraga bryoïdes.</i>	<i>Hypericum humifusum.</i>
- - - - <i>cæfia.</i>	<i>Tragopogon bifidum.</i>
- - - - <i>stellaris.</i>	<i>Carpeum cernuum.</i>
<i>Sceleranthus polycarpos.</i>	<i>Bidens bipinnata.</i>
<i>Oxalis acetosella.</i>	<i>Carduus palustris.</i>
<i>Euphorbia peploides.</i>	- - - - <i>acaulis.</i>
<i>Agrimonia odorata.</i>	<i>Chrysanthemum alpinum.</i>
<i>Rosa monspeliaca.</i>	<i>Erigeron alpinum.</i>
- - - <i>sempervirens.</i>	<i>Anthemis alpina.</i>
<i>Potentilla verna.</i>	<i>Centaurea alba.</i>
- - - <i>caulescens.</i>	- - - - <i>pectinata.</i>
<i>Papaver dubium.</i>	<i>Mycropus erectus.</i>
<i>Aquilegia viscosa.</i>	<i>Orchis bifolia.</i>
<i>Ranunculus parviflorus.</i>	- - - - <i>conopsea.</i>
- - - <i>gramineus.</i>	- - - - <i>incarnata.</i>
- - - <i>aconitifolius.</i>	<i>Ophrys corallorrhiza.</i>
<i>Cistus öelandicus vel po-</i> <i>tiùs italicus.</i>	<i>Satyrium nigrum.</i>
<i>Anemone alpina.</i>	<i>Salix helix.</i>
<i>Ajuga pyramidalis.</i>	<i>Carex arenaria.</i>
<i>Melampyrum nemorosum.</i>	- - - - <i>limesa.</i>
- - - - <i>cristatum.</i>	<i>Ægylops incurva.</i>
- - - - <i>sylvaticum.</i>	<i>Fraxinus ornus.</i>
<i>Stachys annua.</i>	<i>Polypodium fontanum.</i>
- - - - <i>maritima.</i>	<i>Polytrichum alpinum.</i>
<i>Betonica aleppecuros.</i>	<i>Mnium serpillofolium. β. γ.</i>
<i>Hyllopus officinalis.</i>	- - - - <i>purpureum.</i>
<i>Iberis saxatilis.</i>	<i>Bryum pyriforme.</i>
<i>Cheiranthus sinnatus.</i>	- - - - <i>pulvinatum.</i>
- - - - <i>littoreus.</i>	- - - - <i>subulatum.</i>
<i>Thlaspi alpestre.</i>	- - - - <i>rurale.</i>
	- - - - <i>heteromallum.</i>

- - - - -	<i>truncatum.</i>	- - - - -	<i>prunastri.</i>
- - - - -	<i>hypnoides.</i>	- - - - -	<i>caperatus.</i>
- - - - -	<i>cespitosum.</i>	- - - - -	<i>fimbriatus.</i>
- - - - -	<i>apocarpum.</i>	- - - - -	<i>cornutus.</i>
- - - - -	<i>striatum.</i>	- - - - -	<i>roccella.</i>
Hypnum	<i>taxifolium.</i>	- - - - -	<i>floridus.</i>
- - - - -	<i>bryoides.</i>	Fucus	<i>nodosus.</i>
- - - - -	<i>complanatum.</i>	- - - - -	<i>ericoides.</i>
- - - - -	<i>undulatum.</i>	Ulva	<i>latissima.</i>
- - - - -	<i>crispum.</i>	- - - - -	<i>umbilicata.</i>
- - - - -	<i>triquetrum.</i>	Jungermannia	<i>dilatata.</i>
- - - - -	<i>rutabulum.</i>	- - - - -	<i>complanata.</i>
- - - - -	<i>filicinum.</i>	- - - - -	<i>platyphylla.</i>
- - - - -	<i>proliferum.</i>	Agaricus	<i>umbilicatus.</i>
- - - - -	<i>cupressiforme.</i>	- - - - -	<i>speciosus.</i>
- - - - -	<i>viticulosum.</i>	- - - - -	<i>piperatus.</i>
- - - - -	<i>alopecurum.</i>	Boletus	<i>versicolor.</i>
- - - - -	<i>sciuroides.</i>	- - - - -	<i>bovinus.</i>
Fontinalis	<i>squamosa.</i>	Peziza	<i>infundibuliformis.</i>
Targionia	<i>hypophylla.</i>	Mucor	<i>mucedo.</i>
Lichen	<i>carpincus.</i>	- - - - -	<i>crustaceus.</i>
- - - - -	<i>rugosus.</i>	- - - - -	<i>erysiphe.</i>
- - - - -	<i>ciliaris.</i>	- - - - -	<i>glaucus.</i>
- - - - -	<i>farinaceus.</i>		



APPENDIX ALTERA.

Ad regnum animale pertinent :

- 1°. Alcyonium 12^{um}. seu bursa marina. *mag. Bot. 7.*
Alcyonium molle & concavum aurantii formâ.
Tour. cor.
Alcyonium, *bursa*, acaule pulposum subglobosum.
Linn. sist. nat. ed. 10. tom. 1. p. 803.
- 2°. Corallina sive muscus marinus officinarum. *mag.*
Bot. 78. Tour.
Corallina, *officinalis*, trichotoma, articulis cylindricis, terminali ovato. *Linn. sist. nat. ed. 10^a.*
tom. 1. p. 805.
- 3°. Muscus marinus tenui capillo, sive corallinis affinis. *mag. Bot. 180.*
Corallina, *rubens*, dichotoma capillaris, articulis cylindricis brevissimis : dichotomiae subclavatis.
Linn. sist. nat. ed. 10^a. tom. 1. p. 806.
- 4°. Androsaces cotyledon foliosum marinum, & umbilicus marinus Monspeliensium. *mag. Bot. 19.*
Acetabulum marinum. *Tour. 793.*
Madrepora, *acetabulum*, stellâ orbiculari solitariâ planiusculâ, pedunculo filiformi. *Linn. sist. nat. ed. 10^a. tom. 1. p. 793.*
- 5°. Alcyonium 5^{um}, sive pila marina ex ampullis confitans ad spuma similitudinem. *mag. Bot. 7.*
Est congeries ovorum purpuræ majoris.
- 6°. Corallina fistulosa fragilis lævis. *mag. Bot. app. 294.*
Muscos coralloïdes polygonoïdes, falicorniæ folio major. *Barr. icon. 1275. fig. 7.*
Eschara, *fistulosa*, ramea dichotoma fistulosa articulata teres. *Linn. sist. nat. ed. 10^a. tom. 1. p. 804.*
- 7°. Urtica marina. *mag. Bot. app. p. 282.* Videtur species Medusæ. *Linn. sist. tom. 1. p. 659.*
- 8°. Corallina fruticosa recta alba. *mag. Bot. 78.* An Gorgoniae species? *Linn. ib. p. 800.*

Species Magnolii dubia.

- 1°. Alsine nodosa gallica. mag. Bot. 13.
An myagrum monospermum minus. pin. ? vel ranunculum arvense flore albo. Tour. ?
 - 2°. Alsine fetidæ similis laciniata. mag. Bot. 15.
 - 3°. Aster auricomus glaber latifolius, folio non rigido. mag. Bot. 32.
 - 4°. Gramen sparteum monspeliacum. mag. Bot. 119.
 - 5°. Gramen aliud monspeliense. mag. Bot. 122.
 - 6°. Jacea montana incana odora. mag. Bot. 137.
 - 7°. u
-

Hæc incautè repetitæ species delcantur.

- Pag. 370. n°. 7. Anthemis alpina & synonymon Seguierii.
201. n°. 4. Lotus angustissima.
389. n°. 3. Cyperus flavescens.
129. Gramen caninum maritimum spicatum: mag. Bot.
189. Vicia perennis multiflora majori flore ex cæruleo & albo. mag. Bot.





INDEX GENERUM,

C U M

SUBJECTIS EORUM SPECIEBUS.

A

A CANTHUS.	p. 97.	* Incurva.	ib.
Mollis.	ib.	ÆGOPODIUM.	p. 225.
Spinolus.	ib.	Podagraria.	ib.
A CER.	p. 280.	A GARICUS.	p. 460.
Pseudo-platanus.	ib.	* Chantarellus.	ib.
Platanoïdes.	ib.	* Integer.	ib.
Campestre.	ib.	* Campestris.	ib.
Monspessulanum.	ib.	* Extinctorius.	p. 461.
A CHILLÆ,	p. 371.	* Piperatus.	ib.
Ageratum.	ib.	* Umbilicatus.	ib.
Ptarmica.	p. 372.	* Speciosus.	ib.
Millefolium.	ib.	* Quercinus.	ib.
Nobilis.	ib.	A GRIMONIA.	p. 245.
A CONITUM.	p. 294.	Eupatorium.	ib.
Lycoctonum.	ib.	β. Odorata.	p. 473.
Napellus.	ib.	A GROSTEMMA.	p. 245.
A CROSTICHUM.	p. 440.	Githago.	ib.
* Thelypteris.	ib.	A GROSTIS.	p. 117.
* Septentrionale.	ib.	* Interrupta.	ib.
* Pulchrum.	ib.	* Calamagrostis.	p. 118.
A CTÆA.	p. 152.	* Spica venti.	ib.
Christophoriana.	ib.	* R. bræ.	ib.
A DIANTUM.	p. 443.	* Canina.	ib.
Capillus Veneris.	ib.	* Stolonifera.	ib.
β. Alba.		β. Alba.	
A DONIS.	p. 321.	γ. Viridis.	
Annua.	ib.	* Capillaris.	ib.
Vernalis.	ib.	* Minima.	ib.
A DOXA.	p. 46.	A IRA.	p. 121.
* Moschatellina.	ib.	* Cespitosa.	ib.
A EGIOPS.	p. 132.	* Montana.	ib.
* Ovata.	ib.	* Canescens.	ib.
* Triuncialis.	ib.	* Caryophyllæa.	ib.

Hh

432 INDEX GENERUM.

* Flexuosa.	ib.	* Hirfuta.	ib.
* Cristata.	ib.	ALYSSUM.	p. 161.
* Aquatica.	ib.	* Spinosum.	ib.
AJUGA.	p. 88.	* Clypeatum.	ib.
Reptans.	ib.	Calycinum.	ib.
* Pyramidalis.	ib.	Campestre.	ib.
ALCEA.	p. 49.	AMARANTHUS.	p. 410.
Rosea.	ib.	Tricolor.	ib.
Ficifolia.	p. 50.	Melancholicus.	ib.
ALCHEMILLA.	p. 392.	Blittum.	ib.
Vulgaris.	ib.	Hybridus.	p. 413.
Alpina.	ib.	Caudatus.	ib.
ALISMA.	p. 136.	AMMI.	p. 283.
Plantago.	ib.	Majus.	ib.
* Damaſonum.	p. 137.	AMYGDALUS.	p. 250.
* Ranunculoïdes.	ib.	Perfica.	ib.
ALLIUM.	p. 305.	Communis.	ib.
Porrum.	ib.	ANAGALLIS.	p. 29.
* Victorialis.	p. 306.	Arvensis.	ib.
* Sub-hirſutum.	ib.	f. Phænicea.	
Roseum.	ib.	v. Cærulea.	
Sativum.	ib.	ANAGYRIS.	p. 292.
* Scorodoprasum.	ib.	Fætida.	ib.
Sphærocephalum.	ib.	ANCHUSA.	p. 19.
* Flavum.	p. 307.	Officinalis.	ib.
* Moschatum.	ib.	Tinctoria.	ib.
* Vineale.	ib.	ANDROPOGON.	p. 131.
Oleraceum.	ib.	* Gryllus.	ib.
* Angulosum.	ib.	* Ischænum.	ib.
Aſcalonicum.	p. 308.	ANDROSACE.	p. 23.
Ursinum.	ib.	Maxima.	ib.
Cepa.	ib.	* Septentrionalis.	ib.
Fistulosum.	ib.	* Lactea.	ib.
* Schænopræſum.	ib.	* Carnea.	ib.
ALOPECURUS.	p. 69.	ANDRYALA.	p. 352.
* Bulbosus.	ib.	* Integrifolia.	ib.
* Pratenſis.	ib.	* Sinuata.	ib.
* Geniculatus.	ib.	ANEMONE.	p. 315.
* Monſpelienſis.	ib.	Hepatica.	ib.
* Paniceus.	ib.	Pulsatilla.	ib.
ALSINE.	p. 227.	* Coronaria.	ib.
Media.	ib.	* Hortensia.	ib.
ALTHÆA.	p. 49.	* Alpina.	ib.
Officinalis.	ib.	* Trifolia.	ib.
Cannabina.	ib.		

INDEX GENERUM. 483

* Nemorosa.	p. 316.	APIUM.	p. 224.
ANETHUM.	p. 223.	Petroselinum.	ib.
Fœniculum.	ib.	Graveolens.	ib.
ANGELICA.	p. 221.	AQUILEGIA.	p. 267.
Archangelica.	ib.	Vulgaris.	ib.
Sylvestris.	ib.	* Viscosa.	ib.
ANTHEMIS.	p. 369.	ARABIS.	p. 167.
* Altissima.	ib.	* Alpina.	ib.
Maritima.	ib.	* Thaliana.	ib.
Cotula.	ib.	Tarrita.	ib.
Arvensis.	p. 370.	ARBUTUS.	p. 46.
* Pyrethrum.	ib.	Unedo.	ib.
* Alpina.	ib.	Uva ursi.	ib.
* Valentina.	p. 371.	ARCTIUM.	p. 325.
* Tinctoria.	ib.	Lappa.	ib.
ANTHERICUM.	p. 311.	ARENARIA.	p. 242.
* Liliago.	ib.	* Grandiflora.	ib.
Calyculatum.	ib.	* Trinervia.	ib.
ANTHIRRINUM.	p. 100.	* Serpyllifolia.	ib.
Afarina.	ib.	Rubra.	ib.
Cymbalaria.	ib.	p. Campestris.	
Elatine.	ib.	~. Marina.	
Spurium.	ib.	* Saxatilis.	ib.
* 2-punctatum.	p. 101.	* Tenuifolia.	ib.
* Arvense.	ib.	* Laricifolia.	ib.
* Peliiserianum.	ib.	* Multicaulis.	p. 243.
* Origanifolium.	ib.	* Ciliata.	ib.
* Oronthium.	ib.	* Hispida.	ib.
* Supinum.	ib.	ARISTOLOCHIA.	p. 106.
* Linaria.	p. 102.	Pistlochia.	ib.
* Monspessulanum.	ib.	Rotunda.	ib.
* Minus.	ib.	* Longa.	ib.
Majus.	ib.	Clematitis.	ib.
* Bellidifolium.	ib.	ARNICA.	p. 365.
ANTHOXANTHUM.	p. 110.	* Montana.	ib.
* Odoratum.	ib.	* Scorpioïdes.	ib.
ANTHYLLIS.	p. 183.	ARTEMISIA.	p. 334.
Tetraphylla.	ib.	Abrotanum.	ib.
Vulneraria.	ib.	Campestris.	p. 335.
* Montana.	ib.	Maritima.	ib.
APHANES.	p. 393.	Absinthium.	ib.
* Arvensis.	ib.	Vulgaris.	ib.
APHYLLANTES.	p. 305.	Dracunculus.	p. 336.
Monspeliensis.	ib.	ARUM.	p. 405.

H h ij

Maculatum.	ib.	ATHAMANTA.	p. 287.
Arisarum.	ib.	* Libanotis.	ib.
Dracunculus.	ib.	Cretensis.	ib.
ARUNDO	p. 110.	Meum.	ib.
* Arenaria.	ib.	* Cervaria.	ib.
* Calamagrostis.	ib.	ATRACTYLIS.	p. 331.
Donax.	p. 126.	Cancellata.	ib.
Phragmites.	ib.	ATRIPLEX.	p. 432.
ASARUM.	p. 404.	* Portulacoïdes.	ib.
Hypocystis.	ib.	Hortensis.	ib.
ASCLEPIAS.	p. 37.	Laciniata.	p. 433.
Vincetoxicum.	ib.	* Haftata.	ib.
Nigra.	ib.	* Patula.	ib.
ASPARAGUS.	p. 311.	ATROPA.	p. 32.
Officinalis.	ib.	Belladonna.	ib.
Acutifolius.	ib.	AVENA.	p. 125.
ASPERUGO.	p. 22.	* Bromoïdes.	ib.
Procumbens.	ib.	Sativa.	ib.
ASPERULA.	p. 12.	Fatua.	ib.
* Odonata.	ib.	* Pratensis.	p. 126.
Arvensis.	ib.	* Flavescens.	ib.
* Taurina.	p. 13.	* Fragilis.	ib.
* Tinctoria.	ib.	Elatior.	p. 129.
Cynanchica.	ib.		
ASPHODELUS.	p. 40.		B
Ramosus.	ib.	BALLOTA.	p. 94.
ASPLENIUM.	p. 440.	Officinalis.	ib.
Scolopendria.	ib.	BELLIS.	p. 366.
Ceterach.	p. 441.	Perennis,	ib.
Trichomanes.	ib.	* Annua.	ib.
Adiantum nigrum.	ib.	BERBERIS.	p. 312.
Ruta muraria.	ib.	Dumetorum.	ib.
* Onopteris.	ib.	BETA.	p. 398.
ASTER.	p. 363.	Vulgaris.	ib.
* Alpinus.	ib.	BETONICA.	p. 89.
Tripolium.	ib.	Officinalis.	ib.
Amellus.	ib.	BETULA.	p. 107. 412.
Sedifolius.	ib.	Alnus.	ib.
ASTRAGALUS.	p. 196.	BIDENS.	p. 332.
Glycyphyllos.	ib.	* Tripartita.	ib.
Hamosus.	ib.	* Cernua.	ib.
* Sesameus.	ib.	Bipinnata.	ib.
Monspeñulanus.	ib.	BISCUTELLA.	p. 162.
* Incanus.	ib.	Didyma.	ib.
* Montanus.	ib.		

INDEX GENERUM. 485

BISSERRULA.	<i>p. 197.</i>	* Pulvinatum.	<i>ib.</i>
Pelecinus.	<i>ib.</i>	* Cæspititum.	<i>p. 449.</i>
BOLFTUS.	<i>p. 461.</i>	* Apocarpum.	<i>ib.</i>
* Vericolor.	<i>ib.</i>	* Striatum.	<i>ib.</i>
* Cristatus.	<i>p. 462.</i>	BUFONIA.	<i>p. 145.</i>
* Ignarius.	<i>ib.</i>	* Tenuifolia.	<i>ib.</i>
* Luteus.	<i>ib.</i>	BUNIAS.	<i>p. 170.</i>
* Bovinus.	<i>ib.</i>	Erucaago.	<i>ib.</i>
BORRAGO.	<i>p. 22.</i>	Cakile.	<i>ib.</i>
Officinalis.	<i>ib.</i>	BUNIUM.	<i>p. 217.</i>
BRASSICA.	<i>p. 168.</i>	Bulbocastanum.	<i>ib.</i>
Napus.	<i>ib.</i>	BUPHTHALMUM.	<i>p. 372.</i>
Rapa.	<i>ib.</i>	Spinosum.	<i>ib.</i>
Oleracea.	<i>ib.</i>	Aquaticum.	<i>p. 373.</i>
* Erucastrum.	<i>p. 169.</i>	* Salicifolium.	<i>ib.</i>
Eruca.	<i>ib.</i>	BUPLEVRUM.	<i>p. 215.</i>
BRIZA.	<i>p. 123.</i>	Rotundifolium.	<i>ib.</i>
* Monspessulana.	<i>ib.</i>	* Odontites.	<i>ib.</i>
* Eragrostis.	<i>ib.</i>	Rigidum.	<i>p. 216.</i>
Minor.	<i>ib.</i>	* Tenuissimum.	<i>ib.</i>
* Media.	<i>ib.</i>	* Junceum.	<i>p. 476.</i>
* Maxima.	<i>ib.</i>	Fruticosum.	<i>p. 216.</i>
BROMUS.	<i>p. 124.</i>	BUTOMUS.	<i>p. 313.</i>
* Distachyos.	<i>ib.</i>	* Umbellatus.	<i>ib.</i>
Secalinus.	<i>ib.</i>	BUXUS.	<i>p. 111. 137.</i>
* Squarrosum.	<i>p. 125.</i>	Arborescens.	<i>ib. ib.</i>
Sterilis.	<i>ib.</i>		
* Arvensis.	<i>ib.</i>		
Tectorum.	<i>ib.</i>		
* Pinnatus.	<i>ib.</i>		
BRUNELLA.	<i>p. 79.</i>		
Vulgaris.	<i>ib.</i>		
Hyssopifolia.	<i>ib.</i>		
BRYONIA.	<i>p. 55.</i>		
Alba.	<i>ib.</i>		
BRYUM.	<i>p. 447.</i>		
* Pomiforme.	<i>ib.</i>		
* Pyriforme.	<i>ib.</i>	CALLITRICE.	<i>p. 109.</i>
* Extinctorium.	<i>ib.</i>	* Autumnalis.	<i>ib.</i>
* Subulatum.	<i>ib.</i>	* Verna.	<i>p. 110.</i>
* Rurale.	<i>ib.</i>	CALTHA.	<i>p. 272.</i>
* Murale.	<i>ib.</i>	Populago.	<i>ib.</i>
* Heteromallum.	<i>ib.</i>	CAMPANULA.	<i>p. 24.</i>
* Truncatulum.	<i>ib.</i>	* Rotundifolia.	<i>25.</i>
* Hypnoïdes.	<i>ib.</i>	Rapunculus.	<i>ib.</i>
		Persicifolia.	<i>ib.</i>

C

ACALIA.	<i>p. 332.</i>
Alpina.	<i>ib.</i>
CACHRYS.	<i>p. 220.</i>
* Libanotis.	<i>ib.</i>
CALFDULIA.	<i>p. 378.</i>
Officinalis.	<i>ib.</i>
CALLITRICE.	<i>p. 109.</i>
* Autumnalis.	<i>ib.</i>
* Verna.	<i>p. 110.</i>
CALTHA.	<i>p. 272.</i>
Populago.	<i>ib.</i>
CAMPANULA.	<i>p. 24.</i>
* Rotundifolia.	<i>25.</i>
Rapunculus.	<i>ib.</i>
Persicifolia.	<i>ib.</i>

Trachelium.	ib.	* Acaulis.	ib.
* Glomerata.	ib.	Lanata.	ib.
Medium.	ib.	* Corymbosa.	ib.
Speculum.	p. 26.	* Racemosa.	ib.
* Hybrida.	ib.	CARPESIUM.	p. 338.
Erinus.	ib.	* Cernuum.	ib.
* Hederacea.	ib.	CARPINUS.	p. 417.
CAMPHOROSMA.	p. 392.	Betulus.	ib.
Monspeliacum.	ib.	CARTHAMUS.	p. 331.
CANNABIS.	p. 423.	Lanatus.	ib.
Sativa.	ib.	Carduncellus.	ib.
CAPPARIS.	p. 152.	CARUM.	p. 223.
Spinosa.	ib.	Carvi.	ib.
CAPSICUM.	p. 33.	CATANANCHE.	p. 354.
Annum.	ib.	Cærulea.	ib.
CARDAMINE.	p. 146.	CAUCALIS.	p. 285.
Hirsuta.	ib.	* Pumila.	ib.
* Pratensis.	p. 163.	Grandiflora.	ib.
* Parviflora.	ib.	Daucoïdes.	ib.
Amara.	ib.	* Platycarpos.	ib.
* Resedifolia.	ib.	* Leptophylla.	ib.
Impatiens.	p. 404.	CELOSIA.	p. 395.
CARDUUS.	p. 326.	Cristata.	ib.
Lanceolatus.	ib.	CELTIS.	p. 431.
* Nutans.	p. 327.	Australis.	ib.
* Acanthoides.	ib.	CENCHRUS.	p. 131.
* Crispus.	ib.	* Racemosus.	ib.
Monspelulanus.	ib.	* Capitatus.	ib.
* Palustris.	ib.	CENTAUREA.	p. 374.
Marianus.	ib.	Crupina.	ib.
* Eriophorus.	ib.	Moschata.	ib.
* Tuberulosus.	ib.	* Peclinata.	ib.
* Acaulis.	ib.	* Phrygia.	ib.
CAREX.	p. 408.	* Nigra.	ib.
* Leporina.	ib.	Pullara.	ib.
* Vulpina.	ib.	Montana.	p. 375.
* Muricata.	ib.	Cyanus.	ib.
* Flava.	ib.	* Paniculata.	ib.
* Digitata.	ib.	* Scabiosa.	ib.
* Pseudo-cyperus.	ib.	* Jacea.	ib.
* Limosa.	ib.	Conifera.	ib.
* Arenaria.	p. 473	* Alba.	ib.
* Acuta.	p. 409.	* Seridis.	p. 376.
* Vesicaria.	ib.	* Aspera.	ib.
CARLINA.	p. 330.	Calcitrapa.	ib.

INDEX GENERUM. 487

Solstitialis.	ib.	Botrys.	ib.
* Melitensis.	ib.	Vulvaria.	p. 398.
* Sicula.	p. 377.	* Polyppermum.	ib.
* Calcitrapoides.	ib.	Scoparium.	ib.
* Centauroides.	ib.	* Maritimum.	ib.
Collina.	ib.	CHONDRILLA.	p. 347.
Salmantica.	ib.	Juncea.	ib.
Galaëtites.	ib.	CHRYSANTHEMUM?	367.
CERASTIUM.	p. 246.	Leucanthemum.	ib.
* Viscosum.	ib.	* Montanum.	ib.
* Arvense.	ib.	* Graminifolium.	p. 368.
* Semidecandrum.	ib.	* Monspeliense.	ib.
Repens.	ib.	* Corymbosum.	ib.
Tomentosum.	ib.	* Alpinum.	ib.
* Latifolium.	ib.	CHRYSOCOMA.	p. 334.
CERATOPHYLLUM.	p. 414.	* Linosyris.	ib.
Demersum.	ib.	CHRYSOSPLENIUM.	p. 403.
CERCIS.	p. 292.	Oppositifolium.	ib.
Siliquastrum.	ib.	CICER.	p. 190.
CERINTHE.	p. 21.	Arietinum.	ib.
Major.	ib.	CICHORIUM.	p. 355.
CHÆROPHYLLUM.	p. 290.	Intybus.	ib.
Sylvestre.	ib.	Endivia.	ib.
* Temulum.	ib.	CYNARA.	p. 330.
* Hirsutum.	ib.	Scolymus.	ib.
CHARA.	p. 457.	Cardunculus.	ib.
Vulgaris.	ib.	CIRCÆA.	p. 109.
CHEIRANTHUS.	p. 165.	Lutetiana.	p. 110.
Cheiri.	ib.	CISTUS.	p. 262.
Incanus.	p. 166.	Laurifolia.	ib.
* Annuus.	ib.	* Ladanifera.	ib.
* Trifitis.	ib.	Monspeliensis.	p. 263.
* Sinuatus.	ib.	Albida	ib.
* Littoreus.	ib.	* Salvifolia.	ib.
CHELIDONIUM.	p. 153.	* Crispa.	ib.
Majus.	ib.	Fumana.	ib.
Glaucom.	ib.	* Lævipes.	ib.
* Corniculatum.	ib.	* Canus.	ib.
* Hybridum.	ib.	* Oëlandicus?	ib.
CHENOPODIUM.	p. 397.	* Tuberaria.	p. 264.
* Bonus Henricus.	ib.	* Guttatus.	ib.
* Rubrum.	ib.	* Ledifolius.	ib.
* Album.	ib.	* Nummularius.	ib.
* Viride.	ib.	* Serpyllifolius.	ib.
Hybridum.	ib.	* Thymifolius.	p. 265.

* Pilosus.	ib.	CONVOLVULUS.	p. 27.
Helianthemum.	ib.	Arvensis.	ib.
* Hirtus.	ib.	Sepium.	ib.
CLITRUS.	p. 275.	β. Maritimus.	
Medica.	ib.	Althæoides.	p. 28.
Aurantium.	p. 276.	* Cneorum.	ib.
CLATRUS.	p. 463.	Cantabrica.	ib.
* Cancellatus.	ib.	Soldanella.	ib.
CLAVARIA.	p. 463.	CONYZA.	p. 338.
* Coralloide.	ib.	Squarrosa.	ib.
CLEMATIS.	p. 155.	CORIANDRUM.	p. 289.
* Vitalba.	ib.	* Testiculatum.	ib.
Flammula.	ib.	CORIARIA.	p. 431.
* Recta.	ib.	Myrtifolia.	ib.
CLINOPODIUM.	p. 81.	CORIS.	p. 75.
Vulgare.	ib.	Monspeliensis.	ib.
CLYPSOLA.	p. 162.	CORISPIRMUM.	p. 109.
* Jonthlaspi.	ib.	* Hyssopifolium.	ib.
Maritima.	ib.	CORNUS.	p. 147.
CNEORUM.	p. 134.	Mas.	ib.
Tricoccos.	ib.	Sanguinea.	ib.
CNICUS.	p. 329.	CORONILLA.	p. 193.
* Acarna.	ib.	Emerus.	ib.
Benedictus.	ib.	* Juncea.	ib.
COCHLEARIA.	p. 160.	* Valentina.	ib.
Draba.	ib.	Glauca.	ib.
Coronopus.	ib.	* Minima.	ib.
* Armoracia.	ib.	Varia.	ib.
COLCHICUM.	p. 313.	Securidaca.	ib.
* Autumnale.	ib.	CORRIGIOLA.	p. 226.
COLUTFA.	p. 184.	* Littoralis.	ib.
Arborescens.	ib.	CORYLUS.	p. 417.
CONFerva.	p. 459.	Avellana.	ib.
* Rivularis.	ib.	COTYLEDON.	p. 47.
* Bullosa.	ib.	Umbilicus.	ib.
* Ægagropila.	ib.	CRATAEGUS.	p. 252.
CONIUM.	p. 286.	Aria.	ib.
Maculatum.	ib.	* Torminalis.	ib.
CONVAILARIA.	p. 39.	Oxyacantha.	ib.
Maialis.	ib.	Azarolus.	ib.
* Verticillata.	ib.	CREPIS.	p. 351.
Polygonatum.	ib.	* Barbata.	ib.
* Mult. flora.	p. 40.	* Rubra.	ib.
* Bifolia.	p. 15.	* Pulchta.	ib.

* Biennis.	352.	Paniceus.	ib.
Fætida.	ib.	CYPERUS.	p.
CRESSA.	p. 37.	Longus.	
* Cretica.	ib.	* Flavescens.	
CRITHMUM.	p. 220.	* Fuscus.	
Maritimum.	ib.	* Esculentus.	p. 476.
CROCUS.	p. 7.	CYPRIPEDIUM.	p. 300.
Sativus.	ib.	* Calceolus.	ib.
CROTON	p. 278. 419.	CYTIRUS.	p. 192.
Tinctorium.	ib.	* Nigricans.	ib.
CRUCIANELLA.	p. 14.	* Sesiliifolius.	ib.
* Angustifolia.	ib.	* Supinus.	ib.
* Latifolia.	ib.	Argenteus.	ib.
* Monspeliacaca.	ib.		
Maritima.	p. 17.	D	
CUCUBALUS.	p. 239.	ACTYLIS.	p. 119.
Baccifer.	ib.	Glomeratus.	ib.
Bchen.	ib.	DAPHNE.	p. 43.
Reflexus.	ib.	* Mezereum.	ib.
* Otites.	p. 279.	Thymelæa.	ib.
CUCUMIS.	p. 53.	Laureola.	ib.
Melo.	p. 54.	Gnidium.	p. 44.
Sativus.	ib.	* Cneorum.	ib.
CUCURBITA.	p. 52.	DATURA.	p. 31.
Citrullus.	p. 53.	Stramonium.	ib.
Lagenaria.	ib.	DAUCUS.	p. 286.
Pepo.	ib.	Carota.	ib.
Melopepo.	ib.	* Vismaga.	ib.
CUPRESSUS.	p. 418.	Gingidium.	ib.
Semperfivrens.	ib.	DELPHINIUM.	p. 293.
CUSCUTA.	p. 16.	Consolida.	ib.
Europæa.	ib.	Ajacis.	ib.
CYCLAMEN.	p. 24.	Staphysagria.	ib.
Europæum.	ib.	DENTARIA.	p. 162.
CYNANCHUM.	p. 36.	Pentaphyllos.	ib.
Monspeliacum.	ib.	DIANTHUS.	p. 237.
CYNOGLOSSUM.	p. 20.	Barbatus.	ib.
Officinale.	ib.	Carthusianorum.	ib.
β. Montanum.	ib.	Prolifer.	ib.
* Apenninum.	ib.	Armeria.	ib.
Cherifolium.	ib.	Caryophyllus.	p. 238.
CYNOSURUS.	p. 126.	* Deltoïdes.	ib.
* Cristatus.	ib.	* Plumarius.	ib.
* Echinatus.	ib.	* Monspessulanus.	ib.

* Arenarius.	<i>ib.</i>	Palustre.	<i>ib.</i>
* Virginicus.	<i>ib.</i>	* Fluviatile.	<i>ib.</i>
DICTAMNUS.	<i>p. 292.</i>	* Hyemale.	<i>ib.</i>
Albus.	<i>ib.</i>	ERICA	<i>p. 42.</i>
DIGITALIS.	<i>p. 99.</i>	Vulgaris.	<i>ib.</i>
Purpurea.	<i>ib.</i>	Scoparia.	<i>ib.</i>
Lutea.	<i>ib.</i>	* Viridi purpurea.	<i>ib.</i>
DIPSACUS.	<i>p. 71.</i>	* Cinerea.	<i>ib.</i>
Fullonum.	<i>p. 72.</i>	* Arborea.	<i>p. 43.</i>
<i>p. Sylvestris.</i>		* Multiflora.	<i>ib.</i>
DORONICUM.	<i>p. 365.</i>	ERIGERON.	<i>p. 359.</i>
Pardalianches.	<i>ib.</i>	Viscosum.	<i>ib.</i>
* Plantagineum.	<i>p. 366.</i>	Graveolens.	<i>ib.</i>
* Bellidiastrum.	<i>ib.</i>	Canadense.	<i>ib.</i>
DRABA.	<i>p. 157.</i>	* Acre.	<i>ib.</i>
Verna.	<i>ib.</i>	* Siculum.	<i>p. 360.</i>
* Muralis.	<i>p. 158.</i>	* Tuberosum.	<i>ib.</i>
* Nemorosa.	<i>ib.</i>	* Alpinum.	<i>ib.</i>
* Incana.	<i>ib.</i>	ERINUS.	<i>p. 99.</i>
DROSERA.	<i>p. 230.</i>	* Alpinus.	<i>100.</i>
Rotundifolia.	<i>ib.</i>	ERIOPHORUM.	<i>p. 391.</i>
		* Vaginatum.	<i>ib.</i>
		* Polystachion.	<i>ib.</i>
E			
ECHINOPHORA.	<i>p. 284.</i>	ERVUM.	<i>p. 191.</i>
Maritima.	<i>ib.</i>	Lens.	<i>ib.</i>
ECHINOPS.	<i>p. 325.</i>	Tetraspermum.	<i>ib.</i>
Sphærocephalus.	<i>ib.</i>	* Hirsutum.	<i>ib.</i>
* Ritro.	<i>ib.</i>	Ervilia.	<i>ib.</i>
ECHIUM.	<i>p. 73.</i>	* Soloniense.	<i>ib.</i>
Italicum.	<i>ib.</i>	ERYNGIUM.	<i>p. 214.</i>
Vulgare.	<i>74.</i>	Maritimum.	<i>ib.</i>
* Creticum.	<i>ib.</i>	Campestre.	<i>ib.</i>
ELYMUS.	<i>p. 127.</i>	ERYSIMUM.	<i>p. 165.</i>
* Arenarius.	<i>ib.</i>	Officinale.	<i>ib.</i>
EPHEDRA.	<i>p. 429.</i>	Barbarea.	<i>ib.</i>
Distachia.	<i>ib.</i>	Alliaria.	<i>ib.</i>
EPILOBIUM.	<i>p. 150.</i>	EVONYMUS.	<i>p. 147.</i>
* Angustifolium.	<i>ib.</i>	Europæus.	<i>ib.</i>
* Hirsutum.	<i>ib.</i>	<i>p. Tenuifolius.</i>	
* Montanum.	<i>ib.</i>	* <i>Latifolius.</i>	
* Tetragonum.	<i>ib.</i>	EUPATORIUM.	<i>p. 333.</i>
EQUISETUM.	<i>p. 438.</i>	Cannabinum.	<i>ib.</i>
Arvense.	<i>ib.</i>	EUPHORBIA.	<i>p. 174.</i>
		Chamælyce.	<i>ib.</i>
		Peplos.	<i>ib.</i>

INDEX GENERUM. 491

* <i>Peploides.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Arvensis.</i>	<i>ib.</i>
<i>Peplus.</i>	<i>ib.</i>	<i>FONTINALIS.</i>	p. 445.
* <i>Exigua.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Antipyretica.</i>	<i>ib.</i>
<i>Lathyrus.</i>	p. 175.	* <i>Squamosa.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Dulcis.</i>	<i>ib.</i>	<i>FRAGARIA.</i>	p. 253.
<i>Paralias.</i>	<i>ib.</i>	<i>Vesca.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Segetalis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Sterilis.</i>	<i>ib.</i>
<i>Helioscopia.</i>	<i>ib.</i>	<i>FRANKENIA.</i>	p. 232.
<i>Serrata.</i>	p. 176.	<i>Lævis.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Verrucosa.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Pulverulenta.</i>	<i>ib.</i>
<i>Platyphyllos.</i>	<i>ib.</i>	<i>FRAXINUS.</i>	p. 434.
* <i>Pilosæ.</i>	<i>ib.</i>	<i>Excelsior.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Efula.</i>	<i>ib.</i>	<i>Ornus.</i>	p. 471.
<i>Cyparissias.</i>	<i>ib.</i>	<i>FUCUS.</i>	p. 457.
* <i>Myrsinites.</i>	p. 177.	* <i>Vesciculosus.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Amygdaloïdes.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Nodosus.</i>	p. 458.
* <i>Sylvatica.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Natans.</i>	<i>ib.</i>
<i>Characias.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Siliquosus.</i>	<i>ib.</i>
EUPHRASIA.	p. 96.	* <i>Cartilagineus.</i>	<i>ib.</i>
<i>Latifolia.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Pavoninus.</i>	<i>ib.</i>
<i>Officinalis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Palmatus.</i>	<i>ib.</i>
<i>Odontites.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Fatigiatus.</i>	<i>ib.</i>
<i>Lutea.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Filum.</i>	<i>ib.</i>
		* <i>Ericoïdes.</i>	<i>ib.</i>
		FUMARIA.	p. 104.
FAGUS.	p. 416.	<i>Bulbosa.</i>	<i>ib.</i>
<i>Castanea.</i>	<i>ib.</i>	<i>Officinalis.</i>	<i>ib.</i>
<i>Sylvatica.</i>	<i>ib.</i>	<i>Spicata.</i>	<i>ib.</i>
FERULA.	p. 220.	* <i>Capreolata.</i>	p. 105.
<i>Communis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Claviculata.</i>	<i>ib.</i>
FESTUCA.	p. 124.		
* <i>Ovina.</i>	<i>ib.</i>		
* <i>Rubra.</i>	<i>ib.</i>		
* <i>Myuros.</i>	<i>ib.</i>		
* <i>Bromoïdes.</i>	<i>ib.</i>		
* <i>Maritima.</i>	<i>ib.</i>		
* <i>Fluitans.</i>	<i>ib.</i>		
* <i>Decumbens.</i>	p. 470.		
FICUS.	p. 435.		
<i>Communis.</i>	<i>ib.</i>		
FILAGO.	p. 339.		
* <i>Pygmæa.</i>	<i>ib.</i>		
<i>Maritima.</i>	<i>ib.</i>		
<i>Germanica.</i>	<i>ib.</i>		
* <i>Montana.</i>	<i>ib.</i>		
		G	
		GALFOPSIS.	p. 90.
		<i>Ladanum.</i>	<i>ib.</i>
		<i>Tetrahit.</i>	p. 91.
		<i>Galcobdolon.</i>	<i>ib.</i>
		GALLIUM.	p. 11.
		<i>Palustre.</i>	<i>ib.</i>
		<i>Verum.</i>	<i>ib.</i>
		* <i>Uliginosum.</i>	<i>ib.</i>
		<i>Mollugo.</i>	<i>ib.</i>
		* <i>Glaucum.</i>	p. 12.
		* <i>Rotundifolium.</i>	<i>ib.</i>
		<i>Aparine.</i>	<i>ib.</i>

* Parisiense.	<i>ib.</i>	* γ . <i>Difflibus.</i>	
GENISTA.	<i>p. 180.</i>	GLECHOMA.	<i>p. 83.</i>
* Candicans.	<i>ib.</i>	Hederacea.	<i>ib.</i>
* Sagittalis.	<i>p. 181.</i>	GLOBULARIA.	<i>p. 71.</i>
Tinctoria.	<i>ib.</i>	Alypum.	<i>ib.</i>
Pilosa.	<i>ib.</i>	Vulgaris.	<i>ib.</i>
* Hispanica.	<i>ib.</i>	GLYCYRRHIZA.	<i>p. 192.</i>
* Germanica.	<i>ib.</i>	Glabra.	<i>ib.</i>
* Anglica.	<i>ib.</i>	GNAPHALIUM.	<i>p. 340.</i>
* Purgans.	<i>ib.</i>	Dioicum.	<i>ib.</i>
GENTIANA.	<i>p. 34.</i>	* Luteo-album.	<i>p. 336.</i>
Lutea.	<i>ib.</i>	Sæchas.	<i>ib.</i>
* Asclepiadea.	<i>p. 35.</i>	Sordidum.	<i>ib.</i>
* Purpurea.	<i>ib.</i>	* Uliginosum.	<i>p. 337.</i>
* Punetata.	<i>ib.</i>	* Sylvaticum.	<i>ib.</i>
* Acaulis.	<i>ib.</i>	GRATIOLA.	<i>p. 65.</i>
Centaurium.	<i>ib.</i>	Officinalis.	<i>p. 66.</i>
* Pumila.	<i>ib.</i>	GYPSOPHILA.	<i>p. 236.</i>
* Spicata.	<i>p. 36.</i>	* Aggregata.	<i>ib.</i>
* Campestris.	<i>p. 15.</i>	Fætigata.	<i>ib.</i>
* Cruciata.	<i>ib.</i>	* Rrigida.	<i>ib.</i>
* Ciliata.	<i>ib.</i>	Saxifraga.	<i>ib.</i>
* Perfoliata.	<i>ib.</i>		
* Filiformis.	<i>p. 469.</i>		
GERANIUM.	<i>p. 273.</i>		H
Cicutarium.	<i>ib.</i>	HEDERA.	<i>p. 213.</i>
Malacoïdes.	<i>ib.</i>	Helix.	<i>ib.</i>
Gruinum.	<i>ib.</i>	HEDYSARUM.	<i>p. 195.</i>
Nodosum.	<i>p. 274.</i>	Onobrychis.	<i>ib.</i>
Pratense.	<i>ib.</i>	Caput galli.	<i>ib.</i>
Robertianum.	<i>ib.</i>	* Humile.	<i>p. 196.</i>
Molle.	<i>ib.</i>	HELIANTHUS.	<i>p. 373.</i>
Lucidum.	<i>ib.</i>	Multiflorus.	<i>ib.</i>
Columbinum.	<i>ib.</i>	Tuberosus.	<i>ib.</i>
* Dissectum.	<i>ib.</i>	Annuus.	<i>ib.</i>
Rotundifolium.	<i>p. 275.</i>	HELYOTROPIUM.	<i>p. 17.</i>
Sanguineum.	<i>ib.</i>	* Supinum.	<i>ib.</i>
* Sylvaticum.	<i>ib.</i>	Europæum.	<i>ib.</i>
GEUM.	<i>p. 261.</i>	HELLEBORUS.	<i>p. 272.</i>
Urbanum.	<i>ib.</i>	Viridis.	<i>ib.</i>
* Rivale.	<i>ib.</i>	Fætidus.	<i>ib.</i>
* Montanum.	<i>ib.</i>	HERACLFUM.	<i>p. 283.</i>
GLADIOLUS.	<i>p. 67.</i>	Sphondylium.	<i>ib.</i>
Communis.	<i>ib.</i>	HERNIARIA.	<i>p. 393.</i>
* β . <i>Grandiflorus.</i>			

INDEX GENERUM. 493

* <i>Fruticosa.</i>	<i>ib.</i>	<i>Vulgaris.</i>	<i>ib.</i>
<i>Glabra.</i>	p. 399.	HYOSCYAMUS.	p. 76.
<i>Hirsuta.</i>	<i>ib.</i>	<i>Niger.</i>	<i>ib.</i>
HESPERIS.	p. 167.	<i>Albus.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Africana.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Aureus.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Verna.</i>	<i>ib.</i>	HYOSERIS.	p. 352.
* <i>Inodora.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Fætida.</i>	<i>ib.</i>
HIERACIUM.	p. 349.	* <i>Radiata.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Hedypnoïdes.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Minima.</i>	p. 353.
* <i>Alpinum.</i>	<i>ib.</i>	<i>Hedypnoïs.</i>	<i>ib.</i>
<i>Pilosella.</i>	<i>ib.</i>	HYPECOUM.	p. 173.
* <i>Dubium.</i>	<i>ib.</i>	<i>Procumbens.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Præmorsum.</i>	p. 350.	* <i>Pendulum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Mutorum.</i>	<i>ib.</i>	HYPERICUM.	p. 276.
<i>S. Sylviticum.</i>		<i>Androsænum.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Umbellatum.</i>	<i>ib.</i>	<i>Quadtangulum.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Paludosum.</i>	<i>ib.</i>	<i>Perforatum.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Amplexicaule.</i>	p. 351.	* <i>Hirsutum.</i>	p. 277.
* <i>Villosum.</i>	<i>ib.</i>	<i>Tomentosum.</i>	<i>ib.</i>
HIPPOCREPIS.	p. 194.	<i>Pulchrum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Unisiliquosa.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Hamifusum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Multisiliquosa.</i>	<i>ib.</i>	HYPNUM.	p. 449.
<i>Conosa.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Taxifolium.</i>	<i>ib.</i>
HIPPURIS.	p. 386.	* <i>Bryoïdes.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Vulgatis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Complanatum.</i>	<i>ib.</i>
HOLCUS.	p. 130.	* <i>Undulatum.</i>	p. 450.
<i>Halepensis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Crispum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Lanatus.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Triquetrum.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Odoratus.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Rurabulum.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Mollis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Filicinum.</i>	<i>ib.</i>
HORDEUM.	p. 129.	* <i>Proliferum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Vulgare.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Cupressiforme.</i>	p. 451.
<i>Distachyon.</i>	p. 130.	* <i>Viticulosum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Murinum.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Alopecurum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Hottonia.</i>	p. 29.	* <i>Sericum.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Palustris.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Sciutoïdes.</i>	<i>ib.</i>
HUMULUS.	p. 424.	HYPCHÆRIS.	p. 353.
<i>Lupulus.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Maculata.</i>	<i>ib.</i>
HYACINTHUS.	p. 40.	* <i>Glabra.</i>	<i>ib.</i>
<i>Comosus.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Radicata.</i>	<i>ib.</i>
<i>Botryoïdes.</i>	<i>ib.</i>	HYSSOPUS.	p. 467.
HYDROCHARIS.	p. 139.	<i>Officinalis.</i>	p. 468.
<i>Morsus ranæ.</i>	<i>ib.</i>		
HYDROCOTILE.	p. 214.		

J.

JASIONE.	<i>p. 277.</i>	* <i>Articulatus.</i>	<i>p. 402.</i>
Montana.	<i>ib.</i>	* <i>Bufonius.</i>	<i>ib.</i>
JASMINUM.	<i>p. 5.</i>	* <i>Campestris.</i>	<i>ib.</i>
Officinale.	<i>ib.</i>	* <i>Pilosus.</i>	<i>ib.</i>
Fruticans.	<i>ib.</i>	* <i>Spicatus.</i>	<i>ib.</i>
Humile.	<i>ib.</i>	* <i>Bulbosus.</i>	<i>ib.</i>
IBERIS.	<i>p. 177.</i>	* <i>Niveus.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Saxatilis.</i>	<i>ib.</i>	JUNGERMANNIA.	<i>p. 452.</i>
* <i>Umbellata.</i>	<i>p. 178.</i>	* <i>Complanata.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Amara.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Dilatata.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Nudicaulis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Platyphylla.</i>	<i>ib.</i>
Pinnata.	<i>ib.</i>	JUNIPERUS.	<i>p. 139. 428.</i>
ILEX.	<i>p. 16.</i>	* <i>Oxycedrus.</i>	<i>ib. ib.</i>
Aquifolium.	<i>ib.</i>	* <i>Phænicea.</i>	<i>ib. ib.</i>
ILLECEBRUM.	<i>p. 394.</i>	Licia.	<i>ib. 429.</i>
* <i>Verticillatum.</i>	<i>ib.</i>	Sabina.	<i>p. 140. ib.</i>
* <i>Cymosum.</i>	<i>ib.</i>	Communis.	<i>ib. ib.</i>
* <i>Patonychia.</i>	<i>ib.</i>		
* <i>Capitatum.</i>	<i>ib.</i>		
INULA.	<i>p. 364.</i>		
* <i>Oculus Christi.</i>	<i>ib.</i>	L	
Dysenterica.	<i>ib.</i>	ACTUCA.	<i>p. 346.</i>
* <i>Pulicaria.</i>	<i>ib.</i>	Sativa.	<i>ib.</i>
Salicina.	<i>ib.</i>	Virosa.	<i>ib.</i>
Crithmoïdes.	<i>ib.</i>	β. <i>Laciniata.</i>	
* <i>Montana.</i>	<i>p. 365.</i>	γ. <i>Integrifolia.</i>	
IRIS.	<i>p. 8.</i>	* <i>Saligna.</i>	<i>ib.</i>
Germanica.	<i>ib.</i>	* <i>Pereennis.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Pumila.</i>	<i>ib.</i>	LAGURUS.	<i>p. 119.</i>
β. <i>Angustifolia.</i>		* <i>Ovatus.</i>	<i>ib.</i>
γ. <i>Lutea.</i>		* <i>Cylindricus.</i>	<i>p. 120.</i>
Pseudo-acorus.	<i>p. 9.</i>	LAMIUM.	<i>p. 90.</i>
Fætidissima.	<i>ib.</i>	Album.	<i>ib.</i>
JUGLANS.	<i>p. 51.</i>	* <i>Purpureum.</i>	<i>ib.</i>
Regia.	<i>ib.</i>	Amplexicaule.	<i>ib.</i>
JUNCUS.	<i>p. 401.</i>	LAPSANA.	<i>p. 354.</i>
Acutus.	<i>ib.</i>	Communis.	<i>ib.</i>
* <i>Conglomeratus.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Zacintha.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Effusus.</i>	<i>ib.</i>	Stellata.	<i>ib.</i>
* <i>Inflexus.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Capillaris.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Squarrosum.</i>	<i>ib.</i>	LASERPITIUM.	<i>p. 217.</i>
		* <i>Latifolium.</i>	<i>ib.</i>
		Gallicum.	<i>ib.</i>
		Siler.	<i>ib.</i>
		Chironium.	<i>p. 218.</i>

INDEX GENERUM. 495

* Trilobum.	<i>ib.</i>	LEUCOIUM.	<i>p. 303.</i>
LATHYRUS.	<i>pag. 186.</i>	Vernum.	<i>ib.</i>
* Nissolia.	<i>ib.</i>	LICHEN.	<i>p. 454.</i>
Aphaca.	<i>ib.</i>	* Carpineus.	<i>ib.</i>
* Amphicarpos.	<i>ib.</i>	* Rugosus.	<i>ib.</i>
Cicera.	<i>p. 187.</i>	* Ciliaris.	<i>ib.</i>
Sativus.	<i>ib.</i>	* Farinaceus.	<i>ib.</i>
Setifolius.	<i>ib.</i>	* Prunastri.	<i>ib.</i>
* Angulatus.	<i>ib.</i>	* Caperatus.	<i>ib.</i>
* Hirsutus.	<i>ib.</i>	* Pulmonarius.	<i>p. 455.</i>
* Annuus.	<i>ib.</i>	* Furfuraceus.	<i>ib.</i>
Tuberosus.	<i>p. 188.</i>	* Cornutus.	<i>ib.</i>
Pratinus.	<i>ib.</i>	* Pyxidatus.	<i>ib.</i>
Latifolius.	<i>ib.</i>	* Fimbriatus.	<i>ib.</i>
* Heterophyllus.	<i>ib.</i>	* Rangiferinus.	<i>ib.</i>
LAVANDULA.	<i>p. 85.</i>	* Roccella.	<i>p. 456.</i>
Stachys.	<i>ib.</i>	* Plicatus.	<i>ib.</i>
Spica.	<i>p. 86.</i>	* Barbatus.	<i>ib.</i>
LAVATERA.	<i>p. 47.</i>	* Floridus.	<i>ib.</i>
* Triloba.	<i>p. 48.</i>	LIGUSTICUM.	<i>p. 221.</i>
* Thuringiaca.	<i>ib.</i>	Levisticum.	<i>ib.</i>
LAURUS.	<i>p. 55.</i>	* Peloponesiacum.	<i>ib.</i>
Nobilis.	<i>ib.</i>	LIGUSTRUM.	<i>p. 5.</i>
LEMNA.	<i>p. 407.</i>	Vulgare.	<i>ib.</i>
* Trisulca.	<i>ib.</i>	LILIUM.	<i>p. 308.</i>
Minor.	<i>ib.</i>	Candidum.	<i>ib.</i>
LEONTODON.	<i>p. 348</i>	Martagon.	<i>p. 309.</i>
Taraxacum.	<i>ib.</i>	LINNÆA.	<i>p. 103.</i>
* <i>Rotundifolium.</i>		* Borealis.	<i>ib.</i>
* <i>Tenuissimum.</i>		LINUM.	<i>p. 227.</i>
* <i>Angustifolium.</i>		* Trigynum.	<i>ib.</i>
* Bulbosum.	<i>ib.</i>	Usitatissimum.	<i>p. 228.</i>
* Autumnale.	<i>ib.</i>	Petenne.	<i>ib.</i>
Tuberosum.	<i>ib.</i>	* Narbonense.	<i>p. 229.</i>
* Hispidum.	<i>ib.</i>	Tenuifolium.	<i>ib.</i>
* Hirtum.	<i>ib.</i>	* Flavum.	<i>ib.</i>
LEPIDIUM.	<i>p. 145.</i>	Strictum.	<i>ib.</i>
Iberis.	<i>ib.</i>	* Campanulatum.	<i>ib.</i>
* Nudicaule.	<i>p. 147.</i>	Maritimum.	<i>ib.</i>
* Procumbens.	<i>p. 158.</i>	Catharticum.	<i>ib.</i>
* Petraeum.	<i>ib.</i>	LITHOSPERMUM.	<i>p. 18.</i>
Latifolium.	<i>ib.</i>	Officinale.	<i>ib.</i>
Sativum.	<i>ib.</i>	Arvense.	<i>p. 19.</i>
* Ruderale.	<i>p. 387.</i>	Purpuro-cæruleum.	<i>ib.</i>

Fruticosum.	ib.	Palustris.	ib.
LOLIUM.	<i>p. 127.</i>	$\beta.$ <i>Toomentosus.</i>	63.
Perenne.	ib.	LYSIMACHIA.	<i>p. 30.</i>
* <i>Temulentum.</i>	ib.	<i>Vulgaris.</i>	ib.
LONICERA.	<i>p. 76.</i>	<i>Linum stellatum.</i>	ib.
<i>Caprifolium.</i>	ib.	* <i>Nemorum.</i>	ib.
<i>Periclimenum.</i>	<i>p. 77.</i>	<i>Nummularia.</i>	ib.
* <i>Xylosteum.</i>	ib.	* <i>Tenella.</i>	<i>p. 31.</i>
* <i>Alpigena.</i>	ib.	LYTHRUM.	<i>p. 313.</i>
* <i>Nigra.</i>	ib.	<i>Hyslopifolium.</i>	ib.
* <i>Cærulea.</i>	ib.	<i>Salicaria.</i>	<i>p. 314.</i>
LOTUS.	<i>p. 200.</i>	* <i>Thymifolium.</i>	<i>p. 146.</i>
<i>Maritima.</i>	ib.		
* <i>Conjugata.</i>	ib.		
* <i>Siliquosa.</i>	<i>p. 201.</i>		
* <i>Angustifolia.</i>	ib.	M	
<i>Ornithopodioïdes.</i>	ib.	MALVA.	<i>p. 48.</i>
<i>Hirsuta.</i>	ib.	<i>Rotundifolia.</i>	ib.
<i>Recta.</i>	ib.	<i>Sylvestris.</i>	ib.
<i>Corniculata.</i>	<i>p. 202.</i>	<i>Alcea.</i>	ib.
<i>Dorycnium.</i>	ib.	<i>Moschata.</i>	<i>p. 49.</i>
LUPINUS.	<i>p. 183.</i>		
<i>Varius.</i>	ib.	MARCHANTIA.	<i>p. 453.</i>
* <i>Hirsutus.</i>	<i>p. 184.</i>	* <i>Polymorpha.</i>	ib.
* <i>Luteus.</i>	ib.	* <i>Cruciata.</i>	ib.
LYCHNIS.	<i>p. 245.</i>	* <i>Hemisphærica.</i>	ib.
<i>Chalcedonica.</i>	ib.	* <i>Conica.</i>	ib.
<i>Flos cuculi.</i>	ib.		
<i>Dioïca.</i>	<i>p. 279.</i>	MARRUBIUM.	<i>p. 94.</i>
LYCIUM.	<i>p. 34.</i>	<i>Vulgare.</i>	ib.
<i>Europæum.</i>	ib.	MARSILEA.	<i>p. 444.</i>
LYCOPERDON.	<i>p. 464.</i>	* <i>Natans.</i>	ib.
* <i>Tuber.</i>	ib.	MATRICARIA.	<i>p. 368.</i>
* <i>Bovista.</i>	ib.	<i>Parthenium.</i>	ib.
* <i>Stellatum.</i>	ib.	* <i>Chamomilla.</i>	<i>p. 369.</i>
LYCOPodium.	<i>p. 444.</i>	* <i>Inodora.</i>	ib.
* <i>Clavatum.</i>	ib.	MEDICAGO.	<i>p. 203.</i>
* <i>Alpinum.</i>	ib.	<i>Sativa.</i>	ib.
* <i>Denticulatum.</i>	ib.	<i>Falcata.</i>	ib.
LYCOPSIS.	<i>p. 73.</i>	<i>Lepulina.</i>	ib.
<i>Arvensis.</i>	ib.	<i>Marina.</i>	ib.
* <i>Vesicaria.</i>	ib.	<i>Polymorpha.</i>	ib.
LYCOPUS.	<i>p. 62.</i>	$\alpha.$ <i>Orbicularis.</i>	
		$\beta.$ <i>Scutellata.</i>	
		$\gamma.$ <i>Turbinata.</i>	
		$\delta.$ <i>Intertexta.</i>	
		* $\epsilon.$ <i>Arabica.</i>	
		* $\zeta.$ <i>Coronata.</i>	

* <i>Z. Coronata.</i>		* <i>Paradoxum.</i>	<i>ib.</i>
* <i>„ Ciliaris.</i>		* <i>Lendigerum.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Z. Hirsuta.</i>		MNIUM.	<i>p. 446.</i>
* <i>„ Rigidula.</i>		* <i>Hygrometricum.</i>	<i>ib.</i>
* <i>„ Laciñiata.</i>		* <i>Capillare.</i>	<i>ib.</i>
* <i>„ Minima.</i>		* <i>Fontanum.</i>	<i>ib.</i>
MELAMPYRUM.	<i>p. 98.</i>	* <i>Serpillifolium.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Sylvaticum.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Purpureum.</i>	<i>447.</i>
* <i>Nemorosum.</i>	<i>ib.</i>	MOERHINGIA.	<i>p. 131.</i>
* <i>Cristatum.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Muscosa.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Arvense.</i>	<i>97.</i>	MOMORDICA.	<i>p. 52.</i>
* <i>Pratense.</i>	<i>98.</i>	Elaterium.	<i>ib.</i>
MELIA.	<i>p. 233.</i>	MONOTROPA.	<i>p. 320.</i>
Azedarach.	<i>ib.</i>	* <i>Hypopithys.</i>	<i>ib.</i>
MELICA.	<i>p. 121.</i>	MONTIA.	<i>p. 70.</i>
* <i>Nutans.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Fontana.</i>	<i>ib.</i>
Ciliata.	<i>ib.</i>	MORUS.	<i>p. 412.</i>
MELISSA.	<i>p. 81.</i>	Alba.	<i>ib.</i>
Officinalis.	<i>ib.</i>	Nigra.	<i>422.</i>
* <i>Grandiflora.</i>	<i>82.</i>	MUCOR.	<i>p. 464.</i>
Calamintha.	<i>ib.</i>	* <i>Mucedo.</i>	<i>ib.</i>
Nepeta.	<i>ib.</i>	* <i>Glaucus.</i>	<i>ib.</i>
MELITTIS.	<i>p. 81.</i>	* <i>Crustaceus.</i>	<i>ib.</i>
Melysophyllum.	<i>ib.</i>	* <i>Erysiphe.</i>	<i>ib.</i>
MENIANTHES.	<i>p. 28.</i>	MYAGRUM.	<i>p. 157.</i>
Trifoliata.	<i>ib.</i>	Perenne.	<i>ib.</i>
* <i>Nymphoides.</i>	<i>29.</i>	Perfoliatum.	<i>ib.</i>
MENTHA.	<i>p. 83.</i>	Sativum.	<i>ib.</i>
Spicata.	<i>ib.</i>	* <i>Paniculatum.</i>	<i>ib.</i>
<i>β. Longifolia.</i>		* <i>Saxatile.</i>	<i>ib.</i>
<i>γ. Rotundifolia.</i>		MYCROPOUS.	<i>p. 340.</i>
Aquatica.	<i>84.</i>	* <i>Erectus.</i>	<i>ib.</i>
Pulegium.	<i>ib.</i>	MYOSOTIS.	<i>p. 18.</i>
* <i>Cervina.</i>	<i>ib.</i>	Scorpioides.	<i>ib.</i>
Gentilis.	<i>ib.</i>	<i>β. Glabra.</i>	
MERCURIALIS.	<i>p. 427.</i>	<i>γ. Hirsuta.</i>	
Perennis.	<i>ib.</i>	* <i>Lappula.</i>	<i>ib.</i>
Annua.	<i>428.</i>	* <i>Apula.</i>	<i>ib.</i>
Tomentosa.	<i>ib.</i>	MYOSURUS.	<i>p. 401.</i>
MESPILUS.	<i>p. 254.</i>	* <i>Minimus.</i>	<i>ib.</i>
Germanica.	<i>ib.</i>	MYRIOPHYLLUM.	<i>p. 413.</i>
Amelanchier.	<i>ib.</i>	Spicatum.	<i>ib.</i>
MILIUM.	<i>p. 117.</i>	* <i>Verticillatum.</i>	<i>414.</i>

MYRTUS.	p. 249.	* λ . Variegata.	ib.
Communis.	ib.	* μ . Sylvestrus.	ib.
ρ . Latifolia.	ib.	ONONIS.	p. 182.
γ . Alba.	ib.	Spinosa.	ib.
δ . Minor.	ib.	Arvensis.	ib.
N		* Minutissima.	ib.
N AJAS.	p. 55. 419.	Natrix.	ib.
* Marina.	ib.	Viscosa.	ib.
N ARCISSUS.	p. 303.	Cherleri.	ib.
* Odorus.	ib.	ONOPORDUM.	p. 329.
* Poëticus.	304.	Acanthium.	ib.
Pseudo-narcissus.	ib.	* Illyricum.	ib.
Jonquilla.	ib.	ONOSMA.	p. 22.
* Tazeta.	ib.	* Echoïdes.	ib.
N ARDUS.	p. 114.	OPHIOGLOSSUM.	p. 439.
* Stricta.	ib.	Vulgatum.	ib.
* Aristatus.	ib.	OPHRYS.	p. 298.
N EPETA.	p. 93.	* Nidus avis.	ib.
Cataria.	ib.	* Corallorrhiza.	ib.
N IGELLA.	p. 268.	* Spiralis.	ib.
Damascena.	ib.	* Ovata.	ib.
Arvensis.	ib.	* Anthrophophora.	ib.
N YMPHÆA.	p. 320.	Insectifera.	ib.
Lutea.	ib.	β . Myodes.	ib.
Alba.	p. 321.	γ . Major.	ib.
O		* δ . Lutea.	ib.
O ENANTHE.	p. 288.	* ϵ . Adrachnites.	ib.
Fistulosa.	ib.	ORCHIS.	p. 295.
* Pimpinelloïdes.	ib.	* Bifolia.	ib.
O LEA.	p. 6.	* Pyramidalis.	ib.
Europæa.	ib.	* Coriophora.	p. 296.
β . Angulosa.	ib.	Morio.	ib.
γ . Amygdalina.	ib.	* Ustulata.	ib.
* δ . Craniomorpha.	ib.	* Militaris.	ib.
* ϵ . Sphærica.	ib.	* Palmata.	ib.
* ζ . Oblonga.	ib.	* Odoratissima.	ib.
* η . Viridula.	ib.	Maculata.	p. 297.
* ϑ . Præcox.	p. 7.	* Conopsea.	ib.
* ι . Racemosa.	ib.	Abortiva.	ib.
* κ . Atro-rubens.	ib.	* Incarnata.	p. 472.
R		ORIGANUM.	p. 80.
* Creticum.	ib.	* Creticum.	ib.
Vulgare.	ib.	Vulgare.	ib.
Majorana.	ib.	Majorana.	ib.

ORNITHOGALUM.	<i>p. 309.</i>	* <i>Luteum.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Verticillatum.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Minimum.</i>	<i>ib.</i>			<i>Dactylon.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Pyrenaicum.</i>	<i>ib.</i>			<i>Miliaceum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Umbellatum.</i>	<i>p. 310.</i>			PAPAVER.	<i>p. 153.</i>
* <i>Narbonense.</i>	<i>ib.</i>			* <i>Hybridum.</i>	<i>ib.</i>
ORNITHOPUS.	<i>p. 194.</i>			* <i>Argemone.</i>	<i>p. 154.</i>
<i>Perpusillus.</i>	<i>ib.</i>			* <i>Alpinum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Compressus.</i>	<i>ib.</i>			* <i>Dubium.</i>	<i>ib.</i>
<i>Scorpioides.</i>	<i>ib.</i>			<i>Rhaea.</i>	<i>ib.</i>
OROBANCHE.	<i>p. 95.</i>			<i>Somniferum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Lævis.</i>	<i>ib.</i>			PARIETARIA.	<i>p. 432.</i>
* <i>Major.</i>	<i>ib.</i>			<i>Officinalis.</i>	<i>ib.</i>
<i>Ramosa.</i>	<i>ib.</i>			PARIS.	<i>p. 151.</i>
OROBUS.	<i>p. 186.</i>			<i>Quadrifolia.</i>	<i>ib.</i>
<i>Vernus.</i>	<i>ib.</i>			PARNASSIA.	<i>p. 227.</i>
<i>Tuberous.</i>	<i>ib.</i>			<i>Palustris.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Niger.</i>	<i>ib.</i>			PASSIFLORA.	<i>p. 278.</i>
* <i>Pyrenaicus.</i>	<i>ib.</i>			<i>Cerulea.</i>	<i>ib.</i>
OSMUNDA.	<i>p. 439.</i>			PASTINACA.	<i>p. 222.</i>
* <i>Lunaria.</i>	<i>ib.</i>			<i>Sativa.</i>	<i>ib.</i>
<i>Regalis.</i>	<i>ib.</i>			* <i>Opopanax.</i>	<i>p. 223.</i>
<i>Spicant.</i>	<i>ib.</i>			PEDICULARIS.	<i>p. 102.</i>
OSYRIS.	<i>p. 434.</i>			* <i>Sylvatica.</i>	<i>p. 103.</i>
<i>Alba.</i>	<i>ib.</i>			* <i>Rostrata.</i>	<i>ib.</i>
OTHONNA.	<i>p. 378.</i>			* <i>Verticillata.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Helenitis.</i>	<i>ib.</i>			* <i>Tuberosa.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Maritima.</i>	<i>p. 379.</i>			PEPLIS.	<i>p. 312.</i>
OXALIS.	<i>p. 244.</i>			* <i>Portula.</i>	<i>ib.</i>
<i>Corniculata.</i>	<i>ib.</i>			PEUCEDANUM.	<i>p. 216.</i>
* <i>Acetosella.</i>	<i>p. 472.</i>			<i>Officinale.</i>	<i>ib.</i>
	<i>P</i>			<i>Silaus.</i>	<i>ib.</i>
PEONIA.	<i>p. 266.</i>			PEZIZA.	<i>p. 463.</i>
<i>Officinalis.</i>	<i>ib.</i>			* <i>Infundibuliformis.</i>	<i>ib.</i>
PANCRATIUM.	<i>p. 305.</i>			PHALARIS.	<i>p. 116.</i>
<i>Maritimum.</i>	<i>ib.</i>			* <i>Utriculata.</i>	<i>ib.</i>
PANICUM.	<i>p. 115.</i>			<i>Canariensis.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Italicum.</i>	<i>ib.</i>			<i>Phleoides.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Cris galli.</i>	<i>ib.</i>			* <i>Arundinacea.</i>	<i>ib.</i>
<i>Sanguinale.</i>	<i>ib.</i>			* <i>Aquatica.</i>	<i>p. 476.</i>
<i>Viride.</i>	<i>ib.</i>			PHALLUS.	<i>p. 462.</i>
				* <i>Esculentus.</i>	<i>ib.</i>
				* <i>Impudicus.</i>	<i>ib.</i>
				PHASEOLUS.	<i>p. 185.</i>

S^OO I N D E X G E N E R U M.

Vulgaris.	<i>ib.</i>	Sativum.	<i>ib.</i>
Coccineus.	<i>ib.</i>	Ochrus.	<i>ib.</i>
PHELLANDRIUM	<i>p.</i> 288.	PLANTAGO.	<i>p.</i> 9.
Aquaticum.	<i>ib.</i>	Major.	<i>ib.</i>
PHILLYREA.	<i>p.</i> 8.	Media.	<i>ib.</i>
* Media.	<i>ib.</i>	* Lanceolata.	<i>p.</i> 10.
Angustifolia.	<i>ib.</i>	Lagopus.	<i>ib.</i>
Latisfolia.	<i>ib.</i>	* Albicans.	<i>ib.</i>
PHLEUM.	<i>p.</i> 116.	* Alpina.	<i>ib.</i>
Pratense.	<i>ib.</i>	Maritima.	<i>ib.</i>
* Schænoïdes.	<i>ib.</i>	* Subulata.	<i>ib.</i>
* Bulbosum.	<i>p.</i> 117.	Coronopus.	<i>ib.</i>
* Arenarium.	<i>ib.</i>	Psyllium.	<i>ib.</i>
PHLOMIS.	<i>p.</i> 89.	Cynops.	<i>ib.</i>
Lychnitis.	<i>ib.</i>	PLUMBAGO.	<i>p.</i> 27.
Herba venti.	<i>ib.</i>	Europaea.	<i>ib.</i>
PHœNIX.	<i>p.</i> 141.	POA.	<i>p.</i> 122.
Dactylifera.	<i>ib.</i>	* Aquatica.	<i>ib.</i>
PHYTEUMA.	<i>p.</i> 26.	Trivialis.	<i>ib.</i>
* Hemisphærica.	<i>ib.</i>	Angustifolia.	<i>ib.</i>
* Orbicularis.	<i>ib.</i>	Pratensis.	<i>ib.</i>
Spicata.	<i>ib.</i>	* Annua.	<i>ib.</i>
* Comosa.	<i>p.</i> 27.	Eragrostis.	<i>ib.</i>
PHYTOLACCA.	<i>p.</i> 247.	* Compressa.	<i>ib.</i>
Americana.	<i>ib.</i>	* Nemoralis.	<i>ib.</i>
PICRIS.	<i>p.</i> 344.	* Bulbosa.	<i>ib.</i>
Echioïdes.	<i>ib.</i>	* Rigida.	<i>ib.</i>
Hieracioïdes.	<i>p.</i> 345.	* Litoralis.	<i>p.</i> 470.
PIMPINELLA.	<i>p.</i> 224.	POLYCARPON.	<i>p.</i> 211.
Saxifraga.	<i>ib.</i>	Tetraphyllum.	<i>ib.</i>
* Major.		POLYCNEUM.	<i>p.</i> 387.
* Minor.		Arvense.	<i>ib.</i>
* Rubra.		POLYGALA.	<i>p.</i> 178.
PINGUICULA.	<i>p.</i> 66.	Vulgaris.	<i>ib.</i>
* Vulgaris.	<i>ib.</i>	* Monspeliaca.	<i>p.</i> 179.
PINUS.	<i>p.</i> 418.	POLYGONUM.	<i>p.</i> 37.
Sylvestris.	<i>ib.</i>	* Amphibium.	<i>p.</i> 38.
Pinea.	<i>ib.</i>	Hydropiper.	<i>p.</i> 41.
PISTACIA.	<i>p.</i> 424.	Pelticaria.	<i>ib.</i>
Narbonensis.	<i>ib.</i>	Bistorta.	<i>p.</i> 45.
Therebinthus.	<i>ib.</i>	* Aviculare.	<i>ib.</i>
Lentiscus.	<i>ib.</i>	Maritimum.	<i>ib.</i>
PISUM.	<i>p.</i> 185.	Fagopyrum.	<i>ib.</i>
		* Convolvulus.	<i>p.</i> 46.

INDEX GENERUM. 501

POLYPODIUM.	<i>p. 442.</i>	PRIMULA.	<i>p. 23.</i>
Vulgare.	<i>ib.</i>	Officinalis.	<i>ib.</i>
Cambricum.	<i>ib.</i>	* Auricula.	<i>ib.</i>
* Lonchitis.	<i>ib.</i>	* Farinosa.	<i>ib.</i>
* Fontanum.	<i>ib.</i>	* Vitaliana.	<i>ib.</i>
* Phegopteris.	<i>ib.</i>	* Integrifolia.	<i>ib.</i>
Filix mas.	<i>ib.</i>	PRUNUS.	<i>p. 251.</i>
* Filix femina.	<i>p. 443.</i>	Laurocerasus.	<i>ib.</i>
* Cristatum.	<i>ib.</i>	Lusitanica.	<i>ib.</i>
Aculeatum.	<i>ib.</i>	Mahaleb.	<i>ib.</i>
* Rhæticum.	<i>ib.</i>	Armeniaca.	<i>ib.</i>
* Fragile.	<i>ib.</i>	Cerasus.	<i>ib.</i>
* Dryopteris.	<i>ib.</i>	Domeſtica.	<i>ib.</i>
POLYTRICHUM.	<i>p. 445.</i>	Spinosa.	<i>p. 252.</i>
Commune.	<i>ib.</i>	PSORALEA.	<i>p. 197.</i>
* Alpinum.	<i>p. 446.</i>	Bituminosa.	<i>ib.</i>
POPULUS.	<i>p. 427.</i>	PTERIS.	<i>p. 440.</i>
Alba.	<i>ib.</i>	Aquilina.	<i>ib.</i>
Nigra.	<i>ib.</i>	PULMONARIA.	<i>p. 19.</i>
PORTULACA.	<i>p. 247.</i>	Officinalis.	<i>p. 20.</i>
Oleracea.	<i>ib.</i>	PUNICA.	<i>p. 249.</i>
POTAMOGETON.	<i>p. 148.</i>	Granatum.	<i>ib.</i>
Natans.	<i>ib.</i>	PYROLA.	<i>p. 233.</i>
* Densum.	<i>ib.</i>	* Rotundifolia.	<i>ib.</i>
Crispum.	<i>ib.</i>	* Minor.	<i>ib.</i>
* Seraceum.	<i>ib.</i>	* Secunda.	<i>ib.</i>
* Pusillum.	<i>ib.</i>	PYRUS.	<i>p. 254.</i>
POTERIUM.	<i>p. 51.</i>	Communis.	<i>ib.</i>
Sanguisorba.	<i>ib.</i>	Malus.	<i>ib.</i>
POTENTILLA.	<i>p. 259.</i>	Cydonia.	<i>ib.</i>
* Anserina.	<i>ib.</i>		Q
* Rupestris.	<i>ib.</i>	Q UERCUS.	<i>p. 415.</i>
* Recta.	<i>ib.</i>	Ilex.	<i>ib.</i>
Argeitea.	<i>ib.</i>	* Gramuntia.	<i>ib.</i>
* Hirta.	<i>ib.</i>	Coccifera.	<i>ib.</i>
* Alba.	<i>p. 260.</i>	Robur.	<i>ib.</i>
Reptans.	<i>ib.</i>		R
* Caulescens.	<i>ib.</i>	R ANUNCULUS.	<i>p. 268.</i>
* Verna.	<i>ib.</i>	* Flammula.	<i>ib.</i>
PRENANTHES.	<i>p. 347.</i>	* Graminifolius.	<i>p. 472.</i>
* Viminea.	<i>ib.</i>		Liij
* Purpurea.	<i>ib.</i>		
* Muralis.	<i>ib.</i>		

* Lingua.	p. 269	ROBINIA.	p. 184.
* Amplexicaulis.	ib.	Pseudo-acacia.	ib.
Ficaria.	ib.	ROSA.	p. 254.
* Auricomus.	ib.	Eglanteria.	ib.
* Sceleratus.	ib.	* Villosa.	ib.
* Illyricus.	ib.	* Monspeliaca.	ib.
* Aconitifolius.	ib.	* Sempervirens	p. 256.
* Monspeliacus.	p. 270	Canina.	ib.
* Parviflorus.	ib.	Spinosissima.	ib.
Bulbosus.	ib.	Gallica.	ib.
Repens.	271	ROSMARINUS.	p. 63.
Acris.	ib.	Officinalis.	ib.
* Lanuginosus.	ib.	RUBIA.	p. 13.
Chærophyllos.	ib.	Tinctorum.	ib.
* Arvensis.	ib.	RUBUS.	p. 257.
Muricatus.	ib.	Idæus.	ib.
Falcatus.	ib.	Cæsius.	ib.
Aquatalis.	p. 272.	Fruticosus.	ib.
RAPHANUS.	p. 170.	* Saxatilis.	p. 258.
Sativus.	ib.	RUMEX.	p. 134.
Raphanistrum.	ib.	Patientia.	ib.
RESEDA.	p. 318.	Crispus.	ib.
Luteola.	ib.	Acutus.	p. 135.
* Sesamoïdes.	ib.	Pulcher.	ib.
Alba.	ib.	* Bucephalophorus.	ib.
Lutea.	ib.	* Aquaticus.	ib.
Phyteuma.	ib.	Scutatus.	ib.
RHAMNUS.	p. 395.	* Tingitanus.	p. 136.
Frangula.	ib.	Acetosa.	p. 138.
Ziziphus.	p. 400.	* Acetosella.	ib.
Paliurus.	ib.	RUPPIA.	p. 394.
Catharticus.	p. 422.	* Maritima.	ib.
* Alpinus.	p. 423.	RUSCUS.	p. 430.
Alaternus.	p. 433.	Aculeatus.	ib.
RHUS.	p. 226.	RUTA.	p. 149.
Coriaria.	ib.	Graveolens.	ib.
RIBES.	p. 212.		S
* Alpinum.	ib.	SAGINA.	p. 149.
Nigrum.	ib.	* Procumbens.	ib.
Rubrum.	ib.	* Erecta.	ib.
Uva crispa.	ib.	SAGITTARIA.	p. 138.
RINANTHUS.	p. 97.	Sagittifolia.	ib.
* Trixago.	ib.		
Crista galli,	ib.		

INDEX GENERUM. 503

SALICONIA.	<i>p. 386.</i>	* <i>Hircinum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Hebacea.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Nigrum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Fruticosa.</i>	<i>ib.</i>	SAXIFRAGA.	<i>p. 234.</i>
SALIX.	<i>p. 419.</i>	<i>Cotyledon.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Vitellina.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Bryoïdes.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Amygdalina.</i>	<i>p. 420.</i>	* <i>Cæfia.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Rorismarinifolia.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Stellatis.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Fragilis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Aizoïdes.</i>	<i>p. 235.</i>
<i>Helix.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Rotundifolia.</i>	<i>ib.</i>
<i>Capraea.</i>	<i>ib.</i>	<i>Granulata.</i>	<i>ib.</i>
<i>Viminalis.</i>	<i>ib.</i>	<i>Tridactylites.</i>	<i>ib.</i>
<i>Alba.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Cespitosa.</i>	<i>ib.</i>
SALSOLO.	<i>p. 396.</i>	* <i>Hypnoïdes.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Tragus.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Ascendens.</i>	<i>ib.</i>
<i>Soda.</i>	<i>ib.</i>	SCABIOSA.	<i>p. 72.</i>
<i>Hirsuta.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Integrifolia.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Fruticosa.</i>	<i>ib.</i>	<i>Arvensis.</i>	<i>ib.</i>
SALVIA.	<i>p. 61.</i>	<i>Columbaria.</i>	<i>ib.</i>
<i>Officinalis.</i>	<i>p. 62.</i>	* <i>Maritima.</i>	<i>ib.</i>
* <i>Pratensis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Ochroleuca.</i>	<i>p. 73.</i>
<i>Verbenaca.</i>	<i>ib.</i>	<i>Leucantha.</i>	<i>p. 14.</i>
<i>Glutinosa.</i>	<i>ib.</i>	<i>Gramuntia.</i>	<i>p. 15.</i>
<i>Sclarea.</i>	<i>ib.</i>	<i>Succisa.</i>	<i>p. 14.</i>
* <i>Æthiopis.</i>	<i>p. 469.</i>	SCANDIX.	<i>p. 289.</i>
AMBUCUS.	<i>p. 38.</i>	<i>Pecten veneris.</i>	<i>ib.</i>
<i>Ebulus.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Australis.</i>	<i>ib.</i>
<i>Nigra.</i>	<i>p. 39.</i>	<i>Cerefolium.</i>	<i>ib.</i>
SAMOLUS.	<i>p. 24.</i>	SCHŒNUS.	<i>p. 388.</i>
<i>Valerandi.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Mariscus.</i>	<i>ib.</i>
SANGUISORBA.	<i>p. 11.</i>	* <i>Mucronatus.</i>	<i>ib.</i>
<i>Officinalis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Nigricans.</i>	<i>ib.</i>
SANICULA.	<i>p. 215.</i>	* <i>Aculeatus.</i>	<i>ib.</i>
<i>Officinalis.</i>	<i>ib.</i>	SCILLA.	<i>p. 310.</i>
SANTOLINA.	<i>p. 468.</i>	* <i>Autumnalis.</i>	<i>ib.</i>
<i>Chamæcyparissus.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Bifolia.</i>	<i>ib.</i>
SAPONARIA.	<i>p. 236.</i>	SCIRPUS.	<i>p. 390.</i>
<i>Officinalis.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Palustris.</i>	<i>ib.</i>
<i>Vaccaria.</i>	<i>p. 237.</i>	* <i>Acicularis.</i>	<i>ib.</i>
<i>Ocymoides.</i>	<i>ib.</i>	* <i>Fluitans.</i>	<i>ib.</i>
SATUREJA.	<i>p. 93.</i>	* <i>Lacustris.</i>	<i>ib.</i>
<i>Hortensis.</i>	<i>ib.</i>	<i>Holoschænus.</i>	<i>ib.</i>
<i>Montana.</i>	<i>ib.</i>	<i>Romanus.</i>	<i>ib.</i>
SATYRIUM.	<i>p. 297.</i>	* <i>Setaceus.</i>	<i>ib.</i>
		* <i>Mucronatus.</i>	<i>p. 391.</i>

504 INDEX GENERUM.

* Maritimus.	ib.	Abrotanifolius.	ib.
* Sylvaticus.	ib.	Jacobæa.	ib.
SCLERANTHUS.	<i>p. 403.</i>	Doria.	<i>p. 362.</i>
* Annuus.	ib.	* Nemorensis.	ib.
* Polycarpos.	ib.	* Sarracenicus.	ib.
SCOLYMUS.	<i>p. 356.</i>	* Doronicum.	ib.
* Maculatus.	ib.	SERAPIAS.	<i>p. 299.</i>
Hispanicus.	ib.	Helleborine.	ib.
SCORPIURUS.	<i>p. 195.</i>	* Lingua.	ib.
Vermiculata.	ib.	Longifolia.	ib.
* Subvillosa.	ib.	SERRATULA.	<i>p. 326.</i>
* Sulcata.	ib.	* Tinctoria.	ib.
SCORZONERA.	<i>p. 343.</i>	Arvensis.	ib.
* Humilis.	ib.	SESELI.	<i>p. 290.</i>
Hispanica.	ib.	Glaucum.	ib.
* Angustifolia.	ib.	Tortuosum.	<i>p. 291.</i>
Lacinata.	ib.	* Annuum.	ib.
Pectioïdes.	ib.	* Carvifolia.	ib.
SCROPHULARIA.	<i>p. 98.</i>	* Pumilum.	ib.
Nodosa.	ib.	* Elatum.	ib.
Aquatica.	ib.	SHERARDIA.	<i>p. 13.</i>
Vernalis.	ib.	Arvensis.	ib.
Canina.	ib.	SIDERITIS.	<i>p. 85.</i>
Peregrina.	ib.	Perfoliata.	ib.
SCUTELLARIA.	<i>p. 78.</i>	Hyssopifolia.	ib.
Galericulata.	ib.	* Scordioïdes.	ib.
SECALE.	<i>p. 127.</i>	* Hirsuta.	ib.
Cereale.	ib.	Romana.	<i>p. 83.</i>
Villosum.	ib.	SILENE.	<i>p. 240.</i>
SEDUM.	<i>p. 243.</i>	* Vulnera.	ib.
Telephium.	ib.	Nutans.	ib.
* Cœpaea.	ib.	Conoïdæa.	ib.
Dasyphyllum.	ib.	Behen.	ib.
* Reflexum.	ib.	Muscipula.	ib.
* Album.	<i>p. 244.</i>	Armeria.	ib.
Acte.	ib.	* Inaperta.	ib.
* Sexangulare.	ib.	* Rupestris.	<i>p. 241.</i>
* Villosum.	ib.	* Saxifraga.	ib.
* Annum.	<i>p. 472.</i>	SINAPIS.	<i>p. 169.</i>
SENECIO.	<i>p. 338.</i>	* Arvensis.	ib.
Vulgaris.	ib.	Nigra.	ib.
Viscosus.	<i>p. 361.</i>	* Alba.	ib.
* Sylvaticus.	ib.	SISON.	<i>p. 219.</i>
* Lucasius.	ib.	Amomum.	ib.

INDEX GENERUM. 505

* Verticillatum.	<i>ib.</i>	Junceum.	<i>ib.</i>
SISYMBRIUM.	<i>p. 146.</i>	* Monoispermum.	<i>ib.</i>
* Loëselii.	<i>ib.</i>	Scorpius.	<i>p. 180.</i>
Nasturtium.	<i>p. 163.</i>	* Complicatum.	<i>ib.</i>
* Sylvestre.	<i>p. 164.</i>	Scoparium.	<i>ib.</i>
Amphibium.	<i>ib.</i>	* Spinosum.	<i>ib.</i>
* Tenuifolium.	<i>ib.</i>	SPERGULA.	<i>p. 246.</i>
Polyceratum.	<i>ib.</i>	* Nodosa.	<i>ib.</i>
* Mirale.	<i>ib.</i>	* Saginoïdes.	<i>p. 247.</i>
* Asperum.	<i>ib.</i>	* Arvensis.	<i>ib.</i>
Irio	<i>ib.</i>	* Pentandra.	<i>p. 228.</i>
* Altissimum.	<i>p. 471.</i>	SPHAGNUM.	<i>p. 445.</i>
* Pyrenaicum.	<i>ib.</i>	* Palustre.	<i>ib.</i>
SIUM.	<i>p. 218.</i>	SPINACIA.	<i>p. 425.</i>
* Berula.	<i>ib.</i>	Oleracea.	<i>ib.</i>
Nodiflorum.	<i>p. 219.</i>	SPIRÆA.	<i>p. 261.</i>
Latifolium.	<i>ib.</i>	Filipendula.	<i>ib.</i>
* Falcaria.	<i>ib.</i>	Ulmaria.	<i>ib.</i>
SMILAX.	<i>p. 426.</i>	STACHYS.	<i>p. 91.</i>
Aspera.	<i>ib.</i>	Sylvatica.	<i>ib.</i>
SMYRNUM.	<i>p. 468.</i>	Palustris.	<i>ib.</i>
Olusatrum.	<i>ib.</i>	Germanica.	<i>ib.</i>
SOLANUM.	<i>p. 32.</i>	* Maritima.	<i>ib.</i>
Dulcamara.	<i>ib.</i>	* Annua.	<i>p. 92.</i>
Tuberosum.	<i>p. 33.</i>	* Hirta.	<i>ib.</i>
Nigrum.	<i>ib.</i>	STÆHELINA.	<i>p. 333.</i>
Melongena.	<i>ib.</i>	* Dubia.	<i>ib.</i>
SOLIDAGO.	<i>p. 363.</i>	STATICE.	<i>p. 230.</i>
Virga aurea.	<i>ib.</i>	Armeria.	<i>ib.</i>
* Montana.	<i>p. 364.</i>	Limonium.	<i>ib.</i>
* Alpina.	<i>ib.</i>	<i>β.</i> Oleæfolia.	
SONCHUS.	<i>p. 345.</i>	* <i>γ.</i> Bellidifolia.	
Arvensis.	<i>ib.</i>	* <i>δ.</i> Fruticosa.	
Oleraceus.	<i>ib.</i>	Echioïdes.	<i>ib.</i>
Tenerimus.	<i>ib.</i>	* Cordata.	<i>ib.</i>
* Alpinus.	<i>ib.</i>	* Reticulata.	<i>ib.</i>
* Maritimus.	<i>ib.</i>	STELLARIA.	<i>p. 241.</i>
SORBUS.	<i>p. 253.</i>	* Nemorum.	<i>ib.</i>
Aucuparia.	<i>ib.</i>	* Dichotoma.	<i>ib.</i>
Domestica.	<i>ib.</i>	* Graminea.	<i>ib.</i>
SPARGANIUM.	<i>p. 403.</i>	* Cerastroïdes.	<i>ib.</i>
Ramosum.	<i>ib.</i>	STELLERA.	<i>p. 44.</i>
SPARTIUM.	<i>p. 179.</i>	* Passerina.	<i>ib.</i>

STIPA.	<i>p. 119.</i>	Cynocrambe.	<i>ib.</i>
* Pennata.	<i>ib.</i>	THESIUM.	<i>p. 395.</i>
* Juncea.	<i>ib.</i>	* Linophyllum.	<i>ib.</i>
SYMPHYTUM.	<i>p. 21.</i>	THLASPI.	<i>p. 159.</i>
Officinale.	<i>ib.</i>	* Saxatile.	<i>ib.</i>
Tuberosum.	<i>ib.</i>	Perfoliatum.	<i>ib.</i>
SYRINGA.	<i>p. 7.</i>	* Hirtum.	<i>ib.</i>
Vulgaris.	<i>ib.</i>	* Campestre.	<i>ib.</i>
T		* Montanum.	<i>ib.</i>
TAGETES.	<i>p. 366.</i>	Bursa Pastoris.	<i>ib.</i>
Patula.	<i>ib.</i>	* Alpestre.	<i>p. 470.</i>
Erecta.	<i>p. 367.</i>	THYMUS.	<i>p. 78.</i>
TAMARIX.	<i>p. 226.</i>	Serpullum.	<i>ib.</i>
Gallica.	<i>ib.</i>	<i>β.</i> Citratum.	<i>p. 79.</i>
TAMUS.	<i>p. 426.</i>	Vulgaris.	<i>ib.</i>
Communis.	<i>ib.</i>	* <i>β.</i> Incanus.	<i>ib.</i>
TARGIONIA.	<i>p. 453.</i>	Zygis.	<i>ib.</i>
* Hypophylla.	<i>ib.</i>	Acinos.	<i>ib.</i>
TEUCRIUM.	<i>p. 86.</i>	* Pulegioides.	<i>ib.</i>
* Mountanum.	<i>ib.</i>	TILIA.	<i>p. 265.</i>
Polium.	<i>ib.</i>	Europaea.	<i>ib.</i>
* <i>β.</i> Variegatum.	<i>p. 87.</i>	TILLÆA.	<i>p. 149.</i>
* Capitatum.	<i>ib.</i>	* Rubra.	<i>ib.</i>
Chamæpitys.	<i>ib.</i>	* Muscosa.	<i>ib.</i>
Iva.	<i>ib.</i>	TORDYLIUM.	<i>p. 284.</i>
Botrys.	<i>ib.</i>	Officinale.	<i>ib.</i>
Scordium.	<i>ib.</i>	* Maximum.	<i>ib.</i>
Chamædrys.	<i>88.</i>	Anthriscus.	<i>ib.</i>
* Flavum.	<i>ib.</i>	* Latifolium.	<i>ib.</i>
* Scorodonia.	<i>82.</i>	Nodosum.	<i>ib.</i>
THALICTRUM.	<i>p. 156.</i>	TORMENTILLA.	<i>p. 151.</i>
Fætidum.	<i>ib.</i>	Erecta.	<i>ib.</i>
* Minus.	<i>ib.</i>	TRAGOPOGON.	<i>p. 342.</i>
* Angustifolium.	<i>ib.</i>	* Hirsutum.	<i>ib.</i>
* Flavum.	<i>ib.</i>	Pratense.	<i>ib.</i>
THAPSIA.	<i>p. 222.</i>	Porrifolium.	<i>ib.</i>
Villosa.	<i>ib.</i>	Dalechampii.	<i>p. 343.</i>
* Fætida.	<i>ib.</i>	* Picroides.	<i>ib.</i>
Asclepium.	<i>ib.</i>	* Asperum.	<i>ib.</i>
THELIGONUM.	<i>p. 414.</i>	* Crocifolium.	<i>ib.</i>
		TREMELLA.	<i>p. 457.</i>
		* Nostoc.	<i>ib.</i>
		* Auricula.	<i>ib.</i>
		* Verrucosa.	<i>ib.</i>

INDEX GENERUM. 507

* Hemisphærica.	<i>ib.</i>	TURRITIS.	<i>p. 168.</i>
TRIBULUS.	<i>p. 233.</i>	Hirsuta.	<i>ib.</i>
Terrestris.	<i>ib.</i>	TUSSILAGO.	<i>p. 360.</i>
TRIFOLIUM.	<i>p. 198.</i>	* Alpina.	<i>ib.</i>
Melilotus Officinalis.	<i>ib.</i>	Farfara.	<i>ib.</i>
* Melilotus Italica.	<i>ib.</i>	TYPHA.	<i>p. 410.</i>
* Alpinum.	<i>ib.</i>	Latifolia.	<i>ib.</i>
Subterraneum.	<i>ib.</i>	* Angustifolia.	<i>ib.</i>
* Cherleri.	<i>p. 199.</i>	V	
* Glomeratum.	<i>ib.</i>	ACCINNIUM.	<i>p. 41.</i>
* Lappaceum.	<i>ib.</i>	* Myrtillus.	<i>ib.</i>
Angustifolium.	<i>ib.</i>	* Uliginosum.	<i>p. 42.</i>
Stellatum.	<i>ib.</i>	VALANTIA.	<i>p. 467.</i>
* Scabrum.	<i>ib.</i>	* Muralis.	<i>ib.</i>
Kubens.	<i>p. 105.</i>	* Aparine.	<i>ib.</i>
Pratense.	<i>ib.</i>	* Cruciata.	<i>ib.</i>
Lagopus.	<i>ib.</i>	VALERIANA.	<i>p. 61.</i>
Repens.	<i>ib.</i>	Rubra.	<i>ib.</i>
* Tomentosum.	<i>ib.</i>	* Calcitrapa.	<i>ib.</i>
* Montanum.	<i>p. 199.</i>	* Tuberosa.	<i>p. 469.</i>
* Spinosum.	<i>ib.</i>	Phu.	<i>p. 67.</i>
* Resupinatum.	<i>p. 200.</i>	Tripteris.	<i>p. 68.</i>
* Fragiferum.	<i>ib.</i>	Locusta.	<i>ib.</i>
Agrarium.	<i>ib.</i>	β. Olitoria.	
* Spadiceum.	<i>ib.</i>	γ. Coronata.	
TRIGLOCHIN.	<i>p. 136.</i>	* δ. Dentata.	
Palustre.	<i>ib.</i>	* ε. Multifida.	
TRIGONELLA.	<i>p. 203.</i>	* Mixta.	<i>ib.</i>
Polyceratia.	<i>ib.</i>	VELEZIA.	<i>p. 232.</i>
* Monspeliaca.	<i>ib.</i>	* Rigida.	<i>ib.</i>
Fænum Græcum.	<i>ib.</i>	VERATRUM.	<i>p. 316.</i>
TRITICUM.	<i>p. 128.</i>	Album.	<i>ib.</i>
Æstivum.	<i>ib.</i>	VERBASCUM.	<i>p. 74.</i>
Hypernum.	<i>ib.</i>	Thapsus.	<i>ib.</i>
* Spelta.	<i>ib.</i>	* Lychnitis.	<i>ib.</i>
Monococcum.	<i>ib.</i>	* Phlomoïdes.	<i>ib.</i>
* Repens.	<i>ib.</i>	* Nigrum.	<i>p. 75.</i>
* Caninum.	<i>ib.</i>	Blattaria.	<i>ib.</i>
* Tenellum.	<i>p. 129.</i>	Sinuatum.	<i>ib.</i>
TROLLIUS.	<i>p. 321.</i>	VERBENA.	<i>p. 70.</i>
* Europæus.	<i>ib.</i>	Communis.	<i>ib.</i>
TULIPA.	<i>p. 309.</i>		
Sylvestris.	<i>ib.</i>		
Gesneriana.	<i>ib.</i>		

V ERONICA.		V ISCUM.	p. 421.
* Spicata.	p. 63.	* Album.	ib.
Officinalis.	p. 64.	V ITEX.	p. 103.
* Alpina.	ib.	Agnus castus.	ib.
* Serpyllifolia.	ib.	V ITIS.	p. 213.
Beccabunga.	ib.	Vinifera.	ib.
* Anagallis.	ib.	* Laciniosa.	ib.
Chamaedrys.	ib.	U LMUS.	p. 399.
Latifolia.	p. 65.	Campestris.	ib.
Agrestis.	ib.	U LVA.	p. 459.
Arvensis.	ib.	* Intestinalis.	ib.
* Hederæfolia.	ib.	* Lactuca.	ib.
* Trifolios.	ib.	* Latissima.	ib.
V IBURNUM.	p. 38.	* Umbilicata.	ib.
Tinus.	ib.	U RTICA.	p. 411.
Lantana.	ib.	Pilulifera.	ib.
Opulus.	ib.	Urens.	ib.
V ICIA.	p. 188.	Dioica.	p. 422.
* Dumetorum.	ib.	U TRICULARIA.	p. 66.
* Sylvatica.	ib.	* Vulgaris.	ib.
* Cracca.	p. 189.		X
* Incana.	ib.	X ANTHIUM.	p. 50. 412.
* Onobrychioïdes.	ib.	Strumarium.	ib. ib.
* Biennis.	ib.	Spinosum.	ib. 413.
Sativa.	ib.	X ERANTHEMUM.	p. 337.
* Lathyroïdes.	ib.	* Annuum.	ib.
Lutea.	p. 190.		Z
* Hybrida.	ib.	Z ANICHELLIA.	p. 406.
Peregrina.	ib.	* Palustris.	ib.
* Sepium.	ib.	Z EA.	p. 111.
* Narbonensis.	ib.	Mays.	ib.
Faba.	ib.	Z OSTERA.	p. 406.
V INCA.	p. 31.	* Marina.	ib.
Major.	ib.		
V IOLA.	p. 294.		
Odorata.	ib.		
Canina.	p. 295.		
Tricolor.	ib.		



INDEX SYNONYMORUM.

A

- A** Brotanum. pag. 334. 335.
336.
Absinthium. 335.
Acacia. 180.
Acanthium. 329.
Acanthus. 96.
Acer. 280.
Acetosa. 135. 136. 138.
Acinos. 79.
Aconitum. 294.
Adianthum. 440. 441. 442.
443.
Adonis. 322.
Agaricus. 457. 458. 459. 462.
Ageratum. 361. 371.
Agrostis. 118.
Agnus castus. 103.
Alaternus. 433. 434.
Alchemilla. 392. 393. 395.
Alcyonium. 460
Algæ. 456. 460. 406.
Allium. 306. 307. 308.
Alni effigie. 254.
Alnus. 106. 395. 412.
Alopecurus. 169. 120.
Alfine. 65. 142. 150. 226. 228.
236. 239. 241. 242. 246.
247. 414.
Althæa. 48. 49.
Alypum. 71.
Alysson. 161.
Amaranthus. 410. 413.
Amni. 219. 283.
Amygdalus. 250.
Anagallis. 24. 29. 30. 64.
Anchusa. 18. 19.
Androsænum. 276. 277.
Androsace. 23.
Anemone. 315.
- Angelica. 218. 221. 222.
Anguria. 53.
Anonis. 198.
Anthemis. 370.
Anthyllis. 232. 37. 211.
Anthirrinum. 97. 100. 101.
102.
Aparine. 12. 13.
Aphaca. 186.
Apium. 225. 291.
Apocynum. 36.
Aquifolium. 16. 17.
Aquilegia. 266.
Arbutus. 46.
Arenaria. 243.
Argemone. 153. 154.
Aristolochia. 106.
Armeniaca. 251.
Artemisia. 335.
Arum. 405. 406.
Arundo. 126.
Asclepias. 37.
Ascyron. 276.
Asparagus. 311.
Asphodelus. 40.
Asplenium. 441.
Aster. 336. 359. 363. 364.
365. 373.
Asteriscus. 373.
Astragalus. 183. 196. 197.
Atractylis. 331.
Atriplex. 397. 398. 432. 433.
Avellana. 417.
Avena. 125.

B

- B** ARBA Jovis. 183.
Bellis. 366. 367. 368.

510 INDEX SYNONYMORUM.

- Berberis. 312.
 Beta. 398.
 Beronica. 85. 89. 92.
 Bistorta. 45.
 Blattaria. 75.
 Blittum. 398. 410.
 Borrage. 22.
 Botrys. 397.
 Brassica. 168.
 Bryonia. 54. 426.
 Buglossoides. 22.
 Buglossum. 19. 22. 73.
 Bugula. 88. 89.
 Bulbocastanum. 217.
 Buphtalmum. 371.
 Buplevrum. 215. 216.
 Bursa pastoris. 157. 158. 160.
 167. 178.
- C**
- C**ACALIA. 333.
 Cachrys. 220.
 Calamintha. 82.
 Calendula. 377.
 Caltha. 272. 378.
 Campanula. 25. 26.
 Camphoratae congener. 387.
 Camphorosma. 392.
 Cannabina. 332.
 Cannabis. 423.
 Capparis. 152.
 Caprificus. 435.
 Capsicum. 33.
 Cardamine. 146. 163. 404.
 Carduus. 325. 326. 327. 328.
 329. 376. 377.
 Carduncellus. 331.
 Carlina. 330. 331.
 Carpinus. 417.
 Carvifolia. 291.
 Caryophyllata. 261.
 Caryophyllus. 121. 230. 236.
 237. 238. 239. 244. 245.
 246. 305.
 Casia. 434.
- Cassida. 76.
 Castanea. 416.
 Cataria. 93.
 Caucalis. 284. 285. 286.
 Catananche. 355.
 Centaurium. 35. 36. 44.
 Cepa. 307. 308.
 Cerasus. 251.
 Cerinthe. 22.
 Cererach. 441.
 Chærophylum. 289. 290.
 Chæmæcerasus. 77.
 Chamædrys. 65. 87. 88.
 Chamælea. 134.
 Chamæleon. 329.
 Chamænerion. 150.
 Chamæpitys. 87.
 Chamæsyce. 174.
 Chamæmelum. 369. 370.
 Chelidonia. 269.
 Chelidonium. 153.
 Chenopodium. 396.
 Chondrilla. 343. 346. 347.
 348. 354. 355.
 Chondrillis affinis. 344.
 Christophoriana. 152.
 Chrysanthemum. 371.
 Cicer. 190.
 Cichoriis affinis. 353. 354.
 Cichorium. 355.
 Cicuta. 286.
 Cicutaria. 221. 288.
 Cinara. 330.
 Circæa. 110.
 Cirsium. 326. 327. 328.
 Cistus. 262. 263. 264. 265.
 Clematis. 31. 155.
 Clinopodium. 79. 81.
 Cnicus. 327. 329. 331.
 Cochlearia. 157. 160.
 Colchicum. 313.
 Colutea. 184. 193.
 Consolida. 88. 89. 293.
 Convolvulus. 27. 28. 46.
 Conyza. 338. 359. 360. 364.
 379.

INDEX SYNONYMORUM. 511

Conyzis affinis. 334.
Coralloïdes. 463.
Coriandrum. 289.
Coris. 75.
Corispernum. 109.
Cornus. 147.
Coronilla. 193.
Coronopus. 10. 160.
Corylus. 417.
Cotyledon. 47.
Crocus. 7.
Crithmum. 220. 284. 265.
Crucianella. 14.
Cucumi. 52. 54.
Cucurbita. 53.
Cupressus. 418.
Cuscuta. 16.
Cyanus. 374. 375.
Cyclamen. 24.
Cynocrambe. 414.
Cynoglossum. 18. 20.
Cyperoïdes. 408. 409.
Cyperus. 389. 391.
Cytisus. 180. 181. 192.

D

D
APHNE. 44.
Daucus. 286. 287. 290.
Delphinium. 293.
Dens leonis. 348. 349. 352.
 353.
Dentaria. 162.
Digitalis. 99.
Dipsacus. 72.
Draba. 160. 167.
Dracunculus. 406.
Doronicum. 362. 365. 366.

E

E
CHINOPHORA. 285.
Echinops. 325.
Echium. 18. 73. 74.
Elatine. 100.
Elychryso-gnaphalium. 339.
 340.

Elychrysum. 336. 337. 340.
Equisetum. 386. 414. 438. 457.
Erica. 42. 43. 459.
Eringium. 214.
Ervum. 191.
Eruca. 170.
Erucago. 170.
Erysimum. 146. 164. 165.
Evonymus. 147.
Eupatorium. 248. 332. 333.
Euphorbia. 176.
Euphrasia. 96. 97.

F

F
ABA. 190.
Fagopyrum. 46.
Fagus. 416.
Ferula. 220.
Ferrum equinum. 193. 194.
 195.
Festuca. 124.
Ficus. 435.
Filix. 440. 443.
Filipendula. 261.
Fœniculum. 220. 223. 291.
Fœnum græcum. 202. 203.
Fragaria. 258.
Frangula. 396. 424.
Fraxinella. 292.
Fraxinus. 434.
Fucus. 456. 457. 458. 459.
Fumaria. 104. 105.
Fungus. 455. 460. 461. 462.
 463. 464.

G

G
ALEOPSIS. 90. 91. 92.
Galium. 11. 12.
Genista. 179. 180. 181.
Genista-spartium. 181.
Genistella. 181.
Gentiana. 15. 34. 35.
Geranium. 273. 274. 275.
Geum. 235.

312 INDEX SYNONYMOUM.

- Gingidium.* 286.
Gladiolus. 67.
Glaux. 312.
Globularia. 71.
Glycyrhiza. 184. 192.
Gnaphalium. 336. 339. 340.
Gnaphalio similis. 337.
Gramen album. 338.
 alopecuros. 69. 120. 126.
 angustifolium. 131.
 aquaticum. 116. 124.
 arvense. 117. 122.
 arundinaceum. 120.
 avenaceum. 119. 122.
 caninum. 118. 129.
 caryophyllatæ. 409.
 cyperoides. 388. 389. 391.
 408. 409. 421.
 dactylon. 115. 131.
 gros Montbelgar. 124.
 hordeaceum. 130.
 junceum. 136. 402.
 keramelinum. 122.
 legitimum. 115.
 loliaceum. 117. 127. 129.
 maritimum. 394.
 minimum. 118.
 montanum. 121.
 nemorosum. 402.
 nodosum. 117.
 paniceum. 115. 126.
 paniculatum. 116. 121. 123.
 431.
 phænicoides. 124.
 phalaroides. 69.
 pratense. 122. 126. 130.
 rubrum. 118.
 spica brizæ. 124. 125.
 spicatum. 117. 119. 120.
 388.
 sparteum. 114. 119. 120.
 129.
 sive festuca. 125. 132.
 tomentosum. 120.
 tremulum. 123.
 typhoides. 69. 116.

Gratiola. 66. 146. 313.
Grossularia. 212.

H
H ALIMUS. 432.
Hedera. 83. 203.
Helleborine. 299.
Helleborus. 272. 316. 321.
Helianthemum. 264.
Helichrysum. 333.
Heliotropium. 18. 278. 419.
Herba venti. 89.
Herniaria. 145. 211. 226. 387.
 393. 394. 403.
Hesperis. 165. 167.
Hieracium. 343. 344. 345. 348.
 349. 350. 351. 352. 353. 354.
Holosteum affinis. 401.
Holosteum. 10.
Hordeum. 130.
Horminum. 62.
Hyacinthus. 40. 310.
Hyoscyamus. 76.
Hypecotium. 173.
Hypericum. 276. 277.
Hypocystis. 404.

J
J ACEA. 326. 333. 337. 374.
 375. 376. 377.
Jacobæa. 361. 362. 364. 379.
Jasminum. 5.
Iberis. 145. 387.
Ilex. 415.
Imperatoria. 222.
Iris. 8. 9.
Juncago. 136.
Junco affinis. 402.
Juncus. 313. 390. 391. 401.
 402. 403.
Juniperus. 139. 140. 428. 429.

KALI.

INDEX SYNONYMORUM. 513

K

K ALL. 386. 396. 398.

L

L ACTUCA. 346. 347.
Lamium. 81. 90. 91.

Lapathum. 134. 135.
Lappa. 50. 325. 412.

Laserpitium. 217.
Lathyrus. 186. 187. 188.

Lavandula. 85.
Laureola. 43.

Laurocerasus. 251.
Laurus. 45.

Leimna. 407.

Lens. 191.

Lenticula. 110. 407. 444.
Lentiseus. 425.

Leontodon. 348.

Leontopodium. 340.

Lepidium. 27. 145. 158. 160.
Leucanthemum. 368.

Leucoium. 165. 166. 167. 303.
Libanotis. 218. 220.

Lichen. 453. 454. 455. 456.
457.

Ligusticum. 216. 218. 221. 225.
287.

Ligustrum. 5.

Lilium. 308. 309.

convallium. 39.

Limonium. 230. 231.

Linaria. 100. 101. 102. 334. 395.

Linariæ affinis. 66.

Lingua cervina. 441.

Linum. 30. 227. 228. 229. 391.

Lithospermum. 18. 19. 44.

Loto affinis. 183.

Lotus. 183. 200. 201. 202. 431.

Lonchitis. 439.

Lunaria. 161. 162.

racemosa. 439.

Lupinus. 183. 184.

Lupulus. 424.

Lychnis. 232. 236. 237. 239.

240. 241. 245. 279.

Lycium. 423.

Lycoperdon. 463.

Lycopis. 73. 74.

Lycopus. 63.

Lysemachia. 30. 150. 314.

M

M ALVA. 48. 49.

Malus. 249. 254. 275. 276.

Marrubiastrum. 94.

Marrubius affinis. 63.

Marrubium. 63. 89. 94.

Matricaria. 368.

Mays. 111.

Medica. 204.

Medicago. 204.

Melampyrum. 97. 98.

Melilotus. 198. 203.

Melissa. 81.

Melo. 54.

Mentha. 83. 84. 93.

Mercurialis. 428.

Mespilus. 252. 253. 254.

Meum. 287.

Milium. 115.

Millefolium. 66. 272. 372. 413.

414.

Mollugo. 12.

Morus. 412. 422.

Moschatellina. 100.

Muscus. 444. 445. 446. 447.

448. 449. 450. 451. 452.

454. 455. 457. 459.

Myagrodes. 157.

Myosotis. 246.

Myosuros. 401.

Mirrhys. 290.

Myrthus. 249.

N

N APUS. 168.

Narciss-leucoium. 303.

K k

514 INDEX SYNONYMOUM.

- Narcissus.* 304. 305.
Nasturtium. 146. 147. 158.
 160. 163. 387.
Nigella. 268.
Nummularia. 31.
Nux. 51.
Nymphaea. 29. 139. 321.
Nymphoides. 29.

O

- O**
CHRUS. 185.
Œnanthe. 188.
Olea. 6. 7.
Onobrychis. 26. 195. 196.
Ononis. 182.
Orchis. 295. 296. 297. 298.
 299.
Oreoselinum. 287.
Origanum. 70.
Orobanche. 95. 298.
Ornithogalum. 309. 310.
Ornithopodio affinis. 194. 196.
Ornithopodium. 194.
Orobus. 186. 191.
Osmunda. 439.

P

- P**
ALIURUS. 400.
Panax. 218. 223.
Panicum. 69. 115.
Papaver. 153. 154.
Pastinaca. 218. 222. 223. 286.
Parietaria. 432.
Parietariae affinis. 414.
Pedicularis. 96. 97. 103.
Pentaphylloides. 259.
Pentaphyllum. 259. 260.
Pepo. 53.
Peplus. 174.
Perfoliata. 215.
Periclymenum. 77.
Persica. 250.
Persicaria. 38. 41.
Peucedanum. 216.

- Peziza.* 463.
Phaseolus. 185.
Phalangium. 311.
Phillyrea. 6.
Phlomis. 89.
Phyllon. 428.
Pilosella. 349. 350.
Pimpinella. 11. 51. 52. 224.
Pinus. 418.
Pisum. 185.
Pistochia. 106.
Plantago. 9. 10. 136. 137.
Plumbago. 27.
Polium. 86. 87.
Polycarpus. 404.
Polygonatum. 39. 41.
Polygala. 178. 179. 193.
Polygonifolia. 226.
Polygonum. 45. 145. 149. 232.
 393. 394. 399. 403.
 bacciferum. 429.
Polypodium. 442.
Pœonia. 226.
Populus. 427.
Portulaca. 248.
Porrum. 305. 307.
Potamogeton. 38. 148. 406.
 445.

- Primula.* 23.
Prunella. 79. 80.
Prunus. 251. 252.
Psyllium. 10. 11.
Ptarmica. 371. 372.
Pulegium. 84.
Pulsatilla. 315.
Pyrus. 254.
Pyrola. 233.

Q

- Q**
UERCUS. 416.
Quinquefolium. 259. 260.

R

- R**
ANUNCULOÏDES. 214. 228.

INDEX SYNONYMOUM. 515

- Ranunculus.* 136. 137. 138.
 214. 268. 269. 270. 271.
 272. 315. 318. 322.
Rapa. 168.
Raphanistrum. 170.
Raphanus. 170.
Rapistrum. 157. 169. 170.
Rapum. 168.
Rapunculus. 25. 26. 278.
Reseda. 348.
Resedæ affinis. 348.
Rhamnus. 34. 400. 423.
Rhus. 226. 431.
Ricinis affinis. 227. 419.
Rosa. 255. 256. 257.
Rosmarinus. 63.
Rosfolis. 230.
Rubeola. 4.
Rubia. 12. 13. 14. 17.
Rubus. 257. 258.
Ruscus. 430.

S

- S**
SABINA. 139. 418.
Sagitta. 138.
Salicaria. 146. 313. 314.
Salicornia. 386.
Salix. 420.
Salvia. 62.
Sambuco affinis. 38.
Sambucus. 38. 39.
Samolus. 24.
Sanamunda. 44. 395.
Sanicula. 215.
Saxifraga. 224. 234.
Saponaria. 236.
Satureja. 93.
Scabiosa. 14. 15. 72. 73. 375.
Scammonea. 36.
Scandix. 289.
Scolymus. 356.
Scoridium. 82. 87.
Scorpioïdes. 194. 195.
Scorpioïdi affinis. 194.
Scorzonera. 343. 344.

- Scrophularia.* 98. 99.
Secale. 127.
Securidaca. 193. 196.
Sedis affinis. 343.
Sedum. 149. 235. 243. 244.
Selinum. 287.
Serpillum. 78. 79.
Serapias. 299.
Serratula. 326.
Seseli. 206. 284. 290. 291.
Senecio. 338.
Sideritis. 83. 85. 90. 91. 92.
Siler. 217. .
Siliqua. 292.
Sinapi. 164. 169. 170.
Sion. 218.
Sison. 219.
Silymbrium. 164.
Sium. 219.
Solanum. 31. 32. 33.
Solanis affinis. 32. 151. 239.
 247.
Soldanella. 28.
Smilax. 426.
Soncho affinis. 354.
Sonchus. 343. 344. 345. 347.
 352.
Sorbus. 253.
Sparganium. 409.
Spinacia. 425.
Sphonaylium. 283.
Stachys. 91.
Stæbe. 376.
Stæchas. 86. 333.
Staphysagria. 293.
Statice. 230.
Sumach. 226.
Stramonium. 31.
Sympytum. 21.

T

- T**
AGETES. 366. 367.
Tamariscus. 226.
Tamariz. 226.
Tamus. 426.

K k ij

516 INDEX SYNONYMOBUM.

Tanacetum. 368.
 Telephium. 243.
 Terebinthus. 424.
 Tetrahit. 85.
 Teucrium. 88.
 Thapsia. 222.
 Thalictrum. 156.
 Thlaspi. 157. 158. 161. 162.
 177. 178.
 Thymelea. 43. 44. 71.
 Thymelæz affinis. 44.
 Thymum. 79.
 Tilia. 265. 266.
 Tithymalus. 174. 175. 176.
 177.
 Tormentilla. 151.
 Tragopogon. 342. 343. 344.
 Tribulus. 233.
 Trifolium. 105. 192. 197. 198.
 199. 200. 202. 203. 204.
 245. 315.
 Tripolium. 363.
 Triticum. 128.
 Tulipa. 309.
 Tussilago. 359.
 Tubera. 464.
 Turritis. 167. 168.
 Typha. 410.

V

VALANTIA. 467.
 Valeriana. 61. 67.
 Valerianella. 68.
 Verbascum. 74. 75. 89.
 Verbena. 70.
 Veronica. 64. 67. 68.
 Viburnum. 38.
 Vicia. 186. 188. 189. 190. 191.
 Viciae similis. 187.
 Viola. 294. 295.
 Virga aurea. 359. 362. 364.
 Vitis. 213.
 Vitis idæa. 42.
 Ulmaria. 262.
 Ulmus. 399.
 Urtica. 91. 411. 422.
 Uva marina. 429.

X

XANTHIUM. 50. 413.
 Xeranthemum. 337.

Z

ZEA. 128.
 Ziziphus. 400.



NOMINA TRIVIALIA.

A

A	BROTANUM.	pag.	Aurantium.	276
Abelinthium.	334		Auricula.	23
Acanthium.	335		Auricula Judæ.	457
Acarna.	329		Azatolus.	253
Acetosa.	ib.		Azedarach.	233
Acetosella.	138			
Acinos.	ib.			
Adianthum nigrum.	79			
Ægagropila.	441		B	ARBAREA.
Ageratum.	460		Beccabunga.	165
Agnus castus.	371		Bæhen.	64
Ajacis.	103		Belladonna.	239. 240
Alaternus.	293		Bellidiastrum.	32
Alcea.	433		Berula.	366
Alliaria.	48		Betulus.	248
Alnus.	165		Bistorta.	417
Alpum.	107. 412		Blattaria.	45
Amelanchier.	71		Blittum.	75
Amellus.	254		Bonus Henricus.	410
Amomum.	363		Bottys.	397
Anagallis.	219		Bulbocastanum.	87. 397
Androsænum.	64			217
Anserina.	276		C	
Anthriscus.	259		C AKILE.	170
Aparine.	284		Calamagrostis.	118. 120
Aphaca.	12		Calamintha.	82
Aquifolium.	186		Calceolus.	300
Aquilina.	16		Calcytrapa.	376
Archangelica.	440		Cantharellus.	460
Argemone.	221		Capillus Veneris.	443
Aria.	154		Caprifolium.	443
Arisatum.	252		Caput galli.	77
Armeria.	405		Carduncellus.	195
Armoracia.	230. 237		Cardunculus.	331
Asarina.	160		Carota.	330
Asclepium.	100		Carvifolia.	286
Avellana.	222		Garyophyllus.	291
	417			238

K k iij

518 NOMINA TRIVIALIA.

Castanea.	416	E	
Cataria.	93	Eurus.	38
Centaurium.	35	Elaterium.	53
Cepa.	308	Elatine.	100
Cepaea.	243	Emerus.	193
Cerasus.	251	Eragrostis.	122. 123
Cerefolium.	289	Erinus.	26
Cervaria.	287	Erilia.	192
Ceterach.	441	Eruca.	169
Chamædrys.	64. 83	Erucastrum.	169
Chamæpitis.	87	Erisyphe.	464
Chamælice.	174	Eula.	176
Chamomilla.	369	Endivia.	355
Characias.	177	Eupatorium.	248
Chironium.	218		
Christophoriana.	152	F	
Cicera.	187	FABA.	190
Citrullus.	53	Fagopyrum.	45
Cneorum.	28. 44	Falcaria.	219
Consolida.	293	Farfara.	360
Coriaria.	216	Ficaria.	269
Coronopus.	10. 160	Filipendula.	261
Carvi.	222	Filix mas.	442
Cotula.	369	— femina.	444
Cotyledon.	234	Filum.	458
Cracca.	189	Flammula.	155. 268
Crista galli.	97	Flos cuculi.	245
Crus galli.	115	Fœniculum.	222
Cyanus.	375	Fœnum græcum.	202
Cydonia.	254	Frangula.	394
Cymbalaria.	100		G
Cynocrambe.	414	GALFOBDOLON.	91
Cynops.	10	Gingidium.	286
Cyparissias.	176	Githago.	245
		Glaucium.	153
D		Gnidium.	44
Actylon.		Granatum.	249
Damaſonium.	115	Gryllus.	131
Donax.	137		H
Doria.	227	EDYPNOÏS.	353
Doronicum.	362	Helianthemum.	265
Dorygnium.	ib.		
Dracunculus.	202		
Driopteris.	336. 405		
Dulcamara.	443		
	32		

NOMINA TRIVIALIA. 519

<i>Helix.</i>	213.	240	<i>Malus.</i>	254
<i>Helleborine.</i>		299	<i>Mariscus.</i>	388
<i>Hepatica.</i>		315	<i>Martagon.</i>	309
<i>Hipopithys.</i>		320	<i>Mays.</i>	511
<i>Holoschœnus.</i>		390	<i>Medica.</i>	275
<i>Hydropipet.</i>		41	<i>Medium.</i>	25
	J		<i>Melilotus.</i>	198
JACEA.			<i>Melo.</i>	54
<i>Jacobaea.</i>		375	<i>Melongena.</i>	33
<i>Jonquilla.</i>		362	<i>Melopepo.</i>	53
<i>Iberis.</i>		304	<i>Meum.</i>	287
<i>Ilex.</i>		145	<i>Mezereum.</i>	43
<i>Intibus.</i>		415	<i>Millefolium.</i>	272
<i>Irio.</i>		355	<i>Mollugo.</i>	11
<i>Ichænum.</i>		164	<i>Morsus ranæ.</i>	139
<i>Iva.</i>		131	<i>Moschatellina.</i>	46
	L		<i>Mucedo.</i>	44. 464
LACTUCA.			<i>Myrtillus.</i>	41
<i>Ladamum.</i>		459		N
<i>Lagopus.</i>		90	N APELLUS.	294
<i>Lappa.</i>	10.	105	<i>Napus.</i>	168
<i>Lappula.</i>		325	<i>Nasturtium.</i>	163
<i>Lantana.</i>		18	<i>Natrix.</i>	181
<i>Lathyrus.</i>		38	<i>Nepera.</i>	82
<i>Laureola.</i>		175	<i>Nidus avis.</i>	298
<i>Laurocerasus.</i>		43	<i>Noftoc.</i>	457
<i>Lens.</i>		251	<i>Nummularia.</i>	30
<i>Lentiscus.</i>		191	<i>Nymphoides.</i>	29
<i>Levisticum.</i>		425		O
<i>Leucanthemum.</i>		221		
<i>Libanotis.</i>	220.	367	O CHRUS.	185
<i>Liliago.</i>		287	<i>Oculus Christi.</i>	364
<i>Linaria.</i>		311	<i>Ocymoïdes.</i>	237
<i>Lingua.</i>		102	<i>Odontites.</i>	96. 215
<i>Linosyris.</i>	269.	299	<i>Onobrychis.</i>	195
<i>Linum stellatum.</i>		334	<i>Onopteris.</i>	441
<i>Lonchitis.</i>		30	<i>Opopanax.</i>	223
<i>Lunaria.</i>		442	<i>Opulus.</i>	38
<i>Lupulus.</i>		439	<i>Ornus.</i>	471
<i>Luteola.</i>		424	<i>Orontium.</i>	101
	M		<i>Orites.</i>	279
M AHALES.			<i>Oxyacantha.</i>	252
<i>Majorana.</i>		318	<i>Oxycedrus.</i>	139. 429
		80		

P

PALIURUS.		Rapunculus.	25
Paralias.	400	Ritro.	305
Pardalianches.	175	Robur.	415
Paronychia.	366	Ruta muraria.	441
Parthenium.	394		S
Passerina.	368	SABINA.	140. 429
Patientia.	44	Salicaria.	314
Pecten Veneris.	134	Sanguisorba.	51
Pelecinus.	289	Schænoprasum.	308
Peplus.	197	Scholymus.	330
Pepo.	174	Sclarea.	62
Periclymenum.	53	Scolopendrium.	440
Persica.	77	Scordium.	87
Persicaria.	250	Scorodonia.	82
Perroselinum.	41	Scorodoprasum.	306
Phegopteris.	225	Scorpioïdes.	194. 365
Phu.	442	Scorpius.	180
Phyteuma.	67	Securidaca.	193
Pilosella.	318	Serpillum.	78
Pistochia.	349	Sesamoïdes.	318
Pinea.	106	Silaus.	216
Plantago.	418	Siler.	217
Podagraria.	136	Siliquastrum.	292
Polum.	225	Soda.	396
Polycarpon.	86	Soldanella.	28
Polygonatum.	404	Speculum.	26
Populago.	39	Sphondilium.	283
Porrum.	272	Spica.	86
Portula.	303	Spica venti.	118
Pseudoacacia.	312	Stæchas.	336
Pseudoacorus.	184	Staphisagria.	293
Pseudocyperus.	9	Stramonium.	31
Pseudo-narcissus.	409	Succisa.	14
Pseudo - platanus.	304		T
Pÿllium.	280	TARAXACUM.	348
Ptarmica.	10	Tazeta.	304
Pulegium.	372	Telephium.	243
Pulsatilla.	84	Terebinthus.	424
Pyrethrum.	315	Tetrahit.	91
	370	Thelypteris.	440

R

RANUNCULOÏDES.	137	Thapsus.	74
Rapa.	168	Thymelæa.	43
Raphanistrum.	170	Tinus.	33

Trachelium.	25	Vulvaria.	398
Tragus.	396	Ulmaria.	262
Trichomanes.	441	Umbilicus.	47
Trixago.	97	Unedo.	46
Tuber.	464	Uva crispa.	212
		Uva ursi.	46

V

V ACCARIA.	237
Victorialis.	306
Vincetoxicum.	37
Virga aurea.	363
Visnaga.	286
Vitalba.	155
Vitalicana.	24
Vulneraria.	183

X

X YLOSTEUM.	77
--------------------	----

Z

Z ACINTHA.	354
Ziziphus.	400
Zygis.	79



NOMINA PHARMACEUTICA.

A

A			
BROTANUM.	pag. 334	Arum.	405
<i>Absinthium vulgare.</i>	335	Asclepias.	37
<i>— majus.</i>	335	Asparagus.	311
<i>Acacia nostras.</i>	252	Atropa rubra.	397
<i>Acanthium.</i>	329	Avellana.	417
<i>Acanthus.</i>	96	Avena.	126
<i>Acetosa hortensis.</i>	135	Aurantium.	276
<i>— pratensis.</i>	138	Auricula Judæ.	457
<i>Acetosella.</i>	245	<i>— muris.</i>	349
<i>Acorus palustris.</i>	9		
<i>Actæa.</i>	152	B	
<i>Adiantum nigrum.</i>	441	ALAUSTIA.	249
<i>— aureum.</i>	446	Balloita.	94
<i>Ageratum.</i>	371	Barba hirci.	342
<i>Agromonia.</i>	348	Barbarea.	165
<i>Alcea.</i>	49	Bardana.	326
<i>Alchemilla.</i>	392	Beccabunga.	64
<i>Alliaria.</i>	165	Behen rubrum.	231
<i>Allium.</i>	306	Belladonna.	32
<i>Alnus.</i>	107. 412	Bellis major.	367
<i>Althæa.</i>	49	<i>— minor.</i>	366
<i>Amomum.</i>	219	Berberis.	312
<i>Amygdalæ amaræ.</i>	250	Berula.	218
<i>— dulces.</i>	ib.	Beta alba.	398
<i>Anagallis.</i>	28	<i>— rubra.</i>	ib.
<i>Anserina.</i>	259	Bistorta.	45
<i>Angelica sativa.</i>	221	Bonus Henricus.	397
<i>— sylvestris.</i>	222	Borrago.	221
<i>Apium.</i>	225	Botrys.	397
<i>Aquilegia.</i>	267	Branca ursina.	96
<i>Aristolochia longa.</i>	106	Brassica rubra.	169
<i>— rotunda.</i>	ib.	Bryonia.	54
<i>— vulgaris.</i>	107	Bugula.	88
<i>Amoracia.</i>	160	Buglossum.	19
<i>Arnica.</i>	365	Bursa pastoris.	III. 137
<i>Artemisia rubra.</i>	335	Buxus.	160
<i>— alba.</i>	ib.		
<i>Artemisia.</i>	24		

C

C		— media.	88
C ALAMINTHA vulgaris.	82	Cotula fœtida.	370
— magnō flore.	ib.	Crassula minor.	244
— pulegii odore.	ib.	Crepus lupi.	464
Calcitrapa.	376	Crocus orientalis.	8
Calendula.	378	Cucumis.	54
Camomilla.	369	— asininus.	52
Camphorata.	392	Cucurbita.	53
Cannabis.	423	Cupressus.	418
Capillus Veneris.	443	Cuscuta.	16
Capparis.	152	Cyanus.	375
Caprifolium.	77	Cyclamen.	24
Cardones.	330	Cydonia.	154
Carduus Mariæ.	328	Cynara.	330
— eriocephalus.	ib.	Cynoglossum.	20
— benedictus.	329	Cyperus longus.	389

D

D	ACTYLI.	141
Daucus.	286	
— sativus.	ib.	
— creticus.	287	
Dentaria.	27	
Dictamnus albus.	292	
Digitalis.	99	
Dracunculus.	406	
Dulcamara.	32	

E

E	BULUS.	38
Endivia.	355	
Epithymum.	16	
Equisetum.	438	
Ervum.	291	
Eruca.	169	
Eryngium.	214	
— maritimum.	ib.	
Esula major.	176	
— minor.	ib.	
Eupatorium.	333	

F

F	ABA.	198
----------	------	-----

524 NOMINA PHARMACEUTICA.

— crafta.	243	J
Fagus.	416	JACOBÆA.
Farfara.	360	Jasminum.
Filipendula.	262	Iberis.
Filix florida.	439	Illecebra minor.
— mas.	443	Iris nostras.
— femina.	ib.	Jujuba.
Fœniculum.	223	Juniperus.
Fœnum græcum.	203	Iva molchata.
Fragaria.	258	L
Frangula.	395	ACMUS.
Fraxinus.	434	Lactuca.
Fumaria.	104	Ladanum.
Fungus igniarius.	462	Lamium album.
G		Lapatum crispum.
G ALEOPSIS.	91	— acutum.
Galium luteum.	11	— aquaticum.
Genista.	179	Lapsana vulgaris.
— hispanica.	ib.	Lavandula.
— vulgaris.	180	Laurus.
— tinctoria.	181	Lenticula palustris.
Gentiana.	34	Lentiscus.
— alba.	217	Lepidium.
Geranium columbinum.	275	Leucoium bulbosum.
— robertianum.	274	Levisticum.
Gnaphalium vulgare.	389	Lilium.
Gramen.	128	— convallium.
Granatum.	249	Linaria.
Gratiola.	66	Linnæa.
H		Linum sativum.
H EDERA terrestris.	83	— catharticum.
— arborea.	213	Liquiritia.
Helianthemum.	264	Lithospermum.
Heliotropium.	18	Lupulus.
Hepatica nobilis.	315	Lydmachia purpurea.
— fontana.	453	M
Herba impia.	339	MAJORANA.
Herniaria glabra.	399	Malcorium.
Hordeum.	129	Malva.
Hyoscyamus.	76	— major.
Hypericum.	276	— minor.
Hypocistis.	404	ib.

NOMINA PHARMACEUTICA. 525

<u>—</u>	rosea.	49.	Opopanax.	225
Malus.		50	Origanum.	80
Marrubium nigrum.		254	Orvala sylvestris.	62
<u>—</u> album.		94	Oxalis.	245
Matricaria.		ib.	Oxyacantha.	257
Matriflyva.		368		
Melilotus alba.		14		
<u>—</u> lutea.		198		P
Melissa sylvestris.		ib.		
<u>—</u> citrina.		81	PALIURUS.	400
Melissophyllum.		82	Papaver rhæas.	154
Melo.		81	<u>—</u> album.	ib.
Mentha aquatica.		54	Parietaria.	432
<u>—</u> hortensis.		84	Paronychia.	235
Menhastrum.		ib.	Pastinaca sativa.	222
Mercurialis.		ib.	<u>—</u> sylvestris.	ib.
Mespilus vulgaris.		428	Pellibossa.	30
Meu.		254	Perfoliata vulgaris.	215
Mezereum.		287	Persica.	250
Millefolium.		43	Pericaria urens.	41
Morus alba.		372	<u>—</u> mitis.	ib.
<u>—</u> nigra.		422	Pes cati.	340
Morsus diaboli.		ib.	Petroselinum.	225
Muscus clavatus.		15	Pervinca.	31
<u>—</u> pyxidatus.		444	Peucedanum.	216
<u>—</u> quercinus.		455	Phytolacca.	247
Myrtillus.		456	Pimpinella italicica major.	11
Myrtus.		42	<u>—</u> minor.	52
		249	<u>—</u> saxifraga.	224
N				
N	Arus.	Pinus.	418	
Nasturtium hortense.		Piper indicum.	33	
<u>—</u> aquaticum.		Plantago.	9	
Nepeta.		<u>—</u> aquatica.	136	
Nigella sylvestris.		Pæonia mas.	266	
Noſtoc.		<u>—</u> femina.	266	
Nummularia.		Polium.	86	
Nux juglans.		Polypodium.	442	
Nymphaea alba.		Populeum.	427	
<u>—</u> lutea.		Populus.	ib.	
O		Polygala.	178	
O	Livæ.	Porrum.	303	
Onobrychis.		Portulaca.	248	
Ononis.		Primula veris.	23	
		Prunella.	80	
		Prunus.	252	
		Psyllium.	10	
		Pulegium.	84	

Pharmica.	372	Terracrepola.	344
Pulmonaria gallorum.	350	Thalictrum.	158
— arborea.	455	Thlaspi.	156
— maculata.	20	Thymus.	79
Pulsatilla.	315	Tilia.	268
Pyrethrum.	370	Tithymalus.	175
Pyrola.	233	Tomentilla.	151
	S	Trichomanes.	441
S ABINA.	140. 429	Trifolium bituminosum.	197
Salvia.	62	— corniculatum.	202
Salix alba.	420	Triticum.	128
Sambucus.	39	Tussilago.	362
Sandarach.	139. 429		V
Sanguinaria.	275	V ALERIANELLA.	68
Sanicula.	215	Valeriana hortensis.	67
Satureja.	93	Verbascum mas.	74
Satyrion.	295	— femina.	75
Saxifraga alba.	235	Verbena.	71
Scabiosa.	72	Vermicularis.	244
Scomonium monspeliacum.	36	Veronica spicata.	64
Sclarea.	62	— pratensis rotundifolia.	65
Scolopendra.	441	Victoria longa.	306
Scordium.	87	— glutinosa.	306
Scorodonia.	82	Vinca.	31
Sorbus torminalis.	252	Vincetoxicum.	37
— aucuparia.	253	Viola.	294
— sativa.	ib.	— alba.	303
Spina alba acuta.	ib.	Virga aurea.	339
— alba.	329	— major.	364
— cervina.	423	Viscum.	422
Spinacia.	425	Vitis.	213
Stachys arabica.	86	Ulmus.	399
— citrina.	336	Umbilicus Veneris.	47
Staphysagria.	293	Urtica major.	411. 422
Statice.	230	— minor.	411
Stramonium.	31	— iners.	91
Succisa.	15	— flore luteo.	ib.
Sumach.	226	— fatidissima.	ib.
	T	— angustifolia.	ib.
T AMARISCUS.	226	Uva ursi.	47
Taraxacum.	348	— crispa.	212
Telephium.	243		X
Terebinthus.	424	X ANTHIMUM.	59

NOMINA GALLICA.

A

A	BRICOTIER.	Page	
Absinthe.		335	Benoîte.
Acanthe.		96	Berce.
Aconit.		294	Berle.
Aigremoine.		248	Betoine.
Ail.		306	Betterave.
Airelle.		42	Biforte.
Alaterne.		433	Blé de vache.
Alcée.		48	— de Turquie.
Algue.		406	— noir.
Alliaire.		165	Bluet.
Amandier.		250	Bois gentil.
Amarante.		413	Bonne dame.
Angelique.		221	Bonnet d'Électeur.
Anemone.		315	Bon Henri.
Ancolie.		267	Bouillon blanc mâle.
Arbousier.		46	— femelle.
Argentine.		259	Bouquetine.
Aritoioche.		106	Bourigene.
— longue.		ibid.	Bourrache.
— ronde.		ibid.	Boufette.
Arrête-bœuf.		182	Bouffrolle.
Armoise.		335	Boyau de chat.
Arroche.		432	Brancufine.
— puante.		398	Brioyne.
Artichaud.		330	Bruyere.
Afperge.		311	Buglosse.
Aiphodele.		40	Buis.
Avoine.		125	
Aube.		427	
Aubepin.		252	C
Aubergine.		33	ADE.
Aulne.		412	Caillélat blanc.
Aurone.		334	— jaune.
Azerolier.		253	Calament de montagne.

B

B	AGUENAUDIER.	Page	
Ballotte.		184	Cameline.
Barbe de bouc.		94	Camomille.
Bardane.		342	Camphrée.
Baume.		325	Capillaire.
Beccabunga.		84	Caprier.
Bec de grue.		64	Carline.
Belladone.		273	Carvi.
		31	Cassis.

C	ADE.		
	Caillélat blanc.	139	
	— jaune.	11	
	Calament de montagne.	ibid.	
	— ordinaire.	82	
	Cameline.	ibid.	
	Camomille.	157	
	Camphrée.	369	
	Capillaire.	392	
	Caprier.	443	
	Carline.	152	
	Carvi.	330	
	Cassis.	223	
	Carotte.	212	
	Cedre.	286	
	Céleri.	428	
		225	

Centauree petite.	35	Douce amere.	32
Cerfeuil.	289	Doucette.	68
Cerisier.	251	Drouillier.	252
Chamærras.	87		E
Champignon.	460	E CHALOTTES.	308
Chanvre.	423	Eclaire.	153
Chardon à foulon.	72	Ecuelle d'eau.	214
Charme.	417	Egagropile de mer.	460
Chasseboisse.	30	Endive.	355
Châtaignier.	416	Endormie.	31
Chaußetraper.	376	Epinars.	425
Chelidoine.	153	Epine vinette.	312
Chêne verd.	415	— blanche.	319
Chevrefeuille.	77	Epithyme.	16
Chicorée.	355	Epurge.	175
Chiendent.	128	Erable grand.	280
Chou.	168	Ers.	191
— marin.	28	Eſule petite.	176
Chinois.	277	— grande.	<i>ibid.</i>
Ciboule.	308	Eupatoire.	333
Ciguë.	286	Euphraife.	96
Ciguë d'eau.	288		F
Cirée.	110	F AUSSE SAUGE.	82
Citronnelle.	81	Faux platane.	280
Citronnier.	275	Fenouil de porc.	216
Citrouille.	53	— ordinaire.	223
Coignaffier.	254	Fenu grec.	202
Concombre d'âne.	52	Feve.	190
— ordinaire.	54	Figuier.	435
Confoude.	21	Filaris.	6
Corail des jardins.	33	Filipendule.	261
Corne de cerf.	160	Flambe.	8
Corneille.	30	Fleche d'eau.	138
Cornouillier.	147	Foin de mer.	406
Coquelicoq.	154	Fougere fleurie.	439
Coucoumele.	460	— mâle.	442
Couleuvrée.	54	— femelle.	443
Courge.	53	Fraise.	258
Crestion d'eau.	163	Framboisier.	257
— alenois.	158	Frêne.	434
Crête de coq.	395	Fromental.	129
Cupidonne.	354	Fumeterre.	104
Cuscute.	16		G
Cynoglosse.	20	G ANTS NOTRE-DAME.	99
Cyprès.	418	Garence.	13
		Gaude.	318
		Gazon d'Olympe.	230
		Genêt	

D

D ATTIER.	141
Daucus de Candie.	287
Dent de lion.	348
Dentelaire.	27
Digitale.	99
Dompte-venin.	37

G

G ANTS NOTRE-DAME.	99
Garence.	13
Gaude.	318
Gazon d'Olympe.	230
Genêt	

Genêt d'Espagne.	179	Houx.	16
— Epineux.	180	Houx frelon.	430
— à balais.	ibid.	Hydre cornu.	414
— ordinaire.	181		
Genevrier.	429		I
Genievre.	140		
Gentiane.	34		
Gerille.	460	JACOBÉE.	361
Germandrée.	88	Jasmin.	5
Gesle.	187	Jonc.	401
Glaveul.	67	Jonc fleuri.	313
— puant.	9	Jonquille.	364
Glouteron petit.	50. 412	Jujubier.	400
Graine de canari.	115	Jusquame.	76
Grafette.	66	Ieble.	38
Grateron.	12	Iveche.	216, 221
Gratirole.	66	Ivette ordinaire.	87
Gremil.	18	IVRAYE.	127
Grenadille.	278	— fausse.	ibid.
Groselier noir.	212		
— rouge.	ibid.		K
Guainier.	292		
Guimauve.	49	KINORRHODON.	256
Guy de chêne.	421		

H

H ARICOT.	185
Heliotrope.	17
Hellebore d'Hypocrate.	322
Hellebore verd.	272
— blanc.	316
Hepatique.	315
Herbe à cotton.	359
— à éternuer.	372
— au charpentier.	ibid.
Herbe au pauvre homme.	66
— au chat.	93
— aux gueux.	155
Herbe aux puces.	10
— dorée.	441
Herbe du siège.	98
— de St. Christophe.	152
— de Ste. Barbe.	165
Herbe aux verrues.	17
— à Robert.	274
— à Gerard.	225
Herbe aux écus.	30
Hêtre.	416
Hipociste.	404
Houblon.	424

L

L AITRON.	345
Laitue.	346
Langue de serpent.	439
Lavande.	86
Laureole mâle.	43
Laurier.	55
Laurier cerise.	251
Laurier-tin.	38
Lentille.	191
— d'eau.	407
Lentisque.	425
Lierre ordinaire.	213
— terrestre.	85
Lilac.	7
Limonier.	275
Lin.	228
Lis des valées.	39
Liferon grand.	28
— petit.	27
Lotier.	201
Lunetiere.	162
Lupin.	183
Lusérne.	203
Lustre d'eau.	457
Lys.	308

L 1

530 N O M I N A G A L L I C A.

M

M ACHE.	68
Malagué.	251
Marjolaine.	80
Marrube blanc.	94
— noir.	<i>ibid.</i>
— puant.	<i>ibid.</i>
Masse au bedeau.	170
Masse d'eau.	410
Matricaire.	368
Mauve.	48
— petite.	<i>ibid.</i>
— sauvage.	<i>ibid.</i>
— rose.	49
Melilot.	198
Melinet.	21
Mélisse bâtarde ou de montagne.	81
— ordinaire.	<i>ibid.</i>
Melon.	54
Menthe aquatique.	84
— sauvage.	83
Mercurielle.	428
Meurier blanc.	412
— noir.	422
Micocoulier.	431
Millefeuille.	372
Millepertuis.	277
Millet.	115
Morgeline.	227
Morelle.	33
Mouron.	29
Mouron d'eau.	24
Moutarde.	169
Muffle de Veau.	102
Myrthe.	249
Myrtille.	42

N

N ARCISSE.	304
— de mer.	305
Nastor.	158
Navet.	168
Nayade.	419
Nefflier.	254
Nenufar jaune.	320
— blanc.	321
Nerprun.	422
Nielle.	268
Nombril de Venus.	47
Noyer.	51
Numinulaire.	30

O

O BIER.	38
Oeillet.	238
— d'Inde.	266, 267
Oignon.	308
Olivier.	6
Oranger.	277
Oreille de Judas.	457
Oreille de souris.	18
Oreille d'ours.	25
Orcanette.	19
Origan commun.	80
— de Crète.	<i>ibid.</i>
Orge.	129
Ormeau.	399
Orobe.	186
Oranges.	461
Orpin.	243
Ortie morte.	90
— à fleur blanche.	<i>ibid.</i>
— à fleur jaune.	<i>ibid.</i>
— grande puante.	91
— petite puante.	<i>ibid.</i>
— romaine.	411
— grieche.	<i>ibid.</i>
— ordinaire.	422
Orzeille.	456
Ozeille ronde.	135
— des prés.	138
Ozier.	419
P	
P AIN de pourceau.	24
Pain d'oiseau.	244
— à coucou.	<i>ibid.</i>
Paliure.	400
Panais.	212
Panicaut de mer.	214
Panis.	115
Pariétaire.	432
Passerage sauvage.	145
— ordinaire.	158, 160
Passerofe.	49, 50
Patience.	134
Patte de lievre.	105
Paquerette.	366
— grande.	367
Pavot blanc.	154
— noir.	<i>ibid.</i>
— rouge.	<i>ibid.</i>
Pêcher.	250
Percefeuille annuel.	215

NOMINA GALLICA. 531

Perce mousse.	445	Raifort sauvage.	160
Perce neige.	303	Raponce.	25
Perficaire.	41	Raisin de mer.	429
Perfil.	225	—— de renard.	151
Pervanche.	31	Rave.	168
Pesse d'eau.	386	Reglisse.	192
Pet d'âne.	329	Reine des prés.	306
Petit chêne.	88	Renouée.	45
Peuplier blanc.	427	Rocambole.	306
—— noir.	447	Romarin.	63
Pied de chat.	340	Ronce.	257
—— de lion.	392	Roseau.	126, 410
Pied de loup.	63	Roquette.	169
—— de veau.	405	—— sauvage.	164
Piloselle.	349	Rossolis.	230
Pimprenelle.	11, 51	Ruban d'eau.	403
Pin domestique.	418		
—— sauvage.	<i>ibid.</i>		S
Pivoine.	266	S ABINE.	140, 429
Pivoulade.	461	Sabot notre Dame.	300
Plantain large.	9	Safran.	7
—— moyen.	<i>ibid.</i>	Sainfoin.	195
—— étroit.	10	Salicaire.	314
—— d'eau.	130	Saltcor.	386
Poirée.	398	Sanicle.	215
Poirier.	254	Sarriette.	93
Pois.	185	—— sauvage.	<i>ibid.</i>
—— chiche.	190	Savonnaire.	236
Poivrier d'eau.	41	Sauge.	62
—— faux.	103	—— de montagne.	<i>ibid.</i>
Pommier.	254	Saule marceau.	420
Perreau.	305	Saxifrage doré.	403
Pouillot de mer.	87	Scabieuse des bois.	14
Pourpier.	247	—— ordinaire.	72
Politic.	441	Scamonnée de Montpellier.	36
Polypode.	442	Sceau de la Vierge.	426
Prime-verre.	23	Sceau de Salomon.	39
Prunelle.	79	Sclopendre.	440
Prunellier.	252	Scordium.	87
Prunier.	251	Scorzonere.	344
Pulmonaire <i>append.</i>	20	Seropulaire grande.	98
—— de chêne.	455	—— aquatique.	<i>ibid.</i>
Pulfatille.	315	Seigle.	127
Pyrole.	233	Senecion.	338

Q

Q UEUE de souris.	
—— de cheval.	
Quintefeuille.	

R

R ADI.	
Raifort.	

Raifort sauvage.	160
Raponce.	25
Raisin de mer.	429
—— de renard.	151
Rave.	168
Reglisse.	192
Reine des prés.	306
Renouée.	45
Rocambole.	306
Romarin.	63
Ronce.	257
Roseau.	126, 410
Roquette.	169
—— sauvage.	164
Rossolis.	230
Ruban d'eau.	403
S ABINE.	140, 429
Sabot notre Dame.	300
Safran.	7
Sainfoin.	195
Salicaire.	314
Saltcor.	386
Sanicle.	215
Sarriette.	93
—— sauvage.	<i>ibid.</i>
Savonnaire.	236
Sauge.	62
—— de montagne.	<i>ibid.</i>
Saule marceau.	420
Saxifrage doré.	403
Scabieuse des bois.	14
—— ordinaire.	72
Scamonnée de Montpellier.	36
Sceau de la Vierge.	426
Sceau de Salomon.	39
Sclopendre.	440
Scordium.	87
Scorzonere.	344
Seropulaire grande.	98
—— aquatique.	<i>ibid.</i>
Seigle.	127
Senecion.	338
Sernii.	342
Serpolet.	78
Seurette.	326
Seteli de montagne.	217
Soldanelle.	28
Sorbier sauvage.	253
—— commun.	<i>ibid.</i>
Souchet.	389
Souci.	378

L1 ij


Staphisaigne.	293	Truffe.	464
Staticé.	230	Tuë-loup.	294
Stechas.	86	— chien.	313
Stramonium.	31	Turquette.	399
Sumac.	226	Tusilage.	360
Sureau.	39		

T

T Abouret.	159
Tamarisc.	226
Taupinambour.	33, 373
Terebentine.	424
Teregriepe.	344
Thalitron.	156
Thé de l'Europe.	64
Thlaspi.	159
Thym.	79
Tilleul.	265
Tormentille.	151
Tortelle.	165
Tourrette.	168
Tournefoul	278, 419
Toutte bonne.	62
— faine.	276
Trefle bitumineux.	197
— cornu.	202
— d'eau.	28
— hémorroïdal.	201
Trenasse.	45
Troëgne.	5

V

V ALERIANE des jardins.	67
— rouge.	61
Velar.	165
Velvotte.	100
— femelle.	<i>ibid.</i>
Verge d'or.	363
Vermiculaire brûlante.	244
Veronique.	64
Veronique des hayes.	65
Veryeine.	70
Vesse.	189
— de loup.	464
Vigne.	213
Violette.	294
Violier jaune.	165
— des jardins.	167
Violon.	134
Viorne.	38
Viperine.	74
Volant d'eau.	413
Vulnéraires des paysans.	183
Ufnée commune.	456



NOMINA VERNACULA.

A

A	BELANIE	-	-	corylus. n°. 1. p. 417.
Absin menut	-	-	-	artemisia. n°. 4. p. 334.
Absintra	-	-	-	robinia. n°. 1. p. 184.
Acacia ,	-	-	-	rosa. n°. 1. p. 254.
Agalancié ,	-	-	-	ononis. n°. 1. & 4. p. 182.
Agalouffés ,	-	-	-	ilex. n°. 1. p. 16.
Agas ,	-	-	-	acer. n°. 3. p. 280.
Agréta	-	-	-	rūmex. n°. 7. p. 134.
Agrera saouïaja	-	-	-	rumex. n°. 10. p. 138.
Agrevous	-	-	-	ilex. n°. 1. p. 16.
Agrimena	-	-	-	agrimonia. n°. 1. p. 245.
Agriotié	-	-	-	prunus. n°. 5. p. 251.
Agriola masclaoü	-	-	-	centaurea. n°. 16. p. 376.
Agruna	-	-	-	prunus. n°. 7. p. 252.
Agrunéla	-	-	-	geranium. n°. 3. p. 273.
Aguïera	-	-	-	vaccinium. n°. 1. p. 41.
Airés	-	-	-	allium. n°. 5. p. 306.
Aradéch	-	-	-	ramnus. n°. 6. p. 433.
Al	-	-	-	phillyrea. n°. 2. p. 8.
Alader	-	-	-	arctium. n°. 1. p. 325.
Alader masclé	-	-	-	boletus. n°. 3. p. 462.
Alapas	-	-	-	ornithopos. n°. 3. p. 194.
Amadou	-	-	-	prunus. n°. 3. p. 251.
Amarella	-	-	-	lathyrus. n°. 2. p. 186.
Amarel	-	-	-	salix. n°. 1. p. 419.
Amarou	-	-	-	olea. n°. 1. p. 6.
Amarinié	-	-	-	amygdalus. n°. 2. p. 250.
Amellaoü	-	-	-	briza. n°. 1. 2. 3. 4. 5. p. 123.
Amellié	-	-	-	rubus. n°. 3. p. 257.
Amouretas	-	-	-	morus. n°. 2. p. 422.
Amourié de bartas	-	-	-	morus. n°. 1. p. 412.
— dé Dama	-	-	-	rubus. n°. 2. p. 257.
Amourié	-	-	-	olea. n°. 1. p. 6.
Amouras terrenquas	-	-	-	valeriana. n°. 6. d. p. 68.
Ampoulaoü	-	-	-	angeliqua. n°. 1. p. 221.
Ampouléta	-	-	-	agrostemma. n°. 1. p. 245.
Angelica	-	-	-	lepidium. n°. 6. p. 158.
Aniela	-	-	-	
Anitor	-	-	-	

Aoúba ,	-	-	-	populus. n°. 1. p. 427.
Aoübergina	-	-	-	solanum. n°. 4. p. 333.
Aouberjas	-	-	-	amygdalus. n°. 1. p. 250.
Aoübrespi	-	-	-	crataegus. n°. 3. p. 252.
Aoubriortié ,	-	-	-	prunus. n°. 4. p. 251.
Aoüné ,	-	-	-	betula. n°. 1. p. 107. & 412.
Aouréia d'ours ,	-	-	-	primula , n°. 2. p. 23.
Aouriola ,	-	-	-	centaurea. n°. 16. p. 376.
Api ,	-	-	-	apium. n°. 2. p. 224.
Api bouscas ,	-	-	-	apium. <i>ibid.</i>
Arapa man ,	-	-	-	galium. n°. 7. p. 12.
A:bousié ,	-	-	-	arbutus. n°. 1. p. 46.
Atcemisa ,	-	-	-	<i>Z</i> artemisia. n°. 5. p. 335.
Artemisa ,	-	-	-	<i>Z</i> artemisia. n°. 5. p. 335.
Arjalas ,	-	-	-	spartium. n°. 3. p. 180.
Arjerola ,	-	-	-	crataegus. n°. 4. p. 252.
Armol ,	-	-	-	triplex. n°. 2. p. 432.
Arrives vel	-	-	-	<i>Z</i> lycium. n°. 1. p. 34.
Argalou ,	-	-	-	<i>Z</i> lycium. n°. 1. p. 34.
Artichaoü ,	-	-	-	cinara. n°. 1. p. 330.
Aspic ,	-	-	-	lavandula. n. 2. p. 86.
Avaoussé ,	-	-	-	quercus. n°. 3. p. 415.
Avenat ,	-	-	-	avena. n°. 2. p. 125.

B

B ADASE ,	-	-	-	lavandula. n°. 2. p. 85.
Balsamina ,	-	-	-	impatiens <i>balsamina</i> .
Bandina ,	-	-	-	polygonum. n°. 4. p. 45.
Baibajou ,	-	-	-	semperfivum <i>tectorum</i> .
Begos ,	-	-	-	lathyrus. n°. 5. p. 187.
Béligana ,	-	-	-	vitis. n°. 1. p. <i>sylvestris</i> .
Berbéna ,	-	-	-	<i>Z</i> verbena. n°. 1. p. 70.
Berména ,	-	-	-	<i>Z</i> verbena. n°. 1. p. 70.
Berbouillét ,	-	-	-	rufcus. n°. 1. p. 430.
Béifa ,	-	-	-	vicia. n°. 7. p. 189.
Bigarada ,	-	-	-	cerasus <i>versicolor</i> .
Bilieus ,	-	-	-	vicia. n°. 7. p. 430.
Birafourél ,	-	-	-	helianthus. n°. 1. 2. 3. p. 373.
Blad ,	-	-	-	triticum. n°. 1. & 2. p. 128.
——— d'aou diablé ,	-	-	-	<i>Z</i> gylops. n°. 1. & 2. p. 132.
——— déspania ,	-	-	-	zea. n°. 1. p. 111.
——— dé miraclé ,	-	-	-	triticum.
Blamaré ,	-	-	-	zea. n°. 1. p. 111.
Blanquéta ,	-	-	-	chenopodium. n°. 10. p. 398.
Blavéta ,	-	-	-	centaurea. n°. 8. p. 375.

NOMINA VERNACULA. 535

Bléda,	-	-	-	-	beta. n°. 1. p. 398. <i>viridis</i> .
Bleta rava,	-	-	-	-	beta. <i>ib. rubra</i> .
Boui,	-	-	-	-	buxus. n°. 1. p. 111. & 137.
Bouléts,	-	-	-	-	agaricus. n°. 3. p. 460.
Bou,	-	-	-	-	ficus. n°. 1. p. 35. <i>caprifolius</i> .
Bouracha,	-	-	-	-	borrago. n°. 1. p. 22.
Bourtoulaiga,	-	-	-	-	portulaca. n°. 1. p. 247.
— de mar,	-	-	-	-	atriplex. n°. 1. p. 432.
Bragalou,	-	-	-	-	aphyllantes. n°. 1. p. 305.
Bouteillaoü,	-	-	-	-	olea. n°. 1. p. 6. 1.
Braiétas,	-	-	-	-	primula. n°. 2. p. 23.
Brigoula,	-	-	-	-	cinara. n°. 1. p. 330.
Bruc,	-	-	-	-	erica. n°. 2. p. 42.
Bugadieira,	-	-	-	-	convolvulus. n°. 1. §. p. 28.
Butorda,	-	-	-	-	prunus. n°. 5. p. 251.

C

Cade,	-	-	-	-	juniperus. n°. 1. p. 139. 418.
Cacalaca,	-	-	-	-	anthirrinum. n°. 14. p. 102.
Cagarela,	-	-	-	-	mercurialis. n°. 2. p. 428.
Cambé,	-	-	-	-	cannabis. n°. 1. p. 423.
Campanétas,	-	-	-	-	convolvulus. n°. 1. p. 27.
Campaniola,	-	-	-	-	<i>Agaricus. fimetarius</i> .
Campaniolé,	-	-	-	-	arundo. n°. 3. p. 126.
Cana,	-	-	-	-	cannabis. n°. 1. p. 423.
Canabou,	-	-	-	-	daphne. n°. 4. p. 44.
Cantaperdris,	-	-	-	-	rhamnus. n°. 3. p. 400.
Capeléts,	-	-	-	-	umbilicus. n°. 1. p. 47.
Capeléta,	-	-	-	-	asplenium. n°. 3. p. 441.
Capillera,	-	-	-	-	sempervivum. <i>tectorum</i> .
Carchoféta,	-	-	-	-	carduus. n°. 4. p. 327.
Carchofa d'afé,	-	-	-	-	carlina. n°. 1. p. 330.
Cardouila,	-	-	-	-	cinara. n°. 1. p. 330. <i>sylvestris</i> .
Cardounéta,	-	-	-	-	scolymus. n°. 2. p. 356.
Cardouffés,	-	-	-	-	brassica. n°. 3. p. 168.
Caoulét,	-	-	-	-	cucubalus. n°. 2. p. 239.
Caoulichou,	-	-	-	-	ferratula. n°. 2. p. 326.
Caouffida,	-	-	-	-	pastinaca. n°. 1. p. 229.
Carrota,	-	-	-	-	hyoscyamus. n°. 1. 2. 3. p. 76.
Careillada,	-	-	-	-	ribes. n°. 2. p. 212.
Cassis,	-	-	-	-	equisetum. n°. 3. p. 438.
Cassooïda,	-	-	-	-	fructus.
Castania,	-	-	-	-	<i>Fagus</i> . n°. 1. p. 416.
Castanié,	-	-	-	-	euphorbia. n°. 6. p. 175.
Catapuce,	-	-	-	-	

536 NOMINA VERNACULÀ.

Céba,	-	-	-	-	allium. n°. 15. p. 308.
Cédra ,	-	-	-	-	citrus. n°. 1. p. 276.
Cerful ,	-	-	-	-	{Scandix. n°. 3. p. 289.
Cerfiol ,	-	-	-	-	3
Cerisié ,	-	-	-	-	prunus. n°. 5. p. 251.
Cézé ,	-	-	-	-	cicer. n°. 1. p. 190.
Chaïné ,	-	-	-	-	quercus. n°. 4. p. 415.
Chainé <i>pichot</i> ,	-	-	-	-	veronica. n°. 7. p. 64.
Charmilla ,	-	-	-	-	carpinus. n°. 1. p. 417.
Chicourea ,	-	-	-	-	cichorium. n°. 1. p. 355.
Chinoues ,	-	-	-	-	citrus. n°. 2. p. 276.
Ciboula ,	-	-	-	-	allium. n°. 16. p. 308.
Cipré ,	-	-	-	-	cupressus. n°. 1. p. 418.
Citroun ,	-	-	-	-	citrus. n°. 1. p. 275.
Citrounela ,	-	-	-	-	melissa. n°. 1. p. 81.
Citrouïa ,	-	-	-	-	cucurbita. n°. 1. p. 53.
Civada ,	-	-	-	-	avena. n°. 2. p. 125.
Civada conguoüla ,	-	-	-	-	avena. n°. 3. p. 125.
Co dé reinar ,	-	-	-	-	melampyrum. n°. 4. p. 97.
Coucarela ,	-	-	-	-	ficus. <i>Tour.</i> n°. 9.
Coucoumbré ,	-	-	-	-	cucumis. n°. 2. p. 53.
Coucoumbré d'afé ,	-	-	-	-	momordica. n°. 1. p. 52.
Coucoumela ,	-	-	-	-	cotyledon. n°. 1. p. 47.
Coudounié ,	-	-	-	-	pyrus. 3 n°. 3. p. 254.
Coudoun ,	-	-	-	-	fructus. 3
Cougourla ,	-	-	-	-	cucumis.
_____ de St. Jean ,	-	-	-	-	cucurbita. n°. 4. p. 53.
Cougourié saouvajé ,	-	-	-	-	bryonia. n°. 1. p. 55.
Couloubrinié ,	-	-	-	-	sambucus. n°. 2. p. 39.
Couéta dé lapin ,	-	-	-	-	lagurus. n°. 1. p. 119.
Couguou ,	-	-	-	-	hyacinthus. n°. 1. & 2. p. 40.
Courniaou ,	-	-	-	-	olea. n°. 1. p. 6. &.
Cornebioolü ,	-	-	-	-	vicia. n°. 9. p. 190. & n°. 10.
Cournie ,	-	-	-	-	cornus. n°. 1. p. 147.
Coutela ,	-	-	-	-	iris. n°. 1. p. 8.
Coutelasse ,	-	-	-	-	gladiolus. n°. 1. p. 67.
Coural ,	-	-	-	-	capsicum. n°. 1. p. 33.
Créissous ,	-	-	-	-	{sisymbrium. n°. 2. p. 163.
Crésta dé gal ,	-	-	-	-	veronica. n°. 5. p. 64.
					{fium. n°. 2. p. 119.
					amaranthus. n°. 1. 2. 4. p. 418.
					& 413.

D

DATAUS , - - - - - phoenix. n°. 1. p. 141.

E

E	Bous,	-	-	sambucus. n°. 1. p. 38.
Eli,	-	-	-	lilium. n°. 1. p. 308.
Embriaigua,	-	-	-	lotus. n°. 9. p. 202.
Embriaigwas,	-	-	-	orchis. n°. 4. p. 296.
Endevia,	-	-	-	cichorium. n°. 1. p. 355.
Endourmidouira,	-	-	-	datura. n°. 1. p. 31.
Engane,	-	-	-	falsola. n°. 4. p. 396.
Entrefiol,	-	-	-	trifolium. n°. 14. p. 105.
Entrefiges,	-	-	-	clematis. n°. 3. p. 155.
Eoure,	-	-	-	hedera. n°. 1. p. 213.
Eousé,	-	-	-	quercus. n°. 1. p. 415.
Esca,	-	-	-	boletus. n°. 3. p. 462.
Escabiousa,	-	-	-	scabiosa. n°. 2. p. 72.
Espargous,	-	-	-	asparagus. n°. 1. p. 311.
Esparset,	-	-	-	hedyarum. n°. 1. p. 195.
Epidet,	-	-	-	v... aspic.
Espinars,	-	-	-	spinacia. n°. 1. p. 425.
Esses,	-	-	-	ervum. n°. 4. p. 191.
Estragoun,	-	-	-	artemisia. n°. 6. p. 336.

F

F	A B A,	-	-	vicia. n°. 14. p. 190.
Fabarooü,	-	-	-	phaseolus. n°. 1. p. 185.
Faoüi,	-	-	-	fagus. n°. 2. p. 416.
Faouterna,	-	-	-	aristochiaæ omnes.
Fanabrega,	-	-	-	celtis. n°. 1. p. 431.
Favelou,	-	-	-	viburnum. n°. 1. p. 38.
Fé,	-	-	-	aira... poa... festuca...
Fenafie,	-	-	-	hedyarum. n°. 1. p. 195.
Fenoul,	-	-	-	anethum. n°. 1. p. 223.
Figueira,	-	-	-	ficus. n°. 1. p. 435.
Figueira cabraoü,	-	-	-	ficus. ib. sylvestris.
Figueirou,	-	-	-	atum. n°. 1. p. 405.
Fragousta,	-	-	-	rubus. n°. 1. p. 257.
Fraisse,	-	-	-	fraxinus. n°. 1. p. 434.
Frambouesa,	-	-	-	rubus. n°. 1. p. 257.
Fresié,	-	-	-	fragaria. n°. 1. p. 258.
Frigoula,	-	-	-	thymus. n°. 2. p. 79.
Froumen,	-	-	-	triticum. n°. 1. & 2. p. 128.

G

G	ALANCIE',	-	-	rosa. n°. 1. p. 254.
Galantine,	-	-	-	aquilegia. n°. 1. p. 267.

538 NOMINA VERNACULA.

Galinole ,	-	-	-	clavaria. n°. 1. p. 463.
Garou ,	-	-	-	daphne. n°. 4. p. 44.
Gairoutes ,	-	-	-	lathyrus. n°. 4. p. 187.
Geisse ,	-	-	-	lathyrus. n°. 5. p. 187.
Genievré ,	-	-	-	juniperus. n°. 5. p. 140 & 429.
Gerilla ,	-	-	-	agaricus. n°. 1. p. 460.
Ginesta ,	-	-	-	genista. n°. 3. p. 181.
Ginet ,	-	-	-	genista. n°. 3. p. 181.
Girouflada ,	-	-	-	dianthus. n°. 5. p. 238.
Ginousele ,	-	-	-	euphorbia. n°. 6. p. 175.
Gourda ,	-	-	-	cucurbita. n°. 2. p. 53.
Gourraou ,	-	-	-	ficus. Tour. n°. 10.
Graménas ,	-	-	-	panicum. n°. 6. p. 115.
Granéta d'avinjoun ,	-	-	-	lycium. n°. 1. p. 34.
Graousela ,	-	-	-	papaver. n°. 5. p. 154.
Grouselié ,	-	-	-	ribes. n°. 3. p. 212.
Guines ,	-	-	-	prunus. n°. 5. p. 251.
Guindoulié ,	-	-	-	rhamnus. n°. 2. p. 400.

H

H ERBA battuda ,	-	-	-	phlomis. n°. 1. p. 89.
daourada ,	-	-	-	asplenium. n°. 2. p. 441.
daou turc ,	-	-	-	herniaria. n°. 2. 3. p. 399.
das agassissés ,	-	-	-	semper vivum teetorum.
daou cor ,	-	-	-	chenopodium. n°. 7. hort.
daou tal ,	-	-	-	cynoglossum. n°. 1. 3. p. 20.
daou lagui ,	-	-	-	myrtus. n°. 1. p. 249.
daou siegé ,	-	-	-	scrophularia. n°. 2. p. 98.
daou fejé ,	-	-	-	verbena. n°. 1. p. 70.
de cinq costas ,	-	-	-	plantago. n°. 1. 2. 3. p. 10.
dénréliajé ,	-	-	-	erysimum. n°. 2. p. 165.
dé las febrés ,	-	-	-	gentiana. n°. 6. p. 35.
dé las bérugas ,	-	-	-	heliotropium. n°. 2. p. 17.
de la loqua ,	-	-	-	solanum. n°. 1. p. 32.
dé las taoupas ,	-	-	-	datura. n°. 1. p. 31.
de nostra Dama ,	-	-	-	parietaria. n°. 1. p. 432.
de la rompedura ,	-	-	-	convallaria. n°. 3. p. 39.
de St. Jean ,	-	-	-	phlomis. n°. 2. p. 89.
de St. Roch ,	-	-	-	inula. n°. 3. p. 369.
Hissope dé garriga ,	-	-	-	cistus. n°. 18. p. 265.

I

J AOUBERT ,	-	-	-	apium. n°. 1. p. 224.
Jaoüberçassa ,	-	-	-	conium. n°. 1. p. 286.

Jaousémin ,	-	-	-	jasminum. n°. 1. 3. p. 5.
Jansouna ,	-	-	-	gentiana. n°. 1. p. 34.
Jol ,	-	-	-	lolium. n°. 2. p. 127.
Joun ,	-	-	-	juncus. n°. 1. p. 401.
Jounquille ,	-	-	-	narcissus. n°. 4. p. 304.
Immourtela ,	-	-	-	gnaphalium. n°. 3. p. 336.
Irangé dous ,	-	-	-	citrus. n°. 2. p. 276.
Irangé agré ,	-	-	-	citrus. n°. 2. varietas.

L

Lach dé pute ,	-	-	-	euphorbiæ omnes.
Lachéta ,	-	-	-	sonchi omnes.
Lachuga ,	-	-	-	{ senecio. n°. 1. p. 338.
Lachuguéta ,	-	-	-	lactuca. n°. 1. p. 346.
Laoürié ,	-	-	-	valeriana. n°. 6. p. 68.
Laoürié rose ,	-	-	-	laurus. n°. 1. p. 55.
Laoürié-tin ,	-	-	-	nerium. oleander.
Lampourde ,	-	-	-	viburnum. n°. 1. p. 38.
Laoüriole ,	-	-	-	arctium. n°. 1. p. 326.
Laoüserda ,	-	-	-	daphne. n°. 4. p. 43.
Lappétas ,	-	-	-	medicago. n°. 1. p. 203.
Lengue cane ,	-	-	-	arctium. n°. 1. p. 326.
Lentos ,	-	-	-	cynoglossum. n°. 1. & 3. p. 20.
Lentilles ,	-	-	-	ononis. n°. 4. p. 182.
Lilla ,	-	-	-	ervum. n°. 1. p. 191.
Limbarda ,	-	-	-	syringa. n°. 1. p. 7.
Limounié ,	-	-	-	inula. n°. 5. p. 364.
Lin ,	-	-	-	citrus. n°. 1. p. 276.
Lunettas ,	-	-	-	linum. n°. 2. p. 228.
Luzerna ,	-	-	-	biscutella. n°. 1. p. 162.
			-	medicago. n°. 1. p. 203.

M

M AJURENA ,	-	-	-	origanum. n°. 3. p. 80.
Maouva ,	-	-	-	malva omnes.
Maourela ,	-	-	-	croton. n°. 1. p. 278 , 419.
Margal ,	-	-	-	lolium. n°. 1. p. 127.
Margarida ,	-	-	-	chrysanthemum. n°. 1. p. 367.
Margaridéta ,	-	-	-	bellis. n°. 1. p. 366.
Marriblé ,	-	-	-	marrubium. n°. 1. p. 94.
Marsouré ,	-	-	-	helleborus. n°. 2. p. 272.
Martagoun ,	-	-	-	lilium. n°. 2. p. 308.
Meloun ,	-	-	-	cucumis. n°. 1. p. 54.
Menta ,	-	-	-	mentha. n°. 5. p. 83.

540 NOMINA VERNACULA.

Mentastré ,	-	-	-	mentha. n°. 1. p. 83.
Mespoulié ,	-	-	-	mespilus. n°. 1. p. 254.
Mil gros ,	-	-	-	zea. n°. 1. p. 111.
Mil pichot ,	-	-	-	panicum. n°. 7. p. 115.
Micocoulié ,	-	-	-	<i>celtis</i> . n°. 1. p. 431.
Micacoulié ,	-	-	-	<i>polygonum</i> . n°. 7. p. 45.
Mil ngré ,	-	-	-	<i>viburnum</i> . n°. 3. p. 338.
Milaflous ,	-	-	-	<i>punica</i> . n°. 1. p. 249.
Miougranié ,	-	-	-	<i>amygdalus</i> . n°. 1. p. 250.
Mirecoutous ,	-	-	-	<i>cistus</i> . n°. 3. p. 263.
Mougés ,	-	-	-	<i>phaseolus</i> . n°. 1. p. 185.
Moungétas ,	-	-	-	<i>phallus</i> . n°. 1. p. 462.
Mouriïa ,	-	-	-	<i>anagallis</i> . n°. 1. p. 29.
Mourillous ,	-	-	-	<i>olea</i> . n°. 1. p. 6. t.
Mouraoïi ,	-	-	-	<i>solanum</i> . n°. 3. p. 33.
Mourela ,	-	-	-	<i>zostera</i> . n°. 1. p. 406.
Mousta ,	-	-	-	<i>agaricus</i> .
Mousseron ,	-	-	-	<i>sinapis</i> . n°. 1. p. 169.
Moustarda ,	-	-	-	<i>cistus</i> . n°. 4. p. 263.
Mugan ,	-	-	-	<i>myrtus</i> . n°. 1. p. 249.
Murtre ,	-	-	-	

N

N ASITOR ,	-	-	-	<i>lepidium</i> . n°. 6. p. 158.
Nat ,	-	-	-	<i>brassica</i> . n°. 1. p. 168.
Niela ,	-	-	-	<i>agrostemma</i> . n°. 1. p. 245.
Nimphéa ,	-	-	-	<i>nymphæa utraque</i> .
Nouguié ,	-	-	-	<i>juglans</i> . n°. 1. p. 51.

O

O EUILLET saouïvajé ,	-	-	-	<i>dianthus</i> . n°. 6. p. 238.
Ordi ,	-	-	-	<i>hordeum</i> . n°. 1. p. 129.
Orta ,	-	-	-	<i>beta</i> . n°. 1. p. 398. <i>viridis</i> .
Oseilla ,	-	-	-	<i>rumex</i> . n°. 7. p. 135.
Oubloun ,	-	-	-	<i>humulus</i> . n°. 1. p. 424.
Oulivié ,	-	-	-	<i>olea</i> . n°. 1. p. 6.
Ourmeou ,	-	-	-	<i>zizimus</i> . n°. 1. p. 399.
Oumé ,	-	-	-	<i>urticæ omnes</i> .
Ourtiga ,	-	-	-	

P

P ANATALLIA ,	-	-	-	<i>parietaria</i> . n°. 1. p. 432.
Paniïfa .	-	-	-	<i>panicum</i> . n°. 1. p. 115.

Pan blan d'afé ,	-	-	-	eryngium. n°. 2. p. 214.
Panfournémén ,	-	-	-	samolus. n°. 1. p. 24.
Pansea ,	-	-	-	viola. n°. 3. p. 295.
Pantacouste ,	-	-	-	lonicera. n°. 1. p. 76.
Paoumoule ,	-	-	-	hordeum n°. 2. p. 130.
Passeroise ,	-	-	-	alcea, <i>utraque</i> .
Passéroux ,	-	-	-	valeriana. n°. 6. p. 68. γ.
Passelvelour ,	-	-	-	tagetes, <i>utraque</i> .
Pastenaga ,	-	-	-	pastinaca. n°. 1. p. 222.
Pastisou ,	-	-	-	cucurbita. n°. 4. p. 53.
Pasteca ,	-	-	-	cucurbita. n°. 1. p. 53.
Patalos ,	-	-	-	helianthus. n°. 2. p. 373.
Pater noster ,	-	-	-	melia. n°. 1. p. 233.
Pavot ,	-	-	-	{ pœania. n°. 1. p. 266. papaver. n°. 6. p. 153.
Pébérout ,	-	-	-	capiscum. n°. 1. p. 33.
Pébré ,	-	-	-	vitex. n°. 1. p. 103.
Péche ,	-	-	-	amygdalus. n°. 1. p. 250.
Pé dé biooü ,	-	-	-	ficus.
Pé dé cat ,	-	-	-	gnaphalium. n°. 1. p. 340.
Pé dé lebré ,	-	-	-	daëtylis. n°. 1. p. 119.
Périé ,	-	-	-	pyrus. n°. 1. p. 254.
Pervinque ,	-	-	-	vinca. n°. 1. p. 31.
Pésé ,	-	-	-	pisum. n°. 1. p. 185.
Pibou ,	-	-	-	populus n°. 2. p. 427.
Pica poule ,	-	-	-	celtis. n°. 1. p. 431.
Pichouline ,	-	-	-	olea. n°. 1. p. 6. ζ.
Pigale ,	-	-	-	olea. n°. 1. p. 6. ε.
Pin ,	-	-	-	pinus. n°. 2. p. 418.
Pinpanela ,	-	-	-	poterium. n°. 1. p. 51.
Pirela ,	-	-	-	lichen. n°. 12. p. 455.
Pissaoüliech ,	-	-	-	narcissus. n°. 5. p. 304.
Plantagé ,	-	-	-	plantago. n°. 1. 2. 3. p. 9.
Porré ,	-	-	-	allium. n°. 1. p. 305.
Pote ,	-	-	-	thymus. n°. 2. p. 78.
Poumetas ,	-	-	-	crataegus. n°. 3. p. 252.
Poumetés dé douz cloffés ,	-	-	-	crataegus. n°. 4. <i>ibid.</i>
Prudhomé ,	-	-	-	salvia. n°. 3. p. 61.
Prunié ,	-	-	-	prunus. n°. 6. p. 251.
Pudis ,	-	-	-	pistacia. n°. 2. p. 424.

R

RABA ,	-	-	-	brassica. n°. 2. p. 168.
Rabé ,	-	-	-	raphanus. n°. 1. p. 170.
Rafanagé ,	-	-	-	raphanus. n°. 2. p. 170.

542 NOMINA VERNACULA.

Radi,	-	-	-	- raphanus. <i>radice orbiculari</i> .
Rampan,	-	-	-	- laurus. n°. 1. p. 55.
Rascalade,	-	-	-	- triticum. n°. 2. p. 128.
Rasque,	-	-	-	- cuscuta. n°. 1. p. 16.
Rats,	-	-	-	- cynosurus. n°. 3. p. 126.
Redou,	-	-	-	- coriaria. n°. 1. p. 431.
Registel,	-	-	-	- rubia. n°. 1. p. 13.
Regalussia,	-	-	-	- glycyrrhiza. n°. 1. p. 192.
Rénebrié,	-	-	-	- rumex. n°. 3. p. 135.
Renouncule,	-	-	-	- ranunculi omnes.
Repounchous,	-	-	-	- campanula. n°. 2. p. 25.
Réstenclé,	-	-	-	- pistacia. n°. 3. p. 424.
Reveille mati,	-	-	-	- euphorbia. n°. 4. p. 174.
Ris saouvagé.	-	-	-	- sedum. n°. 5. p. 244.
Roumanis,	-	-	-	- rosmarinus. n°. 1. p. 63.
Roumanét,	-	-	-	- agaricus. n°. 2. p. 460.
Roumecounil,	-	-	-	- asparagus. n°. 2. p. 311.
Rounzé,	-	-	-	{ rubus. n°. 3. p. 257. prunus. n°. 7. p. 252. crataegus. n°. 3. <i>ibid.</i>
Roundote,	-	-	-	- glechoma. n°. 1. p. 83.
Rouquéta,	-	-	-	- brassica. n°. 5. p. 169.
Rouquéra saouvaja,	-	-	-	{ brassica. n°. 4. <i>ibid.</i> sisymbrium. n°. 5. p. 164.
Rouserbe,	-	-	-	- rumex. n°. 1. p. 134.
Rouvé,	-	-	-	- quercus. n°. 4. p. 415.
Ruda,	-	-	-	- ruta. n°. 1. p. 149.

S

S	Age' mari,	-	-	- tamus. n°. 1.
Sabina,	-	-	-	- juniperus. n°. 4. p. 140 & 428.
Safran,	-	-	-	- crocus. n°. 1. p. 7.
Sagriegé,	-	-	-	- satureja. n°. 1. p. 93.
Salicör,	-	-	-	- salicornia. n°. 1. p. 386.
Salierne,	-	-	-	- olea. n°. 1. p. 6.
Sambuc,	-	-	-	- sambucus. n°. 1. p. 38.
Sambuc rosa,	-	-	-	- viburnum. n°. 3. <i>ibid.</i>
Sangui,	-	-	-	- cornus. n°. 2. p. 147.
Saouzé,	-	-	-	- salix. n°. 1, 8. p. 419, 420.
Sanicle,	-	-	-	- sanicula. n°. 1. p. 215.
Saoubia,	-	-	-	- salvia. n°. 1. p. 62.
Sarishi,	-	-	-	- tragopogon. n°. 3. p. 342.
Seïa,	-	-	-	- secale. n°. 1. p. 127.
Senegre,	-	-	-	- trigonella. n°. 3. p. 203.
Serpoul,	-	-	-	- thymus. n°. 1. p. 78.

Sounouire ,	-	-	-	salicornia. n°. 1. p. 386.
Soude ,	-	-	-	salsola. n°. 1. & 2. p. 396.
Sourbié ,	-	-	-	forbus. utraque.
Speoute ,	-	-	-	triticum. n°. 4. p. 128.

T

T	AMARIS ,	-	-	tamarix. n°. 1. p. 226.
Tantarével ,	-	-	-	humulus. n°. 1. p. 424.
Tapacuoü ,	-	-	-	rosa. n°. 5. p. 256.
Tapéra ,	-	-	-	capparis. n°. 1. p. 152.
Tartiflé ,	-	-	-	helianthus. n°. 2. p. 375.
Terragrépia ,	-	-	-	scorzonera. n°. 5. p. 343.
Terebinte ,	-	-	-	pistacia. n°. 2. p. 424.
Terrét ,	-	-	-	vitis.
Téta lebré ,	-	-	-	lychnis. n°. 2. p. 245.
Tin ,	-	-	-	thymus. n°. 2. p. 78.
Tira peoüsés ,	-	-	-	xanthium. n°. 1. p. 50. 402.
Toupinambour ,	-	-	-	helianthus. n°. 2. p. 375.
Tournesol ,	-	-	-	croton. n°. 1. p. 278. 419.
Tousela ,	-	-	-	triticum. n°. 2. p. 128.
Tréfoul ,	-	-	-	trifolium. n°. 14. p. 105.
Tréscalau rougé ,	-	-	-	gentiana. n°. 6. p. 35.
Tréscalau jaoüné ,	-	-	-	hypericum. n°. 3. p. 276.
Trintanele ,	-	-	-	daphne. n°. 4. p. 44.
Troüené ;	-	-	-	ligustrum. n°. 1. p. 5.
Trufa ,	-	-	-	lycoperdon. n°. 1. p. 464.
Trufa mande ,	-	-	-	santolina. n°. 1. p. 468.
Trufa dé terra ,	-	-	-	solanum. n°. 2. p. 33.
Turqnéta ,	-	-	-	herniariæ , omnes.
Tussilagé ,	-	-	-	tussilago. n°. 2. p. 360.

V

V	ARAIRE' ,	-	-	veratrum. n°. 1. p. 316.
Ver ,	-	-	-	betula. n°. 1. p. 107. & 412.
Verbouïsét ,	-	-	-	ruscus. n°. 1. p. 430.
Verdale ,	-	-	-	olea. n°. 1. p. 6. ζ.
Vesserou ,	-	-	-	lathyrus. n°. 10. p. 188.
Vessa blanque ,	-	-	-	vicia.
Vienuse ,	-	-	-	solanum. n°. 4. p. 33.
Vigne ,	-	-	-	vitis. n°. 1. p. 213.
Vinous ,	-	-	-	agaricus fimetarius.
Vinétté ,	-	-	-	rumex. n°. 10. p. 138.
Viou!éta ,	-	-	-	viola. n°. 1. p. 294.
Vioüilié ,	-	-	-	cheiranthus. n°. 2. p. 166.
Vioüilié jaoüné ,	-	-	-	cheiranthus. n°. 1. p. 165.

PRIVILEGE GÉNÉRAL.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE
ET DE NAVARRE, à nos amés & féaux Conseillers, les
Gens tenants nos Cours de Parlement, &c. salut. Notre bien
amée LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES DE MONT-
PELLIER, nous a fait exposer qu'elle auroit besoin de nos
Lettres de Privilege pour la réimpression de ses Ouvrages. A
ces causes, voulant favorablement traiter notred. Société,
nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de
faire réimprimer par tel Imprimeur qu'elle voudra choisir,
tous les Ouvrages qu'elle voudra faire imprimer en son nom,
en tels volumes, forme, marge, caractères, conjointement ou
séparément, & autant de fois que bon lui semblera, & de
les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant
le temps de *vingt années* consécutives, à compter de la date
des Présentes ; sans toutefois qu'à l'occasion des Ouvrages
ci-dessus spécifiés il puisse en être réimprimé d'autres qui ne
soient pas de notre Société. Faisons défenses, &c. Donné à
Versailles le *vingt-neuvième* jour du mois d'Août, l'an de
grace mil sept cent soixante, & de notre regne le quarante-
cinquième.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL,

Signé LEBEGUE.

*Registré sur le Registre XV de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 112. fol. 113,
conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses, art.
41, à toutes personnes de quelques qualités & conditions
qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de
vendre, débiter, faire afficher aucun livre pour les vendre
en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs, ou autrement,
&c. A Paris, ce 15^e. Octobre 1760.*

Signé VINCENT, Adjoint.

New York Botanical Garden Library

QK313 .G645

Gouan, Antoine/Antonii Gouan ... Flora M

gen



3 5185 00106 7592

