




QK
313
.B485









CATALOGUE RAISONNÉ
DES
PLANTES VASCULAIRES
DE L'ARRONDISSEMENT DE CHERBOURG.

CHERBOURG. — IMPRIMERIE D'AUGUSTE MOUCHEL.

*à Agen.
Hommage des auteurs.*

CATALOGUE RAISONNÉ

DES

PLANTES VASCULAIRES

DE L'ARRONDISSEMENT DE CHERBOURG,

PAR

M. BESNOU ✱,

Pharmacien en chef de la Marine, Secrétaire général de la 27^e session du Congrès scientifique de France, Membre de l'Institut des Provinces et de plusieurs Académies françaises et étrangères;

ET

M. BERTRAND LACHÈNÉE,

Naturaliste, Membre de l'Institut des Provinces et de plusieurs autres Sociétés savantes.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

*(Extrait du tome II du Congrès scientifique de France, 27^e session
tenue à Cherbourg.)*

CHERBOURG.

AUGUSTE MOUCHEL, IMPRIMEUR-LIBRAIRE.

1862.

. B485

CATALOGUE RAISONNÉ

DES

PLANTES VASCULAIRES

DE L'ARRONDISSEMENT DE CHERBOURG,

Par MM. BESNOU ❄ et BERTRAND LACHÈNÉE.

Ce Catalogue avait été présenté à la Société Impériale des Sciences naturelles de Cherbourg, dans la séance du 3 janvier 1859, et il avait été destiné à être imprimé dans les mémoires de cette Société. Des considérations sérieuses ont porté les auteurs à le réserver pour les volumes du Congrès scientifique de France.

INTRODUCTION.

MM. de Gerville et Delachapelle sont les premiers qui aient donné des catalogues de nos plantes. C'est à la fois un pieux devoir et une bien douce satisfaction pour l'un de nous de rendre à la mémoire de ces deux savants les hommages de respect et de gratitude auxquels ils ont droit de la

part de ceux qui ont été assez heureux pour recevoir leurs conseils et posséder leur amitié. Malgré l'étendue de leurs connaissances et de leurs investigations suivies avec ardeur pendant de longues années, le champ n'était point encore entièrement exploré; il restait même beaucoup à faire. Leur exemple a dû nécessairement exciter l'émulation; aussi M. le docteur Lebel, placé au centre de la presqu'île de la Manche, s'occupe-t-il de la parcourir; en 1848, il a donné une importante notice sur quelques plantes nouvelles, rares ou peu connues de cette presqu'île. Il est regrettable que ce botaniste distingué n'ait pas continué à publier les résultats de ses explorations. D'un autre côté, M. Le Jolis, se livrant à des recherches dans un rayon plus restreint, les a consignées dans ses *Observations*, puis dans les listes qu'il a fait paraître dans les mémoires de la Société des Sciences naturelles de Cherbourg.

Le travail que nous présentons n'est pas le simple dépouillement d'un herbier; il est le fruit de plusieurs années d'études sérieuses, d'herborisations méthodiques auxquelles nous avons consacré nos loisirs, et non le résultat de courses semblables à la marche du cavalier sur les cases de l'échiquier. Les déterminations ont toutes été faites par nous avec le plus grand soin sur des sujets vivants. Si nous n'avons pas adressé d'échantillons de nos plantes aux principaux auteurs de monographies, c'est que, tout en rendant justice à leur savoir, nous avons à craindre les méprises qui résultent forcément des analyses ou des vérifications opérées sur des *exsiccata*. Nous exposer à commettre quelques inexactitudes susceptibles d'être plus tard facilement corrigées nous a paru plus sage que de faire consacrer des erreurs par des noms justement accrédités.

Notre Catalogue ne comprend que les plantes dont nous avons constaté nous-mêmes l'existence dans l'arrondissement de Cherbourg; il renferme bon nombre d'excellentes espèces qui n'y avaient pas été signalées. Quoique y faisant sur tous les points, dans chaque saison, des explorations régulières, nous sommes loin d'oser nous flatter d'avoir trouvé tous les végétaux vasculaires qui y croissent spontanément. En effet, indépendamment de ceux qui, sans nul doute, peuvent encore y être découverts, il en est plusieurs qui y ont été indiqués par divers naturalistes, et que nous rencontrerons peut-être tôt ou tard dans nos herborisations. Toutefois, il y a lieu de croire qu'un certain nombre ont été admis dans la flore locale par erreur ou par confusion dans les déterminations. Une liste placée à la fin de notre Catalogue présentera l'énumération des espèces que nous n'avons pas encore observées dans l'arrondissement de Cherbourg, mais qui y ont été indiquées par différents botanistes.

Un assez grand nombre de plantes se rencontrent à la fois dans notre arrondissement à l'état réellement sauvage et à l'état subspontané, et il est souvent fort difficile, d'après l'examen des localités, de dire avec certitude auquel de ces deux états ces plantes doivent être rapportées; ce qui, dans l'esprit de quelques botanistes un peu trop systématiques, a fait naître des doutes sur leur indigénat. Nous donnons ici la liste suivante, qui réunit les espèces le plus sujettes à offrir ce double *habitat* :

Cichorium Intybus L.	Campanula Rapunculus L.
Doronicum Pardalianches L.	Mentha piperita L.
Tanacetum vulgare L.	Melissa officinalis L.
Artemisia Absinthium L.	Nepeta Cataria L.
Chrysanthemum Parthenium	Fœniculum officinale All.
Pers.	Cornus sanguinea L.

Ribes Uva-crispa L.	Buxus sempervirens L.
— rubrum L.	Euphorbia Lathyris L.
Pyrus communis L.	Ulmus campestris auct.
Malus communis Poir.	Salix alba L.
Sorbus aucuparia L.	— vitellina L.
Rubus idæus L.	— fragilis L.
Cerasus avium Mœnch.	— triandra L.
— vulgaris Mill.	— purpurea L.
Vicia sativa L.	— rubra Huds.
Pisum arvense L.	— viminalis L.
Acer pseudo-Platanus L.	— Smithiana Willd.
Androsæmum officinale All.	— Caprea L.
Clematis Vitalba. L.	— cinerea L.
Aquilegia vulgaris L.	Populus alba L.
Aconitum Napellus L.	Castanea vulgaris Lamk.
Camelina sativa Crantz.	Carpinus Betulus L.
Brassica Napus L.	Narcissus biflorus Curt.
— asperifolia Lamk.	Ornithogalum umbellatum L.
Viola odorata L.	Asparagus officinalis L.
Tamarix Anglica Webb.	Lolium Italicum Braun.

Quant à l'introduction plus ou moins plausible dans notre arrondissement, avec les moissons ou par l'effet des cultures, d'espèces telles que certains *Papaver*, *Chrysanthemum*, *Centaurea*, *Euphorbia*, *Lolium*, etc., comme elles croissent spontanément dans le pays depuis un temps immémorial, mêlées aux végétaux indigènes, nous avons cru devoir nous abstenir d'aborder ce sujet. Les assertions, les discussions peuvent exposer ceux qui veulent le traiter à commettre des erreurs, à ne rien dire de neuf ou à accumuler doutes sur doutes dans une question pour laquelle on est encore loin de posséder un nombre suffisant de bons documents, et dont la solution ne sera jamais complètement satisfaisante. C'est ici le lieu de dire qu'il est regrettable de

voir certains botanistes trancher les délicates questions d'indigénat ou d'introduction avant d'avoir assez parcouru les localités de leur pays; ainsi, M. Le Jolis a considéré comme n'étant point autochtones des espèces que nous avons retrouvées dans les stations qui leur sont éminemment propres, loin des habitations et des cultures. Telles sont: *Avena flavescens* L., *Verbascum virgatum* With., *Thalictrum flavum* L., *Gaudinia fragilis* Pal. B., *Evonymus Europæus* L., *Calamintha ascendens* Jord., *Silybum Marianum* Gærtn., etc.

La multiplicité des espèces opérée dans ces derniers temps sera peut-être plus nuisible qu'utile aux progrès de la science; aussi, jusqu'à ce qu'un examen plus approfondi nous permette d'être fixés à leur égard, nous maintiendrons comme variétés plusieurs plantes élevées récemment par quelques auteurs au rang d'espèces.

Il existait autrefois à Cherbourg deux jardins où l'on avait réuni un certain nombre de végétaux assez remarquables, soit indigènes, soit exotiques. L'un de ces jardins était situé au Cauchin; la création en était due à M. Fréret. L'autre, situé près de l'ancienne chapelle de Notre-Dame-du-Vœu, était une sorte de jardin *pharmaceutique* pour l'hôpital de la marine. Le premier a complètement changé de destination; le second est entièrement détruit, et il a fait place à une partie des glacis et des fossés des nouvelles fortifications.

Quelques plantes, qui tendent de jour en jour à disparaître, s'observent encore dans leurs environs. Nous citerons comme exemple:

1^o Pour le jardin du Cauchin: *Acanthus mollis* L., *Asperula lavigata* L., *Cicutaria aquatica* Lamk., *Hieracium collinum* Gochn.;

2° Pour le second: *Adonis autumnalis* L., *Borrago laxiflora* Desf., *Celsia Cretica* L., *Ecballium Elaterrum* Rich., *Oenothera rosea* Ait., *Silene Armeria* L.

Depuis sept ans environ, M. Besnou a établi au centre de l'hôpital de la marine une petite école botanique où il a réuni des plantes, tant exotiques que du pays, surtout les espèces médicinales, alimentaires, industrielles, etc. Leur nombre, qui approche de deux mille, est réparti en une centaine de familles.

Les plantes qui suivent sont indiquées comme étant *communes* ou même *très communes*, sans nulle restriction, dans la flore de la Normandie, par M. de Brébisson. Elles n'ont pas été, du moins à notre connaissance, observées dans l'arrondissement de Cherbourg; si donc on vient à les y découvrir, elles devront y être citées comme *rare*s ou *très rare*s.

<i>Adoxa Moschatellina</i> L.	<i>Oenanthe Phellandrium</i> Lamk.
<i>Apera Spica-venti</i> Pal. B.	<i>Orehis montana</i> Schm.
<i>Campanula Trachelium</i> L.	<i>Potentilla argentea</i> L.
<i>Carex ampullacea</i> Good.	<i>Ranunculus divaricatus</i>
— <i>paludosa</i> Good.	Schrank.
<i>Chenopodium Vulvaria</i> L.	<i>Sedum album</i> L.
<i>Crassula rubens</i> L.	<i>Silaus pratensis</i> Bess.
<i>Genista Anglica</i> L.	<i>Sium latifolium</i> L.
<i>Geranium lucidum</i> L.	<i>Sorbus torminalis</i> Crantz.
<i>Leontodon hispidus</i> L.	<i>Thlaspi arvense</i> L.
<i>Melittis Melissophyllum</i> L.	<i>Valeriana dioica</i> L.
<i>Nasturtium amphibium</i> R. Br.	

L'arrondissement de Cherbourg, dont la superficie est de soixante mille hectares environ, occupe la partie septentrionale du département de la Manche. Il a la forme d'un triangle irrégulier, dont deux côtés, l'un au nord, l'autre à

l'ouest, s'appuient sur la mer, et le troisième sur l'arrondissement de Valognes, dans la direction du nord-est au sud-ouest. Le point le plus éloigné du littoral (dans la commune de Couville) n'en est distant que de douze kilomètres deux hectomètres. Il résulte de cette configuration que notre flore maritime l'emporte de beaucoup par son importance sur celle de l'intérieur, et que c'est elle qui présente les plantes les plus remarquables et la plupart des espèces caractéristiques de la végétation de cette partie de la France.

Les côtes de l'arrondissement de Cherbourg se divisent en deux grands littoraux, distincts sous le rapport botanique presque autant qu'ils le sont au point de vue topographique.

Le littoral de l'ouest a un développement de quarante-cinq kilomètres environ, de l'extrémité sud de Surtainville à la pointe d'Auderville. C'est le plus riche, et il mérite d'être exploré sur tout son parcours: ses hautes falaises, ses mielles avec leurs bas-fonds marécageux et leurs dunes élevées offriront partout au naturaliste une abondante moisson de plantes rares, appartenant presque toutes à cette flore spéciale si curieuse, dite de l'Ouest, s'étendant du Portugal à l'Irlande.

Le développement approximatif du littoral du nord, vers le milieu duquel Cherbourg est situé, est de soixante-huit kilomètres, depuis la pointe d'Auderville jusqu'au phare de Gatteville; on peut y joindre le petit prolongement (trois kilomètres) qui se trouve à l'est, entre ce phare et Barfleur. Quoique, pour sa richesse, le littoral du nord ne puisse être comparé à celui de l'ouest, il ne laisse pas de produire des plantes intéressantes, des espèces même que l'on chercherait vainement ailleurs, et le botaniste aura lieu de se féliciter de ses excursions s'il visite avec soin les environs de

notre port militaire, les fortifications et les sables de Querqueville, les prés marécageux de Nacqueville, les falaises de Gréville; et de l'autre côté de Cherbourg, les rivages variés de Tourlaville et de Fermanville, les *grandes mares* de Vrasville, de Névile et de Gatteville.

Le sol de l'arrondissement de Cherbourg, sans être montagneux, est très accidenté; il est sillonné par de nombreux cours d'eau, coulant la plupart dans des vallons entourés de coteaux pittoresques; des formations primordiales^a et de transition le constituent. Parmi les points les plus élevés, on remarque le plateau de la Sorellerie (191^m), qui sépare, vers leur origine, les bassins du Trottebec et de la Saire, sur la limite même de l'arrondissement de Valognes; à Tollevast, le plateau d'Ombre (177^m), qui donne naissance à l'Ouve, la principale rivière de la presqu'île; le terrain d'arkose de Brettefey (158^m), sur la route de Saint-Pierre-Église à Cherbourg; les landes de Jobourg (180^m) et celles de Flottemanville-Hague (179^m); le bourg des Pieux (123^m).

A partir du sud-ouest, les stéaschistes et les phyllades occupent la partie centrale de l'arrondissement, le bassin de la Divette, d'où ils rayonnent jusqu'au fond de la Hague. Le quartzite aux rocs abrupts et les grès avec leurs terres de bruyère sont répandus avec profusion dans cette dernière région, ainsi que sur l'emplacement de l'ancienne forêt de Cherbourg, traversé par la route de Valognes. Le terrain granitique occupe le nord et l'arkose le centre du canton de Saint-Pierre-Église, limités, le premier à l'ouest, la seconde au sud, par des gisements d'une nature variée. Les roches granitiques se montrent encore en grandes masses, et sur une notable étendue, dans les cantons de Beaumont et des Pieux, où elles forment nos belles falaises, si dignes de fixer

l'attention, et parmi lesquelles il faut mettre au premier rang celles de Jobourg, dont la hauteur surpasse cent vingt mètres. Le calcaire (marbre intermédiaire) n'existe que sur un espace très circonscrit, dans le sud-ouest.

La constitution géologique de l'arrondissement de Cherbourg rend sa flore de l'intérieur moins intéressante que celle des côtes; elle est assez uniforme, car on sait qu'un pays ne présente des différences tranchées dans sa végétation, quant au sol, quelque varié qu'il soit, qu'autant qu'il s'y trouve des calcaires. Toutefois, si l'on veut voir dans toute leur beauté, étudier dans leur complet développement, au milieu de leurs véritables stations, les plantes essentiellement caractéristiques de nos terrains de première formation et de transition, recueillir les espèces rares qui les distinguent, les localités ne feront pas défaut, et l'on ne sera embarrassé que sur le choix. Nous indiquerons comme plus dignes d'exploration, sous ce rapport, la riante vallée de la Divette, les collines de la Fauconnière, du Roule et des Terres-Feuillies, près de Cherbourg; le riche bassin du Trottebec, avec les bruyères tourbeuses du sud de Tourlaville et de la Boissaie; les rochers pittoresques de la Glacerie, et plus loin ceux de Lorion; les marécages et les belles pièces d'eau de la Saire; les bois de Mesnil-au-Val, du Theil, du Vast et de Gonnevillie; les étangs de Saint-Pierre-Église; la lande de Carneville; les jolis vallons du Doux-Riant et du Nid-du-Corps, sur Maupertus et sur Fermanville; la source et les bords de l'Ouve, à Tollevast; les prés spongieux du Doyviet, à Martinvast; les coteaux de la Marvie, à Virandeville; le bois du Mont-du-Roc, sur Sideville et Nouainville; le petit étang de Percy, à Tonneville; les taillis et les vastes landes de Sainte-Croix-Hague, de Flottemanville et de Vau-

ville; le charmant vallon et le bois de Nérée, à Teurthéville-Hague; le plateau de Grosville, d'où sortent plusieurs rivières. On recueillera à Saint-Germain-le-Gaillard, à Pierreville et à Surtainville, le peu de plantes spéciales que l'on sera fondé à chercher sur le marbre intermédiaire.

C'est à la nature du sol qu'il faut attribuer l'absence ou la rareté, dans l'arrondissement de Cherbourg, d'un assez grand nombre de végétaux qui croissent avec abondance dans celui de Valognes. La richesse de sa flore intérieure, ce dernier la doit à ses vastes marais et à l'étendue de ses terrains calcaires. Sa flore maritime comprend aussi certaines plantes que lui donnent les plages vaseuses de l'embouchure de ses rivières.

Parmi les espèces appartenant à l'arrondissement de Valognes, et qui manquent ou sont fort rares dans le nôtre, nous nous bornerons à citer :

<i>Anagallis cœrulea</i> Schreb.	<i>Equisetum Telmateia</i> Ehrh.
<i>Armeria maritima</i> Willd.	<i>Galeopsis Ladanum</i> Lamk.
<i>Artemisia Gallica</i> Willd.	<i>Gentiana Pneumonanthe</i> L.
— <i>maritima</i> Willd.	<i>Hottonia palustris</i> L.
— <i>salina</i> Willd.	<i>Hydrocharis Morsus-Ranæ</i> L.
<i>Bromus arvensis</i> L.	<i>Isnardia palustris</i> L.
<i>Buplevrum tenuissimum</i> L.	<i>Lactuca Scariola</i> L.
<i>Carduus crispus</i> L.	<i>Limnanthemum nymphoïdes</i>
<i>Cephalanthera grandiflora</i> Bab.	Link.
<i>Cerastium aquaticum</i> L.	<i>Lithospermum arvense</i> L.
<i>Cichorium Intybus</i> L.	<i>Nymphæa alba</i> L.
<i>Cirsium eriophorum</i> Scop.	<i>OEnanthe Phellandrium</i> Lamk.
<i>Clematis Vitalba</i> L.	<i>Ophrys apifera</i> Sm.
<i>Cochlearia Anglica</i> L.	— <i>aranifera</i> Sm.
<i>Elymus arenarius</i> L.	— <i>monorchis</i> L.
<i>Epipactis latifolia</i> All.	<i>Parnassia palustris</i> L.

Peucedanum Silaus L.	Sium latifolium L.
Plantago media L.	Spartina stricta Roth.
Ranunculus Lingua L.	Spiranthes æstivalis Rich.
Rubus cæsius L.	Statice Limonium L.
Sagittaria sagittæfolia L.	Suæda fruticosa Forsk.
Scabiosa Columbaria L.	Thalictrum flavum L.
Senecio erueifolius L.	Torilis infesta Dub.
Sium augustifolium L.	

Nous avons cru devoir suivre autant que possible dans notre Catalogue la classification adoptée par MM. Le Maout et Decaisne, dans leur excellent ouvrage intitulé *Flore élémentaire des Jardins et des Champs*, parce que cet ouvrage peut être consulté avec fruit par les savants, de même qu'il s'adresse aux personnes qui ne s'occupent de la botanique que comme d'une science de pur agrément.

Les principaux auteurs qui nous ont servi de guides pour nos déterminations et pour nos études comparatives sont :

LINNÉ. — Systema, Genera et Species plantarum.

GRENIER ET GODRON. — Flore de France.

DE BRÉBISSE. — Flore de la Normandie.

LLOYD. — Flore de l'Ouest de la France.

BOREAU. — Flore du Centre de la France.

BABINGTON. — Manual of British Botany.

— Primitiæ Floræ Sarnicæ.

BROMFIELD. — Flora Vectensis.

KOCH. — Synopsis Floræ Germanicæ et Helveticæ.

WEIHE ET NEES. — Rubi Germanici.

Il nous a paru utile de donner les noms vulgaires sous lesquels les plantes sont connues dans notre pays, de signaler quelques-uns de leurs principaux usages et leurs qualités nuisibles, ainsi que d'indiquer la période ordinaire de leur floraison,

SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

T C. — Très commun.

C. — Commun.

A C. — Assez commun.

P C. — Peu commun.

A R. — Assez rare.

R. — Rare.

T R. — Très rare.

Quoique générales, ces indications ont été établies de manière à donner une juste idée de la répartition des plantes dans l'ensemble de la végétation de l'arrondissement.

R R R. — Ce signe s'applique aux plantes trouvées dans une ou deux localités en nombre très restreint.

Nob. — Nobis, Nous.

Part. — Partim, en partie.

Var. — Variété.

a, b, c, d, etc. — Numéros d'ordre des variétés. Quand la série commence par *b*, la variété *a* est comprise dans l'espèce même dont elle est le type.

①. — Annuel.

②. — Bisannuel.

℥. — Vivace.

3. — ¾ Ligneux.

PLANTES VASCULAIRES.

I. PHANÉROGAMES DICOTYLÉDONES.

Dicotylédones monopétales périgynes.

COMPOSÉES.

Tribu des CHICORACÉES.

Hieracium L. — *Epervière*.

H. UMBELLATUM L. — *E. EN OMBELLE*. ♀. Juillet-septembre. C. Bois, buissons, coteaux.

Var. *b. grandiflorum* Bréb. — AC.

Var. *c. hirtum* Nob. — Involucre hérissé de poils nombreux, noirs à la base, blanchâtres au sommet; la plupart glandulifères. Par le caractère qui la distingue, cette variété se rapproche des *H. INSUETUM* et *CUSPIDATUM* Jord. — TR. Croît avec le type sur les coteaux de Née, à VIRANDEVILLE.

Cette espèce varie beaucoup dans son mode d'inflorescence et dans la forme de ses feuilles.

H. BOREALE Fries. — *E. DU NORD*. — *H. sylvestre* Tausch. ♀. Juillet-septembre. TR. Bruyères du Culpereux, à TOURLAVILLE.

H. SYLVATICUM Lamk. — *E. DES BOIS*. — *H. vulgatum* Fries. ♀. Juin-août. R. Lisières des bois, haies. TOURLAVILLE:

hameau des Champs, la Glacerie, les Traines, environs de la Boissaie, vallée du Trottebec, Roche-au-Chat. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD: vallon des Roches-Martin. TOLLEVAST: environs de la route de Valognes, coteaux d'Ombre.

H. AURICULA L. — *E. AURICULE*. — *H. Lactucella* Wallr. ♀. Juin-septembre. R. Pelouses, prés, bords des chemins. OCTEVILLE: vallée de la Divette. TOLLEVAST: environs des Jouannes, etc. LE MESNIL-AU-VAL: landes de la Saire, chemin de Saussemesnil. — SURTAINVILLE: vallée de la Scie, bois de la Baronnerie et de la Poupardière.

Var. *b. stoloniflorum* Monn. — TR. LE MESNIL-AU-VAL: chemin de Saussemesnil.

Var. *c. monocalathidum* Monn. — R. OCTEVILLE: vallée de la Divette. TOURLAVILLE: vallon de la Roche-au-Chat. LE MESNIL-AU-VAL. TOLLEVAST. — SURTAINVILLE: bois et vallon de la Baronnerie.

H. PILOSELLA L. — *E. PILOSELLE*. — (*Oreille de Rat*.) ♀. Mai-août. AC. Coteaux arides, pelouses, bords des chemins, murs.

Var. *b. flagellare* Monn. — COUVILLE.

Var. *c. hirsutum* Monn. — PC.

***Crepis* L. — *Crépide*.**

C. POLYMORPHA Wallr. — *C. VARIABLE*. ☉. Juin-octobre. Prés, champs, chemins, murs, pelouses.

Var. *a. C. virens* Dc. — C.

Var. *b. C. diffusa* Dc. — TC.

Var. *c. C. stricta* Dc. — PC.

C. BIENNIS L. — *C. BISANNUELLE*. ☉. Juin, Juillet. RRR. CHERBOURG: remparts du port militaire.

C. TARAXACIFOLIA Thuill. — *C. A FEUILLES DE PISSENLIT*. — *Barkhausia taraxacifolia* Dc. ②. Mai-juillet. C. Champs, prairies, bords des chemins, murs.

***Taraxacum* Juss. — *Pissenlit*.**

T. DENS-LEONIS Desf. — *P. DENT DE LION*. — *T. officinale* Wigg. — *Leontodon Taraxacum* L. 4. Mars-octobre. TC. Partout.

Var. *b. T. lævigatum* Dc. — AC. Pelouses, coteaux, bords des chemins, murs.

Var. *c. T. erythrospermum* Andr. — PC. Mêmes stations.

Var. *d. T. udum* Jord. — AR. Prés marécageux. CHERBOURG. — QUERQUEVILLE. — TONNEVILLE. NACQUEVILLE. URVILLE-HAGUE. ECULLEVILLE. VAUVILLE.

Plante amère, tonique, mangée en salade.

Il est étonnant que M. Le Jolis, qui recherche avec tant d'ardeur les espèces de création récente, n'ait pas observé le *Taraxacum udum* Jord. dans notre arrondissement et que, dans sa liste, il ne l'indique que comme trouvé près de Valognes par M. le docteur Lebel.

T. PALUSTRE Dc. — *P. DES MARAIS*. — *Leontodon palustre* Sm. — *Hedypnois paludosa* Scop. 4. Avril-juin. AR. Prés très humides. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. ÉQUEURDREVILLE. QUERQUEVILLE. MARTINVAST. TEURTHÉVILLE-HAGUE. — MAUPERTUS. GONNEVILLE. GOUBERVILLE. — BEAUMONT. TONNEVILLE. SAINTE-CROIX-HAGUE. BRANVILLE. NACQUEVILLE. GRÉVILLE. ÉCULLEVILLE. HERQUEVILLE. — HÉAUVILLE. FLAMANVILLE.

Var. *b. T. lanceolatum* Poir. — Mare de TOURLAVILLE.

***Lactuca* L. — *Laitue*.**

L. MURALIS Fres. — *L. DES MURS*. — *Prenanthes muralis* L. — *Chondrilla muralis* Lamk. — *Phœnixopus muralis*

Koch. ☉. Juin-août. PC. Haies et chemins ombragés, vieux murs.

L. VIROSA L. — *L. VIREUSE*. ☉. Juillet, août. RRR. CHERBOURG: vieux murs au Cauchin.

On trouve quelquefois le *LACTUCA SATIVA* L. à l'état subspontané près des jardins.

***Sonchus* L. — *Laitron*.**

S. LÆVIS Vill. — *L. LISSE*. — *S. ciliatus* Lamk. — *S. oleaceus* L. var. ☉. Juin-octobre. TC. Lieux cultivés.

Var. *b.* *S. lacerus* Willd. — C.

S. ASPER Vill. — *L. APRE*. — *S. spinosus* Lamk. — *S. oleaceus* L. var. ☉. Juin-octobre. C. Lieux cultivés.

S. ARVENSIS L. — *L. DES CHAMPS*. ♀. Juin-septembre. C. Champs, talus des fossés argileux.

***Picris* Juss. — *Picride*.**

P. HIERACIOIDES L. — *P. ÉPERVIÈRE*. ☉. Juin-octobre. R. Falaises de GRÉVILLE. — Champs des coteaux calcaires de SURTAINVILLE et de SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD.

***Helminthia* Juss. — *Helminthie*.**

II. ECHIOIDES Gærtn. — *H. VIPÉRINE*. — *Picris echioïdes* L. ☉. Juin-octobre. AR. Bords des champs et des chemins, talus des fossés, pied des murs, dans la région maritime. — CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. ÉQUEURDEVILLE. QUERQUEVILLE. — GATTEVILLE. — BEAUMONT. VAUVILLE. — LES PIEUX. SURTAINVILLE. R. à l'intérieur: vallée et coteaux calcaires de la Seie, à PIERREVILLE et à SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD.

Scorzonera L. — Scorzonère.

S. PLANTAGINEA Bor. — S. PLANTAIN. — S. humilis L.
¶. Mai-juillet. AC. Près humides, bruyères et bois marécageux.

Var. *b. subacaulis* Nob. — BRILLEVAST: bois de Blanqueville.

Var. *c. linearifolia* Bréb. — R. CHERBOURG: le Maupas. —
TEURTHÉVILLE-HAGUE: vallée de la Marvie. TOLLEVAST: source de
l'Ouve. — VAUVILLE: vallon de Claire-Fontaine.

Var. *d. ramosa* Bréb. — SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD et HARDINVAST:
vallée de l'Ouve. TOLLEVAST: bord du Gallot. — LE THEIL:
vallée de la Saire. — OMONVILLE-LA-PETITE. — SURTAINVILLE:
vallée de la Scie.

La racine et les jeunes pousses de la Scorzonère sont comestibles.

Tragopogon Tourn. — Salsifis.

T. MAJOR Jacq. — S. A GROS PÉDONCULE. ②. Juin-août.
RRR. Talus des fossés dans les mielles de BIVILLE.

T. ORIENTALIS L. — S. D'ORIENT. ②. Mai-septembre. TR.
CHERBOURG: remparts et fossés du port militaire.

C'est à tort que M. Le Jolis considère cette plante comme intro-
duite, attendu qu'elle croît sur plusieurs autres points en Normandie.

T. PORRIFOLIUS L. — S. A FEUILLES DE POIREAU. ②.
Juin, juillet. TR. Gare du chemin de fer à CHERBOURG. — Cime-
tière d'ANGOVILLE. — Parc de FLAMANVILLE. — Spont. ?

Cette plante est cultivée dans les jardins potagers pour sa racine
alimentaire, connue sous le nom vulgaire de *Sersifs*.

Leontodon L. — Liondent.

L. AUTUMNALIS L. — L. D'AUTOMNE. — *Apargia au-*

tumnalis Willd. — *Oporinia autumnalis* Don. ¼. Juillet - novembre. TC. Prés, chemins, lieux incultes.

Var. *b. villosus* Bréb. — *L. pratensis* Rehb. — PC.

Var. *c. simplex* Dub. — AC.

Var. *d. linearifolius* Bréb. — PC.

***Thrinicia* Roth. — *Thrinicie*.**

T. HIRTA Roth. — *T. HÉRISSEÉ*. — *Leontodon hirtus* L. ¼. Juillet-octobre. TC. Lieux arides et sablonneux, chemins.

Var. *b. cinerea* Bréb. — AC.

Var. *c. arenaria* De. — C. Sables maritimes.

***Hypochaeris* L. — *Porcelle*.**

H. RADICATA L. — *P. ENRACINÉE*. ½. Juin-novembre. TC. Prés, bords des chemins.

H. GLABRA L. — *P. GLABRE*. ¼. Juin-août. R. Falaises et coteaux maritimes de l'Ouest de l'arrondissement.

Var. *b. minor* Dub. — R. Mêmes stations.

***Cichorium* Tourn. — *Chicorée*.**

C. INTYBUS L. — *C. SAUVAGE*. ¼ RRR. Lieux incultes. QUERQUEVILLE.

Plante comestible, amère et tonique.

Le C. ENDIVIA L., qui présente plusieurs variétés cultivées comme alimentaires, est quelquefois subspontané dans le voisinage des jardins.

***Lapsana* L. — *Lampsane*.**

L. COMMUNIS L. — *L. COMMUNE*. — *Lampsana communis* Lamk. ☉. Juin-novembre. TC. Lieux cultivés.

Tribu des CYNAROCÉPHALES.

***Serratula* L. — *Sarrette*.**

S. TINCTORIA L. — S. DES TEINTURIERS. — *Carduus tinctorius* Scop. 4. Juillet, août. TR. Bois du Doux-Riant, à MAUPERTUS. — Falaises de GRÉVILLE.

Pourquoi, sans avoir suffisamment exploré l'arrondissement, M. Le Jolis s'est-il hâté d'affirmer que cette plante n'y croit que dans les falaises de Gréville?

***Lappa* Tourn. — *Bardane*.**

L. PUBENS Bor. — B. PUBESCENTE. — *Arctium pubens* Babingt. ②. Juillet, août. AC. Décombres, bords des chemins.

Cette espèce a été prise longtemps chez nous pour le LAPPA TOMENTOSA Lamk.

L. MAJOR Dc. — B. A GROSSES TÊTES. — *Arctium Lappa* L. part. ②. Juillet, août. RRR. CHERBOURG: environs du port militaire.

On a encore besoin de nouvelles recherches pour s'assurer si le véritable LAPPA MINOR Dc. existe dans notre arrondissement.

Les plantes de ce genre sont connues sous les noms de *Glouteron*, *Gloutonnier*; leurs racines et leurs feuilles sont sudorifiques et dépuratives.

***Cirsium* Tourn. — *Cirse*.**

C. ARVENSE Lamk. — C. DES CHAMPS. — *Carduus arvensis* Curt. — *Serratula arvensis* L. (*Chardon hémorrhoidal*.) 4. Juin-août TC. Champs incultes, chemins, talus des fossés.

Var. *b. mite* Koch. PC.

Ce CIRSE se trouve quelquefois à fleur blanche,

C. ACAULE All. — *C. NAIN*. — *C. Allionii* Spenn. — *Carduus acaulis* L. ④. Juillet-octobre. R. Pelouses et coteaux maritimes, mielles. TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE. — VAUVILLE. BIVILLE. VASTEVILLE. — SURTAINVILLE.

Var. *b. caulescens* Dc. — R. Mêmes stations.

C. ANGLICUM Dc. — *C. D'ANGLETERRE*. — *Carduus Anglicus* Lamk. — *Carduus pratensis* Huds. ④. Mai-août. PC. Prés et bois très humides, marécages.

C. PALUSTRE Scop. — *C. DES MARAIS*. — *Carduus palustris* L. — *Cnicus palustris* Hoffm. ②. Juillet-septembre. TC. Prés, bois, chemins humides.

Var. *b. albiflorum*. — AC.

C. LANCEOLATUM Scop. — *C. LANCÉOLÉ*. — *Carduus lanceolatus* L. — *Eriolepis lanceolata* Cass. ② Juin-septembre. TC. Lieux incultes, chemins.

***Carduus* Gærtn. — Chardon.**

C. NUTANS L. — *C. PENCHÉ*. ②. Juin-septembre. Lieux pierreux ou sablonneux, chemins et talus des fossés. AC. dans la région maritime. AR. à l'intérieur.

C'est à tort que M. Le Jolis dit que cette plante croît exclusivement dans les sables maritimes.

Var. *b. simplex* Bor. — Ça et là avec le type.

C. TENUIFLORUS Sm. — *C. A PETITES FLEURS*. — *C. microcephalus* Gaud. ②. Mai-septembre. Mêmes stations que le précédent. C. dans la région maritime. PC. à l'intérieur.

Var. *b. albiflorus*. — R. QUERQUEVILLE. CARNEVILLE.

M. Le Jolis commet pour cette espèce la même erreur que pour la

précédente, en lui attribuant également pour unique station les sables maritimes.

C. ACANTHOIDES. L. — *C. ACANTHE*. ②. Juin-octobre. RRR. Redoute et cimetière de QUERQUEVILLE.

***Onopordum* L. — *Onoporde*.**

O. ACANTHIUM L. — *O. ACANTHE*. ②. Juillet-septembre. RRR. CHERBOURG : environs du port militaire. — QUERQUEVILLE : plaine du Polygone.

***Silybum* Vaill. — *Silybe*.**

S. MARIANUM Gärtn. — *S. CHARDON-MARIE*. — *S. maculatum* Mœnch. — *Carduus Marianus* L. ② Mai-juillet. R. CHERBOURG : environs de la gare. — EQUEURDREVILLE : champs du littoral. — LES PIEUX : chemin du Rozel, environs de la Bretonnerie. TRÉAUVILLE : Mont Saint-Gilles. FLAMANVILLE : Diélette.

On ignore sur quels motifs se fonde M. Le Jolis pour douter de l'indigénat de cette plante.

***Centaurea* L. — *Centaurée*.**

C. NIGRA. — *C. NOIRE*. (*Tétards, Bourdonnière, Hane, Hanon*.) ④. Juin-octobre. TC. Prés, coteaux, bois, bords des chemins et des champs.

Var. *a. flosculosa*. — *C. nigra* Auct.

Var. *b. radiata*. — *C. nigrescens* Auct.

Les formes que cette Centaurée présente chez nous, et que nous avons réunies dans ces deux variétés, n'ont pas encore été assez étudiées pour qu'on puisse y reconnaître quelques-unes des espèces nouvellement créées.

C. CYANUS L. — *C. Bleuët.* — *Cyanus vulgaris* Cass. — *Jacea segetum* Lamk. — (*Bluets.*) ☉. Juin-août. PC. Moissons.

C. SCABIOSAL. — *C. SCABIEUSE.* — *Jacea Scabiosa* Lamk. 24. Juillet-septembre. RRR. OCTEVILLE: bords d'un champ près l'ancien télégraphe de la Fauconnière.

C. CALCITRAPA L. — *C. CHAUSSE-TRAPE.* — *Calcitrapa stellata* Cass. — (*Chardon étoilé.*) ②. Juillet-septembre. TR. CHERBOURG: environs de l'hôpital maritime, Chantereyne, chemin de Haut-Marais au Maupas. — GATTEVILLE: environs de l'église. — LES PIEUX et LE ROZEL: chemins et lieux incultes du littoral. SURTAINVILLE: les carrières calcaires, environs de l'église, ferme de Guinfard.

Il est surprenant que M. Le Jolis n'ait pas vu cette espèce dans des localités qu'il devrait avoir bien explorées.

Le CENTAUREA MONTANA L. est naturalisé dans le bois des Varendes, sur Hainneville.

***Carlina* Tourn. — *Carlina*.**

C. VULGARIS L. — *C. VULGAIRE.* ②. Juin-septembre. AC. Lieux arides, coteaux secs, mielles.

Tribu des CORYMBIFÈRES.

***Senecio* Less. — *Senecion*.**

S. VULGARIS L. — *S. COMMUN.* — (*Serançon, herbe à la chardronnette.*) ☉. Toute l'année. TC. Partout.

Var. *b. radiatus* Koch. — R. Mielles de VAUVILLE et de BIVILLE.

S. SYLVATICUS L. — *S. DES BOIS.* ☉. Juillet-septembre. AC. Coteaux, lieux secs, bois pierreux.

S. AQUATICUS Huds. — *S. AQUATIQUE.* ② Juillet-septembre. RRR. Mares de TOURLAVILLE et de VAUVILLE.

S. ERRATICUS Bert. — *S. DIVARIQUÉ*. — *S. barbareaefolius* Krock. ☉. Juillet, août. R. BEAUMONT: la Rue. OMONVILLE-LA-ROGUE: la rivière. DIGULLEVILLE: fossés maritimes, rivière Sainte-Hélène, OMONVILLE-LA-PETITE: même rivière. SAINT-GERMAIN-DESLAUX: rue de Bas. VAUVILLE: la mare. — LES PIEUX: la Bretonnerie. PIERREVILLE: vallée de la Seie.

S. JACOBÆAL. — *S. JACOBÉE*. — (*Herbe Saint-Jacques.*) ☿. Juin-septembre. C. Prés, bords des chemins, haies, lieux pierreux.

S. SPATULÆFOLIUS Dc. — *S. A FEUILLES SPATULÉES*. — *S. campestris* Bab. — *Cineraria spatulæfolia* Gm. — *C. integrifolia* With. — *C. campestris* Auct. non Retz. — *Tephrosieris spatulæfolia* Bor. ☿. Mai, juin. TR. Falaises de GRÉVILLE.

Quoique M. Le Jolis, nous le pensons du moins, ait exploré avec soin les falaises de Gréville, cette belle plante lui a échappé. Nous n'en ferions pas ici la remarque, si, en rappelant, dans une des notes de sa liste, qu'elle se trouve sur les calcaires du Cotentin, il ne faisait pas croire à tort qu'elle est étrangère à la flore des environs de Cherbourg.

Le *CALENDULA OFFICINALIS* L. se trouve quelquefois subspontané, échappé des jardins.

Doronicum* Tourn. — *Doronic.

D. PARDALIANCHES L. — *D. MORT-AUX-PANTHÈRES*. ☿. Mai-juil. TR. CHERBOURG: le Cauchin. — OCTEVILLE: le Val. TOURLAVILLE: le Roule. MARTINVAST: bois du château.

Si M. Le Jolis ne considère pas cette plante comme indigène dans notre arrondissement, c'est qu'il ne l'a observée qu'au Cauchin, où il la croit échappée de l'ancien jardin de M. Fréret.

Filago* L. — *Cotonnière.

F. GERMANICA L. — *C. D'ALLEMAGNE*. — *F. canescens* Jord. — *Gnaphalium Germanicum* Huds. — (*Herbe à coton.*)

☉. Juin-septembre. C. Lieux secs ou pierreux, talus des fossés, murs.

F. MONTANA L. — C. DE MONTAGNE. — *Gnaphalium montanum* Huds. ☉. Juin-septembre. PC. Lieux pierreux, coteaux arides.

Var. *b. F. minima* Fries. — TR. CHERBOURG: Montagne du Roule.

F. GALLICA L. — C. DE FRANCE. — *Gnaphalium Gallicum* Huds. — *Logfia subulata* Cass. — *L. Gallica* Coss. et Germ. ☉. Juillet-septembre. R. CHERBOURG: terres remuées du chemin de fer du port, près Tivoli. — OCTEVILLE et EQUEURDREVILLE: carrières des Fourches et des Entes. — SAINT-PIERRE-ÉGLISE: vallon de Hacouville. COSQUEVILLE: ferme de Renouville. ANGOVILLE: champ du plateau des Mouterres.

***Gnaphalium* L. — *Gnaphale*.**

G. LUTEO-ALBUM L. — G. JAUNATRE. ☉. Août, septembre. R. Lieux sablonneux un peu humides. TOURLAVILLE: les Flamands, environs du Beequet. DIGOSVILLE: le Beequet. — GATTEVILLE: environs de l'église, chemins du havre de Crabec et de l'église à Imbranville. — VAUVILLE: les mielles près de la mare. BIVILLE: les mielles. — LES PIEUX: mielles de Sciotot. FLAMANDVILLE: bois du château. SURTAINVILLE: les mielles, hameau Pouchin.

Var. *b. prostratum* Bréb. TR. VAUVILLE: les mielles près de la mare.

G. SYLVATICUM L. — G. DES BOIS. — *G. rectum* Sm. ♀. Août, septembre. TR. SURTAINVILLE: bois de la Baronnerie.

M. Le Jolis dit qu'il n'a pas trouvé ce *Gnaphalium* dans les limites mêmes de notre arrondissement; c'est sans doute parce qu'il n'en a pas exploré avec tout le soin qu'elle mérite la partie du Sud-Ouest, qui est si riche en plantes spéciales.

G. ULIGINOSUM L. — *G. FANGEUX*. — *G. ramosum* Lamk.

☉. Juillet - septembre. C. Fossés, ornières, lieux exondés.

Le GNAPHALIUM UNDULATUM L., complètement naturalisé, croît à Cherbourg, dans les environs du port militaire et à la Bucaille; à Octeville et à Equeurdreville, dans les carrières des Fourches et des Entes. On le trouve également dans les bois du château de Flamanville. Le G. FÆTIDUM L. semble avoir disparu de la lande de Gofontaine, à Tocqueville, où nous nous sommes assurés qu'il était autrefois naturalisé. Enfin le G. MARGARITACEUM L. a aussi été indiqué comme naturalisé à la Fauconnière, près de Cherbourg.

Les espèces des genres *Filago* et *Gnaphalium* sont en général connues sous le nom d'*Immortelles*.

***Tanacetum* L. — Tanaisie.**

T. VULGARE L. — *T. COMMUNE*. — (*Poudre à vers.*) ☿. Août, septembre. AR. Bords des chemins, talus des fossés, haies. CHERBOURG. — OCTEVILLE. QUERQUEVILLE. MARTINAST. TEURTHÉVILLE-HAGUE. VIRANDEVILLE. COUVILLE. — GATTEVILLE. — TONNEVILLE. BIVILLE. — SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC. SOTTEVILLE.

Plante très-usitée comme vermifuge, amère et tonique.

Le SANTOLINA CHAMÆCYPARISSUS L., cultivé quelquefois dans les jardins, ne peut pas même être considéré comme subspontané.

***Artemisia* L. — Armoise.**

A. VULGARIS L. — *A. COMMUNE*. — (*Herbe Saint-Jean*). ☿. Juillet-septembre. C. Lieux incultes, talus des fossés, haies, bords des champs.

Plante éminemment tonique, emménagogue.

A. ABSINTHIUM L. — *A. ABSINTHE*. — *Absinthium vulgare* Gærtn. ☿. Juillet, août. — Lieux pierreux, bords des chemins, talus des fossés, surtout dans la région maritime. C. dans le canton de Saint-Pierre-Église. SAINT-PIERRE. MAUPERTUS. FERMANVILLE, Cos-

QUEVILLE. TOCQUEVILLE. ANGOVILLE. VRASVILLE. RÉTHOVILLE. NÉVILLE. GOUBERVILLE. GATTEVILLE. Moins commune ou même assez rare dans les autres cantons. CHERBOURG. — OCTEVILLE. QUERQUEVILLE. — OMONVILLE-LA-ROGUE. DIGULLEVILLE. — SIOUVILLE. TRÉAUVILLE. FLAMANVILLE. LE ROZEL.

Très-employée comme tonique et vermifuge.

***Chrysanthemum* L. — Chrysanthème.**

C. SEGETUM L. — C. DES MOISSONS. — (*Marguerite dorée, Mullu.*) ☉. Juillet-octobre. PC. Champs cultivés, surtout dans les terrains argileux.

C. LEUCANTHEMUM L. — C. LEUCANTHÈME. — *Leucanthemum vulgare* Lamk. — (*Grande Marguerite, Grande Pâquerette, Amauroque, Mullu blanc.*) ☿. Mai-août. TC. Prés, pâturages, bords des champs, talus des fossés, coteaux.

Var. *b. uniflorum* Bréb. — R. SURTAINVILLE: bois de la Baronnerie.

C. PARTHENIUM Pers. — C. MATRICAIRE. — *Pyrethrum Parthenium* Sm. — *Matricaria Parthenium* L. — *Leucanthemum Parthenium* Gr. et Godr. ☿. Juin-août. AR. Lieux pierreux, murs, près des habitations. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. ÉQUEURDEVILLE. QUERQUEVILLE. DIGOSVILLE. — NÉVILLE. GATTEVILLE. — BEAUMONT. NACQUEVILLE. AUDERVILLE.

Plante tonique et emménagogue.

C. INODORUM L. — C. INODORE. — *Pyrethrum inodorum* Sm. — *Matricaria inodora* L. — *Tripleurospermum inodorum* Schultz. ☉. Juillet-octobre. C. Champs.

Var. *b. maritimum* Bréb. — PC. Lieux incultes maritimes.

C. MARITIMUM Pers. — *C. MARITIME*. — *Pyrethrum maritimum* Sm. — *Matricaria maritima* L. — *Tripleurospermum maritimum* Koch. ☉. Juillet-octobre. TR. CHERBOURG: littoral de l'Est. — QUERQUEVILLE: environs du fort. — SAINT-GERMAIN-DES-VAUX: graviers maritimes.

Le CHRYSANTHEMUM CORONARIUM L. se rencontre très rarement à l'état subspontané. QUERQUEVILLE.

***Matricaria* L. — *Matricaire*.**

M. CHAMOMILLA L. — *M. CAMOMILLE*. — *Chamomilla officinalis* C. Koch. ☉. Juin-août. AC. Champs et talus des fossés, presque exclusivement dans la région maritime.

Var. *b. M. suaveolens* L. — AC. Mêmes stations.

Plante tonique et aromatique.

***Diotis* Desf. — *Diotis*.**

D. CANDIDISSIMA Desf. — *D. COTONNEUSE*. — *D. maritima* Cass. — *Athanasia maritima* L. — *Otanthus maritimus* Link et Hoffm. — *Santolina maritima* Sm. — (*Immortelle maritime, herbe blanche.*) ♀. Juillet-septembre. AR. Sables et graviers maritimes. TOURLAVILLE. — FERNANVILLE. COSQUEVILLE. VRASVILLE. RÉTHOVILLE. NÉVILLE. GOUBERVILLE. GATTEVILLE. — VAUVILLE. — LES PIEUX. SIOUVILLE. LE ROZEL. SURTAINVILLE.

***Achillea* L. — *Achillée*.**

A. MILLEFOLIUM L. — *A. MILLEFEUILLE*. — (*Herbe au Charpentier.*) ♀. Juin-octobre. TC. Lieux inéultes, bords des chemins, talus des fossés.

Var. *b. rubella*. — AC.

Var. *c. purpurea*. — P.C.

Plante vulnérable, très emménagogue.

***Anthemis* L. — Camomille.**

A. NOBILIS L. — C. NOBLE. — *A. odorata* Lamk. — *Chamomilla nobilis* Gr. et God. — *Ormenis nobilis* Gay. — (*Camomille romaine*.) ♀ Juin-septembre. C. Pâturages secs, coteaux, pelouses, landes et bruyères.

Plante éminemment aromatique et tonique.

A. COTULA L. — C. FÉTIDE. — *A. foetida* Lamk. — *Maruta Cotula* De. — *Chamæmelum Cotula* All. — (*Maroute*.) ☉. Juin-septembre. C. Champs.

***Bidens* L. — Bident.**

B. TRIPARTITA L. — B. TRIFIDE. — *B. cannabina* Lamk. (*Chanvre d'eau*). ☉. Juillet-septembre. AR. Lieux humides, fossés. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. COUVILLE. LE MESNIL-AU-VAL. — SAINT-PIERRE-ÉGLISE. COSQUEVILLE. NÉVILLE. GATTEVILLE. — ACQUEVILLE. SAINT-GERMAIN-DES-VAUX. VAUVILLE. -- LES PIEUX. HELLEVILLE. SOTTEVILLE. BRICQUEBOS. GROSVILLE. BENOISTVILLE. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD. PIERREVILLE.

B. CERNUA L. — B. PENCHÉE. ☉. Juillet-septembre. AR. Fossés. lieux marécageux. TOURLAVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. COUVILLE. LE MESNIL-AU-VAL. — SAINT-PIERRE-ÉGLISE. GONNEVILLE. VRASVILLE. GOUBERVILLE. GATTEVILLE. — OMONVILLE-LA-ROQUE. DIGULLEVILLE. ACQUEVILLE. VASTEVILLE. VAUVILLE.

Ces deux plantes donnent une teinture jaune aurore assez solide.

***Inula* L. — Inule.**

H. HELENII L. — I. AUNÉE. — *Aster Helenium* Scop. — *Corvisartia Helenium* Mér. — (*Enula campana*). ♀. Juillet-septembre. TR. Bords des champs, talus des fossés. CHERBOURG :

environs du port militaire. — OCTEVILLE: environs de Saint-Sauveur. TEURTHÉVILLE-HAGUE: la Moutonnerie, hamel-ès-Coutours. — LES PIÉUX: route de Barnéville. BENOISTVILLE: route des Pieux.

Cette plante jouissait jadis d'une grande réputation comme tonique.

I. CRITHMOIDES L. — *I. PERCE-PIERRE*. — *Senecio crithmifolius* Scop. — *Limbarda tricuspis* Cass. ☿. Juillet - septembre. R. Rochers maritimes, falaises de l'Ouest de l'arrondissement. AUDERVILLE. JOBOURG. HERQUEVILLE. — LES PIEUX. FLAMANVILLE.

I. CONYZA De. — *I. CONYZE*. — *Conyza squarrosa* L. — *C. vulgaris* Lamk. ☉. Août-octobre. R. Lieux arides et pierreux, bords des chemins et des champs. — OCTEVILLE. ÉQUEURDREVILLE. HAINNEVILLE. VIRANDEVILLE. TOLLEVAST. — BEAUMONT. JOBOURG. HERQUEVILLE. VAUVILLE. — LES PIEUX. TRÉAUVILLE. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD. SURTAINVILLE.

I. PULICARIA L. — *I. PULICAIRE*. — *Pulicaria vulgaris* Gärtn. — *Aster pulicarius* All. — (*Herbe aux Puces*.) ☉. Juillet-septembre. R. Lieux exondés, chemins humides, bords des mares, des étangs. TOURLAVILLE: hameau Quiévâtre, ancien lit du Trottebec. TEURTHÉVILLE-HAGUE: le Poutrel. — SAINT-PIERRE-ÉGLISE: étang de Hacouville. TOCQUEVILLE: région du Nord-Est, lande de Gofontaine. COSQUEVILLE: chemin d'Angoville. NÉVILLE: Herclat, environs de l'église. GOUBERVILLE: ruisseau de Herclat. GATTEVILLE: environs du village, chemins de l'église au havre de Crabec et à Imbranville. — HELLEVILLE: Étoupeville.

I. DYSENTERICA L. — *I. DYSENTÉRIQUE*. — *Pulicaria dysenterica* Gärtn. — *Aster dysentericus* All. — (*Herbe Saint-Roch, Mullu*.) ☿. Juillet-octobre. C. Lieux incultes un peu humides.

***Solidago* L. — *Solidage*.**

S. VIRGA-AUREA L. — S. VERGE-D'OR. 2. Juillet-octobre.
C. Bois et bruyères.

Var. *b. ampla* Bréb. — AC.

Le *SOLIDAGO CANADENSIS* L. se trouve parfois à l'état subspontané.

***Bellis* L. — *Pâquerette*.**

B. PERENNIS L. — P. VIVACE. — (*Pâquette, Petite-Marguerite*.) 2. Toute l'année. TC. Presque partout.

Var. *b. brevi-radiata* Bréb. — PC. Pelouses rases, mielles.

***Erigeron* L. — *Vergerette*.**

E. ACRIS. L. — V. ACRE. 2. Juin-octobre. R. CHERBOURG : remparts du port militaire. — OCTEVILLE : fort des Fourches, la Jouannerie. EQUEURDEVILLE : murs dans le village. QUERQUEVILLE : environs du château, le fort, les mielles. — BIVILLE : les mielles, coleaux de Bival. — SURTAINVILLE : les mielles.

Var. *b. E. serotinus* Weihe. — TR. Redoute de TOURLAVILLE.

***Aster* L. — *Aster*.**

A. TRIFOLIUM L. — A. TRIPOLIUM. — *Tripolium vulgare* Nees. — (*Aster maritime*.) 2. Août-octobre. TR. TOURLAVILLE : la mare. -- GATTEVILLE : lieux aquatiques du littoral de l'Est, Crabec.

***Tussilago* L. — *Tussilage*.**

T. FARFARA L. — T. PAS-D'ANE. — *Tussilago vulgaris* Lamk. 2. Mars, avril. AC. Champs humides, bords des chemins, terrains argileux.

Plante béchique, très usitée.

T. PETASITES L. — *T. PÉTASITE*. — *Petasites, vulgaris* Desf. — *P. officinalis* Moench. ☿. Mars, avril. TR. FLAMANVILLE : environs du couvent.

M. Le Jolis ignore que cette plante existe dans notre arrondissement, puisque, dans sa liste, il dit seulement à son sujet que M. le docteur Lebel la lui a fait récolter à Valognes.

Le TUSSILAGO SUAVEOLENS Desf. (*Nardosmia fragrans* Rehb.) connu sous le nom vulgaire d'*héliotrope d'hiver*, est complètement naturalisé dans un grand nombre de localités.

***Eupatorium* Tourn. — *Eupatoire*.**

E. CANNABINUM L. — *E. CHANVRINE*. ☿. Juillet-septembre. C. Bords des eaux, fossés, taillis humides.

AMBROSIACÉES. — Nous avons trouvé à Cherbourg, dans la cour de l'entrepôt des Douanes, le *XANTHIUM SPINOSUM* L., dont les graines avaient été sans nul doute apportées avec les marchandises.

LOBÉLIACÉES.

***Lobelia* L. — *Lobélie*.**

L. URENS L. — *L. BRULANTE*. ☿. Juin-août. R. Landes et bruyères marécageuses, prés tourbeux. MARTINVEST : marécages du Doyviet, prairies du château. COUVILLE : vallon du Tocquebœuf, route de Valognes à la Hague. HARDINVEST : vallée de l'Ouve. LE MESNIL-AU-VAL : marécages du Culpéreux. — SOTTEVILLE et BRICQUEBOSQ : environs de la ferme du Bouillon.

Plante vénéneuse.

CAMPANULACÉES.

***Jasione* L. — *Jasione*.**

J. MONTANA L. — *J. DES MONTAGNES*. — *J. undulata* Lamk. (*Fausse Scabieuse*.) ②. Juin-septembre. C. Coteaux arides, haies sèches.

Var. *b. albiflora*. — R. SAINTE-CROIX-HAGUE. — FERMANVILLE.

Var. *c. littoralis* Koch. — *Maritima* Ll. — Bréb. R. AUDERVILLE: environs du havre de Goury. BIVILLE: les dunes. — Falaises de FLAMANVILLE et du ROZEL.

***Wahlenbergia* Schrad. — *Wahlenbergie*.**

W. HEDERACEA Rehb. — *IV. A FEUILLES DE LIERRE*. — *Campanula hederacea* L. ④. Juin-août. C. Bois marécageux, prés ombragés, bords des ruisseaux, haies et pelouses humides.

C'est à tort que M. Le Jolis considère cette charmante espèce comme plus abondante dans le sud de l'arrondissement que dans ses autres parties.

***Phyteuma* L. — *Raiponce*.**

P. SPICATUM L. — R. EN ÉPI. — (*Épi à la Vierge*.) ④. Mai-juillet. R. Bords des bois et chemins très ombragés. CHERBOURG: taillis Sud de la Montagne du Roule. — OCTEVILLE: la Prévalerie, coteaux de Quincampoix, vallée de la Divette, vallon de la Jouannerie, le Loup-Pendu. TOURLAVILLE: la Loge, coteaux de la Divette, vallée de Quincampoix. MARTINVAST: vallée et coteaux boisés de la Divette. — MAUPERTUS: bois du Doux-Riant.

***Campanula* L. — *Campanule*.**

C. RAPUNCULUS L. — *C. RAIPONCE*. ④. Juillet-septembre. R. Haies, murs, bords des champs. CHERBOURG. QUERQUEVILLE.

MARTINVEST. TEURTHÉVILLE-HAGUE. — LE THEIL. THÉVILLE. NÉVILLE.
— LES PIEUX.

Jeunes pousses et racines comestibles.

Contrairement à l'opinion de M. Le Jolis, cette plante doit être regardée comme indigène, attendu qu'elle croît souvent et assez abondamment dans des localités sauvages.

Le CAMPANULA PYRAMIDALIS L., signalé par MM. de Gerville et Delachapelle sur les vieux murs, à Tréauville, est une plante exotique.

***Prismatocarpus* L'Hér. — *Prismatocarpe*.**

P. HYBRIDUS L'Hér. P. HYBRIDE. — *Specularia hybrida* Alph. DC. — *Campanula hybrida* L. ☉. Mai-juillet. TR. Champs des mielles de SURTAINVILLE.

Nous avons découvert cette espèce dans notre arrondissement le 30 juin 1861; elle est donc à rayer de la liste des plantes de l'île de Wight que nous n'avions pas observées dans notre presqu'île (page 224, 1^{er} vol. du Congrès).

DIPSACÉES.

***Dipsacus* Tourn. — *Cardère*.**

D. SYLVESTRIS Mill. — C. SAUVAGE. — D. *Fullonum* L. part. — (*Peignes*.) ☉. Juillet-septembre. AC. Bords des champs, haies, talus des fossés.

***Cephalaria* Schrad. — *Céphalaire*.**

C. PILOSA Gr. et God. — C. POILUE. — *Dipsacus pilosus* L. (*Verge de Pasteur*.) ☉. Juin-août. RRR. CHERBOURG: bords de la Divette. TOURLAVILLE: environs des eaux minérales du Roule.

Malgré sa grande rareté, cette plante est assurément indigène et non introduite.

Scabiosa L. — Scabieuse.

S. ARVENSIS L. — *S. DES CHAMPS*. — *Knautia arvensis* Coult. — *K. communis* God. — *Trichera arvensis* Sehrad. ♀. Juin-septembre. C. Champs, bords des chemins, haies sèches.

Var. *b. pinnatisecta* Coss. et Germ. — AC. Mêmes stations.

Var. *c. integrifolia* Bréb. — *Knautia indivisa* Bor. 3^e éd. — TR. Lieux secs, bords des bois. EQUEURDREVILLE: environs du fortin Sainte-Anne et de la Lande-Misère. — SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD: coteaux calcaires de la Seie.

C'est à tort que M. Le Jolis considère le *S. arvensis* L. comme assez rare et ne croissant chez nous que dans la région littorale.

S. SUCCISA L. — *S. SUCCISE*. — *Succisa pratensis* Mœnch. — (*Mors du Diable*.) ♀. Août-octobre. C. Landes marécageuses, bruyères, prés humides, bois frais.

Var. *b. albiflora*. — CHERBOURG: le Maupas.

VALÉRIANÉES.**Valeriana L. — Valériane.**

V. OFFICINALIS. L. — *V. OFFICINALE*. — (*Herbe aux Coupures*.) ♀. Juin-août. R. OCTEVILLE et TOURLAVILLE: bords de la Divette. TEURINÉVILLE-HAGUE: bords de la même rivière, près de la Nérée. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD: bords de l'Ouve. TOLLEVAULT: bords du Gallot. — LE VAST: bords de la Saire et de ses étangs. — SURTAINVILLE: bords et vallée de la Seie, bois de la Baronnerie.

Plante stimulante, emménagogue, antispasmodique et anti-hystérique.

***Centranthus* DC. — *Centranthe*.**

C. LATIFOLIUS Dufr. — *C. A LARGES FEUILLES*. — *C. ruber* DC. — *Valeriana rubra* L. part. — (*Behen rouge, Lilas des murs.*) ☿. Juin-septembre. AR. Murs, carrières. CHERBOURG. — OCTEVILLE. EQUEURDREVILLE. HAINNEVILLE. MARTINVAST. SIDEVILLE. — SAINT-PIERRE-ÉGLISE. MAUPERTUS. — DIGULLEVILLE. OMONVILLE-LA-PETITE. — LES PIEUX. SOTTEVILLE. FLAMANTVILLE. LE ROZEL. SURTAINVILLE.

Cette plante présente trois variétés de couleur dans ses fleurs, qui sont rouges, roses ou blanches.

***Valerianella* Mœnch. — *Valérianelle*.**

V. OLITORIA Mœnch. — *V. POTAGÈRE*. — *Fedia olitoria* Vahl. — *Valeriana locusta* var. *a.* L. ☉. Avril-juin. PC. Lieux cultivés.

V. CARINATA Lois. — *V. CARÉNÉE*. — *Fedia carinata* Stev. ☉. Avril-juin. TC. Lieux cultivés, murs.

V. AURICULA DC. — *V. A OREILLETTE*. — *Fedia auricula* Mert. et Koch. — *Valeriana locusta* var. *d.* L. ☉. Mai-juillet. R. Moissons. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. SIDEVILLE. — BIVILLE. — SURTAINVILLE.

V. MORISONII DC. — *V. DE MORISON*. — *V. dentata* Soyer-Willm.-Bab. — *Fedia dentata* Wallr. ☉. Juin-août. C. Moissons.

Var. *b.* **V. mixta** Dub. — *Fedia mixta* Vahl. — AC.

C'est à tort que M. Le Jolis considère le *V. Morisonii* DC. comme rare dans notre arrondissement.

Les plantes de ce genre sont généralement connues sous les noms de *Mêche, Doucette, Bourse, Boursette*, et employées comme salades.

M. Le Jolis est évidemment trop exclusif en ne considérant comme indigène que le *V. carinata* Lois.

CAPRIFOLIACÉES.

***Sambucus* L. — Sureau.**

S. NIGRA L. — *S. NOIR*. — (*Seu.*) 3. Juin, juillet. C. Haies, bords des champs.

Fleurs et écorce usitées en médecine.

S. EBULUS L. — *S. YÈBLE*. 4. Juillet, août. TR. QUERQUEVILLE: bords des champs, sous l'église.

M. Le Jolis n'a pas vu l'Yèble dans cette localité, bien qu'elle borde la route où il passe pour se rendre à sa maison de campagne; c'est sans doute pour ce motif que, le jugeant étranger à notre arrondissement, il a cru devoir, dans une note spéciale, rappeler qu'il l'avait recueilli à Valognes.

***Viburnum* L. — Viorne.**

V. OPULUS L. — *V. OBIER*. 3. Juin, juillet. TR. SURTAINVILLE: haies fraîches, dans la vallée de la Scie.

Le *VIBURNUM TINUS* L. (*Laurier-Tin*) est cultivé dans les jardins, où il est pour ainsi dire naturalisé.

***Lonicera* Desf. — Chêrefeuille.**

L. PERICLYMENUM L. — *C. DES BOIS*. — (*Sucets.*) 3. Juin-octobre. TC. Haies, buissons, bois.

RUBIACÉES.

***Sherardia* L. — Shérarde.**

S. ARVENSIS L. — *S. DES CHAMPS*. ☉. Avril-octobre. C. Lieux cultivés, talus des fossés.

***Asperula* L. — *Aspérule*.**

A. ODORATA L. — *A. ODORANTE*. — (*Petit Muguet*.) 24. Mai, juin. RRR. Bois du ROZEL. Spont. ?

***Galium* L. — *Gaillet*.**

G. CRUCIATA Scop. — *G. CROISETTE*. — *G. cruciatum* With. — *Valantia cruciata* L. 24. Mai, juin. R. Croît dans l'Ouest de l'arrondissement. BIVILLE: coteaux des Guérendes, environs de l'église et du hameau David. VASTEVILLE: vallon de Claire-Fontaine, haies et buissons maritimes. — LES PIEUX, route de Barneville. HÉAUVILLE: route de Vasteville à la mer, coteaux de la Roque. SIOUVILLE: vallée du moulin. TRÉAUVILLE: coteaux de la Diélette. FLAMANVILLE: route des Pieux. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD: route des Pieux à Barneville.

G. VERUM L. — *G. JAUNE*. — (*Caille-lait jaune*.) 2. Juin-septembre. PC. Champs secs, pâturages. Croît surtout dans la région maritime.

Var *b. littorale* Bréb. TC. — Sables maritimes.

Le *GALIMUM DECOLORANS* Gr. et God., qui paraît être un hybride des *G. verum* et *elatum* a été indiqué dans notre arrondissement par le docteur Lebel et M. Le Jolis.

G. SAXATILE L. — *G. DES ROCHERS*. — *G. Hercynicum* Weigg. 24. Juin-août. C. Landes, coteaux, pelouses, lisières et sentiers des bois.

C'est sans nul doute cette plante qui figure dans le catalogue de M. de Gerville sous le nom de *Galium montanum*, et dans la note manuscrite de M. Delachapelle sous celui de *G. lève*.

G. ELATUM Thuill. — *G. ÉLEVÉ*. — *G. Mollugo* L. part. — (*Caille-lait blanc*.) 24. Juillet, août. TC. Haies et buissons.

G. NEGLECTUM Le Gall. — *G. NÉGLIGÉ*. Ȳ. Juin, juillet.
TR. Sables maritimes de l'Ouest de l'arrondissement.

G. PALUSTRE L. — *G. DES MARAIS*. — *G. uliginosum*
Thuill. — Méral (non L.). Ȳ. Mai-juillet. PC. Lieux marécageux
Récemment vanté contre l'épilepsie.

G. ELONGATUM Presl. — *G. ALLONGÉ*. — *G. palustre*.
Thuill. — Méral. (non L.). Ȳ. Juin-août. C. Fossés, bords des eaux.

G. ULIGINOSUM L. — *G. FANGEUX*. — *G. spinulosum*
Méral. Ȳ. Juillet, août. RRR. Mare de TOURLAVILLE.

G. APARINE L. — *G. CRATTERON*. — *Aparine hispida*
Mœnch. ☉. Mai-septembre. TC. Haies, buissons, décombres.

Dicotylédones monopétales hypogynes isandrées.

APOCYNÉES.

Vinca L. — Perrenche.

V. MINOR L. — *P. A PETITE FLEUR*. Ȳ. Mars-juin. AR.
Bois, fourrés, haies. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE.
EQUEURDEVILLE. HAINNEVILLE. MARTINVEST. SEDEVILLE. COUVILLE.
SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD. — LE THEIL. CARNEVILLE. — SAINTE-
CROIX-HAGUE. JOBOURG. — SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC. SOTTEVILLE.
GROSVILLE. FLAMANVILLE.

On en trouve des variétés à fleur blanche et à fleur violette.

V. MAJOR L. — *P. A GRANDE FLEUR*. Ȳ. Mars-mai. R.
Haies près des habitations. Spont. ? CHERBOURG. — OCTEVILLE.

TOURLAVILLE. ÉQUEURDREVILLE. MARTINVAST. HARDINVAST. — GONNEVILLE. TOCQUEVILLE. — NACQUEVILLE. URVILLE-HAGUE. OMONVILLE-LA-ROGUE. — FLAMANVILLE. SURTAINVILLE.

Ces deux plantes sont quelquefois employées comme vulnéraires et astringentes.

GENTIANÉES.

Erythraea Rich. — *Erythrée*.

E. PULCHELLA Fries. — E. ÉLÉGANTE. — E. ramosissima Pers. — *Chironia pulchella* Sw. — *Gentiana Centaurium* var. *b.* L. ☉. Juillet-octobre. R. Pelouses et pâturages humides, lieux mouillés l'hiver. TOURLAVILLE: la mare, chemin de la fonderie au hameau Potier. — GATTEVILLE: vases et marais salés de l'Est. — Mielles de VAUVILLE, de BIVILLE, du ROZEL et de SURTAINVILLE.

Var. *b.* **pusilla** Coss. et Germ. — *Chironia inaperta* Willd. — *Gentiana palustris* Lamk. R. CHERBOURG: environs du Mau-pas, pied nord de la montagne du Roule. — TOURLAVILLE.

E. CENTAURIUM Pers. — E. PETITE CENTAURÉE. — *Chironia Centaurium* Sm. — *Gentiana Centaurium* L. ☉. Juin-août. C. Bords des chemins, pâturages, talus des fossés, coleaux.

Fleurs quelquefois blanches ou carnées.

Var. *b.* **capitata** Rœm. et Schultz. — AR. OCTEVILLE: carrières des Fourches. — Falaises de la HAGUE.

La Petite Centaurée est une plante éminemment tonique, employée comme fébrifuge.

E. DIFFUSA Woods. — E. DIFFUSE. ♀. Juin-septembre. AR. Plante caractéristique de la flore de la Hague, où elle croît

dans les landes et les bruyères, au bord des routes et sur les talus des fossés. BEAUMONT. BRANVILLE. GRÉVILLE. DIGULLEVILLE. OMONVILLE-LA-PETITE. AUDERVILLE. JOBOURG. HERQUEVILLE.

Ce n'est point M. Le Jolis, mais bien M. de Gerville qui le premier, et il y a plus de 50 ans, a observé cette jolie Gentianée dans notre presqu'île, sur les *tumuli* de la Hague.

***Cicendia* Adans. — *Cicendie*.**

C. FILIFORMIS Delarb. — C. *FILIFORME*. — *Exacum filiforme* Willd. — *Gentiana filiformis* L. — *Microcala filiformis* Link. ☉. Juin-septembre. PC. Chemins marécageux, landes humides, bords des ruisseaux.

***Chlora* L. — *Chlore*.**

C. PERFOLIATA L. Mant. — C. *PERFOLIÉE*. — *Gentiana perfoliata* L. Sp. ☉. Juin-septembre. R. Chemins, pâturages, coteaux. CHERBOURG : pied nord et sommet de la montagne du Roule, Hautmarais, le Maupas. — TOURLAVILLE : la Gueretterie, route de Saint-Pierre-Eglise. HARDINVAST : route de Bricquebec. — BIVILLE : vallon et coteaux des Guérendes. VASTEVILLE : environs de Toutfresville. — SURTAINVILLE : vallon de la Mare-du-Chuquet, les carrières calcaires.

M. Delachapelle a indiqué le GENTIANA PNEUMONANTHE L. dans les prairies à Breuville, à peu de distance de la limite de notre arrondissement.

***Menyanthes* Tourn. — *Ményanthe*.**

M. TRIFOLIATA L. — M. *TRÈFLE-D'EAU*. — (*Trèfle des marais, Patte d'oie.*) ♀. Mai-août. PC. Prés tourbeux, marais, bords des eaux.

Plante assez usitée, tonique, emménagogue et antiscorbutique.

CONVOLVULACÉES.

***Convolvulus* L. — *Liseron*.**

C. SEPIUM L. — L. DES HAIES. — *Calystegia sepium*
R. Br. — (*Lignolet, Clochettes, Manchettes de la Vierge.*) ♀
Juin-septembre. C. Haies et buissons.

Racine purgative.

C. SOLDANELLA L. — L. SOLDANELLE. — *Calystegia*
Soldanella R. Br. ♀. Juillet, août. AC. Sables maritimes.

C. ARVENSIS L. — L. DES CHAMPS. — (*Liot, Vrillée,*
Clochettes des champs.) ♀. Juin-septembre. TC. Champs, talus
des fossés, bords des chemins.

***Cuscuta* Tourn. — *Cuscute*.**

C. MINOR DC. — C. A PETITES FLEURS. — *C. epithymum*
Murr. — (*Cheveux Saint-Jean, de la Vierge.*) ☉. Juin-sep-
tembre. C. Parasite sur les ajoncs et les bruyères.

C'est cette espèce qui figure sous le nom de *Cuscuta Europæa*
dans le catalogue de M. de Gerville.

POLÉMONIACÉES. — Le POLEMONIUM CÆRULEUM L. se
trouve parfois à l'état subspontané.

BORRAGINÉES.

***Echium* L. — *Vipérine*.**

E. VULGARE L. — V. COMMUNE. — (*Herbe aux Vipères.*)
②. Juin, juillet. R. CHERBOURG: Vieil Arsenal, — OCTEVILLE,

MARTINVEST et COUVILLE: talus du chemin de fer. TOURLAVILLE: champs du littoral, vers la redoute. QUERQUEVILLE: le fort. — BIVILLE: coteau des Guérendes. — SURTAINVILLE: champs des mielles et carrières calcaires.

Var. *b. subcarnea*. — RRR. SURTAINVILLE: les carrières calcaires.

***Pulmonaria* L. — *Pulmonaire*.**

P. ANGUSTIFOLIA L. — LI. fl. de l'O., page 305. — P. *A FEUILLES ÉTROITES*. ♀. Mars-mai. MAUPERTUS et FERMANVILLE: anse du Brick, vallon et bois du Doux-Riant. — GRÉVILLE, ECULLEVILLE et OMONVILLE-LA-ROGUE: falaises et coteaux maritimes.

Comme cette belle plante est commune dans les localités précitées, il est surprenant qu'elle ait échappé à nos devanciers.

***Lithospermum* Tourn. — *Grémil*.**

L. ARVENSE L. — G. DES CHAMPS. ☉. Avril-septembre. RRR. CHERBOURG: environs de l'abattoir, vallée du Roule.

Cette plante est considérée comme appartenant aux terrains calcaires, mais elle croît aussi dans la région maritime (Voir Lloyd, flore de l'Ouest); il n'est donc pas étonnant qu'elle ait été observée à Cherbourg, quoiqu'elle y soit fort rare.

L. OFFICINALE L. — G. OFFICINAL. — (*Herbe aux Perles*.) ♀. Juin-août. TR. LE ROZEL: bois du château. SURTAINVILLE: les carrières calcaires.

***Lycopsis* L. — *Lycopside*.**

L. ARVENSIS L. — L. DES CHAMPS. — *Anchusa arvensis* Bieb. — (*Grisette*.) ☉. Juin-septembre. AC. Champs, talus des fossés, dans la région maritime. — TR. à l'intérieur: ANGOVILLE.

***Anchusa* L. — Buglosse.**

A. SEMPERVIRENS L. — *B. TOUJOURS VERTE*. — *Buglossum sempervirens* All. — *Omphalodes sempervirens* Don. — *Caryolopha sempervirens* F. et T. ♀. Mai-juillet. R. Haies, chemins couverts, bords des champs. CHERBOURG : environs de l'usine à gaz, le Cauchin, l'Amont-Quentin, la petite Fauconnière, le Roule. — OCTEVILLE : le Val, l'Amont-Quentin. TOURLAVILLE : environs des eaux minérales du Roule. EQUEURDEVILLE : le Manoir.

Plante caractéristique de la flore de l'Ouest de la France, et à ce titre assurément indigène pour notre arrondissement, contrairement à l'opinion de M. Le Jolis. (Voir Grenier et Godron, Fl. de Fr. — Lloyd, Fl. de l'Ouest.)

***Myosotis* L. — Scorpione.**

M. VERSICOLOR Pers. — *S. VERSICOLORE*. ☉. Avril-juin. PC. Champs, coteaux, bords des chemins.

M. COLLINA Rehb. — *S. DES COLLINES*. — *M. hispida* Schlecht. ☉. Avril-juin. TC. Murs, coteaux, lieux arides.

M. ARVENSIS Hoffm. — *S. DES CHAMPS*. — *M. intermedia* Link. — *M. scorpioides* var. *a.* L. ☉. Juin-août. C. Lieux cultivés.

M. PALUSTRIS With. — *S. DES MARAIS*. — *M. perennis* var. *a* DC. -- *M. scorpioides* var. *b.* L. — (Ne m'oubliez pas!!) ♀. Juillet-septembre. PC. Fossés, bords des eaux.

Var. *b.* **M. strigulosa** Rehb. — AC.

M. REPENS Don. — *S. RAMPANTE* ♀. Juin-Août. AC. Lieux marécageux, prés tourbeux.

Var. *b.* **M. laxiflora** Rehb. — PC.

M. COESPITOSA Schultz. — *S. GAZONNANTE*. — *M. linguata*. Lehm. ☉. Juin-août. C. Marais, près très humides, bords des eaux.

La nouvelle espèce de *Myosotis* découverte dans la presqu'île de la Manche par le docteur Lebel, et décrite par lui sous le nom de *M. ADULTERINA*, a reçu de MM. Grenier et Godron, dans leur flore de France, la dénomination de *M. LEBELII*; elle a été indiquée à Fermanville et à Saint-Germain-des-Vaux.

***Symphytum* L. — Consoude.**

S. OFFICINALE L. — *C. OFFICINALE* Ȳ. Mai-août. AR. Bords des rivières et des fossés, haies et prés humides. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. EQUEURDEVILLE. MARTINVEST. VIRANDEVILLE. — GONNEVILLE, TOCQUEVILLE. — BENOISTVILLE. PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

Ses fleurs varient souvent de couleur.

Racines et feuilles éminemment émollientes.

Le *SYMPHYTUM TUBEROSUM* L. s'est naturalisé à Equeurdreville dans les haies et aux bords des champs, près du Manoir.

***Borrago* Tourn. — Bourrache.**

B. OFFICINALIS L. — *B. OFFICINALE*. ☉. Juin-septembre. AC. Lieux cultivés, terres remuées.

Plante béchique, diurétique et dépurative, très employée.

***Cynoglossum* L. — Cynoglosse.**

C. OFFICINALE L. — *C. OFFICINALE*. — (*Langue de chien*.) ☉. Mai-juillet. R. NACQUEVILLE et URVILLE-HAGUE: sables et lieux incultes du littoral. GRÉVILLE: coteaux du Hubillan. VAUVILLE, BIVILLE et VASTEVILLE: les mielles. — SIOUVILLE: environs de l'église, hameau Sauvage. FLAMANVILLE: Diélette. LE ROZEL: la falaise, les chemins du littoral, le Poux. SURTAINVILLE: les

carrières calcaires, environs du village, vallon du hameau Pouchin.

Employée jadis comme narcotique.

On trouve très rarement subspontané, près des jardins, le *CYNOGLOSSUM LINIFOLIUM* L.

SOLANÉES.

Solanum L. — *Morelle*.

S. NIGRUM L. — *M. NOIRE*. ☉. Août-octobre. Lieux incultes, décombres, bords des chemins. — AC. dans la région maritime. R. dans l'intérieur.

Plante narcotique.

S. CHLOROCARPUM Spenn. — *M. A FRUITS JAUNES*. ☉. Juillet-octobre.

Var. *a. S. luteo-virescens* Gm. — AR. Lieux incultes du littoral.

Var. *b. S. ochroleucum* Bast. — R. Lieux incultes maritimes, à CHERBOURG et à TOURLAVILLE.

Var. *c. S. humile* Bernh. — R. Mielles de VAUVILLE et de BIVILLE.

S. DULCAMARA L. — *M. DOUCE-AMÈRE*. 3 Juin-août. AC. Haies et buissons, bords des eaux.

Var. *b. albiflorum*. — TR. Anse Saint-Martin, à OMONVILLE-LA-PETITE.

Tiges employées comme dépuratives et sudorifiques; baies vénéneuses.

Le *SOLANUM TUBEROSUM* L. (*Pomme de terre*), cultivé partout, se trouve quelquefois à l'état subspontané.

***Datura* L. — *Datura*.**

D. STRAMONIUM L. — D. STRAMOINE. — (*Pomme-Epineuse*.) ☉. Juin-août. TR. CHERBOURG : lieux incultes dans le Vieil Arsenal. — TOURLAVILLE : environs de la Redoute. EQUEURDREVILLE : chemin près de l'église.

Plante très vénéneuse, narcotique.

***Hyoscyamus* Tourn. — *Jusquiame*.**

H. NIGER L. — J. NOIRE. — (*Hannebanne*.) ☉. Juin-septembre. R. OCTEVILLE : la Bufférie. QUERQUEVILLE : environs du fort. — COSQUEVILLE, NÉVILLE, GOUBERVILLE et GATTEVILLE : lieux incultes et talus des fossés du littoral. FERMANVILLE : village de Fréval. TOCQUEVILLE : hameau de Gofontaine. — NACQUEVILLE et OMONVILLE-LA-ROGUE : chemins et lieux incultes du littoral. VAUVILLE : prieuré de Saint-Hermel. — SIOUVILLE : le littoral. TRÉAUVILLE : pied du mont Saint-Gilles. FLAMANVILLE : Dielette.

Plante très-vénéneuse, employée comme narcotique.

On trouve, mais très-rarement, le NICOTIANA RUSTICA L. à l'état subspontané dans les jardins.

Dicotylédones monopétales hypogynes anisandrées.**PERSONÉES.****Tribu des ANTIRRHINÉES.*****Verbascum* L. — *Molène*.**

V. THAPSUS L. — M. BOUILLON-BLANC. — V. *Schraderi* Mey. ☉. Juin-août. AC. Lieux incultes, bords des chemins, talus des fossés.

Var. *b. V. thapsoides* Schrank. — PC.

V. PHLOMOIDES L. — *M. PHLOMIDE*. ②. Juin-août. RRR. CHERBOURG: glacis du port militaire.

V. COLLINUM Schrad. — *M. DES COLLINES*. ②. Juillet-septembre. RRR. CHERBOURG: carrières sur la route d'Octeville.

V. MIXTUM Ram. — *M. MIXTE*. — *V. Schottianum* Schrad. ②. Juillet-septembre. RRR. CHERBOURG: glacis du port militaire. — ÉQUEURDEVILLE: environs des eaux minérales des Fourches.

La provenance d'hybridation attribuée à ces deux dernières espèces ne nous semblant pas suffisamment établie, nous croyons devoir les maintenir comme espèces légitimes.

V. NIGRUM L. — *M. NOIRE*. — (*Bouillon-noir.*) ④. Juin-octobre. C. Bords des chemins et des haies, champs stériles, lieux arides et pierreux.

Var. *b. bracteatum* Bréb. — R. CHERBOURG: carrières sur la route d'Octeville.

Var. *c. V. Parisiense* Thuill. — AC.

V. BLATTARIA L. — *M. BLATTAIRE*. — (*Herbe aux mites.*) ②. Juillet-septembre. RRR. CHERBOURG: environs nord du cimetière. — VIRANDEVILLE: bords de la route de la Hague à Valognes.

V. VIRGATUM With. — *M. ABAGUETTES*. — *V. viscidulum* Pers. — *V. blattarioides* Lamk. ②. Juillet-septembre. TR. CHERBOURG: remparts et glacis du port militaire. — Région maritime de SURTAUVILLE: champs et prairies, talus des fossés.

C'est par erreur que M. Le Jolis a indiqué que M. Bertrand Lachénée a trouvé cette espèce, ainsi que le *Verbascum phlomoïdes* L. au polygone de Querqueville.

Nous devons dire en outre que si M. Le Jolis n'admet point comme indigènes plusieurs espèces qui croissent aux environs du port militaire, c'est parce qu'il ne les a pas trouvées ailleurs dans l'arrondissement, faute sans doute de l'avoir suffisamment exploré; tel est le cas actuel pour le *Verbascum virgatum* With.

Les plantes du genre Molène ont des feuilles qui sont émollientes. Leurs fleurs sont employées comme béchiques.

Linaria Tourn. — *Linnaire*.

L. CYMBALARIA Mill. — L. CYMBALAIRE. — *Antirrhinum Cymbalaria* L. — *A. hederæfolium* Poir. ♀. Avril-novembre. TR. EQUEURDREVILLE: murs du Manoir et de l'ancien cimetière, environs de la plaine du port militaire, les Varendes. — FLAMANVILLE: murs du pare.

L. SPURIA Mill. — L. BATARDE. — *Antirrhinum spurium* L. — (*Velvete*.) ☉. Juillet-octobre. TR. Champs, talus des fossés. OCTEVILLE: environs de la chapelle Saint-Sauveur. — TRÉAUVILLE: pied du mont Saint-Gilles. FLAMANVILLE: Diélette. LE ROZEL: Cléville. SURTAINVILLE: la région maritime.

L. ELATINE Mill. — L. ÉLATINE. — *Antirrhinum Elatine* L. — (*Velvete*.) ☉. Juin-octobre. TC. Lieux cultivés, talus des fossés.

Il est surprenant que M. Le Jolis ait attribué le degré AR. à cette espèce, qui est si commune dans nos champs cultivés.

L. ARENARIA DC. — L. DES SABLES. — *Antirrhinum arenarium* Poir. ☉. Mai-août. R. Sables maritimes du canton de Saint-Pierre-Église, de FERMANVILLE à GATTEVILLE.

Cette plante figure dans le catalogue de M. de Gerville sous le nom de *Antirrhinum supinum*.

L. STRIATA DC. — L. STRIÉE. — *L. repens* Ait. — *Antirrhinum Monspensulanum et repens* L. ♀. Juin-septembre. RRR.

CHERBOURG: ancienne carrière de la mare Houlette, au Roule.
— ÉQUEURDEVILLE.

L. VULGARIS Mill. — L. COMMUNE. — *Antirrhinum Linaria* L. — *Antirrhinum commune* Lamk. Ț. Juillet-septembre. C. Lieux sablonneux, bords des chemins et des haies, champs arides, talus des fossés.

Var. *b. spectabilis* Nob. — Se distingue du type par ses fleurs beaucoup plus grandes et presque blanches. R. OCTEVILLE. TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE.

Nous avons trouvé à l'état subspontané les LINARIA BIPARTITA Willd. et PURPUREA Mill., le premier à Querqueville, le second à Cherbourg, sur un mur aux environs du port militaire.

***Antirrhinum* L. — *Muflier*.**

A. MAJUS L. — M. A GRANDES FLEURS. — (*Gueule de lion, Mufle de veau.*) Ț. Juin-septembre. PC. Vieux murs.

A. ORONTIUM L. — M. RUBICOND. — (*Tête de mort.*) ○. Juin-octobre. PC. Lieux cultivés, moissons.

***Scrophularia* L. — *Scrophulaire*.**

S. SCORODONIA L. — S. A FEUILLES DE SAUGE. Ț. Mai-septembre. Haies, bords des chemins, lieux pierreux, surtout dans la région maritime, où elle abonde dans beaucoup de localités. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. ÉQUEURDEVILLE. HAINNEVILLE. QUERQUEVILLE. DIGOSVILLE. — VAROUILLE. ANGOVILLE. TOCQUEVILLE. NÉVILLE. GATTEVILLE. — TONNEVILLE. NACQUEVILLE. URVILLE-HAGUE. GRÉVILLE. ÉCULLEVILLE. OMONVILLE-LA-ROGUE. DIGULLEVILLE. OMONVILLE-LA-PETITE. HERQUEVILLE. — SIOUVILLE. SERTAINVILLE.

S. PEREGRINA L. — *S. VOYAGEUSE*. ☉. Juillet, août. RRR.
Bords des champs et des haies, talus des fossés, sur les hauteurs
des Fourches, à OCTEVILLE.

Cette espèce méridionale semble affectionner la région maritime, et
d'après MM. Grenier et Godron, elle remonte le long des côtes de l'Océan
jusqu'au-delà de Vannes, il n'est donc pas surprenant que nous l'ayons
retrouvée aux environs de Cherbourg, où M. Delachapelle l'avait signa-
lée, il y a un grand nombre d'années.

Il n'y a conséquemment plus lieu d'admettre l'opinion de M. Le Jolis,
qui, sans raison aucune, a voulu la faire considérer comme introduite.

S. NODOSA L. — *S. NOUEUSE*. -- (*Herbe aux écrouelles*,
Suie d'enfer). ♀. Juin-août. C. Haies frêches, talus des fossés.

Feuilles et racines jadis très-employées comme résolatives contre
les scrofules.

S. AQUATICA L. — *S. AQUATIQUE*. — *S. Balbisii* Hornem.
— (*Herbe du siège*). ♀. Juin-septembre. C. Lieux humides,
bords des eaux.

Var. *b. appendiculata*. — Plus commune que le type.

Tribu des RHINANTHÉES.

Limosella L. — *Limoselle*.

L. AQUATICA L. — *L. AQUATIQUE*. ☉. Juillet-septembre.
TR. SAINT-PIERRE-ÉGLISE: étang de Hacouville. VRASVILLE: bords
de la mare. — BEAUMONT et HERQUEVILLE: étang de la Huline.
TONNEVILLE: étang de Percy. VAUVILLE: la mare.

Sibthorpia L. — *Sibthorpie*.

S. EUROPÆA. L. — *S. D'EUROPE*. ♀. Juin-septembre.
AC. Pied des haies et des murs humides, chemins frais et ombragés,
bords des ruisseaux et des sources.

***Digitalis* L. — *Digitale*.**

D. PURPUREA L. — *D. POURPRÉE*. — (*Claquets*.) ②. Juin-août. TC. Lieux arides et pierreux, bois et haies.

Varie à fleurs rosées : coteaux de la Divette, à Martinvast, et à fleurs blanches : Martinvast, Omonville-la-Petite, Jobourg.

Employée en médecine comme sédative et diurétique ; vénéneuse à haute dose.

M. Le Jolis a signalé le *DIGITALIS PURPURASCENS* Roth. sur la colline de la Fauconnière, à Oeteville; mais attendu que des auteurs justement accrédités considèrent cette plante comme un hybride du *D. purpurea* L. et du *D. lutea* L. qui manque à notre arrondissement, il devient fort difficile d'expliquer la présence de cet hybride dans la localité précitée.

***Veronica* L. — *Véronique*.**

V. SPICATA L. — *V. EN ÉPI*. ④. Juillet-septembre. R. Mielles de VAUVILLE et de BIVILLE, où cette plante reste naine et constitue la var. *minor* Bréb.

V. ANAGALLIS L. — *V. MOURON*. ④. Juin-septembre. AR. Lieux marécageux, bords des eaux. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. HAINNEVILLE. — NÉVILLE. — NACQUEVILLE. SAINT-GERMAIN-DES-VAUX. VAUVILLE. BIVILLE. VASTVILLE. — FLAMANVILLE. SURTAINVILLE.

V. BECCABUNGA L. — *V. BECCABUNGA*. ④. Mai-septembre. C. Lieux aquatiques.

Var. *b. rosea*. — PC.

Plante antiscorbutique.

V. OFFICINALIS L. — *V. OFFICINALE*. — (*Thé d'Europe, Véronique mâle*.) ④. Juin-août. AC. Bruyères, pelouses, coteaux, taillis.

Légèrement tonique.

V. CHAMÆDRYS L. — V. PETIT-CHÈNE. — (*Véronique femelle*). 2°. Avril-juin. TC. Haies et buissons, bois.

Var. *b. petiolata* Coss. et Germ. — PC.

V. MONTANA L. — V. DE MONTAGNE. 4°. Mai-juillet. AR. Bois humides, haies ombragées, bords des ruisseaux. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. EQUEURDREVILLE. QUERQUEVILLE. MARTINVAST. SIDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. TOLLEVAST. DIGOSVILLE. — MAUPERTUS. FERMANVILLE. — SAINTE-CROIX-HAGUE. NACQUEVILLE. — SURTAINVILLE.

V. SCUTELLATA L. — V. A. ÉCUSSON. 4°. Mai-septembre. AR. Lieux marécageux, fossés, bords des eaux. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. COUVILLE. TOLLEVAST. LE MESNIL-AU-VAL. DIGOSVILLE. — GONNEVILLE. LE THEIL. — ACQUEVILLE. FLOTTEMANVILLE-HAGUE. TONNEVILLE. SAINTE-CROIX-HAGUE. NACQUEVILLE. VAUVILLE. BIVILLE. VASTEVILLE. — BRICQUEBOSQ. SURTAINVILLE.

Var. *b. pubescens* Koch. — V. *parmularia* Poit. et Turp. — R. DIGOSVILLE. LE MESNIL-AU-VAL. — GONNEVILLE.

V. SERPYLLIFOLIA L. — V. A FEUILLES DE SERPOLET. 4°. Mai-septembre. C. Bords des chemins, talus des fossés, pelouses.

V. ARVENSIS L. — V. DES CHAMPS. ☉. Mars-juillet. TC. Lieux cultivés, murs.

Var. *b. V. polyanthos* Thuill. — AC.

Var. *c. V. nana* Lamk. — AC. Sables maritimes, pelouses.

V. AGRESTIS L. — V. AGRESTE. — V. *pulchella* Bast. ☉. Mars-octobre. AC. Talus des fossés, lieux cultivés.

V. POLITA Fries. — V. DES CULTURES. — V. *didyma* Tenore. ☉. Mars-octobre. C. Jardins, murs, champs.

V. HEDERÆFOLIA L. — V. *A FEUILLES DE LIERRE*. ☉. Mars-juillet. TC. Lieux cultivés, talus des fossés, bords des haies.

***Bartsia* L. — *Bartsie*.**

B. VISCOSA L. — B. *VISQUEUSE*. — *Eufragia viscosa* Benth. — *Trixago viscosa* Rehb. ☉. C. Lieux marécageux, pâturages et champs humides.

***Euphrasia* Tourn. — *Euphrase*.**

E. OFFICINALIS L. — Bor. fl. cent., 2^e éd. — E. *OFFICINALE*. (*Casse-Lunettes*.) ☉. Juin-septembre. AC. Prés secs, bruyères, pelouses.

E. NEMOROSA Pers. — E. *DES BOIS*. — (*Casse-Lunettes*.) ☉. Juillet-octobre. TC. Bruyères, bois, pelouses.

Elle présente, ainsi que la précédente, plusieurs variétés dont on a fait récemment des espèces qui ont besoin d'une étude approfondie pour pouvoir être maintenues.

E. ODONTITES L. — E. *ODONTITE*. ☉. Mai-octobre.

Var. *a*. **E. verna** Bellard. — *Odontites verna* Rehb. — *O. rubra* Pers. — AC. Champs.

Var. *b*. **E. serotina** Lamk. — *Odontites erotina* Rehb. — AC. Pâturages, bois, champs,

Var. *c*. **E. divergens**. — *Odontites divergens* Jord. — PC. Bruyères, sentiers des bois, pâturages.

***Rhinanthus* L. — *Rhinanthe*.**

R. MAJOR Ehrh. — R. *A GRANDES FLEURS*. — R. *glabra* Lamk. — R. *Crista-galli* L. part. (*Crête de coq, Sonnettes*.) ☉. Mai, juin. C. Prairies, champs humides.

R. MINOR Ehrh. — R. *A PETITES FLEURS*. — R. *secunda* Bréb. — R. *Crista galli* L. part. ☉. Mai-juillet. R. CHERBOURG: près du Maupas. — LE MESNIL-AU-VAL: bruyères des marais. — NACQUEVILLE: près maritimes.

***Pedicularis* Tourn. — *Pédiculaire*.**

P. SYLVATICA L. — P. *DES BOIS*. — (*Herbe aux poux*.)
 ☉. Avril-juillet. C. Landes, prés et bois humides.

Var. *b. albiflora*. — PC.

P. PALUSTRIS L. — P. *DES MARAIS*. ☿. Mai-septembre.
 AR. Prés marécageux, bords des étangs et des ruisseaux. —
 QUERQUEVILLE. MARTINVEST. SEDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. COU-
 VILLE. HARDINVEST. LE MESNIL-AU-VAL. — LE THEIL. THÉVILLE. —
 FLOTTÉMANVILLE-HAGUE. TONNEVILLE. OMONVILLE-LA-PETITE. VAUVILLE.
 — BRICQUEBOSQ. BENOISTVILLE.

Les plantes de ce genre sont vénéneuses.

***Melampyrum* Tourn. — *Mélampyre*.**

M. PRATENSE L. — M. *DES PRÉS*. — M. *vulgatum* Pers.
 ☉. Juin-août. — C. Bois.

Varie dans les bois de Surtainville, à fleurs rosées, lilas et jaune,
 et lilas et blanc.

OROBANCHIÉES.

***Orobanche* L. — *Orobanche*.**

O. COERULEA Vill. — O. *BLEUE*. — *Phelipæa cœrulea*
 C. A. Mey. ☿. Juin-août. R. Pelouses, champs, lieux sablonneux.
 Parasite sur l'*Achillea Millefolium* L. CHERBOURG. — TOURLA-

VILLE. QUERQUEVILLE. — BRILLEVAST. VRASVILLE. — HERQUEVILLE.
— LE ROZEL. SURTAINVILLE.

Nous avons maintes fois observé cette belle espèce sur la plante qu'elle affectionne toujours, l'*Achillea Millefolium*. M. Le Jolis admet avec doute, dans sa liste, sous le nom de *Phelipæa cœrulea* C. A. Mey., une Orobanche qu'il a trouvée une seule fois à Flamanville, sur l'*Artemisia vulgaris*, à ce qu'il croit. N'étant pas sûr par conséquent de l'existence du véritable *Phelipæa cœrulea* dans notre arrondissement, il a cru devoir rappeler que M. le docteur Lebel l'a constaté aux environs de Valognes.

Var *b. ramosa* Nob. — RRR. BRILLEVAST.

O. RAPUM Thuill. — O. RAVE. — O. *major* Lamk. ♀. Mai-juillet. RRR. Parasite sur l'*Ulex Europæus* L. VIRANDEVILLE : valon de Née.

O. GALII Dub. — O. DU GAILLET. — O. *vulgaris* DC. — O. *caryophyllacea* Sm. ♀. Mai, juin; Parasite sur les *Gaillets*, dans les mielles et les dunes.

O. MINOR Sutt. — O. MINEURE. ☉. Juin-octobre. C. Parasite sur diverses plantes, principalement sur les *Trèfles*.

O. ERYNGII Dub. — O. DU PANICAUT. — O. *amethystea* Thuill. ♀. Juin, juillet. R. Parasite sur les *Eryngium* dans les mielles et les dunes. — VRASVILLE. — VAUVILLE. BIVILLE.

LABIÉES.

Mentha L. — *Menthe*.

M. ROTUNDIFOLIA L. — M. A FEUILLES RONDES. — M. *rugosa* Lamk. ♀. Juillet-septembre. AR. Lieux incultes humides. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. HAINNEVILLE.

QUERQUEVILLE. DIGOSVILLE. BRETTEVILLE. — TOCQUEVILLE. — BEAUMONT. VAUVILLE. BIVILLE. — SIOUVILLE. TRÉAUVILLE. SURTAINVILLE.

M. PIPERITA L. — *M. POIVRÉE*. ☿. Juillet, août. RRR. CHERBOURG: prés marécageux à Sennecey.

M. AQUÁTICA L. — *M. AQUATIQUE*. ☿. Juillet-septembre. TC. Bords des eaux, lieux très humides.

Var. *b. M. hirsuta* L. — PC. Lieux humides, dans les mielles et les dunes.

M. ARVENSIS L. — *M. DES CHAMPS*. ☿. Juillet-septembre. TC. Champs cultivés.

M. PULEGIUM L. — *M. POULIOT*. — *Pulegium vulgare* Mill. ☿. Juillet-septembre. Chemins humides, bords des mares, lieux exondés. AC., quoique manquant dans plusieurs localités.

Les plantes de ce genre portent le nom vulgaire de *Baumes*; elles sont fortement aromatiques et très employées comme excitantes, stomachiques et carminatives.

***Lycopus* Tourn. — *Lycope*.**

L. EUROPÆUS L. — *L. D'EUROPE*. — *L. palustris* Lamk. — (*Marrube aquatique*.) ☿. Juillet-septembre. C. Bords des eaux, lieux marécageux.

***Origanum* Tourn. — *Origan*.**

O. VULGARE L. — *O. COMMUN*. — (*Marjolaine sauvage*.) ☿. Juillet-septembre. TR. OCTEVILLE: coteaux du Roule. MARTIN-VAST: bord de la route des Picux, à Mélingue. — NOUAINVILLE: le cimetière. — GONNEVILLE: murs des fossés du château.

Plante très aromatique, stimulante et emménagogue.

Thymus L. — Thym.

T. SERPYLLUM L. — *T. SERPOLET*. Ȳ. Juin-septembre. C. Landes et bruyères, coteaux, pelouses, mielles.

Var. *b. citriodorus* Schreb. — TR. Mielles de QUERQUEVILLE.

Var. *c. T. lanuginosus* Link. — AC., surtout dans la Hague.

T. CHAMÆDRYS Fries. — *T. GERMANDRÉE*. Ȳ. Juin-septembre. R. BRETTEVILLE: landages de Brettefey, route de Saint-Pierre-Église. — GONNEVILLE. CLITOURPS: la lande. — SOTTEVILLE: route des Pieux. HELLEVILLE: chemins, bruyères et coteaux du Sud. TRÉAUVILLE: coteaux de la Diélette. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD: vallée de la Scie.

Les plantes de ce genre sont très aromatiques et fort usitées.

Calamintha Benth. — Calament.

C. ASCENDENS Jord. — *C. ASCENDANT*. — *C. officinalis* Benth. — *C. menthaefolia* Gr. et God. — *Melissa Calamintha* L. part. — *Thymus Calamintha* Sm. Ȳ. Juin-octobre. TR. Lieux pierreux, bords des haies. CHERBOURG: environs du cimetière et de la route des Pieux. — OCTEVILLE: environs de Saint-Sauveur et du hameau Baquène, chemin de la Polle au fort des Fourches.

Aucun motif ne peut faire regarder cette plante comme n'étant point indigène. Aussi l'on ne comprend pas pourquoi M. Le Jolis la considère comme introduite.

C. NEPETA Clairv. — *C. NÉPÉTA*. — *Melissa Nepeta* L. — *Thymus Nepeta* Sm. Ȳ. Juillet, août. RRR. VIRANDEVILLE: coteaux de Née.

C. CLINOPODIUM Benth. — *C. CLINOPODE*. — *Clinopodium vulgare* L. (*Basilic saurage*.) Ȳ. Juillet-septembre. C. Haies et buissons, coteaux et landages, bords des champs.

***Melissa* Tourn. — *Mélisse*.**

M. OFFICINALIS L. — *M. OFFICINALE*. — (*Citronelle*). ♀. Juillet, août. R. Haies, vergers. CHERBOURG : les Vieilles-Carières. — OCTEVILLE : la Croix-Bonamy, vallée de Quincampoix. TOURLAVILLE : les Flottes. ÉQUEURDEVILLE : le Manoir. SIDEVILLE : le Boulé. — PIERREVILLE : vallée de la Scie.

Plante aromatique, à odeur très suave, employée en parfumerie et en pharmacie.

***Salvia* L. — *Sauge*.**

S. PRATENSIS L. — *S. DES PRÉS*. ♀. Mai, juin. RRR. CHERBOURG : remparts du port militaire.

S. VERBENACA L. — *S. VERVEINE*. — *S. clandestina* Thore. ♀. Mai - octobre. AC. Pâturages, bords des chemins et des champs de la région maritime. — TR. à l'intérieur. COUVILLE : la gare.

***Nepeta* L. — *Népéta*.**

N. CATARIA L. — *N. CHATAIRE*. — *Nepeta vulgaris* Lamk. — *Cataria vulgaris* Moench. — (*Cataire, Herbe aux chats*.) ♀. Juillet-septembre. RRR. Lieux pierreux, bords des chemins. VIRANDEVILLE : environs du hameau Née.

M. Le Jolis a indiqué comme trouvé par M. le docteur Lebel, à Jobourg, le *NEPETA CITRIODORA* Balb., que M. de Brébisson regarde comme une variété du précédent.

***Glechoma* L. — *Gléchome*.**

G. HEDERACEA L. — *G. LIERRE-TERRESTRE*. — *Nepeta Glechoma* Benth. — *Calamintha hederacea* Scop. — (*Herbe terrée*.) ♀. Mars-juin. TC. Pied des haies et des murs, talus des fossés.

Plante très employée comme incisive et béchique.

***Brunella* Tourn. — *Brunelle*.**

B. VULGARIS Mœnch. — *B. COMMUNE*. — *Prunella vulgaris* L. ♀. Juin-août. TC. Bords des chemins, pelouses, prés, bois.

Se trouve rarement à fleurs blanches ou roses.

B. HYSSOPIFOLIA Lamk. — *B. A FEUILLES D'HYSOPE*. — *Prunella hyssopifolia* L. ♀. Juin-août. RRR. QUERQUEVILLE: plaine du polygone.

***Scutellaria* L. — *Scutellaire*.**

S. MINOR L. — *S. NAINÉ*. ♀. Juillet-septembre. AC. Prés tourbeux, lieux marécageux.

S. GALERICULATA L. — *S. TOQUE*. — *Cassida galericulata* Scop. ♀. Juillet-septembre. PC. Bords des ruisseaux et des rivières, fossés, lieux marécageux.

***Marrubium* L. — *Marrube*.**

M. VULGARE L. — *M. COMMUN*. (*Marrube blanc*, *Morlaucquemin*.) ♀. Juin-septembre. AC. Lieux incultes et chemins de la région maritime. — R. à l'intérieur.

On ne sait pas pourquoi M. Le Jolis a négligé de signaler la prédilection de cette plante pour la région maritime, tandis que pour un grand nombre d'autres il a poussé jusqu'à l'exagération les observations qu'il a faites à cet égard.

Plante stimulante, incisive, emménagogue et antispasmodique.

***Betonica* Tourn. — *Bétoine*.**

B. OFFICINALIS L. — *B. OFFICINALE*. — *B. hirta* Leyss. — *Stachys Betonica* Benth. ♀. Juin-août. C. Coteaux, landages, bois, haies.

Var. *b. albiflora*. — CHERBOURG: montagne du Roule.

Les feuilles sont employées comme sternutatoires et fumées comme le tabac. La racine passe pour émétique et purgative.

***Stachys* L. — Épiaire.**

S. SYLVATICA L. — E. DES BOIS. — (*Ortie puante.*) ♀. Juin-août. C. Bords des haies, décombres, pied des murs.

S. AMBIGUA. Sm. — E. AMBIGUE. — *S. palustri-sylvatica* Schied. ♀. Juillet-septembre. TR. Bords des chemins, terres remuées. CHERBOURG: vallée du Roule. — OCTEVILLE: hameau de la Roche-qui-pend. TOURLAVILLE: le château, les Esserts, le Bas-de-la-Loge, la Glacerie. QUERQUEVILLE: environs de la Coquerie.

S. PALUSTRIS L. — E. DES MARAIS. — (*Ortie morte.*) ♀. Juillet-septembre. C. Fossés, champs humides, bords des eaux.

S. ARVENSIS L. — E. DES CHAMPS. — *Cardiaca arvensis* Lamk. ☉. Juin-novembre. C. Moissons, lieux cultivés.

***Galeopsis* L. — Galéopsis.**

G. TETRAHIT L. — G. TÉTRAHIT. — *Tetrahit nodosum* Mœnch. (*Chanvrin, Chanvre sauvage, Ortie royale.*) ☉. Juillet-septembre. AC. Champs.

Var. *b. nigricans* Bréb. — PC.

G. OCHROLEUCA Lamk. — G. JAUNATRE. — *G. dubia* Leers. — *G. villosa* Huds. — *G. grandiflora* Roth. ☉. Juillet-octobre. TR. Moissons du bassin de la Saire. — Parc de FLAMAVILLE.

M. Le Jolis indique comme introduit à Urville-Hague, l'*Agripaume* (LEONURUS CARDIACA L.). Nous l'avons aussi trouvé à Cherbourg, dans les environs de l'hôpital de la marine.

***Galeobdolon* Huds. — *Galéobdolon*.**

G. LUTEUM Huds. — *G. JAUNE*. — *Galeopsis Galeobdolon* L. — *Lamium Galeobdolon* Crantz. — *Cardiaca sylvatica* Lamk. — (*Ortie jaune*). ☿. Avril-juin. AR. Bois, haies et buissons humides. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. ÉQUEURDREVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. TOLLEVAST. — MAUPERTUS. FERMANVILLE. — TONNEVILLE. SAINTE-CROIX - HAGUE. GRÉVILLE. ÉCULLEVILLE. — SURTAINVILLE.

Il est singulier que M. Le Jolis n'ait observé cette belle espèce qu'à la Prévalerie, sur Octeville.

***Lamium* L. — *Lamier*.**

L. AMPLEXICAULE L. — *L. EMBRASSANT*. — *Pollichia amplexicaulis* Willd. ☉. Avril-octobre. AR. Lieux cultivés, terres remuées de la région maritime. CHERBOURG. — QUERQUEVILLE. TOURLAVILLE. — NÉVILLE. — SAINT-GERMAIN-DES-VAUX. AUDERVILLE. HERQUEVILLE. VAUVILLE. — LE ROZEL. SURTAINVILLE. — TR. dans l'intérieur: TOLLEVAST. — ANGOVILLE. TOCQUEVILLE.

L. INCISUM Willd. — *L. DÉCOUPÉ*. — *L. hybridum* Vill. — *L. dissectum* With. ☉. Avril-septembre. AR. Lieux cultivés. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. HAINNEVILLE. QUERQUEVILLE. MARTINVAST. — VAROUVILLE. NÉVILLE. — GRÉVILLE. JOBOURG. — LE ROZEL.

L. PURPUREUM L. — *L. POURPRE*. — (*Ortie rouge*.) ☉. Mars-novembre. TC. Lieux cultivés.

Var. *b*. — *decipiens* Sond. — R. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. — SAINT-PIERRE-ÉGLISE. GONNEVILLE. LE VAST. — PIERREVILLE.

L. ALBUM L. — *L. BLANC*. — (*Ortie blanche*.) ☿. Avril-octobre. R. Pied des murs, bords des chemins, décombres.

CHERBOURG. — OCTEVILLE. ÉQUEURDEVILLE. MARTINVAST. SIDEVILLE.
TOURLAVILLE. DIGOSVILLE. BRETTEVILLE.

***Ballota* L. — *Ballote*.**

B. FOETIDA Lam. — *B. FÉTIDE*. — *B. nigra* Sm. — *B. alba* L. ex Bor. (*Marrube noir*). ♀. Juin-septembre. AC. Décombres, pied des murs, chemins.

***Teucrium* L. — *Germandrée*.**

T. SCORODONIA L. — *G. A FEUILLES DE SAUGE*. — *T. sylvestre* Lamk. — *Scorodonia heteromalla* Mœnch. — (*Sauge des bois*). ♀. Juin-septembre. TC. Lieux secs et pierreux, haies, bois.

T. SCORDIUM L. — *G. SCORDIUM*. — *T. palustre* Lamk. — *Chamædrys Scordium* Mœnch. ♀. Juillet-octobre. R. Redoute de TOURLAVILLE. — Mare de VAUVILLE. — Lieux marécageux des mielles de BIVILLE et de SURTAINVILLE.

Si M. Le Jolis n'a vu cette plante qu'à la redoute de Tourlaville, c'est qu'il n'a pas suffisamment exploré les mielles si riches de l'ouest de notre arrondissement, où il eût pu, aussi bien que nous, reconnaître l'exactitude des observations de M. de Gerville, qui le premier l'y avait constatée.

***Ajuga* L. — *Bugle*.**

A. REPTANS L. — *B. RAMPANTE*. — *Bugula reptans* Lamk. ♀. Mai, juin. C. Prés, bois humides, bords des ruisseaux.

Varie très rarement à fleurs blanches et à fleurs roses.

Plante dont l'usage en médecine est totalement abandonné.

Plusieurs plantes de cette famille sont naturalisées ou subspontanées dans les jardins de la campagne, où on les cultive fréquemment, telles que la *Lavande* (*LAVANDULA VERA* DC.), le *Basilic* (*OCYUM BASILI-*

cum L.), la *Sauge* (SALVIA OFFICINALIS L.), vulgairement *Petite-Sauge*, le *Thym* (THYMUS VULGARIS L.), le *Romarin* (ROSMARINUS OFFICINALIS L.), la *Sarriette* (SATUREIA HORTENSIS L.), etc.

VERBÉNACÉES.

Verbena L. — *Verveine*.

V. OFFICINALIS L. — V. OFFICINALE. ☿. Juillet-septembre. AC. Décombres, pied des murs, bords des chemins, lieux incultes.

Feuilles employées en cataplasmes dans les campagnes contre la pleurésie et les contusions, quoiqu'elles soient sans efficacité.

UTRICULARIÉES.

Utricularia L. — *Utriculaire*.

U. VULGARIS L. — U. COMMUNE. ☿. Juin, juillet. TR. Fossés, eaux stagnantes. Mares de TOURLAVILLE et de NACQUEVILLE.

Pinguicula Tourn. — *Grassette*.

P. LUSITANICA L.—G. DE PORTUGAL.—P. villosa Huds. ☿. Juillet-octobre. CHERBOURG: prés tourbeux du Maupas. — TOURLAVILLE: tourbières du Sud. TOLLEVAST: vallon du Culpeux. LE MESNIL-AU-VAL, bruyères marécageuses de Barville. — MAUPERTUS: ruisseau et vallon du Doux-Riant. CARNEVILLE: vallée des Fonds. FERMANVILLE: vallon du Doux-Riant, ruisseaux et vallons du Nid-du-Corps. VAROUVILLE: marécages de la Bréhoulle.

Plante à propriétés suspectes et délétères.

Dicotylédones semi-monopétalées.

PLANTAGINÉES.

***Plantago* L. — *Plantain*.**

P. MAJOR L. — P. A GRANDES FEUILLES. — (*Plantain femelle*.) ☿. Juin-août. TC. Lieux incultes, chemins.

Var. *b.* **P. intermedia** Gilib. — AC. Lieux et chemins sablonneux.

Var. *c.* **P. minima** DC. — PC. Chemins humides, lieux exondés.

P. LANCEOLATA L. — P. LANCÉOLÉ. — (*Plantain mâle*.) ☿. Mai-août. TC. Prés, pâturages, chemins, lieux incultes.

Var. *b.* **P. capitellata** Koch. — P. *sphærostachya* Wimm. et Grab. — AC. Pelouses et coteaux, sables et graviers maritimes.

Var. *c.* **P. lanuginosa** Koch. — P. *eriphora* Link et Hoffm. — PC. Coteaux et sables de la région maritime.

P. MARITIMA L. — P. MARITIME. ☿. Juin-septembre. R. TOURLAVILLE: la mare. — FERMANVILLE: marécages du littoral. GATTEVILLE: Vases et marais salés de l'Est.

Var. *b.* **P. graminea** Lamk. — R. MAUPERTUS: lieux marécageux du littoral.

P. CORONOPUS L. — P. CORNE-DE-CERF. ☉. Juin-septembre. C. Lieux secs et sablonneux, pelouses; abonde dans la région maritime, où il varie beaucoup.

***Littorella* L. — *Littorelle*.**

L. LACUSTRIS L. Mant. — *L. DES ÉTANGS*. — *L. juncea* Berg. — *Plantago uniflora* L. ♀. Juin-septembre. R. SAINT-PIERRE-ÉGLISE : étang du Pelot. VRASVILLE : la mare. NÉVILLE : la mare. — BEAUMONT et HERQUEVILLE : étang de la Huline. VAUVILLE : la mare. TONNEVILLE : étang de Percy. — SURTAINVILLE : lieux marécageux des mielles.

PLUMBAGINÉES.***Statice* Willd. — *Statice*.**

S. OCCIDENTALIS LI. — *S. OCCIDENTAL*. — *S. spathulata* Bab. fl. Sarn. — Bromfield. ♀. Juillet-septembre. R. Falaises de l'Ouest de l'arrondissement.

***Armeria* Willd. — *Arméria*.**

A. PUBESCENS Link. — *A. PUBESCENTE*. — *Statice Armeria* Sm. — (*Gazon d'Olympe*.) ♀. Mai-septembre. C. Falaises, rochers, coteaux et pelouses maritimes.

Var. *b. albiflora*. — PC.

A. PLANTAGINEA Willd. — *A. A FEUILLES DE PLANTAIN*. — *A. sabulosa* Jord. — *Statice plantaginea* Auct. 2. Juin-août. TR. Sables maritimes et dunes de l'Ouest de l'arrondissement.

Var. *b. longibracteata* Boiss. — *Statice arenaria* Pers. — TR. Mêmes stations.

PRIMULACÉES.***Primula* L. — *Primevère*.**

P. GRANDIFLORA Lamk. — *P. A GRANDES FLEURS*. —

P. acaulis Jacq. — *P. vulgaris* Huds. — *P. veris* L. var. — (*Prumerolle*, *Pruniolle*.) ♀. Mars-juin. TC. Haies, bois, prés.

Var. *b. caulescens* Koeh. — *P. acaulis* Jacq. var. *umbellifera* Mut. — R. CHERBOURG.

Elle offre en outre des variétés dans la couleur des fleurs.

P. OFFICINALIS Jacq. — *P. OFFICINALE*. — *P. veris*. [var. *a.* L. — ♀. Mars-mai. TR. Prés. CHERBOURG : environs de la ferme de la montagne, où elle offre des fleurs de couleurs variées. — TOURLAVILLE : environs de la Pierre-Butée. OCTEVILLE : environs de la chapelle Saint-Sauveur.

Les localités où cette plante a été jusqu'à présent observée chez nous laissent des doutes sur son indigénat.

***Glaux* L. — *Glaux*.**

G. MARITIMA L. — *G. MARITIME*. ♀. Juin, juillet. AR. Lieux marécageux maritimes. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. DIGOSVILLE. — MAUPERTUS. FERMANVILLE. VRASVILLE. GATTEVILLE. — NACQUEVILLE. — LES PIEUX.

***Lysimachia* L. — *Lysimaque*.**

L. VULGARIS L. — *L. COMMUNE*. — (*Chasse-Bosse*.) ♀. Juillet-septembre. R. Bords de la Divette à CHERBOURG, OCTEVILLE, MARTINVAST, SIDEVILLE. — Bords du Trottebec à CHERBOURG et à TOURLAVILLE. — Ruisseau et vallon des Roches-Martin à SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD. — Bords de la Saire et de ses étangs au VAST. — Mare de NÉVILLE. — Mare de VAUVILLE. — Bords de la Seie à PIERREVILLE et SURTAINVILLE. Vallon de Beautrain à SURTAINVILLE.

Var. *b. verticillata*. — Ça et là avec le type.

L. NEMORUM L. — *L. DES BOIS*. — *Lerouxia nemorum*

Mérat. ♀. Mai-août. C. Lieux ombragés humides, bords des ruisseaux.

L. NUMMULARIA L. — *L. NUMMULAIRE*. — (*Herbe aux écus*.) ♀. Juin-août. TR. Prés très humides, lieux marécageux. VAUVILLE: la mare. — PIERREVILLE: vallée de la Seie. SURTAINVILLE: vallée de la Seie et vallon de Beautrain.

***Anagallis* Tourn. — *Mouron*.**

A. PHOENICEA Lamk. — *M. ROUGE*. — *A. arvensis* Sm. — (*Menuchon rouge*.) ☉. Juin-octobre. C. Lieux cultivés.

Var. *b. A. carnea* Schrank. R. Coteaux et sables maritimes. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. BRETTEVILLE. — MAUPERTUS. — JOUBOURG.

A. COERULEA Schreb. — *M. BLEU*. ☉. Juin-septembre. RRR. CHERBOURG: environs de l'hôpital maritime. — TOURLAVILLE: champs près de la redoute, talus de fossés près de la Glacerie.

A. TENELLA L. — *M. DÉLICAT*. ♀. Juin-août. C. Lieux marécageux, landes tourbeuses, prés spongieux.

***Centunculus* L. — *Centenille*.**

C. MINIMUS L. — *C. NAIN*. ☉. Juin-septembre. R. Lieux exondés, ornières humides, bords des mares et des étangs. CHERBOURG. — NOUAINVILLE. MARTINVAST. TEURTHÉVILLE-HAGUE. LE MESNIL-AU-VAL. DIGOSVILLE. — CARNEVILLE. — ACQUEVILLE. TONNEVILLE. OMONVILLE-LA-ROGUE. DIGULLEVILLE. JOUBOURG. HERQUEVILLE. — SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC. HELLEVILLE. GROSVILLE.

***Samolus* L. — *Samole*.**

S. VALERANDI L. — *S. DE VALERANDUS*. — (*Mouron d'eau*.) ♀. Juin-septembre. AR. Lieux humides ou marécageux, surtout

dans la région maritime. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. HAINNEVILLE. QUERQUEVILLE. — MAUPERTUS. FERMANVILLE. VRASVILLE. RÉTHOVILLE. NÉVILLE. GATTEVILLE. — BEAUMONT. NACQUEVILLE. JOBOURG. HERQUEVILLE. VAUVILLE. BIVILLE. VASTEVILLE. — LESPIEUX. HELLEVILLE. FLAMANVILLE. SURTAINVILLE.

Au pied des falaises de la Hague, cette plante acquiert une hauteur de près de deux mètres.

ILICINÉES.

Ilex L. — **Houx.**

I. AQUIFOLIUM L. — *H. COMMUN.* 3. Mai, juin. TC. Haies, bois, rochers.

Sur les vieux pieds les feuilles deviennent entières et planes (var. *senescens* Gaud.).

Feuilles sudorifiques et fébrifuges; baies purgatives. L'écorce intérieure sert à préparer la glu.

OLÉINÉES.

Fraxinus Tourn. — **Frêne.**

F. EXCELSIOR L. — *F. ÉLEVÉ.* 3. Avril, mai. C. Bois, haies.

Feuilles et écorces fébrifuges, diurétiques et sudorifiques.

Le Lilas commun (LILAC VULGARIS Lamk. — *Syringa vulgaris* L.), cultivé dans tous les jardins, est naturalisé çà et là.

Ligustrum Tourn. — **Troène.**

L. VULGARE L. — *T. COMMUN.* — (Bois de Birille.) 3. Juin, juillet. C. Haies.

ÉRICINÉES.

***Erica* L. — *Bruyère*.**

E. CINEREA L. — *B. CENDRÉE*. 3. Juin-septembre. TC. Landes, coteaux et rochers, bords des bois.

E. TETRALIX L. — *B. QUATERNÉE*. 3. Juin-septembre. Croit abondamment dans les landes tourbeuses et les bois marécageux des communes suivantes: TOURLAVILLE. MARTINVAST. COUVILLE. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD. TOLLEVAST. LE MESNIL-AU-VAL. — LE THEIL. — TONNEVILLE. SAINTE-CROIX-HAGUE. VASTEVILLE. VAUVILLE. BIVILLE.

E. CILIARIS L. — *B. CILIÉE*. 3. Juin-septembre. R. CHERBOURG: marécages du pied nord et versant nord de la montagne du Roule, près de Hautmarais.

Ces trois espèces de bruyères varient à fleurs blanches.

***Calluna* Salisb. — *Callune*.**

C. VULGARIS Salisb. — *C. COMMUNE*. — *C. Erica* DC.—*Erica vulgaris* L.—(*Bruyère*.) 3. Juin-août. C. Landes, rochers et coteaux, bords des bois.

Varie à fleurs blanches.

VACCINIÉES.

***Vaccinium* L. — *Airelle*.**

V. MYRTILLUS L. — *A. MYRTILLE*. 3. Avril, mai. C. Bois et bruyères. Manque dans une partie de la Hague.

Fruits aigretes et comestibles, connus sous les noms de *Mourets*, *Lucets*.

Dicotylédones polypétales péri-hypogynes.

CÉLASTRINÉES.

Evonymus Tourn. — *Fusain*.

E. EUROPÆUS L. — *F. D'EUROPE*. — *E. vulgaris* Scop. — (*Bonnet carré, Bonnet de prêtre.*) 3. Mai, juin. AR. Haies, bois. TOURLAVILLE: la Londerie. TEURTHÉVILLE-HAGUE: le Lieu aux Francs. VIRANDEVILLE: la Hanoterie. COUVILLE.—SAINT-PIERRE-ÉGLISE: route de Montebourg.—HÉAUVILLE: route de Vasteville à la mer. SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC et SOTTEVILLE: route des Pieux. TRÉAUVILLE: vallée et coteaux de la Diélette, Bretantot, route de Diélette aux Pieux. BENOISTVILLE: région du nord-ouest. FLAMANVILLE: les bois. LE ROZEL: les bois. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD: bois des coteaux de la Scie, hameau du Chuquet, coteaux Dufresne. PIERREVILLE: route de Barneville, environs de l'église, vallée de la Scie. SURTAINVILLE: vallée de la Scie et vallons calcaires.

Arbrisseau vénéneux; son bois sert à préparer le charbon de fusain employé pour le dessin.

Si M. Le Jolis n'admet pas l'*Evonymus Europæus* L. comme indigène dans l'arrondissement de Cherbourg, c'est qu'il n'a pas exploré suffisamment cet arrondissement, surtout le canton des Pieux.

On trouve parfois, provenant des pares ou des plantations, l'*Evonymus latifolius* Scop.

AMPÉLIDÉES. — La tradition rapporte que la Vigne (*Vitis vinifera* L.) était autrefois cultivée en grand pour la fabrication du vin aux environs de Cherbourg. Il serait d'autant plus intéressant de faire des recherches à cet égard que cela annoncerait un changement marqué dans la température du pays.

RHAMNÉES.

***Rhamnus* Juss. — *Nerprun*.**

R. FRANGULA L. — N. BOURDAINE. — *Frangula vulgaris* Richb. — (*Bourgène*.) 3. Mai-juillet. AC. Bois.

Dicotylédones polypétales périgynes axosporées albuminées.

OMBELLIFÈRES.

***Hydrocotyle* Tourn. — *Hydrocotyle*.**

H. VULGARIS Tourn. — H. COMMUNE. — (*Écuelle d'eau, Doure*.) 4. Juin-septembre. C. Marais, prés très humides, bords des ruisseaux et des étangs.

Plante jadis employée comme détersive.

***Sanicula* Tourn. — *Sanicle*.**

S. EUROPÆA L. — S. D'EUROPE. — *S. officinalis* Gouan. — *Astrantia Diapensia* Scop. 4. Mai, juin. PC. Bois, fourrés.

Plante ayant joui autrefois d'une grande vogue, surtout comme vulnéraire; inusitée aujourd'hui.

L'ASTRANTIA MAJOR L. s'est naturalisé à Cherbourg, dans les îles de la Divette.

***Eryngium* Tourn. — *Panicaut*.**

E. CAMPESTRE. L. — P. DES CHAMPS. — (*Chardon-Roland*.) 4. Juillet-septembre. AC. Lieux arides de la région maritime, sablonneux ou pierreux.

Jadis employé comme tonique et emménagogue.

E. MARITIMUM L. — *P. MARITIME*. ☿. Juillet-septembre.
AC. Sables maritimes.

Mêmes propriétés.

***Apium* Hoffm. — *Ache*.**

A. GRAVEOLENS L. — *A. ODORANTE*. — (*Céleri sauvage*.)
②. Juillet-septembre. AC. Lieux marécageux, surtout dans la région maritime.

Racine diurétique, jadis très employée: semences aromatiques, excitantes. Le *Céleri* de nos tables n'est autre que cette plante améliorée par la culture.

***Petroselinum* Hoffm. — *Persil*.**

P. SEGETUM Koch. — *P. DES MOISSONS*. — *Sison segetum* L. — *Sium segetum* Lamk. ☉. Juillet, août. AR. Bords des chemins, talus pierreux, champs argileux, pelouses, murs. CHERBOURG. OCTEVILLE. ÉQUEURDREVILLE. QUERQUEVILLE. — VAROUVILLE. ANGOVILLE. GATTEVILLE. — URVILLE-HAGUE. BIVILLE. — BRICQUEBOSQ. BENOISTVILLE. FLAMANVILLE. LE ROZEL.

L'indication que M. Le Jolis donne, dans sa liste, au sujet de cette plante, est ainsi conçue: « R. Entre les pierres des murs (talcites calcarifères): Octeville, Querqueville. »

L'analyse chimique que nous avons faite non seulement des prétendus talcites calcarifères, mais encore des roches granitiques et de toutes les terres où nous avons observé le *Petroselinum segetum* Koch, détruit de fond en comble la possibilité de considérer l'existence de cette plante dans notre pays comme étant due à la présence de l'élément calcaire.

Le PETROSELINUM SATIVUM Hoffm. — *Apium Petroselinum* L. — (*Persil*) cultivé comme alimentaire, est devenu spontané çà et là sur les murs et les rochers.

***Helosciadium* Koch. — *Hélosciadie*.**

II. NODIFLORUM Koch. — *H. NODIFLORE*. — *Sium nodiflorum* L. — *Seseli nodiflorum* Scop. — (*Chuë*, *Cresson de cheval*, *Béle*.) 24. Juillet-octobre. TC. Lieux aquatiques.

Var. *b. ochreatum* DC.—*Sium hybridum* Mér. — AC. surtout dans les lieux marécageux de la région maritime.

Plante vénéneuse qu'il ne faut pas confondre avec le Cresson.

II. REPENS Koch. — *H. RAMPANTE*. — *Sium repens* L. 24. Juin-août. TR. Lieux marécageux dans les mielles de SURTAINVILLE.

H. INUNDATUM Koch. — *H. INONDÉE*. — *Sison inundatum* L. — *Sium inundatum* Roth. — *Hydrocotyle inundata* Sm. 24. Juin, juillet. R. TOURLAVILLE: environs du Maupas. DIGOSVILLE: étang de Bruneval. LE MESNIL-AU-VAL: la Saire, marais de Barville.—CARNEVILLE: flaques d'eau dans la lande. GOUBERVILLE: étang de Gattermare. GONNEVILLE. — TONNEVILLE: étang de Percy. OMONVILLE-LA-ROGUE: étangs de la vallée. HERQUEVILLE: route d'Auderville à Beaumont. VAUVILLE. — GROSVILLE: ruisseau des Fondais.

***Sison* L. — *Sison*.**

S. AMOMUM L. — *S. AMOME*. — *Sium Amomum* Roth. — *Sium aromaticum* Lamk. — *Seseli Amomum* Scop. 23. Juillet, août. R. Lieux incultes, bords des chemins, pied des murs, haies. TOURLAVILLE: environs de la Place au bord de la grande route. TEURTHÉVILLE-HAGUE: environs de l'église. — NACQUEVILLE: bords de la route d'Omonville. URVILLE-HAGUE: le cimetière.—SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD: vallée de la Scie. PIERREVILLE: le cimetière, le Val-Moitié, vallées de la Scie et de la Teranne, maison Quatre-Rues. SURTAINVILLE: environs du village, les carrières calcaires,

Il est à remarquer que M. Le Jolis n'a vu cette plante que dans le cimetière d'Urville-Hague; c'est là le motif qui la lui a fait indiquer comme extrêmement rare dans notre arrondissement.

***Ammi* Tourn. — *Ammi*.**

A. MAJUS. L. — *A. MAJEUR*. — *Apium Ammi* Crantz. ☉. Juillet, août. RRR. Champs stériles. OCTEVILLE: les Fourches. QUERQUEVILLE: environs du polygone.

***Egopodium* L. — *Egopode*.**

E. PODAGRARIA L. — *E. DES GOUTTEUX*. — *Seseli Egopodium* Scop. — *Tragoselinum Angelica* Lamk. (*Herbe aux goutteux, Fausse Angélique*.) ☿. Juin-août. AR. Vergers, haies, près des jardins, des habitations. CHERBOURG. — OCTEVILLE. ÉQUEURDREVILLE. VIRANDEVILLE. BRETTEVILLE. — CARNEVILLE. — SAINTE-CROIX-HAGUE. OMONVILLE-LA-ROGUE. OMONVILLE-LA-PETITE. JOBOURG. — LES PIEUX. SOTTEVILLE. FLAMANVILLE. LE ROZEL.

Jadis employée contre la goutte; aujourd'hui inusitée.

***Bunium* Gr. et Godr. — *Bunium*.**

B. VERTICILLATUM Gr. et Godr. — *B. VERTICILLÉ*. — *Carum verticillatum* Koch. — *Sison verticillatum* L. — *Sium verticillatum* Lamk. ☿. Juin-août. C. Landes et prés marécageux.

***Conopodium* Koch. — *Conopode*.**

C. DENUDATUM Koch. — *C. DÉNUDÉ*. — *Bunium denudatum* DC. — *B. flexuosum* Sm. ☿. Mai-juillet. C. Bois, près, coteaux.

Malgré leur âcreté, les bulbes de cette plante, connus sous le nom de *Génottes*, sont recherchés et mangés par les enfants.

C'est cette espèce que MM. de Gerville et Delachapelle ont, par erreur, désignée sous le nom de *Bunium bulbocastanum*.

***Pimpinella* L. — Boucage.**

P. MAGNA L.—*B. A GRANDES FEUILLES*.—*Tragoselinum majus* Lamk. 2. Juin-septembre. TC. Haies, bords des chemins et des champs.

Var. *b. P. dissecta* Retz. — Mêmes stations. AR. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. EQUEURDREVILLE. NOUAINVILLE. MARTINVAST. VIRANDEVILLE. COUVILLE. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD. HARDINVAST. TOLLEVAST. BRETTEVILLE. — FLOTTEMANVILLE-HAGUE. BRANVILLE. GRÉVILLE. — GROSVILLE.

Dans le bassin de l'Ouve, la variété est presque aussi commune que le type.

***Bupleurum* Tourn. — Buplèvre.**

B. ARISTATUM Bartl. — *B. ARISTÉ*.—*B. Odontites* Sm.—DC.—Dub. non L. ☉. Juin, juillet. R. Mielles et dunes. TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE. — NACQUEVILLE. VAUVILLE. BIVILLE. — HÉAUVILLE. LE ROZEL.

Notre plante appartient à la variété *nanum* Koch.

***Ænanthe* L. — Ænanthe.**

OE. *FISTULOSA*. L.—*Æ. FISTULEUSE*. 2. Juillet-septembre. AR. Fossés, lieux marécageux, rutoirs. — CHERBOURG. — TOURLAVILLE. EQUEURDREVILLE. HAINNEVILLE. QUERQUEVILLE. DIGOSVILLE. — FERMANVILLE. COSQUEVILLE. VRASVILLE. RÉTHOVILLE. NÉVILLE. — OMONVILLE-LA-PETITE. VAUVILLE. SOTTEVILLE. SIOUVILLE. PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

OE. *POLLICHII* Gm. — *Æ. DE POLLICH*. — *Æ. peucedanifolia* Pollich. 2. Mai, juin. TR. Prés très humides. CHERBOURG : près du Trottebee. — PIERREVILLE : vallée de la Seic. SURTAINVILLE : même vallée, vallon au sud de l'église, ferme de Guinfard.

OE. LACHENALII Gm. — OE. *DE LACHENAL*. — OE. *peucedanifolia* Pollini. — OE. *pimpinelloïdes* Sm. non L. ♀. Juillet - sept. R. Lieux marécageux et prés humides, surtout dans la région maritime. TOURLAVILLE: la mare. QUERQUEVILLE: les mielles. LE MESNIL-au-VAL: marais de la Saire. — FERNANVILLE et COSQUEVILLE: marécages maritimes. GATTEVILLE: prés et marais salés de l'est. — NACQUEVILLE: prés voisins de la mare. — SURTAINVILLE: ferme de Guinfard.

OE. CROCATA L. — OE. *SAFRANÉE*. — OE. *apiifolia* Brot. — (*Grande chuë*.) ♀. Juin, juillet. C. Rivières et ruisseaux, étangs, fossés.

Toutes les plantes de ce genre sont extrêmement vénéneuses.

***Æthusa* L. — *Ethuse*.**

ÆTHUSA CYNAPIUM L. — E. *ACHE-DES-CHIENS*. — (*Petite ciguë, faux persil*.) ☉. Juillet - septembre. C. Lieux cultivés.

Var. *b. pygmæa* Koch. — *Æ. segetalis* Bœnng. C. Moissons.

Plante très vénéneuse, pouvant être confondue avec le Persil.

***Fœniculum* Hoffm. — *Fenouil*.**

F. OFFICINALE All. — F. *OFFICINAL*. — F. *vulgare* Gærtn. — *Anethum Fœniculum* L. ♀. Juin - septembre. Lieux secs et pierreux, talus des fossés, bords des champs. Croît surtout dans la région maritime. R. à l'intérieur. CHERBOURG. — OCTEVILLE. QUERQUEVILLE. — THÉVILLE. ANGOVILLE. TÈCQUEVILLE. COSQUEVILLE. VRASVILLE. RÉTHOVILLE. NÉVILLE. GOUBERVILLE. GATTEVILLE. — NACQUEVILLE. OMONVILLE-LA-ROQUE. — SIOUVILLE. TRÉAUVILLE. FLAMANVILLE. LE ROZEL. SURTAINVILLE.

Plante très aromatique, dont toutes les parties sont excitantes et carminatives.

***Crithmum* Tourn. — *Crithme*.**

C. MARITIMUM L. — C. MARITIME. Ȳ. Juin-septembre.
Rochers et graviers maritimes, falaises. Abonde dans l'Ouest de
l'arrondissement. — Bien moins commun sur le littoral du Nord.

Plante aromatique, connue sous les noms de *Perce-Pierre*, *Criste-Marine*, *Fenouil-de-mer*, dont les jeunes pousses et les feuilles, confites au vinaigre, servent de condiment.

***Angelica* L. — *Angélique*.**

A. SYLVESTRIS L. — A. SAUVAGE. — *Imperatoria sylvestris* DC. — *Selinum sylvestre* Crantz. Ȳ. Juillet-septembre. C.
Bords des rivières et des ruisseaux, fossés, prés et bois humides.

Plante aromatique, carminative, excitante.

***Pastinaca* Tourn. — *Panais*.**

P. SYLVESTRIS Mill. — P. SAUVAGE. ②. Juillet-septembre.
PC. Champs incultes, bords des chemins.

Le PASTINACA SATIVA Mill. se trouve fréquemment subspontané.

***Heracleum* L. — *Berce*.**

H. SPHONDYLIIUM L. — B. BRANC-URSINE (*Faux panais*, *Souffloure*). ②. Juin-août. TC. Prairies.

Les espèces formées récemment par suite du démembrement du type linnéen présentent-elles bien des caractères assez constants pour mériter d'être conservées ?

***Daucus* Tourn. — *Carotte*.**

D. CAROTA L. — C. COMMUNE. ②. Juin-août. TC. Prés secs, coteaux arides, bords des chemins et des champs.

D. MARITIMUS With. non Lamk. — C. MARITIME. —

D. gummifer Gr. et Godr. ☉. Juin-août. Commun dans les falaises de l'Ouest de l'arrondissement.

La plante citée par M. Delachapelle sous le nom de *Daucus hispidus*, et indiquée par lui comme abondante dans les falaises de Flamanville, n'est autre que le *Daucus maritimus* With.

***Torilis* Hoffm. — *Torilis*.**

T. ANTHRISCUS Gm. — T. ANTHRISQUE. — *Caucalis Anthriscus* Scop. — *Tordylium Anthriscus* L. ☉. Juillet-septembre. TC. Haies et buissons, bords des chemins.

T. NODOSA Gærtn. — T. NOUEUX. — *Caucalis nodiflora* Lamk. — *Tordylium nodosum* L. ☉. Juin-août. AC. Lieux secs ou pierreux, pied des murs, bords des chemins.

Var. *b. nana* Bréb. — PC. Sables et graviers maritimes.

***Scandix* Gærtn. — *Scandix*.**

S. PECTEN VENERIS L.—S. PEIGNE DE VÉNUS. — (*Perce-Pouche*, *Aiguilles*). ☉. Mai-septembre. C. Moissons.

***Anthriscus* Hoffm. — *Anthriscus*.**

A VULGARIS Pers. — A. VULGAIRE. — *Caucalis scandi-cina* Roth. — *Scandix Anthriscus* L. ☉. Mai, juin. Pied des murs, décombres, lieux incultes de la région maritime. AC. surtout dans le canton de Saint-Pierre-Eglise.

A. SYLVESTRIS Hoffm. — A. SAUVAGE. — *Chærophyllum sylvestre* L. ♀. Avril-juin. TR. Haies. OCTEVILLE: chemin ombragé de l'Amont-Quentin à la Bufférie.

L'ANTHRISCUS CEREFOLIUM Hoffm. (*Cerfeuil cultivé*) se trouve assez fréquemment à l'état subspontané.

***Cherophyllum* L. — Cerfeuil.**

C. TEMULUM L. — C. ENIVRANT. — *Scandix nutans* Roth.
— *Myrrhis temula* Spreng. ②. Mai-juillet. TC. Haies et buissons, bords des chemins.

Plante vénéneuse.

Le MYRRHIS ODORATA Scop. (*Cerfeuil perpétuel*) est naturalisé dans quelques localités, entre autres à Sainte-Croix-Hague, à Carneville, dans le cimetière, et à Sideville, près de l'église.

***Conium* L. — Ciguë.**

C. MACULATUM L. — C. TACHETÉE. — *Cicuta major* Lamk.
— (*Grande ciguë, chuë.*) ②. Juin-août. AC. Lieux incultes, décombres, bords des chemins, surtout dans la région maritime.

Plante très vénéneuse; usitée en médecine comme fondante et résolutive.

***Smyrniurn* L. — Maceron.**

S. OLUSATRUM L. — M. ACHE-NOIRE. — *S. Matthioli* Tourn. ②. Avril-juin. TR. CHERBOURG: le Roule, au bord du chemin de la Glacerie. — TOURLAVILLE; même localité. MARTINVAST: environs du pont. — NACQUEVILLE: le Marais-de-Bas.

M. Le Jolis n'a pas vu cette plante dans ses véritables stations, c'est ce qui la lui a fait regarder comme introduite.

***Coriandrum* L. — Coriandre.**

C. SATIVUM L. — C. CULTIVÉE ☉. Juin, juillet. RRR.
CHERBOURG: bords des chemins dans les mielles, environs du fort Longlet, la Bucaille.

Cette plante n'est l'objet d'aucune culture dans le pays.

ARALIACÉES.

***Hedera* L. — Lierre.**

H. HELIX L. — *L. RAMPANT.* — (*Glièru.*) 3. Septembre - novembre. TC. Vieux murs, rochers, troncs d'arbres.

Var. *b. prostrata* Coss. et Germ. — TC. Sur la terre, dans les bois.

Baies légèrement vénéneuses, purgatives; feuilles très utilisées pour le pansement des exutoires.

CORNEES.

***Cornus* Tourn. — Cornouiller.**

C. SANGUINEA L. — *C. SANGUIN.* — (*Cornouiller femelle.*) 3. Mai, juin. AR. Haies, bois. OCTEVILLE. MARTINVAST. TEURTHÉVILLE-HAGUE. — TONNEVILLE. NACQUEVILLE. URVILLE-HAGUE. VAUVILLE. BIVILLE. — Moins rare dans le canton des Pieux : BENOISTVILLE. LES PIEUX. HÉAUVILLE. TRÉAUVILLE. FLAMANVILLE. PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

SAXIFRAGÉES.

***Saxifraga* L. — Saxifrage.**

S. TRIDACTYLITES L. — *S. TRIDACTYLE.* ☉. Avril, mai. C. Murs, toits, lieux sablonneux.

Var. *b pusilla* Bréb. — *S. minuta* Poll. — AC.

***Chrysosplenium* Tourn. — Dorine.**

C. OPPOSITIFOLIUM L. — *D. A FEUILLES OPPOSÉES.* — (*Herbe dorée.*) ♀. Mars-mai. AC. Chemins creux humides, bords des ruisseaux et des sources.

CRASSULACÉES.

***Tillwa* L. — *Tillée*.**

T. MUSCOSA L. — *T. MOUSSUE*. ☉. Mai, juin. R. Lieux pierreux ou sablonneux, bords des chemins, dans les cantons de Saint-Pierre-Église et des Pieux. SAINT-PIERRE-ÉGLISE : vallon de Hacouville. ANGOVILLE : plateau des Mouterres, le Haut-Hameau. TOCQUEVILLE : les coteaux. FERMANVILLE : chemin de Cosqueville. COSQUEVILLE : chemins de Fermanville et d'Angoville, ferme de Renouville. NÉVILLE : Cracret, la Houquette, environs de l'église. GATTEVILLE : le village, chemin de l'église à Imbranville. — FLAMANVILLE : cours du château. LE ROZEL : la falaise.

***Umbilicus* DC. — *Ombilie*.**

U. PENDULINUS DC. — *O. A FLEURS PENDANTES*. — *Cotyledon Umbilicus* L. — (*Godets, Nombril de Vénus, Herbe grasse*.) ☿. Mai-juillet. TC. Vieux murs, toits, rochers, haies.

Plante émolliente, résolutive, très employée en cataplasme.

***Sedum* L. — *Orpin*.**

S. TELEPHIUM L. — *O. REPRISE*. — (*Herbe à la coupure*.) ☿. Juillet, août. RRR. Bois de FLAMANVILLE. LE ROZEL.

S. ANGLICUM Huds. — *O. D'ANGLETERRE*. ☿. Juin, juillet. C. Coteaux, rochers, murs, toits.

S. ACRE L. — *O. ACRE*. ☿. Juin, juillet. AC. Lieux sablonneux, murs, toits, surtout dans la région maritime.

Cette espèce porte, ainsi que la précédente, les noms vulgaires de *Tétine de souris*, *Vermiculaire*, *Thym de crapaud*.

S. ELEGANS Lej. — *O. ÉLÉGANT*. 4. Juin, juillet. TR. OCTEVILLE: murs près de la chapelle Saint-Sauveur. ÉQUEURDEVILLE: vieux murs près du manoir. — SOTTEVILLE: toits des chaumières sur la route des Pieux. LES PIEUX: toits de chaume près de la carrière à kaolin.

M. Le Jolis regarde ce *Sedum* comme échappé des jardins, mais il ne se fonde sur aucun motif à cet égard.

S. GLAUCUM Sm. — *O. GLAUQUE*. — *S. rupestre* L. 4. Juillet, août. R. Vieux murs, toits. TOURLAVILLE: les Flottes. QUERQUEVILLE: vieux murs du village. HAINNEVILLE: environs de l'église. DIGOSVILLE: hameau Garçonnet. — CANTELOUP: hameau des Mieux. TOCQUEVILLE: ferme d'Ozeville.

On ne conçoit pas comment M. Le Jolis a pu élever des doutes sur l'indigénat de cette espèce.

Il n'est pas encore constaté que nous ayons dans notre arrondissement le véritable *SEDUM REFLEXUM* L.

Toutes les plantes de ce genre doivent être regardées comme suspectes.

***Semperivum* L. — Joubarbe.**

S. TECTORUM L. — *J. DES TOITS*. 4. Juillet. PC. Toits, vieux murs.

Plante légèrement acide, employée contre les cors.

Dicotylédones polypétales périgynes pleurosporées.

GROSSULARIÉES.

***Ribes* L. — Groseille.**

R. UVA-CRISPA L. — *G. ÉPINEUX*. 3. Mars-mai. R. Haies, bois. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. COUVILLE.

BRETTEVILLE. — GONNEVILLE. — GRÉVILLE. ÉCULLEVILLE. -- HÉAUVILLE. FLAMANVILLE.

R. RUBRUM L. — *G. ROUGE*. — (*Gradillier*.) 3. Mars, avril.
TR. Bois, bords des rivières. OCTEVILLE: bords de la Divette.
MARTINVEST: bois du château. VIRANDEVILLE: bois du château.
TOLLEVAST: la Terre du Bois. — FLAMANVILLE: les bois.

Les RIBES GROSSULARIA et NIGRUM L. se remarquent quelquefois à l'état subspontané près des vergers et des jardins.

Dicotylédones polypétales périgynes axosporées exalbuminées.

ONAGRARIÉES.

***Epilobium* L. — *Epilobe*.**

E. SPICATUM Lamk. — *E. A ÉPI*. — *E. angustifolium* L.
— *Chamænerium angustifolium* Scop. — (*Osier fleuri, Laurier Saint-Antoine*.) 4. Juillet, août. TR. Buissons ombragés, bois frais. CHERBOURG: l'Hermitage-de-Bas. — TOURLAVILLE: la Roche-au-Chat, les Pares-Basans. TOLLEVAST: environs de la Pierre-Butée.

E. HIRSUTUM L. — *E. VELU*. 4. Juillet-septembre. AC. Fossés, bords des eaux.

Var. *b. verticillatum*. — PC.

E. PARVIFLORUM Schreb. — *E. A PETITES FLEURS*. 4. Juin-septembre. Bords des eaux, lieux très-humides.

Var. *a. E. molle* Lamk. — PC.

Var. *b. E. intermedium* Mér. — C.

E. MONTANUM L. — *E. DES MONTAGNES*. Ȳ. Juin-août.
C. Lieux ombragés, haies.

E. LANCEOLATUM Seb. et Maur. — *E. LANCÉOLÉ*. Ȳ. Juin-septembre. C. Murs, lieux pierreux.

E. PALUSTRE L. — *E. DES MARAIS*. Ȳ. Juin-août. R. TOURLAVILLE: marécages boisés du Culpereux. TOLLEVAST: bords du Culpereux entre la Brigade et la Crevière, marais d'Ombre. — FERMANVILLE: bords de l'étang du moulin du Brick. — TONNEVILLE: marécages boisés de Percy. SAINTE-CROIX-HAGUE et BIVILLE: ruisseau et vallon de Claire-Fontaine.

E. OBSCURUM Schreb. — *E. OBSCUR*. — *E. virgatum* Auct. — *E. ambiguum* Fries. Ȳ. Juin-août. C. Bords des eaux, lieux humides.

E. TETRAGONUM L. — *E. TÉTRAGONE*. Ȳ. Juin-août. PC. Lieux humides, fossés.

***Circaea* Tourn. — *Circée*.**

C. LUTETIANA L. — *C. DES PARISIENS*. (*Herbe aux Sorcières*.) Ȳ. Juin-août. AC. Bois, lieux frais couverts.

HALORAGÉES.

***Myriophyllum* Vaill. — *Myriophylle*.**

M. SPICATUM L. — *M. A. ÉPI*. — (*Volant d'eau*.) Ȳ. Juin-août. R. Grandes mares du littoral.

M. VERTICILLATUM L. — *M. VERTICILLÉ*. Ȳ. Juin-août. R. Fossés, étangs, lieux marécageux. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. — NACQUEVILLE.

M. ALTERNIFLORUM DC. — *M. A FLEURS ALTERNES.* 4.
Mai-juillet. R. DIGOSVILLE: étang de Bruneval. — CARNEVILLE:
flaques au bord de la lande. NÉVILLE: la mare. — VAUVILLE:
chemin de Biville, ruisseau de la Grande-Vallée. — BENOISTVILLE:
étangs de la Diélette. GROSVILLE: ruisseau des Fondais.

CALLITRICHINÉES.

Callitriche L. — *Callitriche.*

C. AQUATICA Huds. — *C. AQUATIQUE.* — (*Étoile d'eau.*)
4. Avril-septembre. Rivières et ruisseaux, mares, étangs, fossés.

Var. *a.* *C. stagnalis* Scop. — TC.

Var. *b.* *C. verna* Kütz. — *C. vernalis* Koch. — C.

Var. *c.* *C. platycarpa* Kütz. — PC.

Var. *d.* *C. pedunculata* DC. — TR. Fossés sur la limite de
JOBOURG et d'OMONVILLE-LA-PETITE.

C'est à tort que M. Le Jolis indique que M. Bertrand Lachênée a
trouvé cette plante à Herqueville.

Var. *e.* *C. hamulata* Kütz. — PC.

Var. *f.* *C. angustifolia* Hopp. — *C. autumnalis* Auct. — AC.

HIPPURIDÉES.

Hippuris L. — *Pesse.*

H. VULGARIS L. — *P. COMMUNE.* (*Queue de cheval.*) 4.
Mai-juillet. TR. QUERQUEVILLE: fossés du fort. — NACQUEVILLE:
la mare et les fossés voisins.

LYTHRARIÉES.

***Lythrum* L. — *Saticaire*.**

L. SALICARIA L. — *S. COMMUNE*. ☿. Juillet - septembre. C.
Bords des eaux, fossés.

L. HYSSOPIFOLIA L. — *S. A FEUILLES D'HYSOPE*. ☉.
Juin - septembre. AR. Bords des flaques, chemins très humides,
lieux exondés. BRETTEVILLE. — GONNEVILLE. THÉVILLE. CARNEVILLE.
FERMANVILLE. COSQUEVILLE. VAROUVILLE. TOCQUEVILLE. NÉVILLE.
GOUBERVILLE. GATTEVILLE. — SAINT-GERMAIN-DES-VAUX. — LES
PIEUX. SOTTEVILLE. BRICQUEBOSQ. HELLEVILLE. LE ROZEL. SAINT-
GERMAIN-LE-GAILLARD. SURTAINVILLE.

On voit que cette plante croît surtout dans les cantons de Saint-
Pierre-Église et des Pieux.

Var. *b. geminiflorum* Leb. — TR. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD :
hameau des Nouettes.

***Peplis* L. — *Péplide*.**

P. PORTULA L. — *P. POURPIER*. ☉. Juillet, août. C. Mares,
fossés et chemins très marécageux.

Var. *b. alternifolia* Bréb. — Bois du Mont-du-Roc.

ROSACÉES.

***Pyrus* L. — *Poirier*.**

P. COMMUNIS L. — *P. COMMUN*. 3. Avril, mai. R. Bois,
haies.

Var. *a. P. Achras* Gärtn. — TOURLAVILLE : colline des Terres-
Feuillies. ÉQUEURDREVILLE.

Var. *b. P. Pyrastrer* Bor. — OCTEVILLE: les Fourches.

Var. *c. P. cordata* Desv. HERQUEVILLE: environs du bois de Beaumont. — PIERREVILLE: vallée de la Scie.

Malus Tourn. — Pommier.

M. COMMUNIS Poir. — *P. COMMUN.* — *Pyrus Malus* L. 3. Avril, mai. PC. Haies, bois, coteaux.

M. ACERBA Mér. — *P. ACERBE.* — *Pyrus acerba* DC. — (*Suret.*) 3. Avril, mai. R. CHERBOURG: montagne du Roule. — BRILLEVAST: bois de Blanqueville. — TONNEVILLE: bois de Percy. SAINTE-CROIX-HAGUE: bois du Bigard. FLOTTEMANVILLE-HAGUE.

Sorbus L. — Sorbier.

S. AUCUPARIA L. — *S. DES OISELEURS.* — *Pyrus aucuparia* Gærtn. 3. Mai, juin. AR. Bois. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. NOUAINVILLE. SIDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. TOLLEVAST. LE MESNIL-AU-VAL. — MAUPERTUS. FERMANVILLE. CARNEVILLE. GONNEVILLE. LE THEIL. BRILLEVAST. — TONNEVILLE. SAINTE-CROIX-HAGUE.

Mespilus L. — Néflier.

M. GERMANICA L. — *N. D'ALLEMAGNE.* — (*Mélier.*) 3. Mai, juin. C. Haies et coteaux boisés.

Crataegus Lindl. — Aubépine.

C. MONOGYNA Jacq. — *A. MONOGYNE.* — *Mespilus oxyacantha* DC. (*Épine blanche.*) 3. Mai, juin. TC. Haies et buissons, bois.

Les fruits portent le nom vulgaire de *Hagues*.

Rosa Tourn. — Rosier.

R. ARVENSIS L. — *R. DES CHAMPS*, 3. Juin, juillet, C. Haies, bois, buissons.

Var. *b.* **R. bibracteata** Bast. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. MARTINVAST. TEURTHÉVILLE-HAGUE. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD. TOLLEVAST. — GRÉVILLE. — BRICQUEBOSQ. SURTAINVILLE.

Var. *c.* **R. leucochroa** Desv. — R. SIDEVILLE: bois du Mont-du-Roc.

R. SYSTYLA Bast. — R. *A STYLES SOUDÉS*. 3. Juin, juillet. R. Haies, buissons. SURTAINVILLE: environs du village de Hauteville.

R. PIMPINELLIFOLIA L. — R. *PIMPRENELLE*. 3. Mai-juillet. AR. Haies, buissons, coteaux, surtout dans la région maritime; mielles et dunes. CHERBOURG. — OCTEVILLE. BRETTEVILLE. — FERMANVILLE. — GRÉVILLE. OMONVILLE-LA-PETITE. SAINT-GERMAIN-DES-VAUX. JOBOURG. HERQUEVILLE. VAUVILLE. BIVILLE.

Var. *b.* **R. spinosissima** L. — Ça et là dans la région maritime.

R. DUMALIS Bechst. — R. *DES HALLIERS*. — R. *stipularis* Mér. — R. *canina* Lém. — (*Rosier de chien*.) 3. Juin, juillet. C. Haies et buissons, bois.

Var. *b.* **umbellata** Nob. CHERBOURG: la Bucaille.

R. DUMETORUM Thuill. — R. *DES BUISSONS*. 3. Juin, juillet. R. Haies, buissons. PIERREVILLE: vallée de la Scie. SURTAINVILLE: environs de Hauteville.

R. RUBIGINOSA L. — R. *ROUILLE*. 3. Juin, juillet. R. Buissons, haies pierreuses. CHERBOURG: pied nord de la montagne du Roule. — TOURLAVILLE: le Roule. — SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD: hameau du Chuquet.

R. LEMANI Boreau. — R. *DE LÉMAN*. — R. *Hystrix* Lém. 3. Juin, juillet. R. Haies et buissons. OCTEVILLE: bords de l'ancienne route des Picux. — PIERREVILLE: coteaux de Teranne.

R. TOMENTOSA Sm. — *R. COTONNEUX*. 3. Juin, juillet. R. Haies, fourrés. OCTEVILLE: environs de Féronnay. TEURTHÉVILLE-HAGUE: environs du bois de Nérée. VIRANDEVILLE. — FLOT-TEMANVILLE-HAGUE: Le Mesnildot. GRÉVILLE: la Quiesce. HERQUEVILLE.

D'après quelques auteurs, les *ROSA TEREBINTHINACEA* Bess., *SUBGLOBOSA* Sm. et *MOLLISSIMA* Fries ne seraient que des formes de cette espèce.

Tous les Rosiers portent le nom vulgaire d'*Églantiers*; leurs fruits astringents étaient autrefois très employés sous le nom de *Cynorrhodons*.

***Agrimonia* Tourn. — *Aigremoine*.**

A. EUPATORIA L. — *A. EUPATOIRE*. 4. Juin - août. PC. Chemins, coteaux, bords des bois.

A. ODORATA Mill. — *A. ODORANTE*. 4. Juin - septembre. AR. Haies, bords des champs. CHERBOURG. — OCTEVILLE. EQUEURDREVILLE. HAINNEVILLE. MARTINVAST. SIDEVILLE. VIRANDEVILLE. COUVILLE. — LE VAST. — TONNEVILLE. JOBOURG.

Ces deux plantes sont légèrement astringentes.

***Aphanes* L. — *Aphane*.**

A. ARVENSIS L. — *A. DES CHAMPS*. — *Alchemilla arvensis* Scop. ☉. Mai - septembre. TC. Champs, talus des fossés, murs.

***Poterium* L. — *Pimprenelle*.**

P. GUESTPHALICUM Bœnng. — *P. DE WESTPHALIE*. — *P. dictyocarpum* var. *glaucum* Spach. 4. Juin, juillet. R. CHERBOURG: remparts du port militaire. — BIVILLE: les mielles, les coteaux maritimes et de Bival, vallon des Guérendes. VASTEVILLE: pelouses maritimes, coteaux de Bival et de Claire-Fon-

taine. — HÉAUVILLE : les mielles, coteaux de la Roque. SIOUVILLE : coteaux maritimes. THÉAUVILLE : coteaux de la Diélette. FLAMANDVILLE et LES PIEUX : coteaux maritimes. LE ROZEL : la falaise. SURTAINVILLE : coteaux du Poux, les carrières calcaires.

P. PLATYLOPHUM Jord. — *P. A LARGES CRÊTES*. — *P. muricatum* var. *a*. Spach. 24. RRR. CHERBOURG : glacis des fortifications du port militaire.

Plantes aromatiques, condimentaires.

***Rubus* L. — Ronce.**

R. IDÆUS L. — *R. FRAMBOISIER*. 3. Mai, juin. R. Collines boisées, buissons rocailleux des vallons. CHERBOURG : montagne du Roule. — OCTEVILLE : la Fauconnière, vallée de Quineampoix.

M. Le Jolis n'a vu cette espèce qu'échappée des jardins.

R. FASTIGIATUS W. et N. — *R. FASTIGIÉE*. 3. Mai-juillet. AC. Taillis, landes buissonneuses.

Var. *b*. **R. plicatus** W. et N. — C. Halliers marécageux, bruyères tourbeuses, bois humides.

R. CARPINIFOLIUS W. et N. — *R. A FEUILLES DE CHARME*. 3. Juin-août. PC. Bois, haies des coteaux ombragés.

Var. *b*. **R. macrophyllus** W. et N. — AC. Fourrés, bois épais.

R. NITIDUS Bell Salt. — *R. BRILLANTE*. 3. Juin, juillet. C. Bois et buissons pierreux, halliers près des carrières.

R. CORYLIFOLIUS Sm. — *R. A FEUILLES DE COUDRIER*. 3. Juin, juillet. AC. Bois, haies.

R. VILLICAULIS W. et N. — *R. A TIGE POILUE*. 3. Juillet, août. C. Haies, buissons épais.

Var. *b.* **R. sylvaticus** W. et N. — PC. Bois.

R. RHAMNIFOLIUS W. et N. — *R. A FEUILLES DE NER-PRUN.* — *R. Thuillieri* Poir. 3. Juin-août. PC. Haies pierreuses, bords des bois montueux.

R. DISCOLOR W. et N. — Bab. — *R. DISCOLORE.* 3. Juin-septembre. TC. Haies et buissons, bords des chemins et des champs, surtout dans les terrains schisteux.

Var. *b.* **R. thyrsoides** Wimm. — *R. candicans* Rehb. — C. Haies, bords des bois.

Var. *c.* **R. argenteus** W. et N. — PC. Buissons pierreux.

Var. *d.* **R. leucostachys** Sm. — PC. Taillis rocailleux.

R. RADULA W. et N. — *R. RAPE.* 3. Juin-août. AR. Halliers découverts, coteaux secs. OCTEVILLE: la Fauconnière. TEURTHÉVILLE-HAGUE.

Var. *b.* **R. Lingua** W. et N. — R. Buissons des collines. OCTEVILLE: la Fauconnière.

Var. *c.* **R. rudis** W. et N. — R. Bois, fourrés ombragés. OCTEVILLE et TOURLAVILLE: vallée de Quincampoix.

R. KOEHLERI W. et N. — *R. DE KOEHLER.* 3. Juin-août. C. Haies et buissons, bords des chemins et des champs incultes, surtout dans les terrains quartzeux.

Var. *b.* **R. infestus** W. et N. — PC. Carrières, champs stériles.

Var. *c.* **R. Güntheri** Bell Salt. — PC. Fourrés et halliers pierreux.

R. SCABER W. et N. — *R. SCABRE.* 3. Juin, juillet. PC. Bois pierreux, buissons des collines.

R. GLANDULOSUS Bellard. — *R. GLANDULEUSE.* 3. Juin,

juillet. PC. Rochers, buissons, bois montueux du terrain quartzeux.

Var. *b. R. rosaceus* W. et N. — PC. Halliers, lisières des bois.

R. HIRTUS Waldst et Kitaib. — *R. HÉRISÉE*. 3. Juin, juillet. AC. Coteaux arides, bruyères, lieux rocailleux.

Var *b. R. Menkei* W. et N. — AC. Mêmes stations.

R. DUMETORUM W. et N. — *R. DES BUISSONS*. 3. Juin-août. PC. Haies sèches, bords des chemins, pied des murs.

R. CÆSIUS L. — *R. BLEUATRE*. 3. Juin-août. TR. Bords des champs du littoral de NACQUEVILLE.

Var *b. pseudo-saxatilis* Godr. — TR. Mielles de VAUVILLE vers la mare.

Les fruits des différentes ronces portent les noms vulgaires de *Mûres sauvages*, *Moures*. Ils sont acides et servent à préparer un sirop employé avec avantage contre les maux de gorge.

L'étude des espèces de ce genre est très-difficile; il faudrait prudemment se garder de trop en restreindre ou de trop en multiplier le nombre, jusqu'à ce que les caractères tranchés et constants qui doivent les distinguer aient pu être reconnus et exposés avec concision et netteté dans une monographie embrassant au moins les différentes régions de l'Europe; car si l'on a déjà quelques bons ouvrages sur cette matière, tels que ceux de Weihe et Nees, de Babington, de Godron, d'Arrhenius, etc., ils ne concernent que la flore d'un pays, et une nouvelle difficulté s'élève quand il s'agit d'en établir la synonymie.

D'après M. Le Jolis, nous aurions encore dans notre arrondissement les *Rubus* suivants : *R. WARLBERGII* Arrhen. — *NEMOCHARIS* Ph. Müll. — *LEJEUNII* W. et N. — *CONSPICUUS* Ph. Müll.

***Fragaria* L. — Fraisier.**

F. VESCA L. — *F. COMESTIBLE*. — (*Fraisier des bois*.) 4. Avril-juin. AC. Bois, haies ombragées.

C'est d'après une indication erronée que M. de Brébisson signale à Cherbourg le *FRAGARIA ELATIOR* Ehrh.

On trouve assez fréquemment subspontané le *FRAGARIA GRANDIFLORA* Ehrh. (*Fraisier Ananas*) dans les vieux jardins et dans le voisinage des vergers.

***Comarum* L. — *Comaret*.**

C. PALUSTRE L. — *C. DES MARAIS*. — *Potentilla Comarum* Scop. ♀. Juin, juillet. TR. HARDINVAST: bord de l'Ouve, près le moulin Clair-Douet; prés marécageux en face de l'église de Tollevast. — SOTTEVILLE: près de la Divette, sous le château.

M. Le Jolis, en indiquant dans sa liste que cette plante croît au bord de la Divette à Tollevast, commet une erreur grave de topographie, puisque cette rivière ne coule nullement en cette commune.

***Potentilla* L. — *Potentille*.**

P. FRAGARIASTRUM Ehrh. — *P. FRAISIÉR*. — *P. Fragaria* Poir. — *Fragaria sterilis* L. — (*Fraisier stérile*, *Faux fraisier*.) ♀. Mars-mai. TC. Haies, bords des chemins, bois.

P. TORMENTILLA Nestl. — *P. TORMENTILLE*. — *Tormentilla erecta* L. ♀. Juin-août. TC. Landes et bruyères, bois.

P. NEMORALIS Nestl. — *P. DES BOIS*. — *P. procumbens* Sibth. — *T. reptans* L. ♀. Juin-août. AR. Bois, haies, bords des chemins pierreux. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. NOUAINVILLE. HAINNEVILLE. VIRANDEVILLE. COUVILLE. HARDINVAST. TOLLEVAST. — BEAUMONT. FLOTTEMANVILLE-HAGUE. TONNEVILLE. ECULLEVILLE. HERQUEVILLE. — SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC. BRICQUEBOSQ. PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

Var. *b. P. mixta* Nolt. — R. Mêmes stations. EQUEURDEVILLE: environs des eaux minérales des Fourches. TOLLEVAST: envi-

rons des Chèvres. — FLOTTEMANVILLE-HAGUE : vallon de Herville.
— HELLEVILLE : vallon d'Etoupeville.

P. REPTANS L. — *P. RAMPANTE*. — (*Quintefeuille*.) 4. Juin-septembre. TC. Bords des chemins, pied des murs, champs incultes.

P. ANSERINA L. — *P. ANSÉRINE*. — (*Argentine, Herbe aux oies*.) 4. Mai-juillet. TC. Chemins humides, pâturages, lieux mouillés l'hiver.

Les plantes de ce genre jouissent de propriétés astringentes marquées.

***Geum* L. — *Benoîte*.**

G. URBANUM L. — *B. COMMUNE*. 4. Mai-août. C. Haies, bois.

Racine astringente et tonique, recherchée.

***Spiræa* L. — *Spirée*.**

S. ULMARIA L. — *S. ULMAIRE*. — (*Reine des prés*.) 4. Juin-août. C. Bords des eaux, fossés, prés très humides.

Var. *a. S. glauca* Schultz.

Var. *b. S. denudata* Hayn.

Les feuilles sont aromatiques, cordiales; la racine astringente. Toute la plante est vantée contre l'hydropisie.

On trouve assez rarement naturalisé dans les haies le *SPIRÆA SALICIFOLIA* L.

***Prunus* Tourn. — *Prunier*.**

P. SPINOSA L. — *P. ÉPINEUX*. — (*Prunellier, Epine noire*.) 3. Mars-mai. TC. Haies et buissons, bois, coteaux.

P. FRUTICANS Weihe. — *P. FRUTESCENT*. — *P. spinosa* var. *macrocarpa* Wallr. 3. Mars-mai. PC. Haies.

P. INSITITIA L. — *P. SAUVAGE*. 3. Avril, mai. R. Haies, buissons pierreux. CHERBOURG: pied nord de la montagne du Roule. — SAINTE-CROIX-HAGUE: environs de la rue d'Auzouville.

Les fruits de ces trois espèces, qui sont connus sous les noms de *Prunelles*, *Blosses*, sont fortement acerbes et astringents.

Le PRUNUS DOMESTICA L. se trouve quelquefois à l'état subsponané dans les haies, aux environs des jardins et des vergers; le P. CERASIFERA Ehrh. se rencontre plus rarement dans le même état, près des parcs, etc.

***Cerasus* Juss. — *Cerisier*.**

C. AVIUM Moench. — *C. DES OISEAUX*. — *Prunus avium* L. — (*Merisier*.) 3. Avril, mai. AC. Bois et haies.

Les CERASUS JULIANA DC. (*Guignier*) et DURACINA DC. (*Bigarreau-tier*) se rencontrent rarement naturalisés çà et là.

C. VULGARIS Mill. — *C. COMMUN*. — *C. caproniana* DC. — *P. Cerasus* L. 3. Avril, mai. PC. Haies.

Le CERASUS LAURO-CERASUS Lois. (*Laurier-Cerise*) est presque naturalisé.

PAPILIONACÉES.

***Ornithopus* L. — *Ornithope*.**

O. PERPUSILLUS L. — *O. DÉLICAT*. — (*Pied-d'oiseau*.) ☉. Mai-juillet. C. Pelouses, landes, coteaux pierreux, murs.

Le CORONILLA EMERUS (*Coronille des jardins*) se remarque rarement à l'état subsponané dans les environs des bosquets et des parcs.

L'ONOBRYCHIS SATIVA Lamk. (*Sainfoin*, *Esparcette*), cultivé dans les calcaires comme excellent fourrage, se trouve bien rarement chez nous à l'état subsponané.

Orobis Tourn. — Orobe.

O. TUBEROSUS L. — O. *TUBÉREUX*. — *Lathyrus macrorhizus* Wimm. ♀. Avril-juin. CHERBOURG: Hautmarais. — TEURTHÉVILLE-HAGUE: bois de Nérée. — MAUPERTUS et FERMANVILLE: ruisseau et bois du Doux-Riant. — FLOTTEMANVILLE-HAGUE: bois de la Villeneuve. GRÉVILLE: les falaises. ÉCULLEVILLE: vallons et coteaux maritimes. OMONVILLE-LA-ROGUE: ferme de la Cotentine. — SURTAINVILLE: bois de la Baronnerie et de la Poupardière.

Cette plante est commune dans la plupart des bois précités, station qui lui est éminemment propre. M. Le Jolis commet donc une grave erreur de géographie botanique, lorsqu'il affirme, dans sa liste des plantes vasculaires, page 99, que l'*Orobis tuberosus* L. ne croît dans notre contrée que dans une *localité restreinte*, les falaises de Gréville.

Lathyrus L. — Gesse.

L. APHACA L. — G. *SANS FEUILLES*. — *L. segetum* Lamk. ☉. Juin, juillet. CHERBOURG: environs de l'abattoir et de la plaine du port militaire. — OCTEVILLE: champs de la Prévalerie.

L. PRATENSIS L. — G. *DES PRÉS*. ♀. Juin-août. AC. Haies, buissons frais, bords des bois.

L. SYLVESTRIS L. — G. *DES BOIS*. — ♀. Juin-août. TR. Falaises de HERQUEVILLE.

Vicia Koch. — Vesce.

V. SATIVA L. — V. *CULTIVÉE*. (*Hivernage*.) ☉. Mai, juin. AC. Champs, moissons.

Cette plante est très cultivée comme fourrage.

Nous avons trouvé à Octeville, dans la vallée de la Divette, une variété de cette espèce, à feuilles obcordées, se rapprochant du *Vicia cordata* Wulf.

V. ANGUSTIFOLIA Koch. — V. *A FEUILLES ÉTROITES*.
— (*Vesce sauvage*.) ☉. Mai-juillet.

Var. *a*. V. *segetalis* Thuill. — (*Vesceron*.) — C. Champs.

Var. *b*. V. *Bobartii* Forst. — C. Coteaux, haies, bords des bois.

Var. *c*. V. *uncinata* Desv. — AC. Lieux secs et pierreux.

Var. *d*. *racemosa* Nob. — Fleurs plus nombreuses que dans le type et formant de petites grappes; port du V. *segetalis*.

Cette variété remarquable se rapproche beaucoup du V. *purpurascens* DC. Nous l'avons observée à Cherbourg, sur les remparts du port militaire.

V. LUTEA L. — V. *JAUNE*. ☉. Juin-septembre. RRR. Les Pieux : mielles de Scioto.

V. SEPIUM L. — V. *DES HAIES*. ♀. Juin-août. R. Bois, buissons. MAUPERTUS; bois du Doux-Riant. LE VAST: vallée de la Saire, bois de Boutron. — SURTAINVILLE: vallée de la Seie; vallon, coteaux et bois de la Baronnerie.

Il faut que M. Le Jolis n'ait pas exploré les localités importantes précitées, puisqu'il n'attribue cette plante qu'à l'arrondissement de Valognes.

V. CRACCA L. — V. *CRACCA*. — *Cracca major* Gr. et Godr. (*Covesce, Gazillon*.) ♀. Juin-août. C. Haies, bois, buissons frais.

V. VARIA Host. — V. *VARIABLE*. — *Cracca varia* Gr. et Godr. ☉. Mai-août. RRR. CHERBOURG: champs sablonneux à Sennecey.

V. HIRSUTA Koch. — V. *VELUE*. — *Errum hirsutum* L. — *Cracca minor* Gr. et Godr. ☉. Mai-août. AC. Champs, lieux pierreux.

V. TETRASPERMA Mœnch. — V. *A QUATRE GRAINES*. —

Errum tetraspermum L. ☉. Juin - août. PC. Moissons, bords des champs.

Le *FABA VULGARIS* Mœnch (*Fève commune*) se trouve à l'état subspontané, quelquefois assez loin des cultures.

***Pisum* Tourn. — *Pois*.**

P. ARVENSE L. — *P. DES CHAMPS*. ☉. Juin, juillet. PC. Champs. Quelquefois cultivé sous les noms de *Pois gris*, *Pisaille*.

On rencontre rarement à l'état subspontané le *PISUM SATIVUM* L.

***Lotus* L. — *Lotier*.**

L. CORNICULATUS L. — *L. CORNICULÉ*. ♀. Juin-septembre. TC. Pâturages, pelouses, coteaux, landes, bords des chemins.

Var. *b. L. villosus* Thuill. — R. OCTEVILLE: coteaux du Val.

Var. *c. crassifolius* Bréb. — AC. Mielles, pelouses et coteaux maritimes.

L. TENUIS Kit. — *L. GRÈLE*. — *L. tenuifolius* Rehb. ♀. Juin-septembre. TR. CHERBOURG: environs de l'église Saint-Clément. — TOURLAVILLE: prairies de la redoute. — HERQUEVILLE: champs de la Vallée.

C'est à tort que M. Le Jolis n'indique cette plante que pour l'arrondissement de Valognes.

L. MAJOR Scop. — *L. MAJEUR*. — *L. uliginosus* Schk. ♀. Juillet-septembre. TC. Haies fraîches, fossés, lieux marécageux.

L. ANGUSTISSIMUS L. — *L. ÉTROIT*. — *L. diffusus* Sm. — *L. gracilis* Waldst. et Kit. ☉. Juin, juillet. TR. OCTEVILLE: coteaux de la Divette, près le pont de Martinvast. — JOBOURG: les falaises.

L. HISPIDUS Desf. — *L. HISPIDE*. ☉. Juillet-septembre. R
CHERBOURG : colline de la Petite-Fauconnière. — OCTEVILLE : che-
min de la Polle au fort des Fourches, carrières des Entes.
ÉQUEURDEVILLE : fort du Tol. — CANELOUP : route de Saint-Pierre-
Église au Vast. NÉVILLE : bords des champs du littoral. — JOBOURG
et HERQUEVILLE : les falaises.

Le Robinier Faux-Acacia (*ROBINIA PSEUDO-ACACIA* L.), vulgairement
Acacia, est parfois planté dans les bosquets, sur les promenades et le
long des berges du chemin de fer.

***Trifolium* Tourn. — Trèfle.**

T. FILIFORME L.-Sm. — *T. FILIFORME*. — *T. micran-
thum* Viv. ☉. Mai - juillet. AC. Pelouses rases, bords des chemins,
murs.

Var. *b. vaginale* Chevall. — TOLLEVAST.

T. MINUS Sm. — *T. MINEUR*. — *T. filiforme* DC.-Dub.-Koch.
— *T. procumbens* L. ☉. Mai-août. TC. Prairies, bords des
chemins.

T. PATENS Schreb. — *T. ÉTALÉ*. — *T. Parisiense* DC. ☉.
Mai-août. TR. CHERBOURG : pelouses près du Maupas. — SURTAIN-
VILLE : vallons au sud de l'église, prairies de la ferme de Guinfard.

T. CAMPESTRE Schreb. — *T. CHAMPÊTRE*. — *T. agra-
rium* Soy.-Wil. — *T. procumbens a. majus* Koch. ☉. Juin-
septembre. C. Champs, murs, bords des chemins et des bois.

Var. *b. T. pseudo-procumbens* Gm. — *T. procumbens b. mi-
nus* Koch. — AC. Lieux sablonneux, pelouses, surtout dans la
région maritime.

T. REPENS L. — *T. RAMPANT*. — (*Triolet, Trèfle blanc.*) ♀.
Mai-septembre. TC. Prés, chemins, lieux incultes.

T. GLOMERATUM L. — *T. AGGLOMÉRÉ*. — ☉. Mai, juin. AR. Pelouses, coteaux, murs, bords des chemins. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. ÉQUEURDEVILLE. HAINNEVILLE. QUERQUEVILLE. — FERMANVILLE. TOCQUEVILLE. VAROUVILLE. ANGOVILLE. NÉVILLE. GATTEVILLE. — BEAUMONT. GRÉVILLE. OMONVILLE-LA-PETITE. HERQUEVILLE.

T. SUFFOCATUM L. — *T. ÉTOUFFÉ*. ☉. Mai, juin. TR. TOURLAVILLE: pelouses du littoral près le Pont-Marçst. QUERQUEVILLE: plaine du polygone. — LE ROZEL: la falaise.

T. SUBTERRANEUM L. — *T. ENTERRÉ*. — (*Trèfle semeur*.) ☉. Mai, juin. PC. Coteaux, pelouses, lieux sablonneux.

T. ARVENSE L. — *T. DES CHAMPS*. — (*Pied de lièvre*.) ☉. Juin-septembre. R. Falaises et champs des falaises de l'Ouest de l'arrondissement.

Var. *b. littorale* Bréb. — R. Rochers des falaises de l'Ouest de l'arrondissement.

T. PRATENSE L. — *T. DES PRÉS*. ♀. Mai-septembre. TC. Pâturages, chemins, lieux incultes.

Cette espèce, améliorée par la culture (*T. SATIVUM* Mill.), porte le nom vulgaire de *Trémaine*.

T. MARITIMUM Huds. — *T. MARITIME*. — *T. irregulare* DC. ☉. Mai-juillet. TR. CHERBOURG: glacis entre les fossés nord du port militaire et le littoral. — HERQUEVILLE: les falaises.

T. SCABRUM L. — *T. SCABRE*. ☉. Mai-juillet. R. Coteaux et pelouses, bords des chemins, surtout dans la région maritime; mielles. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. — FERMANVILLE. VRASVILLE. RÉTHOVILLE. GATTEVILLE. — NACQUEVILLE. HERQUEVILLE. BIVILLE. — LES PIEUX. SURTAINVILLE.

T. STRIATUM L. — *T. STRIÉ*. ☉. Mai-juin. R. Pâturages

sablonneux, pelouses, bords des chemins. CHERBOURG : environs du port militaire, la Polle. — OCTEVILLE : les Fourches, carrières des Entes, la Fauconnière, vallée de la Divette. TOURLAVILLE : le littoral. ÉQUEURDEVILLE : vallon de Grimesnil. — NÉVILLE : Herclat. — GRÉVILLE.

T. BOCCONII Savi. — *T. DE BOCCONE*. — *T. collinum* Bast. ☉. Juin, juillet. TR. Falaises de l'Ouest de l'arrondissement.

T. FRAGIFERUM L. — *T. FRAISE*. ☿. Juin-septembre. AR. Prés, pelouses humides, dans la région maritime. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE. — VRASVILLE. NÉVILLE. GOUBERVILLE. GATTEVILLE. — NACQUEVILLE. AUDERVILLE. VAUVILLE. VASTEVILLE. — FLAMANVILLE. SURTAINVILLE.

Le TRIFOLIUM INCARNATUM L., cultivé sous les noms de *Trèfle rouge*, *Farouche*, se rencontre assez fréquemment à l'état subspontané.

Melilotus Tourn. — *Mélilot*.

M. ARVENSIS Wallr. — *M. DES CHAMPS*. ☉. Juillet-septembre. TR. CHERBOURG : plaine du port militaire, Petite-Fauconnière. — TOURLAVILLE : champs du littoral. — HERQUEVILLE : la Vallée. — LES PIEUX : champs de la mielle de Seiotot.

Rien ne prouve que cette espèce, malgré sa rareté, ne soit pas indigène.

M. OFFICINALIS Willd. — *M. OFFICINAL*. ☉. Juillet-septembre. RRR. Mielles de TOURLAVILLE.

M. l'abbé Tabard a aussi observé cette plante dans les sables maritimes de Portbail.

M. ALBA Lamk. — *M. BLANC*. — *M. leucantha* Koch. ☉. Juillet-septembre. RRR. CHERBOURG : champs du littoral. — HERQUEVILLE : la Vallée.

La nature des stations où ce Mélilot a été constaté ne peut laisser aucun doute sur son indigénat.

***Trigonella* DC. — *Trigonelle*.**

T. ORNITHOPODIOIDES DC. — *T. PIED-D'OISEAU*. — *Trifolium ornithopodioïdes* L. — *Aporanthus Trifolias-trum* Bromf. ☉. Juin, juillet. AR. CHERBOURG: remparts et glacis du port militaire. — OCTEVILLE: fort des Fourches. TOURLAVILLE: Hautmesnil. ÉQUEURDREVILLE: carrières des Fourches, fort du Tot. QUERQUEVILLE: pelouses du littoral, plaine du polygone. DIGOSVILLE: le Becquet, pied des collines maritimes. — TOCQUEVILLE: coteaux près l'église. CARNEVILLE: la lande. FERMANVILLE: les inielles. VRASVILLE: près la mare. NÉVILLE: Cracret, la Houquette, environs de l'église. GATTEVILLE: chemin d'Imbranville. — BEAUMONT: vallons au sud de l'église. — SURTAINVILLE: les carrières calcaires.

C'est à tort que M. Le Jolis n'a signalé cette plante que comme croissant sur le littoral, où il lui attribue évidemment un degré de fréquence exagéré.

***Medicago* L. — *Luzerne*.**

M. MACULATA Willd. — *L. TACHÉE*. — *M. Arabica* Ml. ☉. Mai-août. C. Prés, pâturages, pelouses, bords des chemins.

M. POLYCARPA Dec. et Le M. — *L. POLYCARPE*. ☉. Mai-août. R. Lieux sablonneux, bords des chemins, surtout dans la région maritime.

Var. *a.* **M. denticulata** Willd. — CHERBOURG: sables maritimes de l'Est, environs du canal de retenue, Chantereyne. — LE ROZEL: coteaux du Poux. SURTAINVILLE: les carrières calcaires, coteaux de la Godaillerie.

Var. *b.* **M. apiculata** Willd. — CHERBOURG: sables maritimes de l'Est, plaine du port militaire. — OCTEVILLE: environs de Saint-Sauveur. — HERQUEVILLE: champs des falaises.

M. LUPULINA L. — *L. LUPULINE*. — (*Minette*, *petit trèfle*

jaune.) ☉. Mai-août. TC. Prairies, lieux sablonneux, murs, bords des chemins.

Var. *b.* **M. Willdenowii** Bœnng. — Mielles du ROZEL et de SURTAINVILLE.

La Luzerne cultivée (*MEDICAGO SATIVA* L.) est complètement naturalisée, principalement dans la région maritime.

***Anthyllis* L. — *Anthyllide*.**

A. VULNERARIA L. — *A. VULNÉRAIRE*. — *Vulneraria Anthyllis* Scop. ☿. Mai-juillet. R. Falaises et dunes de l'Ouest de l'arrondissement.

Le *CYTISUS LABURNUM* L., vulgairement *Cytise à grappes*, est planté assez fréquemment dans les parcs et les avenues.

***Genista* Lamk. — *Genét*.**

G. TINCTORIA L. — *G. DES TEINTURIERS*. — *Spartium tinctorium* Roth. ☿. Juillet, août. Falaises de GRÉVILLE.

Cette localité est la seule où cette plante ait été observée dans l'arrondissement. Elle y est commune; aussi y présente-t-elle divers formes plus ou moins prononcées, tant sous le rapport des feuilles que sous celui des fruits.

G. SCOPARIA Lamk. — *G. A BALAIS*, — *Cytisus scoparius* Link. — *Sarothamnus scoparius* Koch. — *Spartium scoparium* L. ☿. Avril - juin. C. Bois, landes, coteaux, haies.

Feuilles et graines émétiques et purgatives.

***Ulex* L. — *Ajone*.**

U. EUROPÆUS Sm. — *A. D'EUROPE*. — *U. vernalis* Thore. — *U. Europæus* var. *a.* L. — (*Landes, jan, bois jan, piquets.*) ☿. Décembre-mai. TC. Landes, haies, bois.

U. GALLII Planch. — *A. DE LE GALL*. 3. Août-décembre.
C. Landes, coteaux, bois, haies.

Var. *b. humilis* Planch. — Abonde dans les landes de la Hague.

U. NANUS Sm. — *A. NAIN*. — *U. autumnalis* Thore. —
U. Europæus var. *b. L.* 3. Juillet-octobre. Landes. Commun à l'est de CHERBOURG, sur les terrains d'arkose, à TOURLAVILLE, LE MESNIL-AU-VAL, DIGOSVILLE, BRETTEVILLE, et dans presque tout le canton de Saint-Pierre-Eglise. — TR. ailleurs: HARDINVAST. — SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD.

M. Le Jolis a publié des observations sur les *Ulex* des environs de Cherbourg; nous devons dire que, quelles que soient les formes qu'ils puissent présenter, il est toujours très facile de les rapporter, sans confusion possible, à l'une des trois espèces précédentes.

***Ononis* L. — *Bugrane*.**

O. PROCURRENS Wallr. — *B. DIFFUSE*. 4. Juin-septembre.

Var. *a. O. arvensis* Lamk. — AC. Champs pierreux, talus des fossés.

Var. *b. O. maritima* Gr. et Godr. — *O. repens* L. — C. Sables maritimes.

O. CAMPESTRIS Koch. — *B. DES CHAMPS*. — *O. spinosa* Wallr. 4. Juillet-septembre. RRR. FLOTTEMANVILLE-HAGUE: bords de la route de la Hague à Valognes.

Les plantes de ce genre portent le nom vulgaire d'*Arrête-Bœuf*,

Dicotylédones polypétales hypogynes axosporées.

ACÉRINÉES.

***Acer* L. — *Erable*.**

A. CAMPESTRE L. — E. CHAMPÊTRE. — (*Cochêne*). 3.
Mai, juin. PC. Haies.

A. PSEUDO-PLATANUS L. — E. FAUX-PLATANE. — (*Sycomore*.) 3. Avril, mai. AC. Haies, bois.

Assurément indigène dans la Hague, ainsi que le fait observer avec raison M. Le Jolis.

L'ACER PLATANOIDES L., vulgairement *Plane*, se trouve sur quelques-unes de nos promenades.

HIPPOCASTANÉES. — L'ÆSCULUS HIPPOCASTANUM L. (*Marronnier d'Inde*) est planté dans les parcs et les avenues.

POLYGALÉES.

***Polygala* L. — *Polygala*.**

P. VULGARIS L. — P. COMMUN. 4. Mai-juillet. R. Pâturages, haies, bords des bois. CHERBOURG : près de la ferme de la montagne.—OCTEVILLE: ferme de la Bruyère. EQUEURDREVILLE: fort du Tot. BRETTEVILLE: vallon et coteaux des Fontaines. COUVILLE. — SURTAINVILLE: les carrières calcaires, coteaux de la Godaillerie, ferme de Guinfard.

C'est à tort que M. Le Jolis attribue au *Polygala vulgaris* L. le même degré d'abondance qu'au *P. depressa* Wend.

Var. *b.* **P. oxyptera** Rehb. R. OCTEVILLE : vallon des Fourches. COUVILLE.

P. DEPRESSA Wend. — *P. DÉPRIMÉ*. — *P. serpyllacea* Rehb. — *P. serpyllifolia* Weihe. ☿. Mai-septembre. TC. Landes, bruyères, coteaux.

Ces deux espèces varient beaucoup dans la couleur de leurs fleurs qui sont le plus souvent d'un très beau bleu.

P. CILIOLATA Leb. — *P. CHILOLÉ*. ☿. Juin-août. TR. Dunes et mielles. QUERQUEVILLE. NACQUEVILLE. — BIVILLE. — HÉAUVILLE. SURTAINVILLE.

Contrairement à l'opinion de M. Le Jolis, cette plante est exactement la même que le *P. ciliolata* des falaises, des dunes et des mielles de Carteret.

HYPÉRICINÉES.

Hypericum Tourn. — *Millepertuis*.

H. HUMIFUSUM L. — — *M. COUCHÉ*. ☿. Juin-août. C. Bords des chemins et des haies, landes, sentiers des bois.

H. TETRAPTERUM Fries. — *M. A. QUATRE AILES*. — *H. quadrangulare* Sm. ☿. Juin-septembre. C. Bords des eaux, lieux très humides ou marécageux.

A Brix, sur le plateau de Delasse, près de la limite de notre arrondissement, nous avons trouvé l'*H. DUBIUM* Leers (*H. quadrangulum* Fries).

H. PERFORATUM L. — *M. PERFORÉ*. — *H. vulgare* Lamk. — *H. officinarum* Crantz. ☿. Juin-septembre. TC. Haies, coteaux, lieux secs.

Var. *b.* **H. lineolatum** Jord. — AC.

Cette espèce est encore assez souvent employée comme vulnéraire et antilaiteuse.

II. PULCHRUM L. — *M. ÉLÉGANT*. — *H. elegantissimum* Crantz. ♀. Juin-août. C. Landes et bruyères, bois.

***Androsæmum* Tourn. — *Androsème*.**

A. OFFICINALE AIL. — *A. OFFICINAL*. — *Hypericum Androsæmum* L. — (*Parencœur*). ♀. Juin-août. R. CHERBOURG : bois et ruisseau des Terres-Feuillies, Sauxmarais. — OCTEVILLE : vallon de Saint-Sauveur, ruisseaux de la petite Polle, de la Jouannerie, de la Butte, vallée de la Divette. TOURLAVILLE : La Loge, bords du Trottebec, la Glacerie. EQUEURDEVILLE : vallée du Fey. — MARTINAST : bois du château. SIDEVILLE : bois du Mont-du-Roc. TEURTHÉVILLE-HAGUE : le lieu aux Francs, bords de la Nérée. VIRANDEVILLE : coteaux de Née. LE MESNIL-AU-VAL : ruisseau de Barville, bois des coteaux de la Saire. DIGOSVILLE : bois du château. — MAUPERTUS : ruisseau et bois du Doux-Riant. FERMANVILLE : ruisseaux du Nid-du-Corps. THÉVILLE : environs de l'église. — ECULLEVILLE : taillis de la Sabine. SAINTE-CROIX-HAGUE : vallon et ruisseau de Claire-Fontaine. HERQUEVILLE et BEAUMONT : le bois. SAINT-GERMAIN-DES-VAUX : ruisseau du Pont-des-Vaux. — SURTAINVILLE : bois de la Baronnerie, vallon de la mare du Chuquel.

Plante jadis employée comme vulnéraire.

L'ANDROSÆMUM FÆTIDUM Spach (*Hypericum hircinum* L.) est naturalisé aux environs de Cherbourg, dans plusieurs localités, entre autres à Sennecey et au Roule. — L'ANDROSÆMUM CALYCINUM. (*Hypericum calycinum* L.) se rencontre plus rarement à l'état subspontané. Nous l'avons observé dans le bois des Varendes, sur Hainneville.

***Elodes* Spach. — *Elode*.**

E. PALUSTRIS Spach. — *E. DES MARAIS*. — *Hypericum Elodes* L. ♀. Juin-septembre. AC. Lieux marécageux, fondrières, près tourbeux.

TILIACÉES. — Plusieurs arbres de cette famille sont plantés dans les parcs et sur les promenades.

MALVACÉES.

Malva L. — *Mauve*.

M. ROTUNDIFOLIA L. — *M. A FEUILLES RONDES.* — (*Petite mauve.*) 4. Juin-octobre. AC. Pied des murs, bords des chemins, cours des fermes.

Le **MALVA VULGARIS** Fries paraît devoir être rapporté à cette espèce.

M. SYLVESTRIS L. — *M. SAUVAGE.* — *M. vulgaris* Ten. — (*Grande mauve.*) 4. Juin-septembre. C. Bords des chemins, talus des fossés, lieux incultes.

M. MOSCHATA L. — *M. MUSQUÉE.* 4. Juin-octobre. AR. Haies, bords des champs, talus des fossés. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. EQUEURDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. VIRANDEVILLE. TOLLEVAST. LE MESNIL-AU-VAL. DIGOSVILLE. — BEAUMONT. FLOTTEMANVILLE-HAGUE. SAINTE-CROIX-HAGUE. OMONVILLE-LA-ROGUE. — HÉAUVILLE. HELLEVILLE. SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC. PIERREVILLE.

Var. *b. albiflora*. — OCTEVILLE : les Roquettes.

M. LACINIATA Desr. — *M. LACINIÉE.* 4. Juin-octobre. R. Haies, talus des fossés, bords des champs. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. VIRANDEVILLE. COUVILLE. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD. TOLLEVAST. — PIERREVILLE.

Althæa L. — *Guimauve*.

A. OFFICINALIS L. — *G. OFFICINALE.* 4. Août, septembre. RRR. Prés maritimes de NACQUEVILLE.

Le *LAVATERA ARBOREA* L. se rencontre quelquefois à l'état subspontané.

Les racines et les feuilles des plantes de cette famille sont mucilagineuses et émollientes; leurs fleurs sont béchiques et pectorales.

GÉRANIACÉES.

Erodium Lhér. — *Erodium*.

E. CICUTARIUM Lhér. -- É. *A FEUILLES DE CIGUE*. ☉. Avril-septembre. AC. Lieux secs ou sablonneux, coteaux, bords des chemins, murs, surtout dans la région maritime.

Cette plante offre plusieurs variétés; nous citerons les principales:

Var. *b.* **E. pilosum** Bor. — *Geranium pilosum* Thuill. — PC. Bords des chemins secs et sablonneux.

Var. *c.* **E. Ballii** Jord. — AC. Sables maritimes.

Var. *d.* **E. Lebelii** Jord. — *E. cicutarium* var. *biflorum* Lebel. — PC. Sables maritimes.

E. MOSCHATUM Lhér. — E. *MUSQUÉ*. — *Geranium moschatum* L. ☉. Mai-septembre. AC. Murs, chemins, lieux incultes.

E. MARITIMUM Sm. — E. *MARITIME*. — *Geranium maritimum* L. ☉. Mai-septembre. C. Coteaux, pelouses, rochers, talus des fossés, pied des haies et des murs, dans la région maritime; s'avance parfois assez loin dans l'intérieur.

Geranium Lhér. — *Géranium*.

G. ROBERTIANUM L. — G. *HERBE A ROBERT*. — (*Feu saurage*.) ☉. Avril-septembre. TC. Haies, lieux incultes et pierreux.

G. DISSECTUM L. — *G. DÉCOUPÉ*. ☉. Juin-septembre. C. Lieux secs, haies, bords des chemins.

G. COLUMBINUM L. — *G. COLOMBIN*. ☉. Juillet-septembre. R. CHERBOURG : colline de Saint-Sauveur. — OCTEVILLE : environs de Saint-Sauveur et du hameau Noblet. HAINNEVILLE : coteaux de Rouland. SIDEVILLE : bords de la route des Pieux. VIRANDEVILLE : coteaux du Prieuré, route de la Hague à Valognes. — SAINT-CRISTOPHE-DU-FOC : coteaux de la Divette. PIERREVILLE : route des Pieux à Barneville. SURTAINVILLE : environs du village, coteaux du Poux.

G. ROTUNDIFOLIUM L. — *G. A FEUILLES RONDES*. — *G. viscidulum* Fries. ☉. Juin-août. TR. CHERBOURG : sables, champs et murs dans les mielles; le Roule.

G. PUSILLUM L. — *G. FLUET*. — *G. malæfolium* Scop. ☉. Juin-septembre. R. CHERBOURG : les mielles, Sennecey, Chante-reyne. — OCTEVILLE : carrières des Fourches. TOURLAVILLE : champs du littoral, le Pont-Marest. HAINNEVILLE : hameau de la Mer. DIGOSVILLE : bords de la route de Cherbourg à Saint-Pierre-Église. — NÉVILLE : la Houquette.

G. MOLLE L. — *G. MOLLET*. ☉. Mai-septembre. TC. Murs, bords des chemins, terres incultes.

Var *b. albiflorum*. — C.

G. PRATENSE. L. — *G. DES PRÉS*. ♀. Juin-août. RRR. environs des bois de FLAMANVILLE.

Le *GERANIUM STRIATUM* L. est naturalisé dans plusieurs communes : Cherbourg, Octeville, Equeurdreville, Nouainville, Digosville, Jobourg, Flamanville.

Les plantes de cette famille portent, à cause de la forme de leurs fruits, les noms vulgaires de *Bec de grue*, *Épingles à la Vierge*.

LINÉES.

Linum* L. — *Lin.

L. ANGUSTIFOLIUM Huds. — *L. A FEUILLES ÉTROITES.*
(*Lin sauvage.*) ☿. Juin-septembre C. Coteaux secs, lieux arides
et pierreux.

Le *LINUM USITATISSIMUM* L. (*Lin cultivé*) se rencontre assez fré-
quemment à l'état subspontané.

L. CATHARTICUM L. — *L. PURGATIF.* ☉. Juin-septembre.
C. Pâturages secs, coteaux, pelouses, landes.

Radiola* Gm. — *Radiole.

R. LINOIDES Gm. — *R. FAUX-LIN.* — *R. millegrana* Sm. —
Linum Radiola L. ☉. Juillet-septembre. PC. Landes, pelouses,
sentiers des bois, ornières, lieux exondés.

OXALIDÉES.

Oxalis* L. — *Oxalide.

O. ACETOSELLA L. — *O. OSEILLE.* — *Oxys alba* Lamk.
(*Pain à coucou, Alleluia, Trèfle oseille.*) ☿. Avril-juin. C.
Bois, chemins humides et couverts, lieux ombragés et frais.

Une variété à fleurs d'un beau rose-violet croît dans le bois du
Coudray, au Mesnil-au-Val. RRR. — Une autre variété à fleurs légè-
rement purpurines croît dans les bois de Martinvast.

Feuilles acides, rafraîchissantes, contenant beaucoup de sel d'oseille,
pouvant servir à nettoyer le cuivre et à enlever les taches de rouille.

O. STRICTA L. — *O. DROITE.* — *Oxys lutea* Mœnch. ☉.
Juin-septembre. AR. Moissons, lieux cultivés. CHERBOURG. —

OCTEVILLE. TOURLAYVILLE. ÉQUEURDREVILLE. SIDEVILLE. MARTINVAST. VIRANDEVILLE. COUVILLE. HARDINVAST. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD. TOLLEVAST. — SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC.

O. CORNICULATA L. — *O. CORNICULÉE*. 4. Juin-septembre. R. Jardins, lieux cultivés. CHERBOURG. — OCTEVILLE.

RUTACÉES. — La Rue (*RUTA GRAVEOLENS* L.) ne se trouve que très rarement à l'état spontané, dans les vieux jardins.

BERBÉRIDÉES. — Le *BERBERIS VULGARIS* L. (vulgairement *Épine-Vinette*) indiqué par M. Delachapelle à Virandeville, était sans doute échappé des bosquets du château.

RENONCULACÉES.

Clematis L. — *Clématite*.

C. VITALBA L. — *C. VIGNE-BLANCHE*. — (*Herbe aux gueux, Vignolet*.) 3. Juin, juillet. R. Croît dans les haies et les carrières du terrain calcaire du Sud-Ouest de l'arrondissement. — Ça et là ailleurs, où elle n'est très probablement que naturalisée.

Plante très âcre, vésicante et vénéneuse.

Il faut croire que M. Le Jolis ignore que cette espèce est spontanée sur les calcaires de l'arrondissement de Cherbourg, puisqu'il ne l'indique en cet état que sur les calcaires de celui de Valognes.

Thalictrum Tourn. — *Pigamon*.

T. FLAVUM L. — *P. JAUNE*. 4. Juin, juillet. RRR. OCTEVILLE: bassin de la Divette, entre la Prévalerie et le pont Cosnard.

Il n'existe plus de motifs pour nier l'indigénat de cette plante, ainsi que le fait M. Le Jolis, car si on l'observe sur le sommet du coteau, au bord d'un champ, station qui a pu paraître insolite, nous l'avons retrouvée dans le fond de la vallée, à quelques mètres de la rivière.

***Anemone* L. — *Anémone*.**

A. NEMOROSA L. — *A. DES BOIS*. — (*Sylvie*.) ♀. Mars-mai. AR. Bois, lieux couverts. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE. MARTINVAST. SIDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. VIRANDEVILLE. TOLLEVAST. LE MESNIL-AU-VAL. — MAUPERTUS. FERMANVILLE. CARNEVILLE. — TONNEVILLE. SAINTE-CROIX-HAGUE. — FLAMANVILLE. SURTAINVILLE.

Nous avons observé l'ADONIS AUTUMNALIS L. croissant à l'état subspontané, à Cherbourg, dans les environs de l'hôpital de la marine. C'est à tort que M. Le Jolis indique cette plante comme ayant été trouvée par M. Bertrand Lachénée près de l'entrepôt.

***Ranunculus* L. — *Renoncule*.**

R. HEDERACEUS L. — *R. A FEUILLES DE LIERRE*. — *Batrachium hederaceum* Dumort. ♀. Avril-août. C. Sources et ruisseaux, lieux fangeux.

R. LENORMANDI Schultz. — *R. DE LENORMAND*. — *Batrachium Lenormandi* Fries. ♀. Février-juillet. AC. Mares, fossés, ruisseaux des bois.

R. TRIPARTITUS DC. — *R. TRIPARTITE*. — *Batrachium tripartitum* Dum. ♀. Mai-juillet. TR. Mares de TOURLAVILLE et de VRASVILLE.

R. BAUDOTH Godr. — *R. DE BAUDOT*. — *Batrachium marinum* Fries. ♀. Mai-juillet. R. Mares et fossés du littoral. TOURLAVILLE. — NÉVILLE. GATTEVILLE. — Se trouve aussi à OCTEVILLE dans les eaux des Fourches et des Entes, à plus d'un kilomètre de la mer.

C'est le *Ranunculus Baudotii* Godr. que M. Le Jolis avait pris pour le *R. Petiveri* Koch, et qu'il a fait connaître sous ce dernier nom, dans les Annales des Sciences naturelles.

M. Le Jolis signale comme trouvé à Vauville par M. le docteur Lebel, le *RANUNCULUS CONFUSUS* Gr. et Godr. Cette plante semble être pour M. de Brébisson une simple variété du *R. Baudotii* Godr.

R. RHIPHYLLUS Bast. — *R. EN ÉVENTAIL*. ♀. Mai-juillet. TR. Rivière de Nérée à TEURTHÉVILLE-HAGUE.

R. AQUATILIS L. — *R. AQUATIQUE*. — *Batrachium heterophyllum* Fries. ♀. Avril-juillet. C. Rivières et ruisseaux, étangs, mares, fossés.

R. TRICHOPHYLLUS Chaix. — *R. A FEUILLES CAPILLAIRES*. — *Ranunculus paucistamineus* Koch. — *R. capillaceus* Thuill. ♀. Avril-juin. PC. Mares, fossés, surtout dans la région maritime.

R. DROUETH Schultz. — *R. DE DROUET*. ♀. Avril, mai. R. Mares, fossés, principalement dans la région maritime. GATTEVILLE. — VAUVILLE. VASTEVILLE. — HÉAUVILLE.

M. Le Jolis n'a point vu cette plante dans notre arrondissement. Il ne la cite que, parce que M. le docteur Lebel la lui a montrée à Yvetot, près Valognes.

Les Renoncules de la section *Batrachium* portent le nom vulgaire de *Grenouillettes*. Elles présentent, pour la plupart, sous le rapport des feuilles, trois formes principales dues à la station, et qui constituent pour chaque espèce les variétés *a. fluitans*, *b. submersus* et *c. terrestris* de la flore de France de Gr. et Godr.

R. FLAMMULA L. — *R. FLAMMETTE*. — (*Petite Douve*.) ♀. Juillet - septembre. C. Lieux marécageux, prés humides.

Var. *b. R. reptans* Thuill. — PC. Bois marécageux.

R. LANUGINOSUS L. — *R. LAINEUSE*. ♀. Mai-juillet. RRR. NACQUEVILLE: bords des fossés près des Marais-de-Bas.

R. ACRIS L.-Babingt. — R. *ACRE*. ♀. Juin, juillet. TC. Prairies, bois humides.

R. REPENS L. — R. *RAMPANTE*. ♀. Mai-août. TC. Lieux incultes, pied des murs, talus des fossés, bords des chemins et des champs.

R. BULBOSUS L. — R. *BULBEUSE*. ♀. Avril-Juin. C. Coteaux, pelouses, pâturages, lieux sablonneux.

Ces trois dernières Renoncles sont connues sous les noms vulgaires de *Bassinot*, *Bouton d'or*, *Pied-pot*.

R. PHILONOTIS Ehrh. — R. *DES MARES*. — R. *hirsutus* Curt. ☉. Juin-octobre. PC. Lieux aquatiques, chemins et champs humides.

Var. *b. R. intermedius* Poir. — PC.

Var. *c. R. parvulus* L. — PC.

R. PARVIFLORUS L. — R. *A PETITES FLEURS*. ☉. Avril-août. AC. Lieux secs et pierreux, bords des chemins, talus des fossés.

R. SCCLERATUS L. — R. *SCÉLÉRATE*. ☉. Mai-août. AR. Fossés, lieux marécageux : croît surtout dans la région maritime. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. ÉQUEURDREVILLE. QUERQUEVILLE. — FERMANVILLE. COSQUEVILLE. VRASVILLE. RÉTHOVILLE. GOUBERVILLE. GATTEVILLE. — OMONVILLE-LA-ROGUE.

Var. *b. minimus* DC. — R.

Les plantes du genre Renoncule sont toutes suspectes; quelques-unes sont très âcres et très vénéneuses.

***Ficaria* Dillen. — *Ficaire*.**

F. RANUNCULOIDES Mœnch. — F. *RENONCULE*. — *Ranunculus Ficaria* L. — (*Jaunets*.) ♀. Mars-mai. TC. Haies. prés, bois.

***Caltha* L. — *Populage*.**

C. PALUSTRIS L. — *P. DES MARAIS*. — (*Souci d'eau, des marais.*) ♀. Mars-mai. AC. Bords des eaux, prés humides, marais.

Var. *b. minor* DC. — R. SIDEVILLE: îles de la Divette.

C. GUERANGERII Bor. — *P. DE GUÉRANGER*. ♀. Avril, mai. R. CHERBOURG: bords du Trottebec. — HAINNEVILLE: vallée de la Bonde. QUERQUEVILLE: près Lucas. SIDEVILLE et TEURTHÉVILLE-HAGUE: vallée de la Divette. VIRANDEVILLE: vallée de la Marvie. — LE THEIL: bords et prés de la Saire. — SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC: bords de la Divette. SIOUVILLE: prés maritimes.

Var. *b. trilobus* Nob. — RRR. Vallée de la Divette, à TEURTHÉVILLE-HAGUE.

***Helleborus* L. — *Hellébore*.**

H. VIRIDIS L. — *H. VERT*. — (*Pommelière.*) ♀. Mars, avril. TR. OCTEVILLE: pré proche le hameau Desplanques. ÉQUEURDEVILLE: vallée de la Bonde. HARDINVAST: haie près la route de Bricquebec. — SAINTE-CROIX-HAGUE: le Mont-Perreux. — SURTAINVILLE: vallon de la Godaillerie.

Contrairement à l'indication de M. Le Jolis, on trouve cette plante dans des localités tellement sauvages, qu'il est impossible de douter de son indigénat.

***Aquilegia* Tourn. — *Ancolie*.**

A. VULGARIS L. — *A. COMMUNE*. — (*Cinq-doigts, Gants de Notre-Dame.*) ♀. Mai-juillet. R. Bois, haies, prés ombragés. CHERBOURG: Hautmarais. — OCTEVILLE: la Prévalerie, la Jouannerie. TOURLAVILLE: le pont Cosnard. MARTINVAST: bois du château. VIRANDEVILLE. — SAINTE-CROIX-HAGUE: bois des Mores. GRÉVILLE: vallée de la Sabine. — SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD:

environs de la lande de Candar. FLAMANVILLE: les bois. SURTAINVILLE: bois de la Baronnerie.

Varie à fleurs blanches ou roses.

***Delphinium* Tourn. — *Dauphinelle*.**

D. CONSOLIDA L. — *D. CONSOUDE*. — (*Pied-d'alouette des champs*.) ☉. Juin-août. RRR. Champs du littoral de Tourlaville, entre la redoute et les Flamands.

***Aconitum* Tourn. — *Aconit*.**

A. NAPELLUS L. — *A. NAPEL*. — (*Casques*.) ☿. Juillet - septembre. TR. Bords des rivières, prés humides.

Plante très rare à l'état spontané; observée dans sa véritable station, sur les bords de la Divette, à Octeville et à Martinvast, loin d'habitations et de cultures; très vénéneuse.

Dicotylédones polypétales hypogynes pleurosporées.

NYMPHÉACÉES.

***Nymphaea* L. — *Nénuphar*.**

N. ALBA L. — *N. BLANC*. — (*Lis des étangs, Rose des mares, Herbe de pirotte*.) ☿. Juillet, août. TR. Mares de VRASVILLE et de VAUVILLE.

Var. *b. minor* DC. — Moins rare que le type. Mare de VRASVILLE; étang de Gattemare, à GATIEVILLE. — Mare de VAUVILLE.

C'est à tort que M. Le Jolis n'indique que la variété dans notre arrondissement.

***Nephaea* Sm. — *Nephaea*.**

N. LUTEUM Sm. — N. JAUNE. — *Nymphæa lutea* L. — (*Bec de bourre, Herbe de pirotte.*) ♀. Juillet, août. Croît dans la Diélette sur TRÉAUVILLE et FLAMANVILLE, et dans la Scie sur PIERREVILLE et SURTAINVILLE.

Nous avons vu cette belle plante très abondante sur un long parcours, dans les stations précitées; c'est donc à tort que M. Le Jolis affirme, dans sa liste, page 20, qu'elle manque complètement dans nos rivières.

Les plantes de cette famille ont joui d'une grande réputation comme anti-aphrodisiaques.

DROSÉRACÉES.***Drosera* L. — *Rossolis*.**

D. ROTUNDIFOLIA L. — R. A FEUILLES RONDES. ♀. Juillet, août. AC. Lieux spongieux, marais et prés tourbeux.

D. INTERMEDIA Hayne. — R. INTERMÉDIAIRE. — *D. longifolia* Sm. non L. ♀. Juillet, août. R. Mêmes stations dans la Hague. — FLOTTEMANVILLE: source du Caudet. — TONNEVILLE: les landes. — Ruisseau et vallon de Claire-Fontaine sur VAUVILLE, SAINTE-CROIX, VASTEVILLE et BIVILLE. — Bruyères marécageuses de la Boiserie à VASTEVILLE. — Landes de l'Est de VAUVILLE.

Plantes âcres, caustiques et vénéneuses.

PAPAVÉRACÉES.***Chelidonium* Tourn. — *Chélidoine*.**

C. MAJUS L. — C. ÉCLAIRE. — (*Herbe aux verrues.*) ♀. Mai-août. FC. Vieux murs, décombres.

Acre et vénéneuse.

Rien ne nous semble autoriser les doutes élevés par M. Le Jolis sur l'indigénat de cette espèce.

***Glaucium* Tourn. — *Glaucière*.**

G. FLAVUM Grantz. — *G. JAUNE*. — *G. luteum* Scop. — *Chelidonium Glaucium* L. — (*Pavot cornu*.) ☉. Juin-août. C. Gravier et sables maritimes.

Plante vénéneuse.

***Papaver* Tourn. — *Pavot*.**

P. ARGEMONE L. — *P. ARGÉMONE*. ☉. Juin-août. AR. Champs et talus des fossés du littoral, mielles. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. ÉQUEURDEVILLE. QUERQUEVILLE. — FERMANVILLE. COSQUEVILLE. VRASVILLE. — OMONVILLE-LA-ROGUE. JOBOURG. BIVILLE. — SURTAINVILLE. — TR. à l'intérieur: HARDINVAST. — SAINT-PIERRE-ÉGLISE. ANGOVILLE.

P. HYBRIDUM L. — *P. HYBRIDE*. ☉. Juillet, août. TR. Champs et talus des fossés de la région maritime, mielles. HAINNEVILLE. — JOBOURG. BIVILLE. — Observé aussi dans les moissons de l'intérieur, à ANGOVILLE.

P. RHÆAS L. — *P. COQUELICOT*. ☉. Juin-septembre. C. Champs, moissons, tant du littoral que de l'intérieur.

Var. *b. pallidum* Bréb. — *P. uniflorum* Balb. — PC. Champs et talus des fossés du littoral.

Var. *c. strigosum* Koch. — PC. Mêmes stations que le type.

P. DUBIUM L. — *P. DOUTEUX*. ☉. Mai-juillet. R. Champs et talus des fossés de la région maritime. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. HAINNEVILLE. QUERQUEVILLE. — SURTAINVILLE. — TR. à l'intérieur: ANGOVILLE.

Le PAPAVER SOMNIFERUM L. se trouve quelquefois à l'état subspontané.

Les plantes de ce genre sont narcotiques; leurs fleurs sont employées comme adoucissantes et pectorales.

FUMARIACÉES.

Corydalis DC. — *Corydalis*.

C. CLAVICULATA DC. — *C. A VRILLES*. — *Fumaria claviculata* L. ☉. Juin, juillet. R. CHERBOURG: montagne du Roule, Petite-Fauconnière. — OCTEVILLE: colcaux du Roule, la Grande-Fauconnière. TOURLAVILLE: colline des Terres-Feuillies; rochers des Planches-Margaux, de la Motterie, de la Glacerie; la Roche-au-Chat; rocs de Cloquant. TEURTHÉVILLE-HAGUE: rochers du bois de Nérée.

Fumaria Tourn. — *Fumeterre*.

F. SPECIOSA Jord. — *F. ÉLÉGANTE*. ☉. Mai - juillet. TR. Talus des fossés, haies à CHERBOURG, près de l'usine à gaz.

F. BORÆI Jord. — *F. DE BOREAU*. — *F. capreolata* Sm. ☉. Avril-septembre. TC. Lieux cultivés, haies.

Var. *b. recurva* Nob. — AR.

F. CONFUSA Jord. — *F. CONFUSE*. — *F. Bastardi* Bor. ☉. Mai-août. C. Lieux cultivés, haies.

F. WIRTGENI Koch. — *F. DE WIRTGEN*. ☉. Juin-septembre. TR. Champs à HERQUEVILLE.

Notre plante offre bien les caractères du véritable *F. Wirtgeni* Koch; une différence dans la grosseur du fruit, si toutefois elle existe réellement, ne saurait, ainsi que le prétend M. Le Jolis, infirmer la validité de la détermination que nous en avons faite.

F. OFFICINALIS L. — *F. OFFICINALE*. ☉. Avril-septembre.
AC. Lieux cultivés.

F. MICRANTHA Lagasca. — *F. A PETITES FLEURS*. —
F. densiflora DC. ☉. Juin-août. TR. CHERBOURG : glacis du port
militaire. — ÉQUEURDREVILLE : terres remuées sur le littoral. —
GATTEVILLE : champs près du village.

Toutes ces plantes sont amères et toniques.

CRUCIFÈRES.

Cheiranthus L. — *Giroflée*.

C. CHEIRI Auct. — *G. VIOLIER*. — (*Giroflée jaune des
murs, Ravenelle.*) ♀. Mars - mai.

Var. *a.* **C. Cheiri** L. — Subspontané sur les murs, près des
jardins. AR.

Var. *b.* **C. fruticosus** L. — R. Spontané sur les vieilles mu-
railles et les ruines. CHERBOURG : murs de l'église Sainte-Trinité,
du vieil hospice et des anciennes maisons de la ville. — Murs des
églises de TOURLAVILLE, de GATTEVILLE et de VAUVILLE.

Matthiola R. Br. — *Matthiote*.

M. SINUATA R.-Br. — *M. SINUÉE*. — *Cheiranthus sinua-
tus* L. ☉. Juin-août. TR. Champs et talus des fossés dans la
mielle du ROZEL, et dans celle de Sciotos sur les PIEUX.

Malcolmia R. Br. — *Malcolmie*.

M. MARITIMA R.-Br. — *M. MARITIME*. — *Cheiranthus ma-
ritimus* L. — *Hesperis maritima* Lamk. — (*Gazon ou Giroflée
de Mahon.*) ☉. Mai-juillet. TR. Lieux pierreux et sablonneux
de la région maritime. CHERBOURG. — QUERQUEVILLE. BRETTEVILLE.

La plupart des stations où nous avons trouvé cette plante nous portent à penser qu'elle peut bien être indigène.

L'HESPERIS MATRONALIS (*Julienne*) croît quelquefois à l'état spontané dans les haies et les buissons, à peu de distance des jardins et des bosquets.

***Barbarea* R. Br. — *Barbarée*.**

B. VULGARIS R. Br. — *B. COMMUNE*. — *Erysimum Barbarea* L. ♀. Avril-juin. PC. Talus des fossés, lieux frais, bords des eaux.

B. INTERMEDIA Bor. — *B. INTERMÉDIAIRE*. ♂. Avril-juin. C. Champs, talus des fossés.

Var. *b. arcuata* Nob. — *B. arcuata* Bréb. non Rehb. — R. CHERBOURG: bords du Trottebec. — DIGOSVILLE: environs du château. — SAINTE-CROIX-HAGUE.

Le BARBAREA PRÆCOX R. Br. a été trouvé en très petite quantité à Octeville, dans les carrières des Entes. Cette espèce croissait sans doute accidentellement dans cette localité. Elle est cultivée sous le nom de *Cresson perpétuel*.

Les plantes de ce genre, connues sous le nom d'*Herbe Sainte-Barbe*, sont anti-scorbutiques, et on les mange quelquefois en salade.

***Sisymbrium* DC. — *Sisymbre*.**

S. OFFICINALE Scop. — *S. OFFICINAL*. — *Erysimum officinale* L. ☉. Juin-août. C. Décombres, pied des murs, chemins, lieux incultes.

Jadis très-employé, sous le nom d'*Herbe aux chantres*, contre les aphonies.

S. SOPHIA L. — *S. SAGESSE*. — *S. parviflorum* Lamk. ☉. Juin-août. RRR. Vieux murs et décombres à CHERBOURG, près de l'entrepôt.

Cette Crucifère doit être, contrairement à l'opinion de M. Le Jolis, considérée comme indigène malgré sa grande rareté, attendu qu'elle occupe sa véritable station dans la localité citée, où elle a été observée pour la première fois, il y a fort longtemps, par MM. de Gerville et Delachapelle.

***Alliaria* Adans. — *Alliaire*.**

A. OFFICINALIS Andrz. — *A. OFFICINALE*. — *Erysimum Alliaria* L. — *Sisymbrium Alliaria* Scop. — *Hesperis Alliaria* Lamk. ②. Avril-juin. AR. Haies fraîches, talus des fossés, chemins ombragés. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. ÉQUEURDREVILLE. — HÉAUVILLE. LE ROZEL. SURTAINVILLE.

Bon anti-scorbutique.

***Nasturtium* DC. — *Cresson*.**

N. OFFICINALE R. Br. — *C. OFFICINAL*. — *Sisymbrium Nasturtium* L. — (*Cresson de fontaine*.) ④. Mai-septembre. C. Fontaines, sources, lieux aquatiques.

Plante alimentaire et anti-scorbutique.

Var. *b. N. siifolium* Rehb. — AC. Rivières, étangs, fossés.

Il faut éviter de confondre cette variété avec la Berle, à laquelle elle ressemble beaucoup et qui est très vénéneuse.

Var. *c. N. microphyllum* Rehb. — AC. Lieux exondés.

N. PALUSTRE DC. — *C. DES MARAIS*. — *Sisymbrium palustre* Lois. — *Roripa nasturtioïdes* Spach. ②. Juin-septembre. TR. Lieux inondés, bords des eaux. CHERBOURG: environs du port militaire. — TOURLAVILLE: marécages entre la mare et le Becquet.

***Arabis* L. — *Arabette*.**

A. HIRSUTA Scop. — Bor. fl. cent. — *A. HÉRISSE*. —

Turritis hirsuta L. ☉. Juin-août. TR. Coteaux sablonneux de BIVILLE.

Nous avons observé cette plante le 4 août 1861; elle est donc à rayer de la liste des plantes des îles Anglo-Normandes que nous n'avions pas trouvées dans notre presqu'île. (Page 224 du 1^{er} vol. du Congrès.)

A. THALIANA L. — *A. DE THALIUS*. — *Sisymbrium Thalianum* Gand. — *Conringia Thaliana* Mut. ☉. Avril, mai; septembre, octobre. TC. Murs, talus des fossés, champs pierreux.

***Cardamine* L. — *Cardamine*.**

C. PRATENSIS L. — *C. DES PRÉS*. — (*Pentecôte, Cresson des prés*.) ♀. Avril-juin. TC. Prés, lieux herbeux humides.

Var. *b. C. dentata* Schultz. — PC.

C. HIRSUTA L. — *C. VELUE*. — (*Cressonnette, Aiguilles à la Vierge*.) ☉. Mars-mai. TC. Murs, talus des fossés, lieux cultivés.

C. SYLVATICA Link. — *C. DES BOIS*. — *C. flexuosa* With. ☉. Mai-août. C. Bois et chemins humides, ruisseaux et sources ombragées.

Ainsi que la plupart des Crucifères, les plantes de ce genre peuvent être employées comme anti-scorbutiques.

On trouve quelquefois subspontané le LUNARIA BIENNIS Mœnch, vulgairement *Monnaie du pape*.

***Erophila* DC. — *Erophile*.**

E. VULGARIS Auct. — *E. COMMUNE*. — *Draba verna* L. ☉. Février-avril. TC. Murs, pelouses, lieux sablonneux.

Var. *a. E. glabrescens* Jord. — TC.

Var. *b.* **E. majuscula** Jord. — *Draba Krockeri* Rehb. — C.

Var. *c.* **E. medioxima** Jord. — AC.

Var. *d.* **E. stenocarpa** Jord. — R.

Var. *e.* **E. brachycarpa** Jord. — *Draba præcox* Rehb. — PC.

***Cochlearia* L. — *Cochléaria*.**

C. DANICA L. — *C. DE DANEMARCK*. ②. Février-juin.
TC. Murs, pelouses, lieux humides de la région maritime.

Plante éminemment anti-scorbutique.

La variété **præcox** de M. Le Jolis, presque aussi commune que le type, n'est qu'une forme naine.

***Camelina* Crantz. — *Cameline*.**

C. SATIVA Crantz. — *C. CULTIVÉE*. — *Myagrum sativum* L.
⊙. Mai-juillet. PC. Champs, moissons.

Cette plante est quelquefois cultivée pour ses graines, qui sont très oléagineuses.

***Isatis* L. — *Pastel*.**

I. TINCTORIA L. — *P. DES TEINTURIERS*. 4. Juillet. RRR.
Champs du littoral, près du fort de NACQUEVILLE.

L'IBERIS UMBELLATA L. (vulgairement *Thlaspi*) se rencontre quelquefois à l'état subspontané.

***Teesdalia* R. Br. — *Teesdalie*.**

T. IBERIS DC. — *T. IBÉRIDE*. — *T. nudicaulis* R. Br. — *Iberis nudicaulis* L. — *Guepinia nudicaulis* Bast. ⊙. Mars-mai. R.
VIRANDEVILLE: coteaux de Née. — SAINT-PIERRE-ÉGLISE: vallon de Hacouville. RÉTHOVILLE. — ÉCULLEVILLE: coteaux et rochers de la Sabine. OMONVILLE-LA-ROGUE: coteaux et rochers au sud de

Pégglise. HERQUEVILLE: coteaux de Herqueinoulin et environs de Pégglise. — LE ROZEL: la falaise. LES PIEUX: coteau de la Pereal-lerie. TRÉAUVILLE: le mont Saint-Gilles.

***Capsella* Vent. — *Capselle*.**

C. BURSA-PASTORIS Mœnch. — *C. BOURSE A PASTEUR*. *Thlaspi Bursa-pastoris* L. ☉. Mars-novembre. TC. Lieux cultivés, bords des chemins, talus des fossés.

***Hutchinsia* R. Br. — *Hutchinsie*.**

H. PETRÆA R. Br. — *H. DES PIERRES*. — *Lepidium petraeum* L. — *Teesdalia petraea* Rehb. ☉. Mars-mai. R. Mielles de l'Ouest de l'arrondissement.

***Lepidium* R.-Br. — *Passerage*.**

L. CAMPESTRE R. Br. — *P. CHAMPÊTRÉ*. — *Thlaspi campestre* L. ②. Mai-août. AR. Champs, talus des fossés. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. NOUAINVILLE. SIDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. COUVILLE. LE MESNIL-AU-VAL. DIGOSVILLE. — VRASVILLE. — SAINTE-CROIX-HAGUE. — BRICQUEBOSQ. HELLEVILLE. PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

Il est surprenant que M. Le Jolis n'ait trouvé cette plante qu'à Cherbourg.

L. SMITHII Hook. — *P. DE SMITH*. — *Thlaspi hirtum* Sm. non L. ♀. Avril-août. AC. Coteaux rocailleux, carrières, bords des chemins.

On trouve à l'état subspontané le *LEPIDIUM SATIVUM* L., qui est cultivé sous le nom de *Cresson alénois*.

***Cakile* Tourn. — *Caquillier*.**

C. MARITIMA Scop. — *C. MARITIME*. — *Bunias Cakile* L. — (*Roquette de mer*.) ☉. Juin-septembre. AC. Sables et graviers du littoral.

Coronopus Sm. — Coronope.

C. VULGARIS Desf. — *C. COMMUN.* — *C. Ruellii* Daléch. — *Cochlearia Coronopus* L. — *Senebiera Coronopus* Poir. — (*Corne-de-Cerf.*) ☉. Mai-septembre. AC. Lieux incultes, pierreux ou sablonneux, bords des chemins, surtout dans la région maritime.

C. DIDYMA Sm. — *C. DIDYME.* — *Lepidium didymum* L. *Senebiera didyma* Pers. — *S. pinnatifida* DC. ☉ Juillet-octobre. R. CHERBOURG: environs et intérieur du port militaire, Chante-reyne, rue de la Cayenne, environs du bassin du commerce, rue Sainte-Honorine. — ÉQUEURDEVILLE: le littoral.

C'est M. E. Jardin qui le premier a trouvé cette plante dans notre arrondissement, et non M. Le Jolis, ainsi que le dit M. de Brébisson, dans sa flore de la Normandie.

Sinapis L. — Sénévé.

S. ARVENSIS L. — *S. DES CHAMPS.* — (*Bézards.*) ☉. Mai-octobre. C. Lieux cultivés, talus des fossés.

Var. *b. S. retro-hirsuta* Bess. — *S. Orientalis* Auct. — TC.

S. CHEIRANTHUS Koch. — *S. GIROFLÉE.* — *Brassica Cheiranthus* Vill. — *S. cheiranthoides* Holland. ☉. Mai-septembre. RRR. CHERBOURG: lieux pierreux aux environs du port militaire.

S. ALBA L. — *S. BLANC.* — (*Moutarde blanche.*) ☉. Juin-août. RRR. Lieux incultes, terres remuées du littoral d'ÉQUEURDEVILLE.

S. NIGRA L. — *S. NOIR.* — *Brassica nigra* Koch. — (*Moutarde noire.*) ☉. Juin-août. R. CHERBOURG: environs et fortifications du port militaire, lieux incultes vers Saint-Sauveur. — TOURLAVILLE: Sennecey. ÉQUEURDEVILLE: terres remuées du littoral. QUERQUEVILLE: le fort. — SURTAINVILLE: environs du village, haies et bords des champs maritimes.

Les semences de ces deux dernières espèces sont journellement employées comme condiments et dans la médecine.

***Brassica* L. — *Chou*.**

B. NAPUS L. — *C. NAVET*. ②. Avril-juin. C. Champs, terres remuées, talus des fossés.

Il présente deux variétés cultivées : la var. *oleifera* (*Navette d'hiver, Colza*) et la var. *esculenta* (*Navet ordinaire*).

B. ASPERIFOLIA Lamk. — *C. A FEUILLES RUDES*. ②. Avril-juin. C. Mêmes stations que le précédent.

Cette plante est aussi cultivée, et elle offre deux variétés : le B. CAMPESTRIS L. (*Colza, Navette*) et le B. RAPA L. (*Rabioule, Turneps*).

Le BRASSICA OLERACEA L. (*Chou potager*), qui offre une foule de variétés cultivées, s'observe parfois à l'état subspontané.

***Diplotaxis* DC. — *Diplotaxis*.**

D. TENUIFOLIA DC. — *D. A FEUILLES MÊNUES*. — *Sisymbrium tenuifolium* L. ④. Juillet-septembre. TR. CHERBOURG : champs des mielles, Chantereyne. — TOURLAVILLE : champs du littoral.

D. MURALIS DC. — *D. DES MURS*. — *Sisymbrium murale* L. ②. Juillet-septembre. R. CHERBOURG : champs des mielles. Chantereyne, intérieur et remparts du port militaire, pied nord de la montagne du Roule. — TOURLAVILLE : la redoute, les Flamands et environs de la mare. ÉQUEURDEVILLE et HAINNEVILLE : champs et lieux incultes du littoral. QUERQUEVILLE : environs du fort, route de Cherbourg. — SIOUVILLE : sables du littoral. SURTAINVILLE : bords des champs maritimes.

***Crambe* Tourn. — *Crambé*.**

C. MARITIMA L. — *C. MARITIME*. — (*Chou marin*.) ④. Mai-juin. TR. Gravier et sables du littoral de GATTEVILLE, près

la limite de Gouberville. — Trouvé une seule fois sur le littoral d'URVILLE-HAGUE.

Plante cultivée en Angleterre comme potagère.

Raphanus L. -- Radis.

R. RAPHANISTRUM L. — R. RAVENELLE. ☉. Mai-septembre. Moissons.

Il présente plusieurs variétés quant à la couleur des fleurs; celle à fleurs jaunes est commune; les autres sont rares.

R. MARITIMUS Sm. — R. MARITIME. ☉. Juin-août. TR. Falaises de JOBOURG et de HERQUEVILLE.

Var. *b. R. Landra* Moretti. — TR. Falaises de JOBOURG.

On trouve parfois subspontané le RAPHANUS SATIVUS L., qui présente trois variétés principales.

RÉSÉDACÉES.

Reseda L. — Réséda.

R. LUTEOLA L. — R. GAUDE. — (*Vaudre.*) ☉. Juin-septembre. C. Lieux stériles, talus des fossés, bords des chemins.

Plante tinctoriale très employée.

R. LUTEA L. — R. JAUNE. ☉. Juin-août. TR. CHERBOURG: glais des fortifications et remparts du port militaire.

Var. *b. R. gracilis* Ten. — RRR. CHERBOURG: plaine du port militaire.

M. Delachapelle ayant aussi observé le *Reseda lutea* L. dans les mielles de Surtainville, cette plante est donc bien autochtone, contrai-

rement à l'opinion de M. Le Jolis. C'est à tort que ce dernier l'indique comme ayant été trouvée au polygone de Querqueville par M. Bertrand Lachénée.

Autour des jardins on voit quelquefois croître subspontanément le
RESEDA ODORATA L.

CISTINÉES.

Helianthemum Tourn. — *Hélianthème*.

H. GUTTATUM Mill. — H. TACHÉ. — *Cistus guttatus* L. ☉.
Juin-août. R. CHERBOURG : montagne du Roule. — TOURLAVILLE :
les Terres-Feuillies, bruyères des Traînes, environs de la Glacerie.
Le MESNIL-AU-VAL : clairières du bois du Coudray. — MAUPERTUS :
bois du Doux-Riant. FERMENVILLE : vallon et bruyères du Doux-
Riant, lisières des taillis du Nid-du-Corps, landes de l'Ouest,
la vallée. GONNEVILLE : bois de Blanqueville. BRILLEVAULT, plateau
de Blanqueville, bois de Boutron. CANTELOUP : bois et bruyères de
Boutron. LE VAST : bois de Bosnel et de Boutron.

Il est certain que nous avons le type de l'*Helianthemum guttatum* Mill., et non pas uniquement une forme de cette espèce, comme le croit M. Le Jolis, dont les observations à cet égard ont été insuffisantes, puisqu'il n'a vu cet *Helianthemum* que dans deux localités, et qu'il le signale comme étant beaucoup plus rare dans notre arrondissement qu'il ne l'est réellement.

VIOLARIÉES.

Viola L. — *Violette*.

V. HIRTA L. — V. HÉRISSE. ♀. Mars-mai. R. Haies
pierreuses, bords des chemins, coteaux. VASTEVILLE : environs du
pont des Sablons. — HÉAUVILLE : Blanche-Pierre, coteaux de la

Roque. TRÉAUVILLE: coteaux de la Diélette. SURTAINVILLE: coteaux calcaires de la Godaillerie.

Cette plante, comme on le voit, caractérise en quelque sorte une partie des cantons de Beaumont et des Pieux que M. Le Jolis paraît ne pas avoir explorée. Il en est résulté que, n'ayant pas vu le *Viola hirta* L. dans notre arrondissement, il a, dans son introduction à sa liste, émis une fausse assertion en prétendant que la présence de cette espèce n'y était pour ainsi dire qu'accidentelle.

V. ODORATA L. — V. ODORANTE. ♀. Mars, avril. AC. Haies, lieux frais et ombragés.

Le VIOLA SUBCARNEA Jord., signalé par M. Le Jolis à la Polle près Cherbourg, n'est, selon M. de Brébisson, qu'une variété du *V. odorata* L.

V. RIVINIANA Rehb. — V. DE RIVIN. — V. canina DC. non L. ♀. Avril-juin. TC. Haies, bois, coteaux, landes et bruyères.

V. ARVENSIS Auct. — V. DES CHAMPS. — V. tricolor L. part. — (*Pensée saurage*.) ○. Mai-septembre. Lieux cultivés, champs, talus des fossés.

Var. a. V. ruralis Jord. — TC.

Var. b. V. agrestis Jord. — C.

Var. c. V. gracilescens Jord. — C.

Var. d. V. segetalis Jord. — AC.

Var. e. V. Paillouxi Jord. — R. BRETTEVILLE: environs du hameau Chandeleur. — CLITOURPS: le Prieuré.

Var. f. V. nana DC. — V. parrula Bréb. — V. Nemausensis Lloyd. Dunes et mielles. — NACQUEVILLE. VAUVILLE. BIVILLE. — HÉAUVILLE. LE ROZEL. SURTAINVILLE.

Les variétés du VIOLA TRICOLOR L. cultivées dans les jardins sous le nom de Pensées se trouvent quelquefois à l'état subspontané.

Les racines des Violettes sont fortement énétiques et purgatives; les fleurs sont béchiques.

TAMARISCINÉES.

Tamarix Desv. — *Tamarix*.

T. ANGLICA Webb. — *T. D'ANGLETERRE*. — *T. Gallica* Sm. non L. 3. Juillet-septembre. Lieux marécageux du littoral. TR. à l'état spontané, GATTEVILLE. — VAUVILLE.

Planté fréquemment en haies dans la région maritime.

Dicotylédones polypétales cyclosporées

ÉLATINÉES.

Elatine L. — *Élatine*.

E. HEXANDRA DC. — *E. HEXANDRE*. — *E. Hydropiper* var. *b.* L. — *E. paludosa* var. *a.* Seub. ☉. Juillet-octobre. TR. OMONVILLE-LA-ROQUE: étangs de la vallée. TONNEVILLE: étang de Percy.

CARYOPHYLLÉES.

Dianthus L. — *Œillet*.

D. ARMERIA L. — *Œ. ARMÉRIA*. ☉. Juillet, août. RRR. Remparts du fort de QUERQUEVILLE.

On trouve quelquefois le SAPONARIA OFFICINALIS L. à l'état spontané.

***Agrostemma* L. — *Agrostemme*.**

A. GITHAGO L. — *A. NIELLE*. — *Lychnis Githago* Lamk. — *Githago segetum* Desf. — (*Coquelourde*.) ☉. Juin-août. AC. Moissons.

***Lychnis* L. — *Lychnide*.**

L. FLOS-CUCULI L. — *L. FLEUR-DE-COUCOU*. — *L. laciniata* Lamk. — *Coronaria Flos-cuculi* Rehb. — (*Œil de perdrix*.) ☿. Mai, juin. C. Prairies, bords des eaux.

Varie très rarement à fleurs blanches.

L. VESPERTINA Sibth. — *L. DU SOIR*. — *L. dioïca* var. *b.* L. — *Silene pratensis* Gr. et Godr. — *Melandrium pratense* Rohl. — (*Compagnon blanc*.) ☿. Juin-septembre. C. Moissons, bords des champs, talus des fossés.

Varie assez fréquemment à fleurs roses.

L. DIURNA Sibth. — *L. DU JOUR*. — *L. dioïca* var. *a.* L. — *L. sylvestris* DC. — *Silene diurna* Gr. et Godr. — *Melandrium sylvestre* Rohl. — (*Compagnon rouge*.) ☿. Avril-septembre. C. Haies, lieux frais ombragés.

Varie rarement à fleurs blanches : Omonville-la-Petite.

***Silene* L. — *Silène*.**

S. INFLATA Sm. — *S. ENFLÉ*. — *Cucubalus Behen* L. — *Behen vulgaris* Mœnch. ☿. Juin-septembre. PC. Champs, bords des chemins et des haies.

On a tout récemment démembré cette plante en plusieurs espèces pour l'admission desquelles un examen très rigoureux est nécessaire.

S. MARITIMA With. — *S. MARITIME*. — *S. amœna* de Gerv. Cat. — *S. uniflora* Delach. — *Cucubalus littoralis* Pers. ☿.

Juin-septembre. C. Rochers, coteaux, sables et graviers maritimes, falaises.

S'écarte parfois assez loin du littoral.

S. ANNULATA Thore. — *S. A ANNEAU*. — *S. clandestina* Dub. — *S. Cretica* Auct. non L. ☉. Juin-août. TR. Champs de lin. TEURTHÉVILLE-HAGUE. — VRASVILLE.

S. NUTANS L. — *S. PENCHÉ*. ☿. Juin-août. R. BRETTEVILLE : vallon, coteaux et rochers des Fontaines. — FERMENVILLE : environs de l'église, hameau Carré, chemin de Cosqueville. — NACQUEVILLE : rochers au sud de la route d'Omonville. SAINT-GERMAIN-DES-VAUX : rochers du pont des Vaux. AUDERVILLE : environs du tumulus. JOBOURG : murs de l'église. HERQUEVILLE : coteaux maritimes de Froide-Fontaine et de Herquemoulin. VAUVILLE : chemin du littoral, prieuré de Saint-Hermel. — LES PIEUX et FLAMANVILLE : coteaux maritimes. LE ROZEL : la falaise. SERTAINVILLE : coteaux du Poux.

S. GALICA L. — *S. DE FRANCE*. ☉. Juin-septembre. AC. Champs cultivés, lieux sablonneux, talus des fossés.

Var. *h. S. Anglica* L. — R. ÉQUEURDREVILLE : talus des fossés près du fort du Tot. TOLLEVAST : la Leu.

Var. *c. S. cerastoïdes* DC. — AR. Ça et là avec le type.

Il est facile de se convaincre que le degré de rareté (RR.) attribué par M. Le Jolis au *Silene Gallica* L. dans les moissons de l'intérieur est exagéré.

S. CONICA L. — *S. CONIQUE*. ☉. Mai-juillet. R. Mielles et dunes. — TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE. — NACQUEVILLE. — LE ROZEL.

C'est à tort que M. Le Jolis indique cette espèce comme étant assez commune dans les sables maritimes de tout le littoral.

On rencontre parfois à l'état subspontané le *SILENE MUSCIPULA* L.

***Sagina* L. — *Sagine*.**

S. PROCUMBENS L. — *S. COUCHÉE*. ☿. Avril - septembre. TC. Murs, pelouses, pied des haies.

S. APETALA L. — *S. APÉTALE*. ☉. Mai - septembre. C. Murs, champs, lieux sablonneux.

S. FILICAULIS Jord. — *S. FILICAULE*. ☉. Juin - septembre. R. Talus des fossés, bords des chemins. SAINT-PIERRE-ÉGLISE : environs de la route de Cosqueville. — GRÉVILLE : environs de l'église.

S. CILIATA Fries. — *S. CILIÉE*. ☉. Juin - septembre. AC. Murs, champs sablonneux, pelouses.

Var. *b. S. patula* Jord. — AC.

S. MARITIMA Don. — *S. MARITIME*. — *S. stricta* Fries. ☉. Mai - septembre. AR. Pelouses, lieux pierreux et sables du littoral. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. ÉQUEURDEVILLE. DIGOSVILLE. BRETTEVILLE. — VRASVILLE. RÉTHOVILLE. — OMONVILLE-LA-ROGUE. — SIOUVILLE.

Var. *b. S. debilis* Jord. — TR. CHERBOURG : canal de retenue, fort du Hommet.

***Alsine* L. — *Alsine*.**

A. VISCOSA Schreb. — *A. VISQUEUSE*. — *Arenaria viscidula* Thuill. — *A. hydrida* Vill. — *Sabulina viscosa* Rehb. ☉. Mai - juillet. R. Mielles et dunes. TOURLAVILLE. — VAUVILLE. VASTEVILLE. — HÉAUVILLE. SIOUVILLE. SURTAINVILLE.

***Arenaria* L. — *Sabline*.**

A. SERPYLLIFOLIA L. — *S. A FEUILLES DE SERPOLET*. — *A. sphærocarpa* Ten. ☉. Mai - septembre. PC. Lieux sablonneux, murs.

Var. *b.* **A. leptoclados** Guss. — C. Murs, champs sablonneux, lieux pierreux.

Var. *c.* **A. Lloydii** Jord. — AC. Sables, champs, murs de la région maritime.

***Mehringia* Clairv. — *Mehringie*.**

M. TRINERVIA Clairv. — **M. TRINERVÉE**. — *Arenaria trinervia* L. ☉. Avril-juin. C. Haies, bords des chemins, lieux ombragés.

***Halianthus* Fries. — *Halianthe*.**

H. PEPLOIDES Fries. — **H. POURPIER**. — *Adenarium peploïdes* Raf. — *Honkeneya peploïdes* Ehrh. — *Arenaria peploïdes* L. ♀. Juin-septembre. AR. Sables et graviers maritimes. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. — GOUBERVILLE. GATTEVILLE. — NACQUEVILLE. URVILLE-HAGUE. VAUVILLE. VASTEVILLE. — LES PIEUX. LE ROZEL. SURTAINVILLE.

***Stellaria* L. — *Stellaire*.**

S. NEGLECTA Weihe. — **S. NÉGLIGÉE**. — *S. latifolia* Dub. — *S. media* var. *major* Koch. ☉. Avril, mai. PC. Haies fraîches, lieux humides et ombragés.

S. MEDIA Vill. — **S. MOYENNE**. — *Alsine media* L. — (*Morgeline, Mouron blanc, Menuchon*). ☉. TC. Partout et toujours.

Plante très recherchée pour la nourriture des petits oiseaux.

S. BORÆANA Jord. — **S. DE BOREAU**. ☉. Mars-mai. C. Murs, pied des haies, pelouses, lieux sablonneux.

S. HOLOSTEA L. — **S. HOLOSTÉE**. — (*Manchettes de la Vierge*). ♀. Avril-juin. TC. Haies, taillis, buissons pierreux.

S. GRAMINEA L. — *S. GRAMINÉE*. 4. Mai-septembre. C. Buissons, haies, bords des champs.

S. GLAUCA With. — *S. GLAUQUE*. — *S. palustris* Retz. 4. Jun, juillet. TR. Prés marécageux de NACQUEVILLE, vers la mare.

Il est surprenant que M. Le Jolis, dans une des notes de sa liste, ne signale cette espèce qu'en dehors de notre arrondissement, dans les endroits marécageux des environs de Valognes, lorsque la localité où nous l'avons trouvée et qu'il a dû souvent visiter, comme riche en plantes intéressantes, est très voisine de sa maison de campagne.

S. ULIGINOSA Murr. — *S. DESFANGES*. — *S. aquatica* Poll. — *Larbrea aquatica* St-Hil. ☉. Mai-juillet. C. Bords des fontaines, des ruisseaux, lieux marécageux.

***Mœnchia* Ehrh. — *Mœnchie*.**

M. ERECTA Ehrh. — *M. DROITE*. — *M. glauca* Pers. — *Sagina erecta* L. — *Cerastium glaucum* var. *quaternellum* Gr. et Godr. ☉. Avril, mai. PC. Pelouses, coteaux, murs.

Var. *b. patula* Mér. — SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD: lande de Candar.

***Cerastium* L. — *Céraiste*.**

C. TRIVIALE Link. — *C. COMMUN*. — *C. vulgatum* L. Sp. et Fries. — *C. viscosum* Sm. ②. Avril-octobre. TC. Lieux incultes, murs, bords des chemins.

Var. *b. C. sylvaticum* Bréb. non Waldest et Kit. — AC. Prés et bois.

Var. *c. glandulosum*. — PC.

C. GLOMERATUM Thuill. — *C. AGGLOMÉRÉ*. — *C. viscosum* Fries. — *C. vulgatum* Sm. non L. ☉. Avril-septembre. TC. Lieux cultivés, murs, talus des fossés.

Var. *b. C. apetalum* Dumort. — C.

C. SEMIDECANDRUM L. — C. *A CINQ ÉTAMINES*. — C. *viscosum* Pers. ☉. Avril, mai. AR. Pelouses, murs, lieux sablonneux. Croît surtout dans la région maritime. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE. — NACQUEVILLE. BIVILLE. VASTEVILLE. HÉAUVILLE. LE ROZEL. SURTAINVILLE.

C. PUMILUM Curt. — C. *GRÈLE*. ☉. Avril-juin. R. Murs, bords des chemins. CHERBOURG. — OCTEVILLE. EQUEURDREVILLE.

Var. *b. C. tetrandrum* Curt. — C. *atrovirens* Bab. — *Sagina cerastoides* Sm. — *Esmarchia cerastoides* Rehb. C. Murs, coteaux, lieux sablonneux de la région maritime; s'avance souvent assez loin dans l'intérieur.

***Spergula* L. — *Spargoute*.**

S. SUBULATA Sw. — S. *SUBULÉE*. — *Sagina subulata* Wimm. — *Spergella subulata* Rehb. ♀. Mai-août. AR. DIGOSVILLE: pied des collines maritimes. — CARNEVILLE: lande de l'Ouest. — BEAUMONT: Coteaux de Herquemoulin et au sud de l'église. ECULLEVILLE: les pelouses maritimes. OMONVILLE-LA-ROQUE: coteaux et rochers au sud de l'église, les falaises. DIGULLEVILLE: environs du presbytère. AUDERVILLE, JOBOURG et HERQUEVILLE: les falaises et les coteaux maritimes. VAUVILLE. — FLAMANVILLE: les falaises. TRÉAUVILLE: le mont Saint-Gilles. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD: lande de Candar.

S. NODOSA L. — S. *NOUEUSE*. — *Sagina nodosa* Fenzl. — *Spergella nodosa* Rehb. ♀. Juin-août. R. CHERBOURG: environs du canal de retenue. — TOURLAVILLE: la redoute. QUERQUEVILLE: les mielles. — NÉVILLE et GOUBERVILLE: les mielles. NACQUEVILLE: pelouses et prés voisins de la mare. VAUVILLE: les mielles, vallon de la Crecque. BIVILLE: mielles et coteaux maritimes. VASTEVILLE: vallon de Bival, coteaux de Claire-Fontaine. — LE ROZEL et SURTAINVILLE: les mielles.

S. VULGARIS Bœnng. — *S. COMMUNE*. — *S. arvensis* de Gerv. et Delach. ☉. Mai - août. PC. Champs, lieux sablonneux.

***Spergularia* Pers. — *Spergulaire*.**

S. RUBRA Pers. — *S. ROUGE*. — *Arenaria rubra* L. — *Alsine rubra* Wahlenb. — *Lepigonum rubrum* Fries. ☉. Mai - septembre. PC. Chemins secs, coteaux, lieux sablonneux.

S. MARINA Bor. — *S. MARINE*. — *Arenaria marina* Roth. ②. Juin - août. C. Sables maritimes humides, vases et prés salés.

S. MARGINATA Bor. — *S. BORDÉE*. — *Arenaria marginata* DC. — *Lepigonum marginatum* Koch. ③. Juin - août. AR. Vases salées et marécages maritimes.

S. RUPICOLA Leb. — *S. DES ROCHERS*. — *Lepigonum rupestre* Kindb. ④. Juin - septembre. Rochers maritimes, falaises. C. principalement sur la côte Ouest de l'arrondissement.

C'est cette espèce que M. Le Jolis avait prise pour l'*ARENARIA MACRORHIZA* Req., qui est une plante de Corse, et qu'il a signalée sous ce nom dans les Annales des Sciences naturelles.

PARONYCHIÉES.

***Corrigiola* L. — *Corrigiole*.**

C. LITTORALIS L. — *C. DES RIVAGES*. ☉. Juillet, août. R. Sables du littoral du canton de Saint-Pierre-Eglise : COSQUEVILLE. NÉVILLE. GOUBERVILLE. GATTEVILLE.

***Polycarpon* L. — *Polycarpe*.**

P. TETRAPHYLLUM L. — *P. A QUATRE FEUILLES*. ☉. Mai - août. PC. Murs, champs, talus des fossés, lieux pierreux, presque exclusivement dans la région maritime.

Var. *b. alsinoides* Gr. et Godr. — *P. alsinæfolium* DC. — Sables, coteaux et pelouses maritimes.

***Scleranthus* L. — *Gnauvelle*.**

S. ANNUUS L. — *G. ANNUELLE*. ☉. Juillet - septembre. R. Lieux sablonneux, coteaux, murs. EQUEURDEVILLE. — THÉVILLE.

Var. *b. hybernus* Rehb. TR. Falaises de HERQUEVILLE.

PORTULACÉES.

***Montia* Mich. — *Montie*.**

M. RIVULARIS Gm. — *M. DES RUISSEAUX*. — *M. fontana* L. part. ♀. Juin - septembre. AC. Ruisseaux, fontaines, sources d'eaux vives.

C'est à tort que quelques botanistes considèrent cette espèce comme exclusive aux terrains granitiques. Nous l'avons trouvée en égale abondance dans tous les terrains primitifs et de transition de notre arrondissement.

M. ARVENSIS Wallr. — *M. DES CHAMPS*. — *M. minor* Gm. — *M. fontana* L. part. ☉. Avril - juillet. PC. Pelouses, coteaux humides, lieux exondés, champs sablonneux.

Le Pourpier (PORTULACA OLERACEA L.) se trouve quelquefois subspontané dans les jardins.

Dicotylédones apétales cyclosporées.

CHÉNOPODÉES.

***Beta* Tourn. — *Bette*.**

B. MARITIMA L. — *B. MARITIME*. ♀. Juillet - septembre.

TC. Sables et graviers, rochers, bords des champs, etc., sur tout le littoral.

Cette plante peut remplacer très avantageusement les épinards.

Le *BETA VULGARIS* L. et ses variétés, généralement cultivées sous les noms de *Bette*, *Poirée* ou *Carde*, *Betterave*, se trouvent parfois à l'état subspontané.

***Chenopodium* L. — *Ansérine*.**

C. POLYSPERMUM Auct. — *A. POLYSPERME*. ☉. Juillet-septembre. Champs, jardins, terres remuées.

Var. *a. C. polyspermum* L. — R. CHERBOURG: environs de Tivoli, le Roule.

Var. *b. C. acutifolium* Sm. — AR. CHERBOURG. — MARTINVAST. COUVILLE. HARDINVAST. — NÉVILLE. — HERQUEVILLE. — HELLEVILLE.

C. LEIOSPERMUM DC. — *A. A GRAINES LUISANTES*. ☉. Juillet-octobre. TC. Lieux cultivées, terres remuées, fumiers.

Var. *a. C. album* L.

Var. *b. C. paganum* Rehb.

Var. *c. C. viride* Bor.

C. MURALE L. — *A. DES MURS*. ☉. Juillet-octobre. PC. Décombres, pied des murs, bords des chemins.

Toutes ces plantes sont confondues sous le nom vulgaire de *Senille*.

***Blitum* Tourn. — *Blite*.**

B. RUBRUM Rehb. — *B. ROUGE*. — *B. polymorphum* Mey. *Chenopodium rubrum* L. ☉. Juillet-septembre. AR. Lieux sablonneux humides, bords des grandes mares du littoral.

Il présente plusieurs variétés dues principalement à la station.

***Atriplex* L. — Arroche.**

A. ANGUSTIFOLIA Sm. — *A. A FEUILLES ÉTROITES*. — *A. patula* L. ☉. Juillet - octobre. C. Bords des chemins, champs, pied des murs.

Cette espèce varie beaucoup, surtout dans les stations du littoral.

A. ERECTA Huds. — *A. DROITE*. ☉. Août - octobre. AC. Lieux cultivés, décombres, terres remuées.

A. LITTORALIS L. — *A. DES RIVAGES*. ☉. Juillet - septembre. R. Talus des fossés, champs, bords des marais du littoral. GATTEVILLE. — NACQUEVILLE.

A. LATIFOLIA Wahlenb. — *A. A LARGES FEUILLES*. — *A. patula* Sm. — *A. hastata* L. ☉. Juin - octobre. C. Lieux incultes, pied des murs, décombres, fumiers.

A. OPPOSITIFOLIA DC. — *A. A FEUILLES OPPOSÉES*. — *A. patula* Dub. — *A. patula* var. *salina* Wallr. ☉. Juillet - octobre. AC. Vases salées des marécages maritimes.

A. CRASSIFOLIA Mey. — *A. A FEUILLES ÉPAISSES*. — *A. rosea* Lloyd et Auct. Gall. part. ☉. Juillet - septembre. PC. Sables maritimes.

L'ATRIPLEX MORTENSIS L. se trouve très rarement à l'état subspontané; il en est de même des épinards (*SPINACIA SPINOSA* et *INERMIS* Mönch).

***Obione* Gærtn. — Obione.**

O. PORTULACOIDES Moq. - Tand. — *O. POURPIER*. — *Atriplex portulacoides* L. — *Halimus portulacoides* Koch. ☿. Août - septembre. TR. CHERBOURG: anciens fossés du port militaire. — GATTEVILLE: vases et marais salés du littoral de l'Est.

On mange ses jeunes pousses comme condiment.

***Salicornia* L. — *Salicorne*.**

S. HERBACEA L. — *S. HERBACÉE*. — (*Criste-marine, Passe-pierre*.) ☉. Août-septembre. AR. CHERBOURG : canal de retenue, fossés du port militaire. — GATTEVILLE : vases et marais salés du littoral de l'Est. — NACQUEVILLE : la mare. AUDERVILLE : environs du port de Goury.

Val. *b. S. procumbens* Sm. — Ça et là avec le type.

Cette plante est employée comme condiment.

S. RADICANS Sm. — *S. RADICANTE*. ☿. Août, septembre. R. CHERBOURG : canal de retenue. — GATTEVILLE : vases salées du littoral de l'Est. — AUDERVILLE : environs du port de Goury.

***Chenopodia* Moq.-Tand. — *Chénopodine*.**

C. MARITIMA Moq.-Tand. — *C. MARITIME*. — *Chenopodium maritimum* L. — *Suaeda maritima* Dumort. — *Schoberia maritima* Mey. — (*Blanquette*.) ☉. Juillet-septembre. AR. Vases et marais salés. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE. — GATTEVILLE. — HERQUEVILLE.

***Salsola* Gærin. — *Soude*.**

S. KALI L. — *S. KALI*. ☉. Juillet, août. C. Sables maritimes.

Var. *b. S. Tragus* DC. non L. — R. NACQUEVILLE.

Les plantes de ces trois derniers genres donnent beaucoup de soude par leur incinération.

POLYGONÉES.***Polygonum* L. — *Renouée*.**

P. AMPHIBIUM L. — *R. AMPHIBIE*. ☿. Juillet, août.

Var. *a. natans* Moench. — PC. Etangs, fossés, rivières lentes.

Var. *b. terrestre* Leers. — C. Prés, fossés, champs humides.

P. LAPATHIFOLIUM L. — R. *A FEUILLES DE PATIENCE*. ☉. Juillet-septembre. AC. Champs et moissons humides, mares desséchées.

Var. *b. P. incanum* DC. — PC.

P. NODOSUM Pers. — R. *NOUEUSE*. ☉. Juillet - septembre. AR. Fossés, bords des eaux. CHERBOURG. — EQUEUDREVILLE. HAINNEVILLE. — GONNEVILLE.

P. PERSICARIA L. — R. *PERSICAIRE*. ☉. Juillet - octobre. C. Lieux cultivés humides, terres remuées, bords des chemins.

Var. *b. elatum* Gr. et Godr. — *P. biforme* Wahlenb. — PC.

P. MITE Schrank. — R. *INSIPIDE*. ☉. Août, septembre. TR. CHERBOURG : lieux marécageux à Sennecey.

P. HYDROPIPER L. — R. *POIVRE-D'EAU*. — *P. acre* Lamk. (*Curage.*) ☉. Juillet - octobre. TC. Chemins humides, fossés, bords des eaux.

Plante très âcre, rubéfiante.

P. AVICULARE L. — R. *DES OISEAUX*. — (*Centinode, Traînasse.*) ☉. Juin - septembre. TC. Bords des chemins, champs, lieux incultes et sablonneux.

Cette plante présente un grand nombre de variétés dues peut-être uniquement à la station, et qu'on a récemment élevées au rang d'espèces.

P. MARITIMUM L. — R. *MARITIME*. ♀. Août, septembre. TR. Sables et graviers maritimes. CHERBOURG. — VRASVILLE. — VAUVILLE.

P. RAIH Bab. — *R. DE RAY*. — *P. littorale* Link. ☉. Juillet-septembre. AC. Lieux sablonneux ou pierreux du littoral.

P. CONVULVULUS L. — *R. LISERON*. — (*Faux liseron, Vrillée.*) ☉. Juillet-septembre. C. Lieux cultivés, talus des fossés, terres remuées.

On trouve souvent subspontanés, quelquefois loin des cultures, les *POLYGONUM FAGOPYRUM* et *TATARICUM* L., cultivés, le premier sous le nom de *Sarrasin* ou *Blé noir*, le second sous celui de *Siberi*.

***Rumex* L. — *Rumex*.**

R. ACETOSELLA L. — *R. PETITE-OSEILLE*. — *Lapathum arvense* Lamk. — (*Surelle.*) ♀. Mai-juillet. C. Coteaux secs, carrières, lieux arides, champs stériles.

Var. *b. multifidus* Wallr. — AC.

Var. *c. angustifolius* Koch. — AC.

R. ACETOSA L. — *R. OSEILLE*. — *Lapathum pratense* Lamk. — (*Grande oseille.*) ♀. Mai-juillet. TC. Prairies, haies, bois humides.

Les feuilles de ces deux espèces sont alimentaires, et leurs racines sont très diurétiques.

R. MARITIMUS L. — *R. MARITIME*. ②. Juin-août. AR. CHERBOURG: canal de retenue. — Prés maritimes de COSQUEVILLE. — Mares de TOURLAVILLE, de VRASVILLE, de NÉVILLE et de VAUVILLE.

R. PULCHER L. — *R. VIOLON*. — *Lapathum sinuatum* Lamk. ②. Juin-septembre. PC. Bords des chemins; lieux secs, incultes et pierreux.

Ce *Rumex* se trouve dans toutes les parties de l'arrondissement, et il n'est pas spécial à la Hague, comme l'indique M. Le Jolis.

R. OBTUSIFOLIUS Koch.-Bor. — *R. A FEUILLES OBTUSES.*
— *R. Friesii* Gr. et Godr. — *Lapathum sylvestre* Lamk. ♀.
Juillet-septembre. TC. Bords des chemins, pied des murs, cours
des fermes.

Var. *b.* **R. pratensis** Mert. et Koch. — *R. acutus* Gr. et Godr.
— *R. cristatus* Wallr. — PC. Prés, lieux frais et humides.

Var. *c.* **R. sylvestris** Wallr. — *R.* CHERBOURG : plaine du port
militaire. — COUVILLE.

R. CRISPUS L. — *R. CRÉPU.* — *Lapathum crispum* Lamk.
♀. Juin-août. TC. Bords des chemins, lieux incultes, talus des
fossés, prés.

On ne saurait comprendre comment M. Le Jolis a pu omettre dans
sa liste cette espèce qui abonde partout.

R. CONGLOMERATUS Murr. — *R. CONGLOMÉRÉ.* —
R. nemolapathum Ehrh. ♀. Juin-août. TC. Bords des chemins,
haies, bois, lieux humides.

R. RUPESTRIS Le Gall. — *R. DES ROCHERS.* ♀. Juillet,
août. R. Rochers et graviers maritimes, pied des falaises de la
Hague.

C'est M. Gust. Thuret qui le premier a trouvé cette plante dans
notre arrondissement.

M. Le Jolis dit dans sa liste que ce savant lui en a rapporté des
échantillons qui ont prospéré dans son jardin.

R. NEMOROSUS Schrad. — *R. DES BOIS.* — *R. viridis* Sibth.
♀. Juin-août. AC. Bois, haies, chemins ombragés.

Var. *b.* **R. sanguineus** L. — *Lapathum sanguineum* Lamk. —
(*Sang de dragon, Patience rouge.*) — TR. CHERBOURG : environs
du port militaire et de l'église Saint-Clément. — HAINNEVILLE : le
Belgireux.

R. HYDROLAPATHUM Huds. — R. *DES EAUX*. — R. *aquaticus* DC. non L. 2. Juillet, août. AC. Bords des eaux, fossés, prés inondés.

Toutes les espèces de ce genre, à l'exception des deux premières, sont confondues sous les noms vulgaires de *Doque*, *Doche*, *Parelle*, *Patience sauvage*. Leurs racines sont employées comme diurétiques et sudorifiques.

Dicotylédones apétales orthosporées.

THYMÉLÉES.

Daphne L. — *Daphné*.

D. LAUREOLA L. — D. *LAURÉOLE*. — (*Laurette*.) 3. Janvier-avril. R. Bois, haies. CHERBOURG: le Maupas et les Terres-Feuillies.—OCTEVILLE: la Prévalerie, vallon Maresquier. TOURLAVILLE: le Roule, la Loge, Cloquant, Sauximerais. QUERQUEVILLE: bois du château et d'Anfreville. MARTINVEST: bois du château. LE MESNIL-AU-VAL: bois de Querebec. — LE VAST: Croix-Blandin. — FLAMANVILLE: les bois. LE ROZEL: bois du manoir.

Arbuste vésicant, vénéneux.

LAURINÉES. — Le Laurier (*LAURUS NOBILIS* L.), cultivé dans nos jardins, est naturalisé.

LORANTHACEES.

Viscum Tourn. — *Gui*.

V. ALBUM L. — G. *BLANC*. 3. Mars-mai. TR. Parasite sur les pommiers. SIDEVILLE. — TRÉAUVILLE.

SANTALACÉES.

***Thesium* L. — *Thésion*.**

T. HUMIFUSUM DC. — *T. COUCHÉ*. — *T. linophyllum* de Gerv. et Delach. ♀. Juin - août. R. Mielles et dunes. TOURLA-VILLE. QUERQUEVILLE. — VAUVILLE. — SURTAINVILLE.

Dicotylédones apétales diclines.

CUCURBITACÉES.

***Bryonia* L. — *Bryone*.**

B. DIOICA Jacq. — *B. DIOIQUE*. — (*Couleurée, Raisins du diable*.) ♀. Mai-septembre. P.C. Haies, buissons, bois.

Plante à suc et à racine fortement purgatifs.

EUPHORBIACÉES.

***Buxus* Tourn. — *Buis*.**

B. SEMPERVIRENS L. — *B. TOUJOURS VERT*. — (*Guezette*.) 3. Mars, avril. Haies, coteaux boisés. Commun dans le sud de l'arrondissement; peu commun à l'est et à l'ouest.

***Euphorbia* L. — *Euphorbe*.**

E. PEPLIS L. — *E. PÉPLIDE*. — *Tithymalus auriculatus* Lamk. ☉. Juillet-septembre. R. Sables maritimes. GATTEVILLE. — VAUVILLE. — LES PIETX. LE ROZEL. SURTAINVILLE.

E. HELIOSCOPIA L. — *E. RÉVEILLE-MATIN*. ☉. Juillet-octobre. C. Lieux cultivés, champs argileux, talus des fossés.

E. PARALIAS L. — *E. MARITIME*. — *Tithymalus maritimus* Lamk. — (*Tithymale*.) ♀. Juin-septembre. C. Sables maritimes.

E. PORTLANDICA L. — *E. DE PORTLAND*. ☉. Juin-septembre. Falaises, coteaux et mielles de l'Ouest de l'arrondissement, où elle est assez commune.

E. EXIGUA L. — *E. FLUETTE*. ☉. Juillet-octobre. AC. Champs, talus des fossés.

Var. *h. E. retusa* DC. — PC.

E. PEPLUS L. — *E. PÉPLUS*. — (*Euphorbe des jardins*.) ☉. Juillet-novembre. — TC. Lieux cultivés, terres remuées.

E. LATHYRIS L. — *E. ÉPURGE*. ☉. Juin, juillet. R. Lieux cultivés, jardins. CHERBOURG. — OCTEVILLE. — FLAMANVILLE.

E. AMYGDALOIDES L. — *E. AMANDIER*. — *E. sylvatica* Jacq. — (*Herbe aux verrues, à la biche*.) ♀. Avril-juin. C. Bois, haies, bords des chemins, coteaux.

Toutes les Euphorbes contiennent un suc blanc, âcre, caustique et vénéneux.

***Mercurialis* Tourn. — *Mercuriale*.**

M. ANNUA L. — *M. ANNUELLE* — (*Foirolle*.) ☉. Juin-novembre. TC. Lieux cultivés, terres remuées.

Feuilles et tiges fortement laxatives.

M. PERENNIS L. — *M. VIVACE*. — (*Mercuriale des bois*.) ♀. Février-mai. AR. Bois, haies, lieux humides ombragés. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. ÉQUEURDEVILLE. QUERQUEVILLE. MARTINVEST. — MAUPERTUS. FERMANVILLE. — SAINTE-CROIX-HAGUE. NACQUEVILLE. GRÉVILLE. ÉCULLEVILLE. — PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

CÉRATOPHYLLÉES.

***Ceratophyllum* L. — Cornifle.**

C. DEMERSUM L. — *C. NAGEANT*. — *C. oxycanthum* Cham.
 ♀. Juin - août. TR. SAINT-PIERRE-ÉGLISE et COSQUEVILLE : étang du
 Pelot. GATTEVILLE : étang de Gattemare.

C. SUBMERSUM L. — *C. SUBMERGÉ*. — *C. muticum* Cham.
 ♀. Juin - août. R. GONNEVILLE : étangs de la filature et du moulin.
 COSQUEVILLE : ruisseau de Renouville, étang du Pelot. NÉVILLE : la
 mare. GOUBERVILLE et GATTEVILLE : étang de Gattemare. — NAG-
 GREVILLE : les fossés maritimes, étang du château. VAUVILLE : la
 mare.

URTICÉES.

***Urtica* L. — Ortie.**

U. URENS L. — *O. BRULANTE*. — (*Ortie-grièche, petite
 ortie.*) ☉. Juin - septembre. Lieux incultes, bords des chemins,
 pied des murs, décombres. C. surtout dans la région maritime.

U. DIOICA L. — *O. DIOIQUE*. — (*Grande ortie.*) ♀. Juin-
 septembre. TC. Lieux incultes, cours des fermes, pied des murs,
 décombres, chemins.

Tige à fibres textiles pouvant être utilisées comme celles du chanvre.

***Parietaria* L. — Pariétaire.**

P. DIFFUSA Mert. et Koch. — *P. DIFFUSE*. — *P. officinalis*
 Sm. — *P. Judaica* DC. non L. ♀. Juin - octobre. C. Vieux
 murs, ruines, décombres.

Var. *b. fallax* Gr. et Godr. — AC.

Plante très diurétique.

***Humulus* L. — *Houblon*.**

H. LUPULUS L. — *H. GRIMPANT*. 2. Juillet, août. AR. Haies et buissons humides, lieux frais, bords des eaux. OCTEVILLE. TOURLAVILLE. ÉQUEURDEVILLE. HAINNEVILLE. SIDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD. TOLLEVAST. — SAINT-PIERRE-ÉGLISE. FERMANVILLE. TOCQUEVILLE. LE VAST. — BRANVILLE. OMONVILLE-LA-ROGUE. — SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC. BENOISTVILLE. PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

Les fruits du houblon sont très employés comme toniques, amers et dépuratifs. Ils entrent dans la fabrication de la bière.

Le Chanvre (*CANNABIS SATIVA* L.) se trouve quelquefois à l'état subspontané.

Le Figuier (*FICUS CARICA* L.), généralement cultivé, est naturalisé, surtout dans la région maritime.

ULMACÉES.

***Ulmus* L. — *Orme*.**

U. CAMPESTRIS Auct. — *O. CHAMPÊTRE*. 3. Mars, avril. Haies, buissons, plantations.

Var. *a. U. major* Sm. — C.

Var. *b. U. campestris* L.-Bor. — C.

Var. *c. U. minor* Mill. — AC.

Var. *d. U. suberosa* Ehrh. — AC.

PLATANÉES. — Le Platane (*PLATANUS VULGARIS* Spach) est planté çà et là dans les avenues et les pares.

SALICINÉES.

***Salix* Tourn. — Saule.**

S. ALBA L. — S. BLANC. — (*Osier blanc*). 3. Avril, mai. C. Bords des eaux.

Var. *b. cœrulea* Sm. — AC.

S. VITELLINA L. — S. JAUNE. — (*Osier franc, Osier jaune.*) 3. Avril, mai. TR. à l'état sauvage. Bords des fossés à NACQUEVILLE.

Fréquemment planté.

S. FRAGILIS L. — S. FRAGILE. 3. Avril, mai. R. Bords des eaux, haies humides. TEURTHÉVILLE-HAGUE. HARDINVAST. TOLLEVAST. — LE VAST.

S. TRIANDRA L.—S. A TROIS ÉTAMINES. — (*Osier brun.*) 3. Avril, mai. R. Bords des eaux. TEURTHÉVILLE-HAGUE. TOLLEVAST. — LE VAST. — PIERREVILLE.

S. PURPUREA L. — S. POURPRE. — S. *monandra* Hoffm. (*Osier rouge.*) 3. Mars, avril. R. Bords des eaux, haies très humides. TOURLAVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. — BIVILLE. VASTEVILLE.

S. RUBRA Huds. — S. ROUGE. — S. *fissa* Ehrh. 3. Mars, avril. TR. Bords de l'Ouve à TOLLEVAST.

S. VIMINALIS L. — S. DES VANNIERS. — (*Osier vert.*) 3. Avril, mai. AR. Bords des eaux, lieux très humides. TOURLAVILLE. MARTINVAST. BRETTEVILLE. — LE VAST. — FLOTTÉMANVILLE-HAGUE. BIVILLE. — GROSVILLE. SIOUVILLE. LE ROZEL. PIERREVILLE.

Var. *b. longifolia* Bréb. — R. LE VAST.

S. SMITHIANA Willd. — *S. DE SMITH*. — *S. Seringeana* Gaud. — *S. lanceolata* Ser. 3. Avril, mai. AR. Haies humides, bords des eaux. TOURLAVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. VIRANDEVILLE. COUVILLE. HARDINVEST. TOLLEVAST. — GONNEVILLE. LE VAST. — FLOTTEMANVILLE-HAGUE. TONNEVILLE. SAINTE-CROIX-HAGUE. JOBOURG. — SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD. SURTAINVILLE.

S. CAPREA L. — *S. MARCEAU*. — *S. tomentosa* Ser. 3. Mars, avril. PC. Haies, bois humides.

S. CINEREA L. — *S. CENDRÉ*. 3. Mars, avril. TC. Haies, bois, fossés.

Var. *b. S. rufinervis* DC. — C.

S. AURITA L. — *S. A OREILLETES*. — *S. rugosa* Ser. 3. Avril, mai. AC. Landes marécageuses, fossés, bois humides.

Var. *b. S. ambigua* Ehrh. — *S. versifolia* Ser. — PC.

S. REPENS L. — *S. RAMPANT*. — *S. depressa* Hoffm. 3. Mars - mai. AC. Landes et bruyères tourbeuses, mielles très humides.

S. ARGENTEA Sm. — *S. ARGENTÉ*. — *S. arenaria* L. — *S. lanata* Thuill. 3. Mars - mai. AC. Mêmes stations que le précédent.

Le *SALIX BABYLONICA* L. (*Saule pleureur*) se rencontre peu souvent naturalisé çà et là.

Quoique la plupart de nos espèces de Saules soient cultivées dans les oseraies, nous les avons toutes trouvées à l'état sauvage. M. Le Jolis est trop exclusif en ce qu'il limite à cinq le nombre de celles qui lui paraissent véritablement indigènes.

***Populus* Tourn. — *Peuplier*.**

P. ALBA L. — *P. BLANC*. — (*Ypréau*.) 3. Avril. PC. Haies, bois frais.

Fréquemment planté.

P. TREMULA L. — P. TREMBLE. 3. Mars, avril. PC. Bois humides, haies.

Le POPULUS FASTIGIATA Poir. (*Peuplier d'Italie*) et le P. VIRGINIANA Desf. (*Peuplier de Virginie*), fréquemment plantés aux bords des eaux et dans les avenues, sont naturalisés. Il en est de même du P. NIGRA L. (*Peuplier noir*), qui est plus rare.

JUGLANDÉES. — Le Noyer (JUGLANS REGIA L.) est planté çà et là dans les cours des fermes.

CUPULIFÈRES.

Castanea Tourn. — **Châtaignier.**

C. VULGARIS Lamk. — C. COMMUN. — C. vesca Gaertn. — *Fagus Castanea* L. 3. Mai, juin. AC. Bois, haies, plantations.

Fagus Tourn. — **Hêtre.**

F. SYLVATICA L. — H. DES FORÊTS. 3. Avril, mai. AC. Bois, haies.

Les fruits de cet arbre, nommés *Faines*, sont très oléagineux.

Quercus L. — **Chêne.**

Q. PEDUNCULATA Ehrh. — C. PÉDONCULÉ. — Q. racemosa DC. — Q. Robur var. a. L. 3. Avril, mai. TC. Bois, haies.

Var. b. Q. **intermedia** Don. — R. CHERBOURG : versant et pied nord de la montagne du Roule. — TEURTHÉVILLE-HAGUE : bois de Nérée.

Q. SESSILIFLORA Sm. — C. A GLANDS SESSILES. — Q. Robur var. b. L. 3. Avril, mai. TR. CANTELOUP : bois de Boultron.

***Corylus* Tourn. — Coudrier.**

C. AVELLANA L. — C. AVELINE. — (Noisetier, Coudre.) 3. Février, mars. TC. Haies et bois.

***Carpinus* Tourn. — Charme.**

C. BETULUS L. — C. COMMUN. 3. Avril, mai. R. CHERBOURG: taillis sud de la montagne du Roule. — TOURLAVILLE: le Roule. QUERQUEVILLE, MARTINVEST et DIGOSVILLE: bois des châteaux. — GONNEVILLE: bois de la Filature. LE VAST. — BRANVILLE: environs de l'église. BEAUMONT et HERQUEVILLE: bois de Beaumont. — SOTTEVILLE: bois du manoir.

BÉTULINÉES.

***Betula* Tourn. — Bouleau.**

B. ALBA L. — B. BLANC. — (Boulard.) 3. Mars-mai. AC. Bois, haies.

B. PUBESCENS Ehrh. — B. PUBESCENT. — (Boulard.) 3. Mars-mai. C. Bois humides, landes marécageuses, haies.

***Alnus* Tourn. — Aulne.**

A. GLUTINOSA Gærtn. — A. GLUTINEUX. — *Betula Alnus* var. *a.* L. 3. Mars, avril. C. Bords des eaux, prés humides.

MYRICÉES.

***Myrica* L. — Myrica.**

M. GALE L. — M. GALÉ. — (Faux-Saule, Voussot.) 3. Mars, avril. R. MARTINVEST: prés marécageux du Doyviet et de la Couvillerie. — SAINTE-CROIX-HAGUE: bois des Mores.

CONIFÈRES. — Aucun arbre de cette famille n'est spontané dans l'arrondissement de Cherbourg. On peut citer comme y étant naturalisés : l'If (*TAXUS BACCATA* L.), qui n'existe à bien dire que dans les cimetières ruraux; le Pin maritime (*PINUS MARITIMA* Lamk.), et le Pin sylvestre (*P. SYLVESTRIS* L.); l'Epicéa (*ABIES EXCELSA* DC.); le Sapin (*A. PECTINATA* DC.); le Mélèze (*LARIX EUROPÆA* DC.). Ces arbres sont plantés ou semés fréquemment sur les coteaux, dans les bois, les parcs et les avenues. On peut encore mentionner les Cyprès, les Thuyas et les Genévriers qu'on ne doit pas considérer comme naturalisés.

II. PHANÉROGAMES MONOCOTYLÉDONES.

Monocotylédones périnthées inférovariées.

ORCHIDÉES.

Platanthera Rich. — *Platanthère*.

P. BIFOLIA Rich. — P. A DEUX FEUILLES. — *Orchis bifolia* L. — *Habenaria bifolia* R. Br. 4. Mai, juin. R. CHERBOURG: pied nord de la montagne du Roule, le Maupas. — TOUR-LAVILLE: près de la Pierre-Butée, landes du Sud. LE MESNIL-AU-VAL: bruyères marécageuses de Barville et de Lorion. — GRÉVILLE: ferme de Gruchy. — SURTAINVILLE: bois de la Poupardière.

Anacamptis Rich. — Anacamptis.

A. PYRAMIDALIS Rich. — *A. PYRAMIDAL.* — *Aceras pyramidalis* Rehb. — *Orchis pyramidalis* L. 4. Mai-juillet. TR. NACQUEVILLE : les prés maritimes. BIVILLE : talus des fossés et pied des dunes, près de la fontaine Saint-Martin. — SURTAINVILLE : les carrières calcaires.

Orchis Rich. — Orchis.

O. MASCULA L. — *O. MALE.* — (*Pain de Couleuvre.*) 4. Avril-juin. AC. Prés, haies, talus des fossés.

Varie à fleurs blanches et à feuilles non maculées.

O. LAXIFLORA Lamk. — *O. A FLEURS LACHES.* 4. Mai, juin. AR. Prés humides. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. COUVILLE. LE THEIL. FERMANVILLE. ANGOVILLE. — BRICQUEBOSQ. PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

O. MACULATA L. — *O. TACHETÉ.* — (*Herbe à la Couleuvre.*) 4. Mai-juillet. TC. Landes et bruyères, bois, coteaux, prés.

O. LATIFOLIA L. — *O. A LARGES FEUILLES.* 4. Mai-juillet. AR. Prés très humides, marais. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. HAINNEVILLE. — NACQUEVILLE. — PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

O. DIVARICATA Rich. — *O. DIVARIQUÉ.* — *O. incarnata* L. — *O. angustifolia* Wimm. et Grab. 4. Juillet, août. TR. PIERREVILLE : vallée de la Scie. SURTAINVILLE : même vallée, vallon de Beautrain.

Cette espèce rare a été indiquée comme assez commune par M. Le Jolis, ce qui provient sans doute de ce qu'il a confondu avec elle les variations de couleur de l'*O. latifolia* L.

Les bulbes de la plupart des Orchis servent à préparer le salep.

Loroglossum Rich. — Loroglosse.

L. HIRCINUM Rich. — *L. BARBE-DE-BOUC*. — *Satyrium hircinum* L. — *Aceras hircina* Lindl. — *O. hircina* Crantz. ♀. RRR. CHERBOURG : remparts du port militaire.

Ophrys Swartz. — Ophrys.

O. APIFERA Huds. — *O. ABEILLE*. ♀. Juin, juillet. RRR. CHERBOURG : remparts du port militaire. — TOURLAVILLE : coteaux pierreux vers la Roche-au-Chat.

Epipactis Crantz. — Epipactis.

E. PALUSTRIS Crantz. — *E. DES MARAIS*. — *Serapias longifolia* L. — *S. palustris* Scop. ♀. Juin - août. TR. PIERREVILLE : vallée de la Scie. SERTAINVILLE : vallon du hameau Pouchin.

Listera R. Br. — Listère.

L. OVATA R. Br. — *L. OVALE*. — *Epipactis orata* All. — *Neottia orata* Rich. — *Ophrys orata* L. — (*Double feuille*.) ♀. Mai, juin. R. CHERBOURG : Hautmarais. — LE MESNIL-AU-VAL : bruyères de Barville. — SAINTE-CROIX-HAGUE : bois des Mores. — FLAMANVILLE : les bois.

Spiranthes Rich. — Spiranthe.

S. AUTUMNALIS Rich. — *S. D'AUTOMNE*. — *Neottia spiralis* Sw. — *Ophrys spiralis* var. *a.* L. ♀. Août, septembre. AC. Coteaux, pelouses.

AMARYLLIDÉES.

Galanthus L. — Galanthine.

G. NIVALIS L. — *G. PERCE-NEIGE*. ♀. Février, mars. RRR. Bois du château de FLAMANVILLE.

Cette plante a été encore indiquée à Teurthéville-Hague. Malgré son extrême rareté dans notre arrondissement, il n'y a pas lieu de l'y considérer comme introduite.

***Narcissus* L. — *Narcisse*.**

N. PSEUDO-NARCISSUS L. — *N. FAUX-NARCISSE*. — (*Porion*.) ♀. Mars-mai. R. CHERBOURG: Petite-Faucconnière, rochers et taillis de la montagne du Roule. — OCTEVILLE: la Prévalerie. MARTINVEST: près du château. — MAUPERTUS: ruisseau et bois du Doux-Riant. FERMANVILLE: vallon du Doux-Riant, bois de la vallée. — GRÉVILLE: les falaises et les coteaux maritimes. ÉCULLEVILLE: taillis et coteau de la Sabine. — SIOUVILLE: pelouses maritimes. FLAMANVILLE: les bois.

Plante jadis employée. Vénéneuse.

N. BIFLORUS Curt. — *N. BIFLORE*. ♀. Avril, mai. R. CHERBOURG. — OCTEVILLE: vallon de la Butte, vallon et coteaux de la Petite-Polle, les Fourches. MARTINVEST: prairies du château. — FERMANVILLE: la vallée. — URVILLE-HAGUE: coteaux au sud de la route d'Omonville. — FLAMANVILLE: les bois.

M. Le Jolis dit que cette plante a été évidemment portée dans les environs de Cherbourg avec les fumiers de la ville; c'est une assertion qu'il n'appuie d'aucune preuve. Du reste, nous ne sommes pas les seuls à l'y considérer comme spontanée, puisque M. de Brébisson l'y indique comme telle dans sa flore de la Normandie

N. INCOMPARABILIS Mill. — *N. INCOMPARABLE*. ♀. Avril, mai. TR. TEURTHÉVILLE-HAGUE: coteaux de la Divette. — FLAMANVILLE: bois du château.

On trouve quelquefois à l'état subspontané les *NARCISSUS POETICUS*, *JUNQUILLA* et *ODORUS* L., et plus rarement les *N. TAZETTA* L. et *AUREUS* Lois.

IRIDÉES.

Romulea Marattii.* — *Romulée.

R. COLUMNÆ Seb. et Maur. — *R. DE COLUMNA.* — *Trichonema Columnæ* Rehb. — *T. Bulbocodium* Sm. — *Ixia Bulbocodium* DC. ☿. Mars, avril. AR. TOURLAVILLE: lande Saint-Maur, près de la chapelle. — GRÉVILLE: coteaux du Hubillan. OMONVILLE-LA-ROGUE: les falaises près du fort. JOBOURG: les falaises. HERQUEVILLE: coteaux de la Fontenelle et de Herquemoulin, les falaises. BIVILLE: les dunes, coteaux de Bival. — HÉAUVILLE: coteaux de la Roque. SIOUVILLE et TRÉAUVILLE: pelouses maritimes. FLAMANVILLE: les falaises. LE ROZEL: la falaise.

Iris* L. — *Iris.

I. PSEUDO-ACORUS L. — *I. FAUX-ACORE.* — (*Glageux, Glageul des marais.*) ☿. Mai-juillet. C. Bords des eaux, marais, prés très humides.

Racine vomitive et purgative.

I. FOETIDISSIMA L. — *I. FÉTIDE.* — (*Iris gigot, Flaque.*) ☿. Juin, juillet. Coteaux, haies, bords des chemins, falaises. Abondant dans les communes littorales de l'Ouest de l'arrondissement; s'avance dans le sud-ouest jusqu'à Pierreville et au bois de la Poupardière. TR. ailleurs: bois de NACQUEVILLE.

Racine purgative, jadis très employée contre l'hydropisie.

L'IRIS GERMANICA L. est naturalisé sur les toits et les murs dans plusieurs communes du canton de Saint-Pierre-Église: Saint-Pierre-Église, le Theil, Varouville, Angoville, Vrasville, Néville, Gatteville.

DIOSCORÉES.

***Tamus* L. — *Tamier*.**

T. COMMUNIS L. — *T. COMMUN* — (*Raisin du Diable*.)
℥. Mai-juillet. C. Haies, buissons, bois.

Racine féculente, âcre et purgative.

Monocotylédones périanthées supérovariées.

LILIAGÉES.

***Allium* L. — *Ail*.**

A. URSINUM L. — *A. DES OURS*. ℥. Avril-juin. R. CHERBOURG : bords de la Divette. — OCTEVILLE : bords de la même rivière, haies humides dans la vallée de Quincampoix et vers la Jouannerie. — MARTINVAST : chemins marécageux des environs du pont.

A. VINEALE L. — *A. DES VIGNES*. — *A. arenarium* Fries.
℥. Juillet. TR. Falaises de HERQUEVILLE.

***Ornithogalum* L. — *Ornithogale*.**

O. UMBELLATUM L. — *O. EN OMBELLE*. — (*Dame-d'onze-heures*.) ℥. Avril-juin. TR. Prés et vergers à CHERBOURG. — Champs vers la redoute de TOURLAVILLE. Prairies de MARTINVAST.

L'observation que nous avons faite relativement à la spontanéité du *Narcissus biflorus* Curt. s'applique également à cette plante.

***Scilla* L. — *Scille*.**

S. AUTUMNALIS L. — *S. D'AUTOMNE*. Ȳ. Juillet-septembre. R. GATIEVILLE : prés et pelouses maritimes de l'Est. — JOBOURG et HERQUEVILLE : falaises et coteaux maritimes. VAUVILLE : pelouses du littoral sous le Grand-Tot, mont du Prieuré. BIVILLE : dunes, coteaux de Bival, vallon des Guérendes. — FLAMANVILLE : les falaises. LES PIEUX : coteaux maritimes. LE ROZEL : la falaise. SURTAINVILLE : les carrières calcaires et les prés maritimes.

C'est par erreur que le *SCILLA VERNA* Huds. a été indiqué à Couville. Cette plante n'a pas encore été trouvée dans l'arrondissement de Cherbourg.

L'espèce recueillie par M. Balmont fils sur un coteau entre Couville et Virandeville, et qu'il possède dans son jardin, n'est point le *SCILLA VERNA* Huds., ainsi que M. Le Jolis dit l'avoir reconnu à l'analyse, mais bien le *S. ITALICA* L. à bractées géminées, subulées, dont une plus longue que le pédicelle.

***Endymion* Dum. — *Endymion*.**

E. NUTANS Dum. — *E. PENCILÉ*. — *Agraphis nutans* Link. — *Scilla nutans* Sm. — *Hyacinthus non scriptus* L. — (*Hyacinthe des bois*, *Muguet bleu*.) Ȳ. Avril, mai. C. Bois, prés, coteaux, rochers.

Varie rarement à fleurs roses ou blanches.

ASPARAGÉES.***Asparagus* L. — *Asperge*.**

A. OFFICINALIS L. — *A. OFFICINALE*. Ȳ. Juin-août. TR. Sables et prés maritimes aux environs de la mare de VAUVILLE.

Elle est quelquefois subspontanée aux bords des champs, à peu de distance des jardins.

***Polygonatum* Tourn. — *Polygonate*.**

P. MULTIFLORUM Desf. — *P. MULTIFLORE*. — *Courallaria multiflora* L. — (*Sceau de Salomon*.) 4. Avril-juin. AR. Bois, vallons ombragés. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. HAINNEVILLE. QUERQUEVILLE. NOUAINVILLE. SIDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. MARTINVAST. HARDINVAST. TOLLEVAST. DIGOSVILLE. — MAUPERTUS. FERMANVILLE. LE THEIL. BRILLEVAST. LE VAST. — FLOTTEMANVILLE-HAGUE. TONNEVILLE. SAINTE-CROIX-HAGUE. BRANVILLE. NACQUEVILLE. — SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD. SURTAINVILLE.

Il faut croire que M. Le Jolis a bien peu herborisé dans nos bois, puisqu'il n'indique cette plante que dans ceux du Mont-du-Roc et de Nacqueville.

Le Muguet (*CONVALLARIA MAJALIS* L.) se rencontre très-rarement à l'état subspontané : bois du Rozel.

***Ruscus* L. — *Fragon*.**

R. ACULEATUS L. — *F. PIQUANT*. — (*Fragonnier, petit houx*.) 3. Novembre-mai. C. Bois, coteaux, rochers, haies pierreuses.

Ce sous-arbrisseau est loin d'être spécial aux terrains calcaires ou d'alluvion. Il est commun dans toutes les parties de notre arrondissement. C'est donc à tort que M. Le Jolis lui attribue le degré AR dans sa liste des plantes vasculaires.

JONCÉES.***Juncus* DC. — *Jonc*.**

J. ACUTUS Lamk. — *J. AIGU*. — *J. acutus* var. *a.* L. 4. Juin, juillet. Mielles et dunes, falaises. AC. sur le littoral de l'Ouest de l'arrondissement. R. sur celui du Nord.

J. MARITIMUS Lamk. — *J. MARITIME*. — *J. acutus* var. *b.* L. ♀. Juillet, août. C. Mielles humides, marécages et prés maritimes.

J. CONGLOMERATUS L. — *J. AGGLOMÉRÉ*. — *J. communis* var. *a.* Mey. ♀. Juin, juillet. AC. Fossés, lieux humides.

J. EFFUSUS L. — *J. ÉPARS*. — *J. communis* var. *b.* Mey. ♀. Juin, juillet. TC. Fossés, lieux marécageux, chemins très humides.

J. GLAUCUS Ehrh. — *J. GLAUQUE*. — *J. tenax* Poir. — (*Jonc des jardiniers.*) ♀. Juin-août. C. Fossés, prés, lieux argileux humides.

Var. *b. longicornis* Bast. — AR. Falaises de la Hague.

J. CAPITATUS Weig. — *J. CAPITÉ*. — *J. ericetorum* Poll. ☉. Juin, juillet. — TR. OCTEVILLE: partie sud de la lande. TOUTLAVILLE: coteaux du Beequet.

J. ACUTIFLORUS Ehrh. — *J. A FLEURS AIGUES*. — *J. sylvaticus* Reich. — *J. articulatus* L. part. ♀. Juin-août. TC. Bois très humides, prés marécageux, bruyères tourbeuses.

Var. *b. J. repens* Req. — RRR. CHERBOURG: anciens fossés du port militaire.

J. LAMPROCARPUS Ehrh. — *J. A FRUITS LUISANTS*. — *J. articulatus* L. part. ♀. Juillet, août. C. Lieux humides ou marécageux.

C'est à tort que M. Le Jolis attribue à cette espèce le degré AR et qu'il ne l'indique que sur le littoral.

J. ULIGINOSUS Mey. — *J. DES FANGES*. — *J. supinus* Moench. — *J. verticillatus* Pers. — *J. fluitans* Lamk. ♀. Juin-août. FC

Lieux sablonneux humides, marécages, mares, étangs, fossés, lieux exondés.

Var. *b. J. nigrnellus* Koch. — C.

L'espèce et la variété offrent beaucoup de formes dues au degré d'humidité de la station.

J. COMPRESSUS Jacq. — *J. COMPRIMÉ*. — *J. bulbosus* L.
 2. Juin-août. TR. Mares de TOURLAVILLE et de NACQUEVILLE.

J. GERARDI Loisel. — *J. DE GÉRARD*. — *J. cœnosus* Bab.
 2. Juin-août. AR. Vases et marais salés, fossés et prés maritimes. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE. — VRASVILLE. GOUBERVILLE. GATTEVILLE.

J. BUFONIUS L. — *J. DES CRAPAUDS*. ☉. Juillet, août.
 TC. Lieux marécageux, chemins humides et exondés.

Var. *b. fasciculatus* Koch. — *J. hybridus* Brot. — PC. Lieux sablonneux humides de la région maritime.

Luzula DC. — *Luzule*.

L. MAXIMA DC. — *L. A LARGES FEUILLES*. — *L. sylvatica* Gaud. — *Juncus maximus* Ehrh. — *J. sylvaticus* Huds. — *J. pilosus* var. *d.* L. 2. Mai, juin. Croît abondamment dans plusieurs bois et sur différents coteaux de notre arrondissement. CHERBOURG: montagne du Roule. — OCTEVILLE: coteaux de la Divette, bois de la Prévalerie. TOURLAVILLE: colline des Terres-Feuillies, vallée de Quincampoix, bois de l'Aubrisserie, rochers et bois de Cloquant et de la Glaerie. SIDEVILLE: bois du Mont-du-Roc. TEURTHÉVILLE-HAGUE: bois de Nérée. TOLLEVAST. la Terre-du-Bois. LE MESNIL-AU-VAL: rochers des coteaux de la Saire. DIGOSVILLE: rochers du Pas-Vastel. — CARNEVILLE: bois de la vallée. FERMANVILLE: bois près de l'église. MAUPERTUS: bois du Doux-Riant.

L. CAMPESTRIS DC. — *L. CHAMPÊTRE*. — *J. campestris* L.
 2. Mars-mai. TC. Pelouses, pâturages stériles.

Var. *b. congesta*. — AC.

L. MULTIFLORA Lej. — *L. MULTIFLORE*. — *J. multiflorus* Ehrh. ♀. Mai, juin. AR. CHERBOURG : bois du Roule et des Terres-Feuillies. — TOURLAVILLE : la Glacerie et les landes du Sud. SIDEVILLE : bois du Mont-du-Roc. — GONNEVILLE : bois de Blanqueville. LE THEIL : bois de Barnavast. BRILLEVAULT : coteaux du Douetti. CARNEVILLE : bois de la vallée. ANGOVILLE : vallon des Landelles. — SAINTE-CROIX-HAGUE : bois du Bigard. — SURTAINVILLE : bois de la Baronnerie et de la Poupardière.

Var. *b. L. congesta* Lej. — AR. CHERBOURG : pied nord de la montagne du Roule. — OCTEVILLE : la lande, vallon de la Butte. TOURLAVILLE : la Glacerie et les landes du Sud. SIDEVILLE : bois du Mont-du-Roc. TEURTHÉVILLE-HAGUE : bois de Nérée. LE MESNIL-AU-VAL : bruyères marécageuses de Barville. — CARNEVILLE : vallée des Bas-Fonds. FERMANVILLE : bois près de l'église. LE VAST : bois du Bosnel. — BEAUMONT : le bois. OMONVILLE-LA-PETITE : hameau des Landes.

L. VERNALIS DC. — *L. PRINTANIÈRE*. — *L. pilosa* Willd. — *Juncus pilosus* var. *a.* L. ♀. Avril, mai. TR. GONNEVILLE et BRILLEVAULT : bois de Blanqueville.

L. FORSTERI DC. — *L. DE FORSTER*. — *J. Forsteri* Sm. ♀. Mai, juin. TR. SURTAINVILLE : bois de la Baronnerie et de la Poupardière.

Monocotylédones glumacées,

CYPÉRACÉES.

Carex L. — *Laîche*.

C. PULICARIS L. — *L. PUCIÈRE*. ♀. Mai, juin. R. CHER-

BOURG : le Maupas, Hautmarais. — TOURLAVILLE : les Terres-Feuillies. HARDINVEST : vallée de l'Ouve. TOLLEVAST : marais d'Ombre. LE MESNIL-AU-VAL : marais de Barville. SDEVILLE : vallée de la Divette. — MAUPERTUS : vallon du Doux-Riant. CARNEVILLE : vallée des Bas-Fonds. FERMANVILLE : vallons du Doux-Riant et du Nid-du-Corps, les prés maritimes. — BEAUMONT : vallée de Herquemoulin. SAINTE-CROIX-HAGUE : vallon de Claire-Fontaine. VAS-TEVILLE : bruyères marécageuses de la Boiserie. VAUVILLE : landes tourbeuses de l'Est. — BRICQUEBOSQ : vallée de la Divette, prairies de la Grande-Maison. PIERREVILLE : vallée de la Scie. SURTAINVILLE : bois de la Baronnerie et de la Poupardière, vallon de Beaurain.

C. DISTICHA Huds. — *L. DISTIQUE*. — *C. intermedia* Good. ♀. Mai, juin. TR. CHERBOURG : prés marécageux sous le cimetière.

C. ARENARIA L. — *L. DES SABLES*. ♀. Mai, juin. C. Sables maritimes.

C. DIVISA Huds. — *L. DIVISÉE*. ♀. Mai, juin. RRR. CHERBOURG : prés tourbeux de Hautmarais.

C. VULPINA L. — *L. JAUNATRE*. ♀. Mai, juin. C. Fossés, prés très humides, lieux marécageux.

Var. *b. C. nemorosa* DC. — R. CHERBOURG : le Maupas. — TOURLAVILLE : environs de Bagatelle. — SURTAINVILLE : vallon au sud de l'église.

C. MURICATA L. — *L. RUDE*. 2°. Mai, juin. R. CHERBOURG : chemins de la Polle et des Aiguillons. — TEURTHÉVILLE-HAGUE : chemin de l'église au hameau Magnan. VIRANDEVILLE : vallée de la Marvie. COUVILLE : haies des environs de l'église. LE ROZEL : Cléville. PIERREVILLE : chemin du manoir au moulin-de-haut. — FERMANVILLE : le Brick.

M. Le Jolis indique ce *Carex* comme assez commun. Ne l'aurait-il pas confondu avec une autre espèce ?

C. DIVULSA Good. — *L. ÉCARTÉE*. 24. Mai, juin. R. CHERBOURG : haies du Cauchin, environs du Trottebec. — OCTEVILLE : le Val, vallée et coteaux de Quincampoix. TOURLAVILLE : le cimetière. — HERQUEVILLE : chemin de Vauville. — PIERREVILLE : cimetière, environs de la route de Surtainville.

C. PANICULATA L. — *L. PANICULÉE*. 24. Avril-juin. AR. Marais, fossés, bords des eaux. CHERBOURG. — QUERQUEVILLE. MARTINVEST. SIDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD. HARDINVEST. TOLLEVAST. LE MESNIL-AU-VAL. — MAUPERTIES LE THEIL. CARNEVILLE. FERMANVILLE. COSQUEVILLE. ANGOVILLE. — BEAUMONT. TONNEVILLE. SAINTE-CROIX-HAGUE. GRÉVILLE. — BRICQUEBOSQ. SIOUVILLE.

Var. *b. subsimplex* Bréb. — Ça et là avec le type.

C. LEPORINA L. — *L. DES LIÈVRES*. — *C. oralis* Good. 24. Mai-juillet. PC. Prés, bords des chemins humides, sentiers des bois marécageux.

Var. *b. pallescens* Gr. et Godr. — *C. argyroglochis* Hornem. — RRR. CHERBOURG : prés tourbeux du Maupas.

C. STELLULATA Good. — *L. ÉTOILÉE*. — *C. echinata* Murr. 24. Mai, juin. C. Prés marécageux, bruyères tourbeuses.

C. REMOTA L. — *L. ESPACÉE*. 24. Mai, juin. C. Fossés, haies humides, bords des eaux.

C. GOODENOWII Gay. — *L. DE GOODENOUGH*. — *C. vulgaris* Fries. — *C. caespitosa* Good. 24. Mai, juin. AC. Prés très humides, marécages, fossés.

C. ACUTA L. — *L. AIGUE*. — *C. gracilis* Curt. — (*Hanette*.)

℥. Mai, juin. TR. HAINNEVILLE et QUERQUEVILLE: bords de la rivière Lucas, dans les prairies entre le château et le polygone. — OMONVILLE-LA-PETITE: maré Saint-Martin. VASTEVILLE: vallée de Claire-Fontaine. — SOTTEVILLE: près de la Divette sous le château. SURTAINVILLE: bords de la Seie.

C. PILULIFERA L. — *L. A PILULES*. ℥. Avril, mai. AR. Landes et bruyères, coteaux, bois. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. NOUAINVILLE. MARTINVEST. SEDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. TOILEVAST. LE MESNIL-AU-VAL. DIGOSVILLE. — GONNEVILLE. LE THEIL. BRILLEVAST. CANTELOUP. LE VAST. CARNEVILLE. FERMANVILLE. ANGOVILLE. — TONNEVILLE. SAINTE-CROIX-HAGUE. GRÉVILLE. — SURTAINVILLE. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD.

Il est étonnant que M. Le Jolis n'ait observé ce *Carex* qu'à la montagne du Roule.

C. PRÆCOX Jacq. — *L. PRÉCOCE*. ℥. Avril, mai. PC. Pelouses, pâturages. bords des chemins, sentiers des bois.

C. GLAUCA Scop. — *L. GLAUQUE*. — *C. recurva* Huds. ℥. Avril-juin. PC. Landes marécageuses, prés humides, fossés.

C. HIRTA L. — *L. HÉRISÉE*. ℥. Mai, juin. AR. Fossés, prés marécageux. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. EQUEURDREVILLE. HAINNEVILLE. QUERQUEVILLE. SEDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. HARDINVEST. — ANGOVILLE. NÉVILLE. — NACQUEVILLE. URVILLE-HAGUE. OMONVILLE-LA-PETITE. VAUVILLE. BIVILLE. — LES PIEUX. SIOUVILLE. TRÉAUVILLE. FLAMANVILLE. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD. PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

M. Le Jolis indique ce *Carex* seulement à Tourlaville et à l'anse de Plainvy; c'est à tort qu'il le croit exclusif aux fossés du littoral.

Var. *b*. C. *hirtæformis* Pers. — R. CHERBOURG. — TOURLAVILLE.

C. OEDERI Ehrh. — *L. D'ÆDER*. — *C. flava* var. *b*. DC. ℥. Mai-août. C. Landes humides, marécages, prés tourbeux.

Var. *acaulis* Nob. — R. Nielles de VAUVILLE et de SURTAINVILLE.

C. EXTENSA Good. — *L. ÉTIRÉE*. — *C. nerrosa* Guss. Ȳ. Mai, juin. TR. FERMANVILLE: marécages maritimes. — Lieux humides au pied des falaises de l'Ouest de l'arrondissement.

C. DISTANS L. — *L. DISTANTE*. Ȳ. Mai, juin. R. CHERBOURG: fossés du port militaire, près de Batavia et du Maupas. — TOURLAVILLE: environs de la redoute. — FERMANVILLE: les prés maritimes. GATTEVILLE: vases et marais salés de l'Est. — BEAUMONT: le littoral. — FLAMANVILLE: environs du moulin de Diélette.

C. BINERVIS Sm. — *L. A DEUX NERVURES*. Ȳ. Mai, juin. Fréquent dans les landes et les bruyères des communes suivantes: CHERBOURG. — TOURLAVILLE. NOUAINVILLE. MARTINVAST. TEURTHÉVILLE-HAGUE. COUVILLE. HARDINVAST. TOLLEVAST. LE MESNIL-AU-VAL. — CLITOURPS. CANTELOUP. LE VAST. FERMANVILLE. ANGOVILLE. — FLOTTEMANVILLE-HAGUE. SAINTE-CROIX-HAGUE. DIGULLEVILLE. HERQUEVILLE. BIVILLE.

C. LÆVIGATA Sm. — *L. LISSE*. — *C. biligularis* DC. Ȳ. Mai, juin. C. Bois humides, bords des ruisseaux, lieux marécageux ombragés.

Cette belle espèce est uniformément répandue dans tous les cantons de notre arrondissement; c'est donc à tort que M. Le Jolis la croit spéciale à la vallée de Quincampoix et à la région qui s'étend au sud de la montagne du Roule.

C. PANICEA L. — *L. PANIC*. Ȳ. Avril, mai. C. Prés, landes humides.

Une variété à épi inférieur porté par un pédoncule très long et presque radical croît dans les îles de la Divette, à Sideville.

C. PALLESCENS L. — *L. PALE*. Ȳ. Mai - juillet. R. MARTINVAST: prés marécageux du Doyviet. SIDEVILLE: prés de la ferme du bois

du Mont-du-Roc. TEURTHÉVILLE-HAGUE : bois de Nérée. — LE THEIL : près du moulin des Gendres, vallée de la Saire. BRILLE-VAST : vallon du Douetti. — BRICQUEBOSQ : vallon de l'Eau-Blanche-Main. SURTAINVILLE : vallée de la Scie, vallon de Beauptrain.

C. SYLVATICA Huds. — *L. DES BOIS*. — *C. patula* Scop. — *C. drymeia* Ehrh. ¼. Avril, mai. R. CHERBOURG : bois des Terres Feuillies. — OCTEVILLE : bois de la Prévalerie. TOURLAVILLE : les Terres-Feuillies, bois de l'Aubrisserie, la Roche-au-Chat. MARTIN-VAST : bois du château. SIDEVILLE : bois du Mont-du-Roc. TEURTHÉVILLE-HAGUE : bois de Nérée. — BRILLE-VAST : bois de Blanqueville. — NACQUEVILLE : bois du château. — FLAMANVILLE : les bois. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD : coteaux de la Scie. PIERREVILLE : vallée de la Scie. SURTAINVILLE : vallon et coteaux de la mare du Chuquet, bois de la Poupardière, vallon et bois de la Baronnerie.

La seule localité indiquée par M. Le Jolis pour ce *Carex* est le bois de la Prévalerie, à Octeville.

C. PSEUDO-CYPERUS L. — *L. FAUX-SOUCHET*. ¼. Mai, juin. R. TOURLAVILLE : fossés entre Bagatelle, Sauxmarais et Longue-Mare. TEURTHÉVILLE-HAGUE : bords de la Nérée. TOLLEVAST : vallée de l'Ouve. — LE VAST : bords de la Saire. — TONNEVILLE : étang et marécages boisés de Percy. NACQUEVILLE : bois du château. VAUVILLE : la mare. — SAINT-CRISTOPHE-DU-FOC : moulin Blangy. SURTAINVILLE : vallée de la Scie.

D'après la liste de M. Le Jolis on croirait ce magnifique *Carex* beaucoup plus rare pour notre arrondissement qu'il ne l'est réellement, attendu qu'il ne l'a signalé qu'à Tourlaville.

C. MAXIMA Scop. — *L. ÉLEVÉE*. — *C. pendula* Huds. ¼. Mai, juin. TR. CHERBOURG : vallée du Roule. — TOURLAVILLE : fourrés du bord de la Divette près de Lucet, fossés entre Bagatelle et la Varengue.

C. VESICARIA L. — *L. VÉSICULEUSE*. ¼. Avril, mai. TR.

MARTINVEST : étang à l'ouest du château. — SURTAINVILLE : bords et vallée de la Scie.

C. RIPARIA Curt. — *L. DES RIVES*. — *C. crassa* Ehrh. 24. Avril, mai. AR. EQUEURDREVILLE : près de Sainte-Anne. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD et TOLLEVAULT : bords et vallée de l'Ouve. — CARNEVILLE : vallée des Bas-Fonds. VRASVILLE : vallée de la Grimonnerie. RÉTHOVILLE : la mare. GATTEVILLE : fossés et ruisseaux de l'Est. — NACQUEVILLE : la mare, les prés et les fossés voisins. URVILLE-HAGUE : les prés maritimes. VAUVILLE : la mare. — TRÉAUVILLE : fossés près la route de Diélette aux Picux. FLAMANVILLE : environs du moulin de Diélette. SOTTEVILLE : près de la Divette sous le château.

Il est surprenant que M. Le Jolis n'ait observé ce grand Carex dans notre arrondissement qu'à la mare de Gatteville. C'est à tort que, jugeant d'après cette seule localité, il le signale comme exclusif au bord des étangs du littoral.

***Schænus* L. — *Choin*.**

S. ALBUS L. — *C. BLANC*. — *Rhynchospora alba* Vahl. 24. Juillet, août. R. Bruyères tourbeuses du vallon de Claire-Fontaine : VAUVILLE, BIVILLE, SAINTE-CROIX-HAGUE, VASTEVILLE.

S. NIGRICANS L. — *C. NOIRATRE*. — *Chætophom nigricans* Kunth. 2. Mai, juin. R. Lieux marécageux ou humides dans les falaises et les dunes de l'Ouest de l'arrondissement.

***Scirpus* L. — *Scirpe*.**

S. FLUITANS L. — *S. FLOTTANT*. — *Isolepis fluitans* R. Br. — *Eleocharis fluitans* Hook. 24. Juin - août. AC. Ruisseaux, fossés, mares.

S. SETACEUS L. — *S. SÉTACÉ*. — *Isolepis setacea* R. Br. 20. Juillet - septembre. PC. Prés marécageux, bords des ruisseaux, chemins très humides.

S. SAVII Seb. et Maur. — *S. DE SAVI*. — *Isolepis Savii* Spreng.
— *I. tenuis* Viv. — *Scirpus leptaleus* Koch. ☉. Juin - octobre.
Prés, lieux marécageux, bords des eaux et des sources.

S. CAMPESTRIS Roth. — Drev. et Hayne. — *S. CHAMPÊTRE*. ♀. Juin - août. TR. Mielles de SURTAINVILLE.

S. LACUSTRIS L. — *S. DES ÉTANGS*. — (*Jaile*.) ♀. Juin, juillet. AC. dans les grandes mares et les fossés du littoral. — R. à l'intérieur : LE VAST : étangs de la Saire. — NACQUEVILLE : étang des Castelets.

S. TABERNÆMONTANI Gm. — *S. DE TABERNÆMONTANUS*. — *S. glaucus* Sm. ♀. Juin, juillet. Plus commun que le précédent dans les mêmes stations de la région maritime.

S. ROTHII Hopp. — *S. DE ROTH*. — *S. tenuifolius* DC. — *S. pungens* Vahl. ♀. Juin - août. TR. Mare de VAUVILLE.

Var. *b. monostachyus* Nob. — TR. Même station.

Nous avons observé cette espèce rare le 1^{er} septembre 1861; elle est donc à rayer de la liste des plantes des îles anglo-normandes que nous n'avions pas trouvées dans notre presqu'île (page 224 du 1^{er} vol. du Congrès).

S. MARITIMUS L. — *S. MARITIME*. ♀. Juin - août. C. Fossés, marais et étangs de la région maritime.

Var. *b. S. compactus* Krock.

Var. *c. monostachyus* Bréb.

Ces deux variétés croissent çà et là avec le type.

S. SYLVATICUS L. — *S. DES BOIS*. ♀. Juin, juillet. R. TOUR-LAVILLE, MARTINVEST et SIDEVILLE : bords de la Divette. TEURTHÉVILLE-HAGUE : bords de la Nérée. SAINT-MARTIN-LE-GREARD : bords

de l'Ouve et fossés de la vallée. — SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD et SERTAINVILLE: bords de la Seie.

S. PALUSTRIS L. — *S. DES MARAIS*. — *Eleocharis palustris* R. Br. ♀. Mai-juillet. C. Lieux marécageux, prés très humides.

Var. *b. reptans* Thuill. — AC. Bords des grandes mares du littoral.

S. MULTICAULIS Sm. — *S. MULTICAULE*. — *Eleocharis multicaulis* Dietr. ♀. Mai-juillet. AC. Landes et bruyères marécageuses, prés tourbeux.

Var. *b. viviparus* — PC.

***Eriophorum* L. — *Linaigrette*.**

E. ANGUSTIFOLIUM Roth. — *L. A FEUILLES ÉTROITES*. — (*Herbe à coton*.) ♀. Avril, mai. AR. Prés tourbeux, bruyères marécageuses. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. MARTINVAST. TOLLEVAST. LE MESNIL-AU-VAL. — FERMANVILLE. — TONNEVILLE. SAINTE-CROIX-HAGUE. NACQUEVILLE. OMONVILLE-LA-PETITE. HERQUEVILLE. VAUVILLE. BIVILLE. VASTEVILLE. — BRIQUEBOSQ.

Var. *b. congestum* Mert et Koch. — *E. Vaillantii* Poit. et Turp. — Mêmes stations que le type.

***Cyperus* L. — *Souchet*.**

C. LONGUS L. — *S. LONG*. ♀. Juillet-septembre. C. Marais, prés, fossés, surtout dans la région maritime.

Très employé, sous le nom de *Han*, à faire des liens et des colliers.

GRAMINÉES.

***Anthoxanthum* L. — Flouve.**

A. ODORATUM L. — F. ODORANTE. ♀. Mai, juin. TC. Frairies, coteaux, bois.

Var. *b. paniculatum* Rehb. — PC.

Var. *c. A. villosum* Dum. — C.

Var. *d. maritimum* Nob. — AC. Coteaux et rochers maritimes, falaises.

Cette dernière variété se rapproche beaucoup de l'ANTHOXANTHUM LLOYDII Jord.

***Phalaris* L. — Alpiste.**

P. ARUNDINACEA L. — A. ROSEAU. — *Calamagrostis colorata* DC. — *Digraphis arundinacea* Trin. — *Baldingera arundinacea* Kunth. — *Arundo colorata* Willd. ♀. Juillet, août. AR. CHERBOURG: fossés du port militaire, bords de la Divette et du Trottebec. — OCTEVILLE: vallée de Quincampoix. TOURLAVILLE: fossés du château. MARTINVAST: bords de la Divette. TEURTHÉVILLE-ILAGUE: bords de la Nérée, — LE VAST: bords et étangs de la Saire. — PIERREVILLE: bords de la Seie.

***Panicum* L. — Panic.**

P. VIRIDE L. — P. VERT. — *Setaria viridis* Pal. Beauv. ☉. Juillet, août. RRR. CHERBOURG: intérieur du port militaire.

***Alopecurus* L. — Vulpin.**

A. AGRESTIS L. — V. AGRESTE. ☉. Avril-octobre. AR. Talus des fossés, champs sablonneux ou calcaires. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE. MARTINVAST. — SAINT-PIERRE-ÉGLISE. GATTEVILLE. — PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

A. GENICULATUS L. — V. *GENOUILLÉ*. ☿. Mai-août. C. Prés, fossés, lieux marécageux, chemins humides.

Var. *b. pseudo-bulbosus* Nob. — AC. surtout dans la région maritime.

A. BULBOSUS L. — V. *BULBEUX*. ☿. Mai-juin. R. CHERBOURG: marécages entre les rues de Paris et l'Hermitage. — COSQUEVILLE: les prés maritimes. GATTEVILLE: prés du havre de Crabec.

Ce Vulpin a été indiqué comme étant assez commun dans notre arrondissement, parce qu'on l'aura confondu sans doute avec la variété à racine presque bulbeuse de l'espèce précédente.

***Phleum* L. — *Phléole*.**

P. ARENARIUM L. — P. *DES SABLES*. — *Phalaris arenaria* Huds. — *Chilochloa arenaria* P. B. ☉. Mai, juin. C. Sables, champs et talus des fossés du littoral.

P. PRATENSE L. — P. *DES PRÉS*. ☿. Mai-juillet. PC-Prairies.

Var. *b. P. præcox* Jord. — P. *nodosum* L. part. AC. Coteaux herbeux, bords des bois.

Var. *c. P. serotinum* Jord. — R. BIVILLE: talus des fossés maritimes. VASTEVILLE: vallée de Claire-Fontaine. — BRIQUEBOSQ: hameau Psalmonville. PIERREVILLE: le cimetière, vallée de la Scie. SURTAINVILLE: les coteaux calcaires.

***Chamagrostis* Borkh. — *Chamagrostis*.**

C. MINIMA Borkh. — C. *NAINÉ*. — *Agrostis minima* L. — *Sturmia minima* Hopp. — *Mibora verna* P. B. — *Knappia agrostidea* Sm. ☉. Mars-mai. Commun dans les mielles du littoral de l'Ouest de l'arrondissement et dans celles de QUERQUEVILLE et de NACQUEVILLE, sur le littoral du Nord.

Lagurus L. — Lagurier.

L. OVATUS L. — L. OVOIDE. — (*Queue de lapin.*) ☉. Juin, juillet. TR. Sables du littoral de TOURLAVILLE, entre les Flamands et le Becquet.

Agrostis L. — Agrostis.

A. ALBA L. — A. BLANCHE. ☿. Juin - août. C. Bois, lieux herbeux et ombragés.

Var. *b. A. gigantea* Roth. — PC. Fossés, marais.

Var. *c. aristata* Bréb. — R. CHERBOURG : chemin du Maupas.

A. STOLONIFERA L. — Le M. et Dec. — A. STOLONIFÈRE. ☿. Juin - septembre. TC. Bords des chemins, champs, talus des fossés argileux.

Var. *b. compacta.* — AR. CHERBOURG : fossés du port militaire. — Région maritime de la Hague.

A. MARITIMA Lamk. — A. MARITIME. ☿. Juillet, août. AC. Sables maritimes, falaises, surtout dans l'Ouest de l'arrondissement.

A. VULGARIS Wither. — A. COMMUNE. ☿. Juillet, août. TC. Bords des chemins, pâturages, lieux secs, bruyères.

Var. *b. A. rubra* Desv. — PC. Lieux marécageux.

Var. *c. A. pumila* L. — PC. Landes, lieux stériles.

A. CANINA L. — A. DES CHIENS. — *Agraulus caninus* P. B. — *Trichodium caninum* Schrad. ☿. Juin - août. C. Landes et bruyères, coteaux, bois.

***Polypogon* Desf. — *Polypogon*.**

P. MONSPELIENSIS Desf. — P. DE MONTPELLIER. — *Alopecurus Monspeliensis* L. — *A. paniceus* Lamk. ☉. Juin, juillet. R. TOURLAVILLE: sables maritimes des Flamands et des environs de la mare. — GATTEVILLE: vases et marais salés de l'Est

P. LITTORALIS Sm. — P. DES RIVAGES. — P. *Lagascæ* Rœm. et Sch. — *Agrostis littoralis* Sm. ♀. Juin, juillet. TR. GATTEVILLE: vases et marais salés de l'Est.

***Calamagrostis* Roth. — *Calamagrostis*.**

C. ARENARIA Roth. — C. DES SABLES. — *Arundo arenaria* L. — *Psamma arenaria* Rœm. et Sch. — P. *littoralis* P.B. — *Ammophila arenaria* Linck. ♀. Juillet, août. TC. Sables maritimes.

C'est la plante la plus commune dans nos dunes, qu'elle sert à fixer. On l'emploie, sous le nom de *Millegreux*, à faire des balais et des chapeaux de marin.

***Milium* L. — *Millet*.**

M. EFFUSUM L. — M. ÉTALÉ. — *Agrostis effusa* DC. ♀. Mai, juin. R. OCTEVILLE: bois de la Prévalerie. TOURLAVILLE: coteaux boisés de la Divette. MARTINVAST: bois du château. SIDEVILLE: bois du Mont-du-Roc. DIGOSVILLE: bois et avenues du château. — BRILLEVAST: bois de Blanqueville. — TONNEVILLE: bois de Percy. SAINTE-CROIX-HAGUE: bois du Bigard. NACQUEVILLE: bois du château.

Var. *b.* M. *confertum* Mill. — TR. Bois du Mont-du-Roc.

Nous avons trouvé à Cherbourg, sur les remparts du port militaire, le MILIUM MULTIFLORUM Cav. et le M. CÆRULESCENS Desf. Ces plantes appartenant à la région méditerranéenne, il serait peut-être nécessaire

de les constater ailleurs dans notre arrondissement avant qu'on pût les y considérer comme indigènes.

***Cynodon* Rich. — *Chiendent*.**

C. DACTYLON Pers. — *C. DIGITÉ*. — *Paspalum Dactylon* DC. — *Panicum Dactylon* L. — *Digitaria stolonifera* Schrad. ♀. Juillet-septembre. AR. Mielles et dunes. QUERQUEVILLE. — VAUVILLE. BIVILLE. — LES PIEUX. LE ROZEL. SURTAINVILLE.

***Aira* L. — *Canche*.**

A. CÆSPITOSA L. — *C. GAZONNANTE*. — *Deschampsia cæspitosa* P. B. ♀. Juin, juillet. R. MARTINVEST : vallée de la Divette. TEURTHÉVILLE-HAGUE : bois de Nérée. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD : bords de l'Ouve. TOLLEVAST : bord du Gallot. — SURTAINVILLE : vallée de la Scie, bois et coteaux de la Poupardière.

A. LEGEI Bor. — *C. DE LÉGÉ*. ♀. Juin, juillet. R. MARTINVEST : vallée de la Divette. — CANTELOUP : bois de Boutron. LE VAST : bois du Bosnel.

A. CARYOPHYLLEA L. — *C. CARYOPHYLLÉE*. — *Avena caryophylllea* Koch. — *Airopsis caryophylllea* Fries. ☉. Mai-juillet. TC. Coteaux, pelouses, bords des chemins, haies sèches.

Var. *b. A. multiculmis* Dum. — PC. Moissons.

Var. *c. A. divaricata* Auct. — PC. Falaises et dunes de la Hague.

A. PRÆCOX L. — *C. PRÉCOCE*. — *Avena præcox* P. B. — *Airopsis præcox* Fries. ☉. Avril-juin. AC. Pelouses, coteaux, murs, lieux sablonneux.

***Holcus* L. — *Houque*.**

H. LANATUS L. — *H. LAINEUSE*. — *Avena lanata* Kœl. ♀. Juin-août. TC. Prairies, bois, haies.

H. MOLLIS L. — *H. MOLLE*. — *Avena mollis* Kœl. ♀. Juin, juillet. AR. Bois humides, haies et buissons, bords des eaux. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. NOUAINVILLE. MARTINYAST. SIDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. VIRANDEVILLE. — MAUPERTUS. FERMANVILLE. CLITOURPS. CANTELOUP. LE VAST. TOCQUEVILLE. — BEAUMONT. ACQUEVILLE. — HELLEVILLE.

***Danthonia* DC. — *Danthonie*.**

D. DECUMBENS DC. — *D. INCLINÉE*. — *Triodia decumbens* P. B. — *Festuca decumbens* L. ♀. Juin, juillet. TC. Landes et bruyères, coteaux et rochers, bois.

***Avena* L. — *Avoine*.**

A. FLAVESCENS L. — *A. JAUNATRE*. — *Trisetum flavescens* P. B. ♀. Juin, juillet. AR. CHERBOURG : champs sablonneux de l'est, près de Batavia, Chantereyne, remparts du port militaire. — OCTEVILLE : pied de la Grande-Fauconnière. QUERQUEVILLE : le littoral, le fort, plateau de l'église. — GATTEVILLE : pelouses maritimes de l'Est. — SURTAINVILLE : Hauteville et chemin de ce village à l'église, ferme de Guinfard, les carrières calcaires, coteaux au sud de l'église.

Comme M. Le Jolis n'a vu cette plante que sur les glacis des fortifications de Querqueville, faute sans doute d'avoir assez herborisé dans la circonscription qu'embrasse sa liste, on s'explique qu'il ait émis un doute sur son indigénat.

A. STRIGOSA Schreb. — *A. RUDE*. — *A. nerrosa* Lamk. ☉. Juin, juillet. TR. CHERBOURG : champs et bords des chemins du littoral, vallée du Roule. — ÉQUEURDEVILLE : carrières des Fourches.

A. FATUA L. — *A. FOLLE*. — (*Arron.*) ☉. Juillet, août. C. Moissons.

***Arrhenatherum* P. B. — *Arrhénathère*.**

A. ELATIUS Gaud. — *A. ÉLEVÉE*. — *A. arenaceum* P. B. — *Arena elatior* L. ☿. Juin, juillet. TR. CHERBOURG : près du Trottebec, fossés du port militaire.

A. BULBOSUM Presl. — *A. BULBEUSE*. — *Avena bulbosa* Willd. — *A. precatoria* Thuill. — (*Chiendent à chapelots*.) ☿. Juin, juillet. TC. Haies, buissons pierreux, bords des champs, bois.

***Gaudinia* P. B. — *Gaudinie*.**

G. FRAGILIS P. B. — *G. FRAGILE*. — *Avena fragilis* L. ☉. Juin, juillet. TR. CHERBOURG : plaine, fossés, glacis et remparts du port militaire ; lieux pierreux près du Maupas, au bord du chemin de la Glacerie.

Aucun motif réellement plausible ne peut être invoqué pour faire regarder cette espèce comme n'étant pas indigène.

***Kœleria* Pers. — *Kœlérie*.**


K. ALBESCENS DC. — *K. BLANCHATRE*. — *K. cristata* Delach. ☿. Juin-août. R. Pelouses sablonneuses du littoral de TOURLAVILLE.

***Phragmites* Trin. — *Phragmite*.**

P. COMMUNIS Trin. — *P. COMMUN*. — *Arundo Phragmites* L. — (*Roseau à balais, Rôs.*) ☿. Août, septembre. C. Fossés, étangs, marais, lieux aquatiques.

***Cynosurus* L. — *Cynosure*.**

C. CRISTATUS L. — *C. A CRÊTES*. ☿. Juin, juillet. TC. Prés secs, pelouses, chemins herbeux.

Var. *b. viviparus*  Pauq. — PC.

C. ECHINATUS L. — *C. HÉRISSE*. — *Chrysurus echinatus* P. B. ☉. Juin, juillet. R. HERQUEVILLE: falaise du Houquet et champs environnants. VAUVILLE: les falaises. — LE ROZEL: le cap, les coteaux maritimes.

***Melica* L. — Mélique.**

M. UNIFLORA Retz. — *M. UNIFLORE*. — *M. nutans* Lamk non L. ♀. Mai, juin. AR. Bois, chemins couverts. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. — MARTINVEST. SIDEVILLE. TEURTHÉVILLE-HAGUE. DIGOSVILLE. — GONNEVILLE. BRILLEVAST. LE VAST. — TONNEVILLE. FLOTTEMANVILLE-HAGUE. — LE ROZEL. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD. PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

***Molinia* Moench. — Molinie.**

M. CÆRULEA Moench. — *M. BLEUE*. — *Aira cærulea* L. Sp. — *Melica cærulea* L. Mant. — *Festuca cærulea* DC. — *Enodium cæruleum* Gaud. ♀. Juillet, août. TC. Landes et bruyères, coteaux et rochers, bois.

Var. *b. M. sylvatica* Bréb. — PC. Bois humides.

***Catabrosa* P. B. — Catabrose.**

C. AQUATICA P. B. — *C. AQUATIQUE*. — *Aira aquatica* L. — *Glyceria airoides* Rehb. — *Poa airoides* Kœl. ♀. Mai-juillet. AR. Fossés, mares, chemins très humides. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. MARTINVEST. COUVILLE. TOLLEVAST. — COSQUEVILLE. VRASVILLE. — BRICQUEBOSQ. PIERREVILLE. SURTAINVILLE.

***Glyceria* R. Br. — Glycérie.**

G. SPECTABILIS Mert. et Koch. — *G. REMARQUABLE*. — *G. aquatica* Sm. — *Poa aquatica* L. ♀. Juillet, août. AR. Fossés, marais, étangs. CHERBOURG. — OCTEVILLE. ÉQUEURDEVILLE.

HAINNEVILLE. MARTINVAST. TEURTHÉVILLE-HAGUE. — COSQUEVILLE.
LE VAST. GOUBERVILLE. GATIEVILLE. — NACQUEVILLE.

G. FLUITANS R. Br. — *G. FLOTTANTE*. — *Festuca fluitans* L. — *Poa fluitans* Kœl. ♀. Juin-septembre. TC. Fossés, mares, étangs, rivières lentes.

G. PLICATA Fries. — *G. PLIÉE*. ♀. Juin-septembre. R. Marc de TOURLAVILLE.

G. DECLINATA Bréb. — *G. ÉTALÉE*. — *G. fluitans* var. *pumila* Fries. ♀. Mai-juillet. R. OCTEVILLE: carrières des Entes. TEURTHÉVILLE-HAGUE: mares au bords de l'ancienne route des Pieux.

G. DISTANS Wahlenb. — *G. DISTANTE*. — *Poa distans* L. *P. retroflexa* Curt. — *Sclerochloa distans* Bab. ♀. Juin, juillet. AR. Lieux marécageux maritimes, vases salées. CHERBOURG. — TOURLAVILLE. ÉQUEURDEVILLE. HAINNEVILLE. — NACQUEVILLE.

Var. *b._{ph} coarctata*. — R. Littoral de TOURLAVILLE.

G. CONFERTA Fries. — *G. SERRÉE*. — *Sclerochloa Borreri* Bab. ☉. Juin-août. TR. CHERBOURG: fossés du port militaire.

G. PROCUMBENS Sm. — *G. TOMBANTE*. — *Poa procumbens* Curt. — *Festuca procumbens* Kunth. — *Sclerochloa procumbens* P. B. ♀. Juin, juillet. R. CHERBOURG: fossés du port militaire, marécages entre les rues de Paris et de l'Ermitage.

***Briza* L. — *Brize*.**

B. MINOR L. — *B. MINEURE*. — *B. virens* DC. ☉. Juin, juillet. C. Moissons, talus des fossés.

R. MEDIA L. — *B. INTERMÉDIAIRE*. ♀. Mai, juin. R.

CHERBOURG : montagne du Roule, près de Batavia et de Haut-Marais, remparts du port militaire. — OCTEVILLE : route des Pieux. TOURLAVILLE : pelouses de la redoute. — BIVILLE : vallons des Guérendes et de Bival. VASTEVILLE : coteau de Bival. — SURTAINVILLE : ferme de Guinfard, vallons au sud de l'église.

B. MAXIMA L. — *B. A GROS ÉPILLET*S. ☉. Mai-juillet. RRR. CHERBOURG : environs du port militaire. — EQUEURDREVILLE : environs du manoir.

Les espèces de ce genre portent les noms vulgaires de *Tremblette*, *Amourette*.

***Poa* L. — *Paturin*.**

P. PRATENSIS L. — *P. DES PRÉS*. ♀. Mai-juillet. TC. Prairies, chemins herbeux, murs, lieux sablonneux.

P. TRIVIALIS L. — *P. COMMUN*. — *P. scabra* Ehrh. ♀. Mai-juillet. TC. Prés, lieux humides, bords des chemins.

P. NEMORALIS L. — *P. DES BOIS*. ♀. Juin, juillet. TR. PIERREVILLE : haies de la vallée de la Scie, non loin du manoir.

Cette localité est la seule où jusqu'à présent nous ayons trouvé cette plante, quoique M. Le Jolis l'indique comme étant assez commune dans nos lieux secs et nos bois, sans doute par confusion avec une autre espèce.

P. BULBOSA L. — *P. BULBEUX*. ♀. Avril, mai. R. Mielles de l'Ouest de l'arrondissement.

P. ANNUA L. — *P. ANNUEL*. ☉. TC. Toute l'année, partout.

***Dactylis* L. — *Dactyle*.**

D. GLOMERATA L. — *D. AGGLOMÉRÉ*. ♀. Juin-août. TC. Prés, lieux herbeux incultes, bords des chemins et des champs.

Var. *b. congesta* Coss. et Germ. — PC.

D. HISPANICA Roth. — *D. D'ESPAGNE*. ④. Juin, juillet. Assez commun sur les coteaux maritimes et dans les falaises de l'Ouest de l'arrondissement.

***Bromus* L. — *Brome*.**

B. STERILIS L. — *B. STÉRILE*. — *B. jubatus* Ten. ☉. Juin-août. TC. Lieux secs incultes, champs stériles, murs, toits.

B. MAXIMUS Desf. — Bor. fl. cent.-Bab. — *B. TRÈS GRAND*. — *B. Madritensis* DC. non L. — *B. rigidus* Auct. ☉. Mai, juin. TR. Champs et talus des fossés du littoral du Sud-Ouest de l'arrondissement : LE ROZEL. SURTAINVILLE.

B. MOLLIS L. — *B. MOLLET*. — *Serrafalcus mollis* Parlat. ☉. Mai, juin. TC. Prairies, champs, bords des chemins, murs.

Var. *b. compactus* Bréb. fl. Norm., 2^e éd. — R. Sables maritimes de CHERBOURG, de VRASVILLE et de VAUVILLE; pied des falaises de HERQUEVILLE.

Var. *c. nanus* Weig. — PC.

B. ARENARIUS Thom. — *B. DES SABLES*. — *B. hordeaceus* L. — *Serrafalcus hordeaceus* Gr. et Godr. ☉. Mai, juin. AC. Sables et pelouses maritimes.

B. RACEMOSUS Koch. — *B. EN GRAPPE*. — *Serrafalcus racemosus* Parlat. ②. Mai, juin. C. Prés.

Var. *h. B. elongatus* Gaud. — AC.

B. COMMUTATUS Schrad. — *B. CONTROVERSE*. — *Serrafalcus commutatus* Bab. ②. Juin, juillet. PC. Champs, prés.

B. SECALINUS L. — *B. SEIGLE*. — *Serrafalcus secalinus* Bab. ☉. Juin, juillet. PC. Champs, moissons.

B. ASPER Murr. — *B. RUDE*. — *B. nemoralis* Huds. — *B. hirsutus* Curt. — *Festuca aspera* Mert. et Koch. ♀. Juin - août. R. Haies, fourrés, chemins couverts. LE VAST : coteaux de la Saire. — SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD : coteaux de la Scie. PIERREVILLE : coteaux de Teranne. SERTAINVILLE : vallon de la mare du Chuquet, coteaux de la Baronnerie.

M. Le Jolis n'a point signalé cette plante dans notre arrondissement; il indique seulement dans une note qu'il l'a recueillie dans les haies autour de Valognes.

B. GIGANTEUS L. — *B. GÉANT*. — *Festuca gigantea* Vill. ♀. Juin - août. TR. CHERBOURG : haies à l'Amont-Quentin, environs de l'usine à gaz. — TOURLAVILLE : bois du château. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD : le cimetière.

B. ERECTUS Huds. — *B. DRESSÉ*. ♀. Juin, juillet. TR. CHERBOURG : plaine et remparts du port militaire.

***Festuca* L. — *Fétuque*.**

F. PSEUDO-MYUROS S. Willm. — *F. FAUSSE-QUEUE-DE-RAT*. — *F. myurus* Bab. — *F. muralis* Kunth. — *Vulpia pseudo-myuros* Gr. et Godr. ☉. Mai-juillet. C. Murs, lieux sablonneux ou pierreux.

F. SCIUROIDES Roth. — *F. QUEUE-D'ÉCUREUIL*. — *F. bromoides* Sm. — *Vulpia sciuroïdes* Gm. ☉. Mai-juillet. TC. Murs, pâturages secs, coteaux,

F. UNIGLUMIS Ait. — *F. UNIGLUME*. — *Vulpia uniglumis* Parlat. — *V. bromoides* Gr. et Godr. ☉. Mai-juillet. PC. Sables maritimes.

F. RUBRA L. — *F. ROUGE*. 24. Mai-juillet. C. Pâturages, coteaux, haies, bords des chemins.

Var. *b. F. dumetorum* DC. non L. — PC.

Var. *c. maritima* Bréb. — C. Sables maritimes.

F. ARENARIA Osb. — *F. DES SABLES*. — *F. sabulicola* L. Duf. — *F. dumetorum* Ll. 24. Juin, juillet. AR. CHERBOURG : sables et champs maritimes de l'est, environs du canal de retenue, fortifications du port militaire. — Littoral de TOURLAVILLE. — Dunes de VAUVILLE et de BIVILLE. — Mielles de SURTAINVILLE.

F. TENUIFOLIA Sibth. — *F. A FEUILLES MENEES*. — *F. capillata* Lamk. — *F. ovina* Auct. — *Poa capillata* Mér. 24. Juin, juillet. TC. Landes et bruyères, rochers, coteaux, pâturages secs.

On a besoin de nouvelles recherches pour s'assurer si le véritable *FESTUCA OVINA* L. et le *F. CINEREA* DC. croissent réellement dans notre arrondissement, où jusqu'à présent ils n'ont été que trop vaguement indiqués.

F. DURIUSCULA L. — *F. DURIUSCULE*. — *F. stricta* Host. 24. Juin, juillet. AC. Coteaux arides, pelouses, lieux sablonneux, surtout dans la région maritime.

Var. *b. F. hirsuta* Host. — PC.

Var. *c. F. dura* Host. — AC. Falaises de la Hague.

Var. *d. F. glauca* Lamk. — C. Pelouses, rochers et coteaux du littoral.

F. ARUNDINACEA Schreb. — *F. ROSEAU*. — *F. elatior* Sm. — *Schœnodoros elatior* R. et Sch. 24. Juin, juillet. AR. CHERBOURG : fortifications du port militaire, fossés à Sennecey. — TOURLAVILLE : la mare. HAINNEVILLE : les prés Lucas. QUERQUEVILLE : les prairies maritimes. — NÉVILLE : la mare. — BEAUMONT et HER-

QUEVILLE: les falaises. VAUVILLE: les falaises et la mare. — LES
PIEUX: la Bretonnerie. SURTAINVILLE: les carrières calcaires.

F. PRATENSIS Huds. — *F. DES PRÉS*. — *F. elatior* DC.
Schœnodoros pratensis R. et Sch. ♀. Juin, juillet. PC. Prés et
grandes mares du littoral.

F. RIGIDA Kunth. — *F. ROIDE*. — *Poa rigida* L. — *Sclero-
chloa rigida* Link. — *Scleropoa rigida* Griseb. ☉. Juin, juil-
let. C. Murs, lieux secs, coteaux pierreux.

F. ROTTBOELLIODES Kunth. — *F. FAUSSE-ROTTBOLLE*.
— *Triticum Rottbolla* DC. — *T. loliaceum* Sm. — *Poa loliacea*
Huds. — *Sclerochloa loliacea* Woods. — *Scleropoa loliacea* Gr.
et Godr. ☉. Mai-juillet. C. Sables et murs du littoral.

***Brachypodium* P. B. — *Brachypode*.**

B. SYLVATICUM R. et Sch. — *B. DES BOIS*. — *B. gracile*
P. B. — *Triticum sylvaticum* DC. — *Festuca sylvatica* Kœl. —
Bromus sylvaticus Poll. ♀. Juin, juillet. TC. Haies, bois, lieux
ombragés.

B. PINNATUM P. B. — *B. PINNÉ*. — *Triticum pinnatum*
DC. — *Festuca pinnata* Kœl. — *Bromus pinnatus* L. ♀. Juin,
juillet. TR. EQUEURDREVILLE: haies près le fort des Couplets.
MARTINVEST: vallée de la Divette. — SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD:
plateau sur la route de Grosville.

***Lolium* L. — *Irraie*.**

L. PERENNE L. — *I. VIVACE*. ♀. Juin, juillet. TC. Prés,
pelouses, bords des chemins.

Var. *b. L. tenue* Sm. — AC.

Var. *c. ramosum* Bréb. — PC.

Var. *d. cristatum* Bréb. — PC.

Var. *e. viviparum* Kœl. — PC.

L. ITALICUM A. Braun. — *I. D'ITALIE*. — *L. Boucheanum* Kunth. — *L. perenne* var. *aristatum* Coss. et Germ. — (*Raygrass.*) 4. Juin, juillet. AC. Prés, bords des chemins, prairies artificielles.

Var. *b. decompositum*. — TR. Environs du port militaire, à CHERBOURG.

L. TEMULENTUM Gaud. — *I. ENIVRANTE*. — *L. temulentum* L. var. *a. macrochaeton* A. Braun. - Gr. et Godr. ☉. Juin, juillet. PC. Moissons.

L. ARVENSE With. non Schrad. — *I. DES CHAMPS*. — *L. speciosum* Bieb. — *L. temulentum* L. var. *b. leptochaeton* A. Braun. - Gr. et Godr. ☉. Juin, juillet. AC. Moissons.

Les semences de ces deux dernières espèces sont narcotiques.

***Hordeum* L. — Orge.**

H. MURINUM L. — *O. QUEUE-DE-SOURIS*. ☉. Juin-août. Lieux incultes sablonneux, bords des chemins, pied des murs. TC. dans la région maritime. — PC. à l'intérieur.

H. MARITIMUM With. — *O. MARITIME*. ☉. Juin, juillet. R. Sables et lieux pierreux du littoral. CHERBOURG. — QUERQUEVILLE.

H. SECALINUM Schreb. — *O. FAUX-SEIGLE*. — *H. pratense* Huds. ☉. Juin, juillet. R. CHERBOURG : fossés du port militaire, prés sous le cimetière, prairies du Trottebec. — QUERQUEVILLE : les prés Lucas. — LE ROZEL : le Poux. PIERREVILLE : vallée de la Seie. SURTAINVILLE : ferme de Guinfard, vallons au sud de l'église.

***Elymus* L. — *Elyme*.**

E. ARENARIUS L. — *E. DES SABLES*. ♀. Juillet, août. RRR.
Mielles de NACQUEVILLE.

M. Delachapelle a indiqué cette belle graminée sur les côtes du Val-de-Saire, et M. de Brébisson la signale à Vauville; quant à M. Le Jolis, il a inséré dans sa liste, relativement à cette plante, une note tendant à faire douter de sa présence dans notre arrondissement.

***Agropyrum* P. B. — *Agropyre*.**

A. JUNCEUM P. B. — *A. A FEUILLES DE JONC*. — *Triticum junceum* L. ♀. Juin - août. AC. Sables maritimes.

A. ACUTUM R. et Sch. — *A. AIGU*. — *Triticum acutum* DC. ♀. Juin - août. PC. Sables maritimes.

A. REPENS P. B. — *A. RAMPANT*. — *Triticum repens* L. — (*Chiendent*.) ♀. Juin - septembre. C. Champs, bords des chemins, lieux sablonneux, haies.

Racine diurétique.

Cette plante présente, surtout dans la région maritime, plusieurs variétés, parmi lesquelles quelques auteurs ont cru reconnaître des espèces distinctes. Nous citerons, entre autres, l'*AGROPYRUM PUNGENS* R. et Sch. et l'*A. CAMPESTRE* Gr. et Godr.

***Nardus* L. — *Nard*.**

N. STRICTA L. — *N. ROIDE*. ♀. Juin, juillet. TR. SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD : lande de Candar.

***Lepturus* R. Br. — *Lepture*.**

L. INCURVATUS Trin. — *L. COURBÉ*. — *Rottboellia incurvata* L. — *Ophiurus incurvatus* P. B. ☉. Juillet, août. PC. Sables et marécages maritimes, vases salées.

L. FILIFORMIS Trin. — L. FILIFORME. — *Rottboellia filiformis* Roth. — *Ophiurus filiformis* R. et Sch. ☉. Juillet, août. PC. Mêmes stations.

Ces deux plantes nous ont toujours paru parfaitement distinctes l'une de l'autre.

Les plantes suivantes, qui sont généralement cultivées, se trouvent plus ou moins fréquemment à l'état subspontané : les Froments (TRITICUM HYBERNUM et ÆSTIVUM L.), les Orges (HORDEUM VULGARE, HEXASTICHON et DISTICHON L.), le Seigle (SECALE CEREALE L.), les Avoines (AVENA SATIVA L. et ORIENTALIS Schreb.), le Mil ou Millet (PANICUM MILIACEUM L.), le Millet des oiseaux (PANICUM ITALICUM L.), etc.

C'est à tort que M. Le Jolis cite le *Secale cereale* L. comme étant la seule céréale qui se trouve à l'état subspontané dans notre arrondissement.

Monocotylédones spadiciflores.

TYPHACÉES.

Typha L. — *Massette*.

T. LATIFOLIA L. — M. A LARGES FEUILLES. 2. Juillet, août. AR. GONNEVILLE : étang de la filature. CARNEVILLE : vallée des Bas-Fonds. FERMENVILLE : les prés maritimes. COSQUEVILLE : marécages maritimes. LE VAST : étangs de la Saire. VRASVILLE et RÉTHOVILLE : la mare. NÉVILLE : la mare. — NACQUEVILLE : étang des Castelets, ruisseau du château.

Var. *b. intermedia* Coss. et Germ. — R. CARNEVILLE : vallée des Bas-Fonds. — NACQUEVILLE : étang des Castelets, ruisseau du château.

T. ANGUSTIFOLIA L. — *M. A FEUILLES ÉTROITES*. Ȳ. Juin, juillet. AR. Grandes mares du littoral : VRASVILLE. NÉVILLE. GOUBERVILLE. GATTEVILLE. — VAUVILLE.

Les plantes de ce genre portent les noms vulgaires de *Quenouille*, *Roseau des étangs*, *Vimble*.

***Sparganium* L. — Rubanier.**

S. RAMOSUM Huds. — *R. RAMEUX*. — *S. erectum* var. *a.* L. Ȳ. Juin-septembre. C. Fossés, étangs, bords des ruisseaux et des rivières.

S. SIMPLEX Huds. — *R. SIMPLE*. — *S. erectum* var. *b.* L. Ȳ. Juillet-octobre. AR. CHERBOURG : bords de la Divette et du Trottebec. — VIRANDEVILLE : bords de la Marvie. LE MESNIL-AU-VAL : marais de la Saire. — TONNEVILLE : étang de Percy. NACQUEVILLE : les fossés maritimes. VAUVILLE : la mare. BIVILLE et VASTEVILLE : ruisseau de Claire-Fontaine.

Ces deux espèces sont vulgairement appelées *Paves*.

AROIDÉES.

***Arum* L. — Gouet.**

A. VULGARE Lamk. — *G. COMMUN*. Ȳ. Avril, mai. C. Haies, prés, bords des chemins.

Var. *b.* **A. maculatum** L. — AC.

A. ITALICUM Mill. — *G. D'ITALIE*. Ȳ. Avril, mai. Assez fréquent dans les haies et les prés à CHERBOURG et dans les communes environnantes. — Assez rare dans le reste de l'arrondissement : GONNEVILLE. TOCQUEVILLE. — OMONVILLE-LA-ROGUE. — FLAMANVILLE.

Les plantes de ce genre sont connues sous le nom vulgaire de *Pilettes*; elles sont âcres, rubéfiantes; leurs racines sont très purgatives.

LEMNACÉES.

***Lemna* L. — *Lenticule*.**

L. MINOR L. — L. PETITE. ☉. Juin, juillet. TC. Mares, fossés, étangs.

L. GIBBA L. — L. GONFLÉE. — *Telmatophace gibba* Schleid. ☉. Juillet - septembre. AR. Mêmes stations que la précédente. CHERBOURG. — OCTEVILLE. TOURLAVILLE. QUERQUEVILLE. — FERMANVILLE. COSQUEVILLE. VRASVILLE. GATTEVILLE.

L. POLYRHIZA L. — L. A PLUSIEURS RACINES. — *Spirodela polyrhiza* Schleid. ☉. Juin - septembre. AR. Grandes mares et fossés du littoral. TOURLAVILLE. — FERMANVILLE. NÉVILLE. GOUBERVILLE. — NACQUEVILLE. — LE ROZEL.

Les plantes de ce genre portent le nom vulgaire de *Lentilles d'eau*.

Monocotylédones exalbuminées.

HYDROCHARIDÉES.

***Hydrocharis* L. — *Morrène*.**

H. MORSUS-RANÆ L. — M. GRENOUILLETTE ♀. Juillet, août. R. Grandes mares et fossés du littoral. VRASVILLE. NÉVILLE. GOUBERVILLE. GATTEVILLE. — NACQUEVILLE.

M. Le Jolis aurait-il été étonné de la présence de cette plante dans notre arrondissement? Le soin qu'il a mis à faire suivre du signe d'af-

firmation le nom de la seule localité où il l'y ait observée (Gatteville!) porterait à le croire.

BUTOMÉES.

Butomus Tourn. — *Bulome*.

B. UMBELLATUS L. — *B. EN OMBELLE*. — (*Jonc fleuri*.)
 ♀. Juin, juillet. R. TOURLAVILLE: fossés de la redoute. QUERQUEVILLE: rivière Lucas. — COSQUEVILLE: les marécages maritimes. GOUBERVILLE: étang de Gattemare, rivière de la Couplière. — NACQUEVILLE: les fossés maritimes.

JONCAGINÉES.

Triglochin L. — *Troscart*.

T. PALUSTRE L. — *T. DES MARAIS*. ♀. Juin, juillet. AR. CHERBOURG: marécages près du Trottebec. — TOURLAVILLE: fossés de la redoute, la mare. — FERMANVILLE et COSQUEVILLE: les prés maritimes. VRASVILLE: la mare. NÉVILLE: la mare. GOUBERVILLE: étang de Gattemare. GATTEVILLE: vases salées de l'Est. — NACQUEVILLE: la mare. — FLAMANVILLE: Diélette. SURTAINVILLE: les vallons calcaires.

T. MARITIMUM L. — *T. MARITIME*. ♀. Juillet, août. AC. Marécages et prés maritimes, vases salées.

ALISMACÉES.

Alisma L. — *Flûteau*.

A. PLANTAGO L. — *F. PLANTAIN D'EAU*. ♀. Juin - août. C. Fossés, étangs, rivières et ruisseaux.

Var. *b. A. lanceolatum* With. — AC.

A. NATANS L. — *F. NAGEANT*. Ȳ. Juin-septembre. AR. NOUAINVILLE: flaques d'eau au bord de la route de Vasteville. SIDEVILLE: la Câtellerie. SAINT-MARTIN-LE-GRÉARD: rivière de la Roche. LE MESNIL-AU-VAL: la Saire, marais de Barville. DIGOSVILLE: ruisseau des Brequequeurs. — GONNEVILLE et LE THEIL: la Saire. CARNEVILLE: la lande. VRASVILLE: la mare. — ACQUEVILLE: route de la Hague à Valognes. FLOTTEMANVILLE-HAGUE: environs du Mesnildot. TONNEVILLE: étang de Percy. SAINTE-CROIX-HAGUE, VAUVILLE et BIVILLE: ruisseau et vallon de Claire-Fontaine. VASTEVILLE: la Haye, la Madeleine. — SOTTEVILLE: la Fage. GROSVILLE: ruisseau des Fondais. SURTAINVILLE: ruisseau de la Poupardière.

A. RANUNCULOIDES L. — *F. RENONCULE*. Ȳ. Mai-septembre. AR. CHERBOURG: marécages du Trottebec. — TOURLAVILLE: fossés de la redoute, la mare. — LE THEIL: moulin Lallemand. FERMANVILLE: les prés maritimes. VRASVILLE: la mare. NÉVILLE: la mare. GOUBERVILLE: étang de Gattemare. — NACQUEVILLE: les fossés maritimes. BIVILLE: ruisseau et vallon de Claire-Fontaine. VASTEVILLE: étang de Claire-Fontaine. — SURTAINVILLE: ruisseau de la Poupardière.

A. REPENS Cav. — *F. RAMPANT*. Ȳ. Mai-septembre. R. Bords des mares de VRASVILLE et de VAUVILLE.

POTAMÉES.

Potamogeton L. — *Potamot.*

P. NATANS L. — *P. NAGEANT*. Ȳ. Juin, juillet. C. Fossés, étangs, mares, rivières.

P. FLUITANS Roth. — *P. FLOTTANT*. Ȳ. Juillet, août. PC. Rivières et ruisseaux, étangs.

P. POLYGONIFOLIUS Pourr. — *P. A FEUILLES DE RENOUÉE*. — *P. oblongus* Viv. ☞. Juin, juillet. AC. Fossés des landes tourbeuses, près marécageux.

P. PERFOLIATUS L. — *P. PERFOLIÉ*. ☞. Juin-août. R. Rivières. OCTEVILLE : la Divette. — LE VAÏT : la Saire.

M. Le Jolis n'a point observé cette plante dans nos rivières; il dit dans sa liste que M. le docteur Lebel la lui a donnée de la côte sud de Saint-Vaast.

P. CRISPUS L. — *P. CRÉPU*. ☞. Juin, juillet. C. Rivières, étangs, mares, fossés.

Comme cette espèce est une de celles que l'on trouve le plus fréquemment, il est surprenant qu'elle ne figure pas dans la liste de M. Le Jolis.

P. DENSUS L. — *P. SERRÉ*. ☞. Juin, juillet. C. Fossés, étangs, mares, ruisseaux.

Var. *b. P. oppositifolius* DC. — *P. serratus* L. — PC.

P. GRAMINEUS L. -- *P. A FEUILLES DE GRAMINÉE*. ☞. Juin, juillet. R. CHERBOURG et OCTEVILLE : la Divette.

P. PUSILLUS L. — *P. FLUET*. ☞. Juin, juillet. AC. Mares, fossés, étangs.

Var. *b. major* Mert. et Koch. — *P. Berchtoldi* Fieb. — R. TOURLAVILLE : la mare. — GOUBERVILLE : étang de Gattenmare.

P. PECTINATUS L. — *P. PECTINÉ*. ☞. Juillet, août. R. Mares de VRASVILLE et de NÉVILLE; étang de Gattenmare à GATTEVILLE.

***Zannichellia* L. — *Zannichelle*.**

Z. PALUSTRIS L. — *Z. DES MARAIS*. — *Z. macrostemon* Gay. ☞. Mai, juin. PC. Ruisseaux, eaux saumâtres.

Z. REPENS Boenng. — Z. *RAMPANTE*. — Z. *brachystemon* Gay. — Z. *dentata* Ll. 24. Mai-juillet. AC. Eaux stagnantes du littoral.

Z. PEDICELLATA Fries. — Z. *PÉDICELLÉE*. 24. Juillet, août. R. Mares de TOURLAVILLE et de VRASVILLE.

***Ruppia* L. — *Ruppie*.**

R. ROSTELLATA Koch. — R. *A BEC*. — *Phucagrostis minor* Caul. 24. Mai-septembre. AC. Fossés et mares du littoral.

***Zostera* L. — *Zostère*.**

Z. MARINA L. — Z. *MARINE*. — (*Herbet, Crin végétal.*) 24. Juin-août. C. Croît dans la mer sur les fonds de sable.

III. CRYPTOGAMES.

FOUGÈRES.

***Ceterach* C. Bauh. — *Cétérach*.**

C. OFFICINARUM C. Bauh. — C. *OFFICINAL*. — *Asplenium Ceterach* L. — *Grammitis Ceterach* Sw. 24. Juillet-septembre. AR. CHERBOURG: le Maupas, ferme de la montagne, la Bucaille. — NOUAINVILLE: maison Néel. HAINNEVILLE et QUERQUEVILLE: murs du littoral. LE MESNIL-AU-VAL: les Écocheux. DIGOSVILLE: collines du Becquet. BRETTEVILLE: ancien chemin de Cherbourg à Barfleur. — GATTEVILLE: chemin de l'église au hameau de Crabec. — GRÉVILLE: murs des coteaux maritimes. BIVILLE: murs du cimetière. — TRÉAUVILLE: vieux murs sous le mont Saint-Gilles. PIERREVILLE: village de la Ferrière. SURTAINVILLE: ferme de l'Herbage-au-Moine.

Autrefois employé comme béchique.

***Polypodium* L. — *Polypode*.**

P. VULGARE L. — *P. COMMUN.* ♀. Toute l'année. TC. Murs, toits, rochers, troncs d'arbres, haies.

Racine laxative, émolliente, vendue en pharmacie sous le nom de *Polypode de chêne*.

Var. *b. serratum* DC. — PC.

Var. *c. lobatum* Chauv. — PC.

Il est singulier que, dans sa liste, M. Le Jolis ait cru devoir en quelque sorte constater par le signe d'affirmation (!) qu'il a trouvé cette fougère sur les arbres, car c'est là une de ses stations ordinaires.

***Pteris* L. — *Ptéride*.**

P. AQUILINA L. — *P. AQUILINE.* — (*Grande Fougère, Fougère commune.*) ♀. Juillet-septembre. TC. Landes, coteaux, bois, champs arides, pâturages secs, haies.

Var. *b. lobato-crenata* Nob. — *undulata* Bréb. — AC. Chemins couverts, lieux humides.

***Blechnum* Sm. — *Blechné*.**

B. SPICANT Sm. — *B. EN ÉPI.* — *B. boreale* Sw. — *Osmunda Spicant* L. — (*Fougerolle.*) ♀. Juin-septembre. C. Bois, landes, bruyères, chemins couverts.

Var. *b. bifidum.* — TR. Landes de TONNEVILLE.

***Asplenium* L. — *Doradille*.**

A. ADIANTHUM NIGRUM L. — *D. CAPILLAIRE NOIR.* ♀. Juin-septembre. TC. Murs, haies, rochers, lieux frais et ombragés.

Cette plante est tellement commune que l'on ne comprend pas comment M. Le Jolis a pu l'indiquer comme assez rare.

Var. *b. acutum* Chauv. — AC.

A. LANCEOLATUM Sm. — *D. LANCÉOLÉE*. Ȳ. Juin-septembre. AC. Vieux murs, rochers.

Var. *b. longipetiolatum* Nob. — R. OCTEVILLE: rochers de la Grande-Fauconnière. — Falaises de GRÉVILLE. ÉCULLEVILLE: rochers de la Sabine.

Var. *c. abbreviatum* Nob. — R. Falaises de GRÉVILLE.

A. MARINUM L. — *D. MARINE*. Ȳ. Juin-octobre. AR. Fissures des rochers voisins de la mer, cavernes au pied des falaises, sur la côte de l'Ouest de l'arrondissement. — TR. sur le littoral du Nord à l'ouest de Cherbourg: GRÉVILLE. SAINT-GERMAIN-DES-VAUX. — RRR. sur le même littoral à l'est de Cherbourg: FERMANVILLE: environs du port du cap Lévi.

A. RUTA MURARIA L. — *D. RUE DES MURAILLES*. Ȳ. Mai-septembre. AR. Croît sur les vieux murs, principalement sur ceux des églises.

A. TRICHOMANES L. — *D. POLYTRIC*. — (*Petit Capillaire*.) Ȳ. Mai-septembre. C. Murs, rochers, haies.

Toutes les Doradilles, connues sous le nom vulgaire de *Capillaires*, sont employées comme béchiques.

***Scolopendrium* Sm. — *Scolopendre*.**

S. OFFICINALE Sm. — *S. OFFICINALE*. — *S. vulgare* Bab. — *Asplenium Scolopendrium* L. — (*Langue-de-bœuf, langue-de-cerf*. Ȳ. Juin-octobre. C. Murs humides, rochers, puits, chemins creux ombragés, bois, bords des ruisseaux.

Varie rarement à feuilles ondulées, crispées ou bifurquées.

Polystichum* Roth. — *Polystic.

P. FILIX-MAS Roth. — P. Fougère-male. — *Aspidium Filix-mas* Sw. — *Nephrodium Filix-mas* Stremp. — *Polypodium Filix-mas* L. — *Lastrea Filix-mas* Presl. ♀. Juin-septembre. TC. Bois, haies, lieux couverts.

Var. *b.* P. **crenulatum** Chevall. — RRR. DIGOSVILLE: coteaux de Bruneval. — Bois de BEAUMONT.

La racine de *Fougère-male* est employée comme vermifuge.

P. OREOPTERIS DC. — P. ORÉOPTÈRE. — *Aspidium Oreopteris* Sw. — *Lastrea Oreopteris* Presl. ♀. Juillet-septembre. R. CHERBOURG: pied nord de la montagne du Roule, bois des Terres-Feuillies. — TOURLAVILLE: vallon de Bruneval, la Roquette, la Glacerie, les landes tourbeuses du Sud, marécages du Culpereux. NOUAINVILLE: ancienne route des Pieux, environs de la Croix-Rouge. — MARTINVAST: Nardouet. HARDINVAST: environs d'Isigny et du Rocher. TOLLEVAST: environs des Tourterelles, marais d'Ombre. LE MESNIL-AU-VAL: vallon du Culpereux, bois de la source de la Saire, ruisseau et marais de Barville. DIGOSVILLE: vallon et coteau de Bruneval. — MAUPERTUS: bois du Doux-Riant. GONNEVILLE. LE THEIL: environs du moulin Lallemand. LE VAST: vallées de la Saire et du Clarbec. — TONNEVILLE: les landes marécageuses. ACQUEVILLE: vallon des Héleines, bord du ruisseau de Nérée entre Marende et les Douets. — SURTAINVILLE: vallon de Beautrain.

Ainsi qu'on peut en juger par les localités précitées, cette plante n'est point limitée au sud de l'arrondissement, ainsi que l'indique M. Le Jolis.

P. THELYPTERIS Roth. — P. THÉLYPTÈRE. — *Aspidium Thelypteris* Sw. — *Acrostichum Thelypteris* L. — *Lastrea Thelypteris* Presl. ♀. Juillet, août. TR. VAUVILLE: bord est de la mare et prés voisins en face du Petit-Tot.

P. DILATATUM DC. — *P. DILATÉ*. — *Lastrea dilatata* Presl.
☞. Août-octobre. C. Bois, coteaux et rochers, haies et chemins
couverts.

P. TANACETIFOLIUM DC. — *P. TANAISIE*. — *Polypodium
tanacetifolium* Hoffm. ☞. Août-octobre. AC. Rochers et coteaux,
bois pierreux, bords des fossés ombragés.

***Aspidium* R. Br. — *Aspidion*.**

A. ANGULARE Kit. — *A. ANGULAIRE*. — *A. fuscatum* Willd.
— *Polystichum angulare* Newm. — *P. stipitatum* Chauv. ☞.
Juin-septembre. C. Haies, bois, coteaux et chemins couverts.

Plus fréquent que le *Polystichum Filix-mas* Roth dans plusieurs
localités.

Var. *b. confluens*. — Ça et là avec le type.

Comme dans tout l'Ouest de la France, l'*Aspidium angulare* Kit.
remplace dans notre arrondissement l'*A. ACULEATUM* Doell.

***Athyrium* Roth. — *Athyrium*.**

A. FILIX-FOEMINA Roth. — *A. FOUGÈRE-FEMELLE*. —
Aspidium Filix-fœmina Sw. — *Asplenium Filix-fœmina*
Bernh. — *Cystopteris Filix-fœmina* Coss. et Germ. — *Polypo-
dium Filix-fœmina* L. ☞. Juillet-septembre. C. Bords des
ruisseaux, fossés, bois et haies humides, lieux frais et ombragés.

Cette fougère varie beaucoup; nous ne citerons que la principale
variété.

Var. *b. A. acrostichoïdeum* Bory. — *A. scorpioïdeum* Chauv.
— *Polypodium Leseblii* Méral. PC. Coteaux rocailleux, carrières.

***Hymenophyllum* Sm. — *Hyménophylle*.**

H. TUNBRIDGENSE Sm. — *H. DE TUNDRIDGE*. — *Trichomanes Tunbridgense* L. ♀. Juillet - novembre. R. Rochers très humides, pied des arbres parmi les mousses, dans les sols quartzeux et presque toujours à l'exposition nord ou est. CHERBOURG : versant nord de la montagne du Roule. — TOURLA-VILLE : colline des Terres-Feuillies, rochers de la Glacerie, la Roche-au-Chat, rocs des Pares-Basans, de Cloquant, des Juifs, de la Fieffe et de la Motterie, mont du Tronquet. LE MESNIL-AU-VAL : rochers et bois du bassin de la Saire. SIDEVILLE : rochers du bois du Mont-du-Roc.

H. WILSONI Hook. — *H. DE WILSON*. ♀. Juillet-novembre. TR. LE MESNIL-AU-VAL : rochers et bois du bassin de la Saire.

Plante nouvelle pour la flore de la France.

***Osmunda* L. — *Osmonde*.**

O. REGALIS L. — *O. ROYALE*. ♀. Juillet-septembre. RRR. SIDEVILLE : bois du Mont-du-Roc. LE MESNIL-AU-VAL : landes tourbeuses et bois marécageux du bassin de la Saire.

Cette belle fougère, connue dans le pays sous le nom de *Mondria*, n'était pas jadis d'une grande rareté dans notre arrondissement; mais elle en a disparu à peu près complètement par suite de la confiance exagérée que les habitants de la campagne attribuent à ses racines mucilagineuses pour la guérison de la phthisie. Les renseignements que nous avons puisés à des sources certaines ne laissent aucun doute sur sa présence autrefois dans les bois marécageux ou dans les tourbières de la Glacerie, de Martinvast, de Teurthéville-Hague, du Theil, de Digosville; dans la vallée du Hubillan entre Urville-Hague et Gréville, et dans celle de la Sabine entre Gréville et Éculleville.

***Ophioglossum* L. — *Ophioglosse*.**

O. VULGATUM L. — *O. COMMUNE*. ♀. Mai, juin. TR. CHERBOURG : près de Hautmarais. — QUERQUEVILLE : lieux herboux vers le fort. — NACQUEVILLE : près voisins de la mare.

ÉQUISÉTACÉES.

***Equisetum* L. — *Prêle*.**

E. ARVENSE L. — *P. DES CHAMPS*. ♀. Mars, avril. C. Haies et champs humides, prés, bords des eaux.

E. TELMATEIA Ehrh. — *P. DES MARÉCAGES*. — *E. eburneum* Roth. — *E. fluviatile* Sm. ♀. Mars, avril. RRR. GRÉVILLE : lieux marécageux dans les falaises.

M. Le Jolis n'ayant point observé cette plante dans notre arrondissement a cru devoir rappeler qu'elle se trouve aux environs de Valognes. La localité où nous l'avons remarquée est cependant à peu de distance de sa maison de campagne d'Urville-Hague.

E. SYLVATICUM L. — *P. DES BOIS*. ♀. Avril, mai. TR. LE MESNIL-AU-VAL : bords de la Saire, non loin de sa source. marais de Barville, bruyères marécageuses de la Boissaie.

E. LIMOSUM L. — *P. DES BOURBIERS*. ♀. Juin, juillet. AC. Étangs, mares, fossés.

Cette prêle croit dans toutes les parties de notre arrondissement ; il est singulier que M. Le Jolis la considère comme exclusive aux fossés et aux prés du littoral.

E. PALUSTRE L. — *P. DES MARAIS*. ♀. Juin, juillet. C. Prairies humides, bords des eaux, prés marécageux.

Var. *b. polystachyon* Ray. — AC.

Les plantes de cette famille sont connues sous le nom vulgaire de *Queues-de-cheval*.

LYCOPODIACÉES.

Lycopodium L. — Lycopode.

L. CLAVATUM L. — *L. A MASSUE.* 4. Juillet, août. TR. Landes et bruyères, bois. TOURLAVILLE: coteaux de Quincampoix, pied de la colline des Terres-Feuillies, la Glacerie. TOLLEVAST: coteaux de la Crevière et de la Beuvinne. LE MESNIL-AU-VAL: bruyères du bassin de la Saire.

C'est cette espèce qui fournit la poudre connue sous le nom de *Soufre végétal*, de *Lycopode*, employée contre les excoriations.

L. INUNDATUM L. — *L. INONDÉ.* 4. Août, septembre. R. TOURLAVILLE: bruyères tourbeuses de la Glacerie. MARTINVAST: prés marécageux de la Couvillerie. LE MESNIL-AU-VAL: marécages de la Boissais et de Barville. — VAUVILLE: bruyères du vallon de Claire-Fontaine.

M. Le Jolis, en faisant suivre de la date 1858 l'indication de la seule localité qu'il cite pour cette plante, ignorait sans doute qu'elle avait été trouvée dans notre arrondissement antérieurement à cette époque; c'est, du reste, la moins rare de nos trois espèces.

L. SELAGO L. — *L. SÉLAGINE.* 4. Juin-août. TR. CHERBOURG: versant nord de la montagne du Roule. — BIVILLE: bruyères du vallon de Claire-Fontaine près de la route de Sainte-Croix-Hague.

OBSERVATION.

Ayant adopté la classification de MM. Le Maout et Decaisne, nous avons dû ne pas comprendre dans notre Catalogue les Characées, qu'ils rangent parmi les plantes cellulaires.

ADDENDA.

A placer dans la famille des Solanées, après le genre *Solanum* :

***Atropa* L. — *Atrope*.**

A. BELLADONA L. — *A. BELLADONE*. 24. Juin - septembre.
TR. SURTAINVILLE: vallon, coteaux et carrières calcaires de la Godaillerie.

A mettre dans la famille des Rosacées, après le *Potentilla Fragariastrum* :

POTENTILLA VERNA L. — *POTENTILLE PRINTANIÈRE*.
24. Mars-mai. TR. SURTAINVILLE: coteaux et carrières calcaires de la Godaillerie.

A placer dans la famille des Crucifères, après le *Barbarea vulgaris*.

BARBAREA STRICTA Andrz. - Koch. — *BARBARÉE RAIDE*.
— *B. parviflora* Fries. 24. Avril-juin. RRR. CHERBOURG: lieux incultes près du nouvel hospice.

LISTE

DES

ESPÈCES DE PLANTES VASCULAIRES

Que nous n'avons pas encore observées dans l'arrondissement de Cherbourg, mais qui y ont été indiquées par divers auteurs.

Nous n'avons pas compris dans cette liste les espèces de création toute récente qui, démembrées des types linnéens ou des meilleurs auteurs, ont besoin d'un mûr examen pour ne pas devoir être considérées comme de simples variétés.

HIERACIUM SABAUDUM L. — R. Bois de la Glacerie. (Delachapelle.)

HIERACIUM TRIDENTATUM Fries. — R. Haies: Octeville, Hardinvast, Le Theil. (Le Jolis.)

HIERACIUM MURORUM L. — R. Environs du château de Querqueville. (Delachapelle.)

HIERACIUM PELLETERIANUM Mér. — Indiqué par M. Le Jolis.

N'aurait-il pas pris pour cette plante la var. *hirsutum* de l'*H. Pilosella* L. ?

CREPIS TECTORUM L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg* (1).

(1) Le *Guide du Voyageur à Cherbourg* dont il est ici question est celui de MM. Fleury et Vallée. Il ne donne qu'une simple liste de plantes sans aucune indication de localités.

CREPIS FOETIDA L. — *Barkhausia foetida* DC. — Environs du port militaire. (Delachapelle.)

SONCHUS PALUSTRIS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

TRAGOPOGON PRATENSIS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

CIRSIIUM ERIOPHORUM Scop. — R. Chemin de Surtainville à Baubigny. (Delachapelle.)

CARDUS CRISPUS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

CENTAUREA JACEA L. — Indiqué par erreur dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

D'après M. de Brébisson, le véritable *C. Jacea* L. n'a pas été trouvé en Normandie.

CENTAUREA SOLSTITIALIS L. — R. Champs de luzerne : Tourlaville. (Le Jolis.)

Plante introduite.

CALENDULA ARVENSIS L. — Terres sablonneuses cultivées près de Cherbourg. (De Gerville.)

SENECIO VISCOSUS L. — R. Lieux pierreux du littoral : Fermanville, etc. (Le Jolis.)

Il est fâcheux que M. Le Jolis n'ait pas cité les autres communes où il a observé cette plante rare. N'aurait-elle pas été confondue avec la var. *radiatus* Koch du *S. vulgaris* L. ?

FILAGO ARVENSIS L. — *Gnaphalium arvense* Willd. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

GNAPHALIUM DIOÏCUM L. — R. Environs de l'église de Siouville. (Delachapelle.)

ARTEMISIA MARITIMA L. — R. Partie sud des falaises de Flamanville. (Delachapelle.) — RR. dans les limites de notre arrondissement : Gatteville. (Le Jolis.)

ACHILLEA PTARMICA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

ANTHEMIS ARVENSIS L. — R. Champs incultes à Tourlaville. (Delachapelle.)

ANTHEMIS MARITIMA L. — R. Rivages de gravier. Val-de-Saire. (De Gerville.) — R. Prés maritimes à Omonville. (Delachapelle.)

Il est fort douteux que cette plante croisse en Normandie.

XANTHIUM STRUMARIUM L. — TR. Lieux incultes dans le Sud-Ouest de l'arrondissement. (Delachapelle.)

VALERIANELLA ERIOCARPA Desv. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*. — Cherbourg. (De Brébisson.)

VIBURNUM LANTANA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

ASPERULA CYNANCHICA L. — R. Cosqueville. (Delachapelle.) — Surtaînville. (Le Jolis.)

RUBIA PEREGRINA L. — Falaises de Beaumont et de Herqueville. (De Gerville.) — Indiqué sous le nom de *R. lucida* par M. Delachapelle dans les dunes de Biville.

GALIUM SYLVESTRE Poll. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

CHLORA IMPERFOLIATA L. fil. — Bords de l'Océan, de Bayonne à Cherbourg. (Gren. et Godr., *Fl. de Fr.*)

GENTIANA AMARELLA L. — Cherbourg. (Gren. et Godr., *Fl. de Fr.*)

VILLARSIA NYMPHOÏDES Vent. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

PULMONARIA OFFICINALIS L. — Cette plante, indiquée par M. Delachapelle à Octeville, près de l'église, était sans nul doute échappée de quelque jardin.

SOLANUM MINIATUM Dun. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*. — Cherbourg. (De Bréb.)

ORORANCHE RAMOSA L. — Dans le Val-de-Saire, sur le chanvre. (Delachapelle.)

MENTHA SYLVESTRIS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

MENTHA VIRIDIS L. — R. Chemin de Surtainville à Baubigny. (Delachapelle.)

MENTHA SATIVA L. — Indiqué par M. Le Jolis comme trouvé à Teurthéville-Hague par le Dr Lebel. — Le *MENTHA PALUSTRIS* Moench, cité dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*, est regardé par M. de Brébisson comme une variété de cette plante.

MENTHA RUBRA Sm. — R. Chemin près de l'église de Sideville. (Delachapelle.)

GALEOPSIS LADANUM L. — R. Lieux cultivés à Querqueville. (Delachapelle.)

UTRICULARIA NEGLECTA Lehm. — Tourlaville. (Dr Lebel.) — Nacqueville. (Le Jolis.)

Pinguicula vulgaris L. — R. Mare de Nacqueville. (Delachapelle.)

STATICE DODARTII Gir. — Cherbourg. (De Brébisson.)— Cette plante n'existe assurément pas à Cherbourg; nous ne savons dans quelle partie de son arrondissement elle a pu avoir été trouvée.

ARMERIA MARITIMA Willd. — R. Vases maritimes de la côte Est: Gatteville. (Le Jolis.)

HOTTONIA PALUSTRIS L. — R. Mares dans le bois de Barnavast. (Delachapelle.)

FALCARIA RIVINI Host. — Trouvé dans un champ du littoral d'Urville-Hague par M. Le Jolis, qui l'y considère comme introduit.

PIMPINELLA DIOICA L. — Prés montueux à Jobourg et à Auderville. (De Gerville et Delachapelle.)

PIMPINELLA SAXIFRAGA L. — Indiqué par M. Delachapelle. Le degré d'abondance (C. dans les haies) qu'il attribue à cette espèce fait voir que son admission est le résultat d'une erreur.

SIUM ANGUSTIFOLIUM L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

OENANTHE PIMPINELLOIDES L. — R. Mare de Tourlaville. (Delachapelle.) — Il importe beaucoup de retrouver cette espèce, qui, comme l'on sait, est une des plantes caractéristiques de la flore de l'arrondissement de Valognes.

SESELI MONTANUM L. — TR. Environs de la Croix-Georges à Benoistville. (Delachapelle.)

SELINUM OREOSELINUM DC. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

CAUCALIS ARVENSIS Huds. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

SEDUM DASYPHYLLUM L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

SEDUM SEXANGULARE L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*. — Cherbourg. (De Brébisson.)

SORBUS DOMESTICA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

ROSA URBICA LÉH. — R. Bois de Barnavast, Le Theil. (Le Jolis.)

SANGUISORBA OFFICINALIS L. — Prés humides de la Hague. (De Gerville.)

HIPPOCREPIS COMOSA L. — C'est à tort que dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*, note page 147, on indique cette plante comme croissant en abondance sur les falaises de Jobourg. Évidemment on l'a confondue avec l'*Anthyllis Vulneraria* L. — RR. Pelouses rases des sables maritimes de Biville. (Le Jolis.)

LATHYRUS PALUSTRIS L. — Falaises de Herqueville. (De Gerville.)

VICIA LATHYROÏDES L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

ASTRAGALUS GLYCYPHYLLOS L. — R. Haies, route de Martinvast à Briquebec. (Delachapelle.)

TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM L. — Les Pieux. (Dr Lebel.)

TRIFOLIUM ALPESTRE L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

HYPERICUM LINEARIFOLIUM Vahl. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*. — Cherbourg. (De Brébisson.)

HYPERICUM HIRSUTUM L. — Haies et coteaux à Surtainville. (Delachapelle.)

LAVATERA ARBOREA L. — Rochers du Nez-de-Jobourg. (De Brébisson et Godey.)

GERANIUM PYRENAÏCUM L. — R. Décombres dans le voisinage des jardins à Urville-Hague. (Le Jolis.)

Cette plante, que M. Le Jolis considère comme introduite, pourrait bien être indigène, d'autant plus qu'elle existe sur d'autres points en Normandie, et que MM. Grenier et Godron l'indiquent commune dans presque toute la France.

MYOSURUS MINIMUS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

RANUNCULUS OLOLEUCOS Ll. — Vauville. (Dr Lebel.)

RANUNCULUS LINGUA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

RANUNCULUS AURICOMUS L. — R. Bois de la Pierre-Butée. (Delachapelle.) Ces bois sont aujourd'hui détruits.

RANUNCULUS ARVENSIS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

HELLEBORUS FOETIDUS L. — R. Bois des Marais à Naequeville. (Delachapelle.)

PARNASSIA PALUSTRIS L. — R. Lieux humides du bois de Barnavast. (Delachapelle.)

FUMARIA MEDIA Lois. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

MALCOLMIA LITTOREA R. Br. — Sables des côtes de l'Océan depuis Bayonne jusqu'à Cherbourg. (Grenier et Godron, *Flore de France*.)

ERYSIMUM CHEIRANTHOÏDES L. — Cherbourg. (de Brébisson.)

SISYMBRIUM SYLVESTRE L. — Gatteville, près de Gattemare. (De Gerville.)

DRABA MURALIS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

COCHLEARIA OFFICINALIS L. — Bord de la mer au moulin de Beaumont. (De Gerville.)

COCHLEARIA ANGlica L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

COCHLEARIA ARMORACIA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

VIOLA CANINA L. — RR. Indiqué par M. Le Jolis comme trouvé par le docteur Lebel dans les landes de la Hague, à Biville.

FRANKENIA LÆVIS L. — RR. Indiqué par M. Le Jolis comme ayant été recueilli par MM. J. Decaisne et Lenormand, près du phare de Gatteville, où il déclare n'avoir pu le retrouver.

DIANTHUS CARYOPHYLLUS L. — R. Murs du parc du château de Flamanville. (Delachapelle.)

GYPSOPHILA MURALIS L. — R. Dunes de Biville. (Delachapelle.)

ALSINE SEGETALIS L. — R. Mielles de Surtainville. (Delachapelle.)

ARENARIA TENUIFOLIA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

HOLOSTEUM UMBELLATUM L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

CERASTIUM ARVENSE L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

CERASTIUM AQUATICUM L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

SPERGULA PENTANDRA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

LEPIGONUM NEGLECTUM Kindb. — Indiqué par M. de Brébisson comme trouvé à Cherbourg par M. Lenormand.

HERNARIA GLABRA L. — R. Lande de Pierreville. (Delachapelle.)

HERNARIA HIRSUTA L. — R. Lande de Pierreville. (Delachapelle.)

ILLECEBRUM VERTICILLATUM L. — R. Champs près de la mare de Siouville. (Delachapelle.)

SCLERANTHUS PERENNIS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*. — RR. Murs granitiques à Flamanville. (Le Jolis.)

Conformément à la remarque faite par M. de Brébisson dans sa flore de la Normandie, 3^e édition, page 113, M. Le Jolis n'aurait-il pas pris pour cette espèce la var. *hybernus* Rchb. du *Scleranthus annuus* L. ?

CHENOPODIUM HYBRIDUM L. — R. Environs de la mare de Tourlaville. (Delachapelle.)

M. Le Jolis citant cette espèce comme assez commune dans nos lieux cultivés, il est évident qu'il l'a confondue avec une autre.

CHENOPODIUM URRICUM L. — Indiqué par M. Delachapelle aux environs de la chapelle du Vœu, aujourd'hui détruite et dont l'emplacement fait actuellement partie du port militaire.

CHENOPODIUM GLAUCUM L. — Mielles de Nacqueville. (Delachapelle.)

CHENOPODIUM FRUTICOSUM L. — PC. Côtes du Val-de-Saire. (Delachapelle.)

Il est douteux que cette plante ait été observée dans les limites mêmes de notre arrondissement.

BLITUM VIRGATUM L. — Sur les fumiers. R. (Delachapelle.)

ATRIPLEX PROSTRATA Bouch. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

ATRIPLEX LACINIATA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

ATRIPLEX PEDUNCULATA L. — R. Canal de retenue à Cherbourg. (Delachapelle.)

AMARANTHUS BLITUM L. — R. Village du Poux, au Rozel. (Delachapelle.)

POLYGONUM MINUS Huds. — AR. Bords des mares: Flamanville, Le Rozel, etc. (Le Jolis.)

Cette plante doit être assez rare dans notre arrondissement pour que M. Le Jolis eût dû faire connaître les noms des autres communes où il semble l'avoir encore observée.

RUMEX PALUSTRIS Sm. — Mare de Tourlaville. (Delachapelle.)

RUMEX DIVARICATUS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

HIPPOPHÆ RHAMNOÏDES L. — R. Marais maritimes du Val-de-Saire. (Delachapelle.)

Il est très probable que cette espèce a été observée hors des limites de notre arrondissement.

SALIX PENTANDRA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

ORCHIS USTULATA L. — R. Lande de Carneville. (Delachapelle.)

ORCHIS MORIO L. — PC. Prairies à Tournaville. (Delachapelle.)

ORCHIS CONOPSEA L. — R. Prairies à Tréauville le long de la Diélette. (Delachapelle.)

ORCHIS PALUSTRIS Jacq. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

ORCHIS MILITARIS DC. — Colline des Terres-Feuillies vers le hameau Quevillon. (Delachapelle.)

OPHRYS MYODES Jacq. — R. Coteaux à Surtainville. (Delachapelle.)

SATYRIUM VIRIDE L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

PARIS QUADRIFOLIA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

CONVALLARIA POLYGONATUM L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

JUNCUS SQUARROSUS L. — R. Marais tourbeux de la Loge, à Tournaville. (Delachapelle.)

JUNCUS OBTUSIFLORUS Ehrh. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*. — AR. Prés, lieux humides du littoral. (Le Jolis.)

JUNCUS TENAGIA Ehrh. — PC. Marais près de la Glacière. (Delachapelle.)

C'est par erreur que M. Le Jolis a indiqué cette espèce comme trouvée à Querqueville par M. Bertrand Lachêné.

CAREX DIOICA L. — Trouvé par M. Delachapelle à Cherbourg dans les marécages où a été creusée depuis la partie sud du bassin de commerce.

CAREX CURTA Good. — R. Mielles de Tournaville. (Delachapelle.)

CAREX STRICTA Good. — Environs de la redoute de Tourlaville. (Delachapelle.)

CAREX ERICETORUM Poll. — R. Falaises de Jobourg. (Delachapelle.)

CAREX PUNCTATA Gaud. — Indiqué par M. Le Jolis comme ayant été trouvé à Fermanville par M. le docteur Lebel.

CAREX FLAVA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

CAREX FULVA Good. — R. Prés tourbeux de la Loge, à Tourlaville. (Delachapelle.)

SCIRPUS CÆSPITOSUS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

SCIRPUS ACICULARIS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

SCIRPUS UNIGLUMIS Link. — Indiqué à Gatteville par MM. Grenier et Godron; trouvé aussi par M. Le Jolis.

ERIOPHORUM LATIFOLIUM Hoppe. — Indiqué sous le nom de POLYSTACHYUM dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

PHALARIS MINOR Retz. — *P. aquatica* Ait. — Plante trouvée pour la première fois dans notre presqu'île par M. Delachapelle, qui l'a observée dans les champs de la côte du Val-de-Saire, près Barfleur. C'est donc à tort que M. de Brébisson, dans sa *Flore de la Normandie*, en a attribué la découverte à M. Le Jolis.

PHALARIS PHLEOÏDES L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

PANICUM CRUS-GALLI L. — R. Mielles de Surtainville et environs de la chapelle Saint-Sauveur sur Cherbourg. (Delachapelle.)

PANICUM VERTICILLATUM L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

ALOPECURUS PRATENSIS L. — R. Prés des environs de Cherbourg et bois du Mont-du-Roc. (Delachapelle.)

AGROSTIS VERTICILLATA Vill. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

GASTRIDIMUM LENDIGERUM Gaud. — *Agrostis lendigera* DC. — TR.
Moissons aux environs de la mare de Vrasville. (Delachapelle.)
— Indiqué aussi par M. Le Jolis comme trouvé par le Dr Lebel
dans le bois de Blanqueville, à Gonneville.

CALAMAGROSTIS EPIGEIOS Roth. — Indiqué par M. Delachapelle
dans son *Catalogue des Graminées*, mais sans citation de
localités.

TRACHYNOTIA STRICTA DC. — Cette graminée, commune dans la
baie de la Hougue, a été indiquée près de la mare de Gatteville
par M. Delachapelle.

AIRA FLEXUOSA L. — Fossés à Ocleville. (Delachapelle.) — RR. Bois
montueux : Le Theil. (Le Jolis.)

AVENA PRATENSIS L. — Cette graminée, indiquée dans le *Guide
du Voyageur à Cherbourg*, a été retrouvée par M. Gustave
Thuret à Biville.

GLYCERIA MARITIMA Wahlenb. — *Poa maritima* Huds. — Indiqué
par M. Delachapelle près du fort du Hommet, à Cherbourg.

POA PALUSTRIS DC. — *P. serotina* Ehrh. — R. Marais de Van-
ville. (Delachapelle.) — Bords des ruisseaux au Theil, et champs
humides du littoral à Naequeville. (Le Jolis.)

POA COMPRESSA L. — Lieux arides et murs. (Delachapelle.)

BROMUS SQUARROSUS L. — M. Delachapelle indique cette plante
dans son catalogue sans citation de localités.

BROMUS MOLLIFORMIS Lloyd. — Bréb., *Fl. Norm.*, 3^e édit. — R.
Sables maritimes de Cherbourg. (De Brébisson.)

N'aurait-on pas pris pour cette espèce la var. *compactus* du *Bromus
mollis* L.? Ce qui le ferait croire, c'est que cette variété, indiquée dans
la 2^e édition de la *Flore de la Normandie*, ne figure plus dans la 3^e.

BROMUS INERMIS L. — Indiqué par M. de Brébisson comme trouvé
à Herqueville par le Dr Lebel.

BROMUS ARVENSIS L. — Cette graminée est indiquée à Urville-
Hague par M. Le Jolis; mais il l'y considère comme introduite.

FESTUCA NEMORUM Leyss. — R. Haies du littoral: falaises de Gré-
ville. (Le Jolis.)

LOLIUM MULTIFLORUM Lamk. — Croît dans les environs et sur les glaciis du port militaire, à Cherbourg. (Delachapelle.)

LOLIUM LINICOLA Sond. — *L. arrense* Schrad. non With. — R. Champs de lin, à Flamanville. (Delachapelle.)

C'est par erreur que, dans la liste des plantes de M. l'abbé Tahard (page 225, 1^{er} vol. du Congrès), cette plante est indiquée à Gatteville. Il faut lire Gatteville, canton de St-Sauveur-le-Vicomte.

TRITICUM PHŒNICOÏDES DC. — Croît sur le littoral du Val-de-Saire. (Delachapelle.)

TRITICUM CANINUM L. — *T. sepium* DC. — M. Delachapelle indiquant cette espèce comme fréquente dans nos haies et nos buissons, il est évident qu'il l'a confondue avec une autre.

SPARGANIUM NATANS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

LEMNA TRISULCA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

SAGITTARIA SAGITTÆFOLIA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*. — Cité aussi par M. Le Jolis comme trouvé à Gonneville par M. le Dr Lebel.

POTAMOGETON PLANTAGINEUS Duer. — Cherbourg. (De Brébisson.) — R. Fossés du littoral: Turlaville, Nacqueville. (Le Jolis.)

La station indiquée par M. Le Jolis paraît insolite pour cette espèce.

POTAMOGETON LUCENS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

POTAMOGETON COMPRESSUS DC. — *P. acutifolius* Link. — PC. Fossés de Querqueville. (Delachapelle.)

POTAMOGETON MARINUS L. — Étang de Gattemare, à Gatteville. (De Gerville.) — Nacqueville. (Delachapelle.)

D'après M. de Brébisson, le véritable *P. marinus* L. ne croît pas en Normandie.

RUPPIA MARITIMA L. — Indiqué par M. Delachapelle. Comme il ne cite pas le *R. rostellata* Koch, il y a lieu de croire que c'est cette dernière espèce qu'il a réellement observée.

PILULARIA GLOBULIFERA L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

POLYPODIUM DRYOPTERIS L. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

POLYSTICHUM ACULEATUM DC. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

POLYSTICHUM CRISTATUM Roth. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*.

POLYSTICHUM CALLIPTERIS DC. — Indiqué dans le *Guide du Voyageur à Cherbourg*. — La plupart des auteurs rapportent cette espèce à la précédente.

TABLEAU DES FAMILLES.

PLANTES VASCULAIRES.

I. PHANÉROGAMES DICOTYLÉDONES.

Monopétales périgynes.

	Pages.		Pages.
COMPOSÉES	47	DIPSACÉES	37
AMBROSIACÉES	35	VALÉRIANÉES	38
LOBÉLIACÉES	35	CAPRIFOLIACÉES	40
CAMPANULACÉES	36	RUBIACÉES	40

Monopétales hypogynes isandrées.

APOCYNÉES	42	POLÉMONIACÉES	45
GENTIANÉES	43	BORRAGINÉES	45
CONVOLVULACÉES	45	SOLANÉES	49

Monopétales hypogynes anisandrées.

PERSONÉES	50	VERBÉNACÉES	67
OROBANCHÉES	58	UTRICULARIÉES	67
LABIÉES	59		

Semi-monopétalées.

	Pages.		Pages.
PLANTAGINÉES	68	OLÉINÉES	72
PLUMBAGINÉES	69	ERICINÉES	73
PRIMULACÉES	69	VACCINIÉES	73
ILICINÉES	72		

Polypétales péri hypogynes.

CÉLASTRINÉES	74	RUHAMNÉES	75
AMPÉLIDÉES	74		

Polypétales périgynes axosporées albuminées.

OMBELLIFÈRES	75	SAXIFRAGÉES	84
ARALIACÉES	84	CRASSULACÉES	85
CORNÉES	84		

Polypétales périgynes pleurosporées.

GROSSULARIÉES	86
---------------	----

Polypétales périgynes axosporées exalbuminées.

ONAGRARIÉES	87	LYTHRARIÉES	90
HALORAGÉES	88	ROSACÉES	90
CALLITRICHINÉES	89	PAPILIONACÉES	99
HIPPURIDÉES	89		

Polypétales hypogynes axosporées.

ACÉRINÉES	409	HYPERICINÉES	410
HIPPOCASTANÉES	409	TILIACÉES	412
POLYGALÉES	409	MALVACÉES	412

	Pages.		Pages.
GÉRANIACÉES	413	RUTACÉES	416
LINÉES	415	BERBÉRIDÉES	416
OXALIDÉES	415	RENONCULACÉES	416

Polypétales hypogynes pleurosporées.

NYMPHÉACÉES	421	RÉSÉDACÉES	433
DROSÉRACÉES	422	CISTINÉES	434
PAPAVÉRACÉES	422	VIOLARIÉES	434
FUMARIACÉES	424	TAMARISCINÉES	436
CRUCIFÈRES	425		

Polypétales cyclosporées.

ELATINÉES	436	PARONYCHIÉES	443
CARYOPHYLLÉES	436	PORTULACÉES	444

Apétales cyclosporées.

CHÉNOPODÉES	444	POLYGONÉES	447
-------------	-----	------------	-----

Apétales orthosporées.

THYMÉLÉES	451	LORANTHACÉES	451
LAURINÉES	451	SANTALACÉES	452

Apétales diclines.

CUCURBITACÉES	452	SALICINÉES	456
EUPHORBIACÉES	452	JUGLANDÉES	458
CÉRATOPHYLLÉES	454	CUPULIFÈRES	458
URTICÉES	454	BÉTULINÉES	459
ULMACEES	455	MYRICÉES	459
PLATANÉES	455	CONIFÈRES	460

II. PHANÉROGAMES MONOCOTYLÉDONES.

Périanthées inférovariées.

	Pages.		Pages.
ORCHIDÉES	460	IRIDÉES	464
AMARYLLIDÉES	462	DIOSCORÉES	465

Périanthées supérovariées.

LILIACÉES	465	JONCÉES	167
ASPARAGÉES	466		

Glumacées.

CYPÉRACÉES	470	GRAMINÉES	479
------------	-----	-----------	-----

Spadiciflores.

TYPHACÉES	495	LEMNACÉES	197
AROÏDÉES	496		

Exalbuminées.

HYDROCHARIDÉES	497	ALISMACÉES	498
BUTOMÉES	498	POTAMÉES	499
JONCAGINÉES	498		

III. CRYPTOGRAMES.

FOUGÈRES	201	LYCOPODIACÉES	208
ÉQUISÉTACÉES	207		

TABLE

DES NOMS LATINS DES GENRES.

Abies, 460.	Anemone, 417.
Acer, 409.	Angelica, 84.
Achillea, 31, 244.	Anthemis, 32, 212.
Aconitum, 424.	Anthoxanthum, 479.
Adonis, 417.	Anthriscus, 82.
Ægopodium, 78.	Anthyllis, 407.
Æsculus, 409.	Antirrhinum, 53.
Æthusa, 80.	Aphanes, 93.
Agrimonia, 93.	Apium, 76.
Agropyrum, 494.	Aquilegia, 420.
Agrostemma, 437.	Arabis, 427.
Agrostis, 484, 249.	Arenaria, 439, 246.
Aira, 483, 220.	Armeria, 69, 243.
Ajuga, 66.	Arrhenatherum, 485.
Alisma, 498.	Artemisia, 29, 244.
Alliaria, 427.	Arum, 496.
Allium, 463.	Asparagus, 466.
Alnus, 459.	Asperula, 44, 242.
Alopecurus, 479, 249.	Aspidium, 205.
Alsine, 139, 246.	Asplenium, 202.
Althæa, 442.	Aster, 34.
Amaranthus, 247.	Astragalus, 244.
Ammi, 78.	Astrantia, 75.
Anacamptis, 464.	Athyrium, 205.
Anagallis, 74.	Atriplex, 446, 247.
Anchusa, 47.	Atropa, 209.
Androsæmum, 444.	Avena, 484, 195, 220.

- Ballota, 66.
 Barbarea, 126, 209.
 Bartsia, 57.
 Bellis, 34.
 Berberis, 116.
 Beta, 144.
 Betonica, 63.
 Betula, 159.
 Bidens, 32.
 Blechnum, 202.
 Blitum, 145, 217.
 Borrago, 48.
 Brachypodium, 192.
 Brassica, 132.
 Briza, 187.
 Bromus, 189, 220.
 Brunella, 63.
 Bryonia, 152.
 Bunium, 78.
 Buplevrum, 79.
 Butomus, 198.
 Buxus, 152.

 Cakile, 130.
 Calamagrostis, 182, 220.
 Calamintha, 61.
 Calendula, 27, 211.
 Callitriche, 89.
 Calluna, 73.
 Caltha, 120.
 Camelina, 129.
 Campanula, 36.

 Cannabis, 155.
 Capsella, 130.
 Cardamine, 128.
 Carduus, 24, 211.
 Carex, 170, 218, 219.
 Carlina, 26.
 Carpinus, 159.
 Castanea, 158.
 Catalpa, 186.
 Caucalis, 214.
 Centaurea, 25, 211.
 Centranthus, 39.
 Centunculus, 71.
 Cephalaria, 37.
 Cerastium, 141, 216.
 Cerasus, 99.
 Ceratophyllum, 154.
 Ceterach, 201.
 Chærophyllum, 83.
 Chamagrostis, 180.
 Cheiranthus, 125.
 Chelidonium, 122.
 Chenopodina, 147.
 Chenopodium, 145, 217.
 Chlora, 44, 212.
 Chrysanthemum, 30.
 Chrysosplenium, 84.
 Cicendia, 44.
 Cichorium, 22.
 Cirsium, 88.
 Cirsium, 23, 211.
 Clematis, 116.

- Cochlearia, 129, 215, 216.
 Comarum, 97.
 Conium, 83.
 Conopodium, 78.
 Convallaria, 167, 218.
 Convolvulus, 45.
 Coriandrum, 83.
 Cornus, 84.
 Coronilla, 99.
 Coronopus, 131.
 Corrigiola, 143.
 Corydalis, 124.
 Corylus, 159.
 Crambe, 132.
 Cratægus, 91.
 Crepis, 18, 210, 211.
 Crithmum, 81.
 Cuscuta, 45.
 Cynodon, 183.
 Cynoglossum, 48.
 Cynosurus, 185.
 Cyperus, 178.
 Cytisus, 107.

 Dactylis, 188.
 Danthonia, 184.
 Daphne, 151.
 Datura, 50.
 Daucus, 81.
 Delphinium, 121.
 Dianthus, 136, 216.
 Digitalis, 55.
 Diotis, 31.
 Diplotaxis, 132.

 Dipsacus, 37.
 Doronicum, 27.
 Draba, 215.
 Drosera, 122.

 Echium, 45.
 Elatine, 136.
 Elodes, 111.
 Elymus, 194.
 Endymion, 166.
 Epilobium, 87.
 Epipactis, 162.
 Equisetum, 207.
 Erica, 73.
 Erigeron, 34.
 Eriophorum, 178, 219.
 Erodium, 113.
 Erophila, 128.
 Eryngium, 75.
 Erysimum, 215.
 Erythræa, 43.
 Eupatorium, 35.
 Euphorbia, 152.
 Euphrasia, 57.
 Evonymus, 74.

 Faba, 102.
 Fagus, 158.
 Falcaria, 213.
 Festuca, 190, 220.
 Ficaria, 119.
 Ficus, 155.
 Filago, 27, 211.
 Foeniculum, 80.

Fragaria, 96.
 Frankenia, 216.
 Fraxinus, 72.
 Fumaria, 124, 215.

Galanthus, 162.
 Galeobdolon, 65.
 Galeopsis, 64, 213.
 Galium, 41, 212.
 Gastridium, 220.
 Gaudinia, 185.
 Genista, 107.
 Gentiana, 44, 212.
 Geranium, 113, 215.
 Geum, 98.
 Glaucium, 123.
 Glaux, 70.
 Glechoma, 62.
 Glyceria, 186, 220.
 Gnaphalium, 28, 211.
 Gypsophila, 216.

Halianthus, 140.
 Hedera, 84.
 Helianthemum, 134.
 Helleborus, 120, 215.
 Helminthia, 20.
 Helosciadium, 77.
 Heracleum, 81.
 Herniaria, 216.
 Hesperis, 126.
 Hieracium, 17, 210.
 Hippocrepis, 214.
 Hippophaë, 217.
 Hippuris, 89.

Holcus, 183.
 Holosteum, 216.
 Hordeum, 193, 195.
 Holtonia, 213.
 Humulus, 155.
 Hutchinsia, 130.
 Hydrocharis, 197.
 Hydrocotyle, 75.
 Hymenophyllum, 206.
 Hyoseyamus, 50.
 Hypericum, 110, 214.
 Hypochaeris, 22.

Iberis, 129.
 Ilex, 72.
 Illecebrum, 216.
 Inula, 32.
 Iris, 164.
 Isatis, 129.
 Jasione, 136.
 Juglans, 158.
 Juncus, 167, 218.

Kæleria, 185.
 Lactuca, 19.
 Lagurus, 181.
 Lamium, 65.
 Lappa, 23.
 Lapsana, 22.
 Larix, 160.
 Lathyrus, 100, 214.
 Laurus, 151.

Lavandula, 66.
 Lavatera, 113, 215.
 Lemna, 197, 221.
 Leontodon, 21.
 Leonurus, 64.
 Lepidium, 130.
 Lepigonum, 216.
 Lepturus, 194.
 Ligustrum, 72.
 Limosella, 54.
 Linaria, 52.
 Linum, 115.
 Listera, 162.
 Lithospermum, 46.
 Littorella, 69.
 Lobelia, 35.
 Lolium, 192, 221.
 Lonicera, 40.
 Loroglossum, 162.
 Lotus, 102.
 Lunaria, 128.
 Luzula, 169.
 Lychnis, 137.
 Lycopodium, 208.
 Lycopsis, 46.
 Lycopus, 60.
 Lysimachia, 70.
 Lythrum, 90.

 Malcolmia, 125, 215.
 Malus, 91.
 Malva, 112.
 Marrubium, 63.
 Matricaria, 31.

Matthiola, 125.
 Medicago, 106.
 Melampyrum, 58.
 Melica, 186.
 Melilotus, 105.
 Melissa, 62.
 Mentha, 59, 242, 213.
 Menyanthes, 44.
 Mercurialis, 153.
 Mespilus, 91.
 Miliun, 182.
 Mœhringia, 140.
 Mœchia, 141.
 Molinia, 186.
 Montia, 144.
 Myosotis, 47.
 Myosurus, 215.
 Myrica, 159.
 Myriophyllum, 88.
 Myrrhis, 83.

 Narcissus, 163.
 Nardus, 194.
 Nasturtium, 127.
 Nepeta, 62.
 Nicotiana, 50.
 Nuphar, 122.
 Nymphæa, 121.

 Obione, 146.
 Ocymum, 66.
 Oenanthe, 79, 213.
 Onobrychis, 99.
 Ononis, 108.

- Onopordum, 25.
 Ophioglossum, 206.
 Ophrys, 162, 218.
 Orchis, 161, 218.
 Origanum, 60.
 Ornithogalum, 165.
 Ornithopus, 99.
 Orobanche, 58, 212.
 Orobus, 100.
 Osmunda, 206.
 Oxalis, 115.

 Panicum, 179, 195, 219.
 Papaver, 123.
 Parietaria, 154.
 Paris, 218.
 Parnassia, 215.
 Pastinaca, 81.
 Pedicularis, 58.
 Peplis, 90.
 Petroselinum, 76.
 Phalaris, 179, 219.
 Phleum, 180.
 Phragmites, 185.
 Phyteuma, 36.
 Pieris, 20.
 Pilularia, 222.
 Pimpinella, 79, 213.
 Pinguicula, 67, 213.
 Pinus, 160.
 Pisum, 102.
 Plantago, 68.
 Platanthera, 160.
 Platanus, 155.

 Poa, 188, 220.
 Polemonium, 43.
 Polycarpon, 143.
 Polygala, 109.
 Polygonatum, 167.
 Polygonum, 117, 217.
 Polypodium, 202, 222.
 Polypogon, 182.
 Polystichum, 204, 222.
 Populus, 157.
 Portulaca, 144.
 Potamogeton, 199, 221.
 Potentilla, 97, 209.
 Poterium, 93.
 Primula, 69.
 Prisma locarpus, 37.
 Prunus, 98.
 Pteris, 202.
 Pulmonaria, 46, 212.
 Pyrus, 90.

 Quereus, 158.

 Radiola, 115.
 Ranunculus, 147, 215.
 Raphanus, 133.
 Reseda, 133.
 Rhamnus, 75.
 Rhinanthus, 57.
 Ribes, 86.
 Robinia, 403.
 Romulea, 164.
 Rosa, 91, 214.
 Rosmarinus, 67.

- Rubia, 212.
 Rubus, 94.
 Rumex, 149.
 Ruppia, 201, 221.
 Ruscus, 167.
 Ruta, 116.

 Sagina, 139.
 Sagittaria, 221.
 Salicornia, 147.
 Salix, 156, 218.
 Salsola, 147.
 Salvia, 62, 67.
 Sambucus, 44.
 Samolus, 71.
 Sanguisorba, 214.
 Sanicula, 75.
 Santolina, 29.
 Saponaria, 136.
 Satureia, 67.
 Satyrium, 218.
 Saxifraga, 84.
 Scabiosa, 38.
 Scandix, 82.
 Schœnus, 176.
 Scilla, 166.
 Scirpus, 176, 219.
 Scleranthus, 144, 216.
 Scolopendrium, 203.
 Scorzonera, 21.
 Scrophularia, 53.
 Scutellaria, 63.
 Secale, 195.
 Sedum, 85, 214.

 Selinum, 214.
 Sempervivum, 86.
 Senecio, 26, 211.
 Serratula, 23.
 Seseli, 214.
 Sherardia, 40.
 Sibthorpia, 54.
 Silene, 137.
 Silybum, 25.
 Sinapis, 131.
 Sison, 77.
 Sisymbrium, 126, 215.
 Sium, 213.
 Smyrnium, 83.
 Solanum, 49, 212.
 Solidago, 34.
 Sonchus, 20, 211.
 Sorbus, 91, 214.
 Sparganium, 196, 221.
 Spergula, 142, 216.
 Spergularia, 143.
 Spinacia, 146.
 Spiræa, 98.
 Spiranthes, 162.
 Stachys, 64.
 Statice, 69, 213.
 Stellaria, 140.
 Symphytum, 48.

 Tamarix, 136.
 Tamus, 165.
 Tanacetum, 29.
 Taraxacum, 19.
 Taxus, 160.

- Teesdalia, 129.
 Teucrium, 66.
 Thalictrum, 116.
 Thesium, 152.
 Thrinicia, 22.
 Thymus, 61, 67.
 Tillaea, 85.
 Torilis, 82.
 Trachynotia, 220.
 Tragopogon, 21, 211.
 Trifolium, 103, 214.
 Triglochin, 198.
 Trigonella, 106.
 Triticum, 195, 221.
 Tussilago, 34.
 Typha, 195.

 Ulex, 107.
 Ulmus, 155.
 Umbilicus, 85.
 Urtica, 154.
 Utricularia, 67, 213.

 Vaccinium, 73.
 Valeriana, 38.
 Valerianella, 39, 212.
 Verbascum, 50.
 Verbena, 67.
 Veronica, 55.
 Viburnum, 40, 212.
 Vicia, 100, 214.
 Villarsia, 212.
 Vinca, 42.
 Viola, 134, 216.
 Viscum, 151.
 Vitis, 74.

 Wahlenbergia, 36.

 Xanthium, 35, 212.

 Zannichellia, 200.
 Zostera, 201.

TABLE

DES NOMS FRANÇAIS DES GENRES.

Ache, 76.	Arrhénathère, 185.
Achillée, 31.	Arroche, 446.
Aconit, 121.	Asperge, 166.
Agripaume, 64.	Aspérule, 41.
Agropyre, 194.	Aspidion, 205.
Agrostemne, 437.	Aster, 34.
Agrostis, 181.	Athyrium, 205.
Aigremoine, 93.	Atrope, 209.
Ail, 165.	Aubépine, 91.
Airelle, 73.	Aulne, 159.
Ajonc, 107.	Avoine, 184, 195.
Alliaire, 127.	
Alpiste, 179.	Ballote, 66.
Alsine, 139.	Barbarée, 126, 209.
Ammi, 78.	Bardane, 23.
Anacampte, 161.	Bartsie, 57.
Ancolie, 120.	Basilic, 66.
Androsème, 111.	Benoîte, 98.
Anémone, 117.	Berce, 81.
Angélique, 81.	Bétoine, 63.
Ansérine, 145.	Bette, 444.
Anthrisque, 82.	Bident, 32.
Anthyllide, 107.	Blechné, 202.
Aphane, 93.	Blite, 445.
Arabette, 127.	Boucage, 79.
Arméria, 69.	Bouleau, 159.
Armoise, 29.	Bourrache, 48.

- Brachypode, 192.
 Brize, 487.
 Brome, 189.
 Brunelle, 63.
 Bruyère, 73.
 Bryone, 152.
 Bugle, 66.
 Buglosse, 47.
 Bugrane, 108.
 Buis, 152.
 Bunium, 78.
 Buplèvre, 79.
 Butome, 198.

 Calamagrostis, 182.
 Calament, 61.
 Callitrique, 89.
 Callune, 73.
 Cameline, 129.
 Camomille, 32.
 Campanule, 36.
 Canche, 183.
 Capselle, 130.
 Caquillier, 130.
 Cardamine, 128.
 Cardère, 37.
 Carline, 26.
 Carotte, 81.
 Catabrose, 186.
 Centaurée, 25.
 Centenille, 71.
 Centranthe, 39.
 Céphalaire, 37.
 Céraiste, 141.

 Cerfeuil, 83.
 Cerisier, 99.
 Cétérach, 201.
 Chamagrostis, 180.
 Chanvre, 155.
 Chardon, 24.
 Charme, 159.
 Châtaignier, 158.
 Chélidoine, 122.
 Chêne, 158.
 Chénopodine, 147.
 Chèvrefenille, 40.
 Chicorée, 22.
 Chiendent, 183.
 Chlore, 44.
 Choin, 176.
 Chon, 132.
 Chrysanthème, 20.
 Cicendie, 44.
 Ciguë, 83.
 Cireée, 88.
 Cirse, 23.
 Clématite, 116.
 Cochléaria, 129.
 Comaret, 97.
 Conopode, 78.
 Consoude, 48.
 Coriandre, 83.
 Cornille, 154.
 Cornoniller, 81.
 Coronille, 99.
 Coronope, 131.
 Corrigiole, 143.
 Corydalis, 124.

Cotonnière, 27.

Coudrier, 159.

Crambé, 132.

Crépide, 18.

Cresson, 127.

Crithme, 81.

Cuscute, 45.

Cynoglosse, 48.

Cynosure, 185.

Cyprès, 160.

Dactyle, 188.

Danthonie, 184.

Daphné, 151.

Datura, 50.

Dauphinelle, 121.

Digitale, 55.

Diotis, 31.

Diploxaxis, 132.

Doradille, 202.

Dorine, 84.

Doronic, 27.

Egopode, 78.

Elatine, 136.

Elode, 111.

Elyme, 194.

Endymion, 166.

Epervière, 17.

Epiaire, 64.

Epilobe, 87.

Epinard, 146.

Epipactis, 162.

Erable, 109.

Erodium, 113.

Erophile, 128.

Erythrée, 43.

Ethuse, 80.

Eupatoire, 35.

Euphorbe, 152.

Euphrase, 57.

Fenouil, 80.

Féluque, 190.

Fève, 102.

Ficaire, 119.

Figuier, 155.

Flouve, 179.

Fluteau, 198.

Fragon, 167.

Fraisier, 96.

Frêne, 72.

Froment, 195.

Fumeterre, 124.

Fusain, 74.

Gaillet, 41.

Galanthine, 162.

Galéobdolon, 65.

Galéopsis, 64.

Gaudinie, 185.

Genêt, 107.

Genévrier, 160.

Géranium, 113.

Germandrée, 66.

Gesse, 100.

Giroflée, 125.

Glaucière, 123.

Glaux, 70.	Jusquiamé, 50.
Gléehome, 62.	Kœlérie, 185.
Glycérie, 186.	Lagurier, 181.
Gnaphale, 28.	Laiche, 170.
Gnavelle, 144.	Laitron, 20.
Gouet, 196.	Laitue, 19.
Grassette, 67.	Lamier, 65.
Grémil, 46.	Lampsane, 22.
Groseillier, 86.	Laurier, 151.
Gui, 151.	Lavande, 66.
Guimauve, 112.	Lenticule, 197.
Halianthe, 140.	Lepture, 194.
Hélianthème, 134.	Lierre, 84.
Hellébore, 120.	Lilas, 72.
Helminthie, 20.	Limoselle, 54.
Hélosciadie, 77.	Lin, 115.
Hêtre, 158.	Linaigrette, 178.
Houblon, 155.	Linaire, 52.
Houque, 183.	Liondent, 21.
Houx, 72.	Liseron, 45.
Hutchinsie, 130.	Listère, 162.
Hydrocotyle, 75.	Littorelle, 69.
Hyménophylle, 206.	Lobélie, 35.
If, 160.	Loroglosse, 162.
Inule, 22.	Lotier, 102.
Iris, 164.	Luzerne, 106.
Ivraie, 192.	Luzule, 169.
	Lychnide, 137.
Jasione, 136.	Lycopé, 60.
Jonc, 167.	Lycopode, 208.
Joubarbe, 86.	Lycopside, 46.
Julienne, 126.	Lysimaque, 70.

- Maceron, 83.
Malcolmie, 125.
Marrube, 63.
Massette, 195.
Matricaire, 31.
Matthioler, 125.
Mauve, 112.
Mélampyre, 58.
Mélèze, 160.
Mélilot, 105.
Mélisque, 186.
Mélisse, 62.
Menthe, 59.
Ményanthe, 44.
Mercuriale, 153.
Millepertuis, 110.
Millet, 182.
Mœhringie, 140.
Mœnchie, 141.
Molène, 50.
Molinie, 186.
Montie, 144.
Morelle, 49.
Morrène, 197.
Mouron, 71.
Mufler, 53.
Muguet, 167.
Myrica, 159.
Myriophylle, 88.

Narcisse, 163.
Nard, 194.
Néflier, 91.
Nénuphar, 121.

Népéta, 62.
Nerprun, 75.
Noyer, 158.
Nuphar, 122.

Obione, 146.
OEillet, 136.
OEnanthe, 79.
Ombilie, 85.
Onoporde, 25.
Ophioglosse, 206.
Ophrys, 162.
Orchis, 161.
Orge, 193, 195.
Origan, 60.
Orme, 155.
Ornithogale, 165.
Ornithope, 99.
Orobanche, 58.
Orobe, 100.
Orpin, 85.
Ortie, 154.
Osmonde, 206.
Oxalide, 115.

Panais, 81.
Panic, 179.
Panicaut, 75.
Pâquerette, 34.
Pariétaire, 154.
Passerage, 130.
Pastel, 129.
Paturin, 188.
Pavot, 123.

- Pédiculaire, 58.
 Péplide, 90.
 Persil, 76.
 Pervenche, 42.
 Pesse, 89.
 Peuplier, 157.
 Phléole, 180.
 Phragmite, 185.
 Pieride, 20.
 Pigamon, 116.
 Pimprenelle, 93.
 Pin, 160.
 Pissenlit, 19.
 Plantain, 68.
 Platane, 155.
 Platanthère, 160.
 Poirier, 90.
 Pois, 102.
 Polycarpe, 143.
 Polygala, 109.
 Polygonate, 167.
 Polypode, 202.
 Polypogon, 182.
 Polystic, 204.
 Pommier, 91.
 Populage, 120.
 Porcelle, 22.
 Potamot, 199.
 Potentille, 97, 209.
 Pourpier, 144.
 Prêle, 207.
 Primevère, 69.
 Prismatocarpe, 37.
 Frunier, 98.
 Ptéride, 202.
 Pulmonaire, 46.
 Radiole, 115.
 Radis, 133.
 Raiponce, 36.
 Renoncule, 117.
 Renouée, 147.
 Réséda, 133.
 Rhinanthé, 57.
 Robinier, 103.
 Romarin, 67.
 Romulée, 164.
 Ronce, 94.
 Rosier, 91.
 Rossolis, 122.
 Rubanier, 196.
 Rue, 116.
 Rumex, 149.
 Ruppie, 201.
 Sabline, 139.
 Sagine, 139.
 Salicaire, 90.
 Salicorne, 147.
 Salsifis, 21.
 Samole, 71.
 Sanicle, 75.
 Sapin, 160.
 Sarrette, 23.
 Sarriette, 67.
 Sauge, 62, 67.
 Saule, 156.
 Saxifrage, 84.

- Scabieuse, 38.
 Scandix, 82.
 Scille, 166.
 Scirpe, 176.
 Scolopendre, 203.
 Scorpione, 47.
 Scorzonère, 21.
 Scrophulaire, 53.
 Scutellaire, 63.
 Seigle, 195.
 Seneçon, 26.
 Sénévé, 131.
 Shérarde, 40.
 Sibthorpie, 54.
 Silène, 137.
 Silybe, 25.
 Sison, 77.
 Sisymbre, 126.
 Solidage, 34.
 Sorbier, 91.
 Souchet, 178.
 Soude, 147.
 Spargoute, 142.
 Spergulaire, 143.
 Spiranthe, 162.
 Spirée, 98.
 Statice, 69.
 Stellaire, 140.
 Surcan, 44.
 Tamarix, 136.
 Tamer, 165.
 Tanaisie, 29.
 Teesdalie, 129.
 Thésion, 152.
 Thrincie, 22.
 Thym, 61, 67.
 Thuya, 160.
 Tillée, 85.
 Torilis, 82.
 Trèfle, 103.
 Trigonelle, 106.
 Troène, 72.
 Troseart, 198.
 Tussilage, 34.
 Utriculaire, 67.
 Valériane, 38.
 Valérianelle, 39.
 Vergerette, 34.
 Véronique, 55.
 Verveine, 67.
 Vesce, 100.
 Vigne, 74.
 Violette, 134.
 Viorne, 40.
 Vipérine, 45.
 Vulpin, 179.
 Wahlenbergie, 36.
 Zannichelle, 200.
 Zostère, 202.

TABLE

DES

NOMS DES GENRES CITÉS COMME SYNONYMES.

<i>Absinthium</i> , 29.	<i>Aspidium</i> , 204, 205.
<i>Aceras</i> , 161, 162.	<i>Asplenium</i> , 201, 203, 205.
<i>Acrostichum</i> , 204.	<i>Aster</i> , 32, 33.
<i>Adenarium</i> , 140.	<i>Astrantia</i> , 75.
<i>Agraphis</i> , 166.	<i>Athanasia</i> , 31.
<i>Agraulus</i> , 181.	<i>Atriplex</i> , 146.
<i>Agrostis</i> , 180, 182, 220.	<i>Avena</i> , 183, 184, 185.
<i>Aira</i> , 186.	
<i>Airopsis</i> , 183.	<i>Baldingera</i> , 179.
<i>Alchemilla</i> , 93.	<i>Barkhausia</i> , 19, 211.
<i>Alopecurus</i> , 182.	<i>Batrachium</i> , 117, 118.
<i>Alsine</i> , 140, 143.	<i>Behen</i> , 137.
<i>Ammophila</i> , 182.	<i>Betula</i> , 159.
<i>Anchusa</i> , 46.	<i>Brassica</i> , 131.
<i>Anethum</i> , 80.	<i>Bromus</i> , 192.
<i>Antirrhinum</i> , 52, 53.	<i>Buglossum</i> , 47.
<i>Apargia</i> , 21.	<i>Bugula</i> , 66.
<i>Aparine</i> , 42.	<i>Bunias</i> , 130.
<i>Apium</i> , 76, 78.	<i>Bunium</i> , 78.
<i>Aporanthus</i> , 106.	
<i>Arctium</i> , 23.	<i>Calamagrostis</i> , 179.
<i>Arenaria</i> , 139, 140, 143.	<i>Calamintha</i> , 62.
<i>Arundo</i> , 179, 182, 185.	<i>Calcitrapa</i> , 26.

- Calystegia*, 45.
Campanula, 36, 37.
Cardiaca, 64, 65.
Carduus, 23, 24, 25.
Carum, 78.
Caryolopha, 47.
Cassida, 63.
Cataria, 62.
Cuculis, 82.
Cerastium, 141.
Chærophyltum, 82.
Chætophora (au lieu de *Chætophom*), 176.
Chamædrys, 66.
Chamæmelum, 32.
Chamænerium, 87.
Chamomilla, 31, 32.
Cheiranthus, 125.
Chelidonium, 123.
Chenopodium, 145, 147.
Chilochloa, 180.
Chironia, 43.
Chondrilla, 49.
Chrysurus, 186.
Cicuta, 83.
Cineraria, 27.
Cistus, 134.
Clinopodium, 61.
Cnicus, 24.
Cochlearia, 131.
Conringia, 128.
Conrallaria, 167.
Conyza, 33.
Coronaria, 137.
Corvisartia, 32.
Cotyledon, 85.
Cracca, 101.
Cucubalus, 137.
Cyanus, 26.
Cystopteris, 205.
Cytisus, 107.
Deschampsia, 183.
Digitaria, 183.
Digraphis, 179.
Dipsacus, 37.
Draba, 128.
Eleocharis, 176, 178.
Enodium, 186.
Epipactis, 162.
Erica, 73.
Eriolepis, 24.
Errum, 101, 102.
Erysimum, 126, 127.
Esmarchia, 142.
Eufragia, 57.
Exacum, 44.
Fagus, 158.
Fedia, 39.
Festuca, 184, 186, 187, 190, 192.
Fragaria, 97.
Frangula, 75.
Fumaria, 124.
Galeopsis, 65.
Gentiana, 43, 44.

- Geranium*, 113.
Githago, 137.
Glyceria, 186.
Gnaphalium, 27, 28, 211.
Grammitis, 201.
Guepinia, 129.

Habenaria, 160.
Halimus, 146.
Hedypnoïs, 19.
Hesperis, 125, 127.
Honkeneja, 140.
Hyacinthus, 166.
Hydrocotyle, 77.
Hypericum, 111.

Iberis, 129.
Imperatoria, 81.
Isolepis, 176, 177.
Ixia, 164.

Jacea, 26.
Juncus, 169, 170.

Knappia, 180.
Knautia, 38.

Lamium, 65.
Lampsana, 22.
Lapathum, 149, 150.
Larbrea, 141.
Lastrea, 204, 205.
Lathyrus, 100.
Leontodon, 19, 22.

Lepidium, 130, 131.
Lepigonum, 143.
Lerouxia, 70.
Leucanthemum, 30.
Limbarda, 33.
Linum, 115.
Logfia, 28.
Lychnis, 137.

Maruta, 32.
Matricaria, 30, 31.
Melandrium, 137.
Melica, 186.
Melissa, 61.
Mespilus, 91.
Microcala, 44.
Myagrurn, 129.
Myrrhis, 83.

Nardosmia, 35.
Neottia, 162.
Nepeta, 62.
Nephrodium, 204.
Nymphæa, 122.

Odontites, 57.
Omphalodes, 47.
Oporinia, 22.
Ophiurus, 194, 195.
Ophrys, 162.
Orchis, 160, 161, 162.
Ormenis, 32.
Osmunda, 202.
Otanthus, 31.

- Oxys*, 115.
Panicum, 183.
Paspalum, 183.
Petasites, 35.
Phalaris, 180.
Phelipæa, 58, 59.
Phœnixopus, 49.
Phucagrostis, 201.
Picris, 20.
Plantago, 69.
Poa, 186, 187, 191, 192, 220.
Pollichia, 65.
Polypodium, 204, 205.
Polystichum, 205.
Potentilla, 97.
Prenanthes, 19.
Prunella, 63.
Prunus, 99.
Psamma, 182.
Pulegium, 60.
Pulicaria, 33.
Pyrethrum, 30, 31.
Pyrus, 91.

Ranunculus, 119.
Rhynchospora, 176.
Roripa, 127.
Rottboellia, 194, 195.

Sabulina, 139.
Sagina, 141, 142.
Santolina, 31.
Sarothamnus, 107.

Satyrium, 162.
Scandix, 82, 83.
Schoberia, 147.
Schœnodoros, 191, 192.
Scilla, 166.
Sclerochloa, 187, 192.
Scleropoa, 192.
Scorodonia, 66.
Selinum, 81, 255.
Senebiera, 131.
Senecio, 33.
Serapias, 162.
Serrafalcus, 189, 190.
Serratula, 23.
Seseli, 77, 78.
Setaria, 179.
Silene, 137.
Sison, 76, 77, 78.
Sisymbrium, 127, 128, 132.
Sium, 76, 77, 78.
Spartium, 107.
Specularia, 37.
Spergella, 142.
Spirodela, 197.
Stachys, 63.
Statice, 69.
Sturmia, 180.
Suxda, 147.
Succisa, 38.
Syringa, 72.

Teesdalia, 130.
Telmatophace, 197.
Tephrosieris, 27.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Tetrahit</i> , 64. | <i>Triodia</i> , 184. |
| <i>Thlaspi</i> , 130. | <i>Tripleurospermum</i> , 30, 31. |
| <i>Thymus</i> , 61. | <i>Tripolium</i> , 34. |
| <i>Tithymalus</i> , 152, 153. | <i>Trisetum</i> , 184. |
| <i>Tordylium</i> , 82. | <i>Triticum</i> , 192, 194. |
| <i>Tormentilla</i> , 97. | <i>Trixago</i> , 57. |
| <i>Tragoselinum</i> , 78, 79. | <i>Turritis</i> , 128.* |
| <i>Trichera</i> , 38. | |
| <i>Trichodium</i> , 181. | <i>Valantia</i> , 41. |
| <i>Trichomanes</i> , 206. | <i>Valeriana</i> , 39. |
| <i>Trichonema</i> , 164. | <i>Vulneraria</i> , 107. |
| <i>Trifolium</i> , 106. | <i>Vulpia</i> , 190. |
-

TABLE

DES NOMS VULGAIRES.

Un assez grand nombre de noms vulgaires qui figurent dans cette table n'ont pas été cités à part dans l'intérieur même du Catalogue, parce qu'ils se trouvent renfermés dans les désignations françaises des espèces auxquelles ils appartiennent. Exemples: *Douce-amère*, *Absinthe*, *Lierre-terrestre*, *Poirre-d'eau*, etc., compris dans les dénominations MORELLE DOUCE-AMÈRE, ARMOISE ABSINTHE, GLÉCHOME LIERRE-TERRESTRE, RENOUÉE POIVRE D'EAU, etc.

<i>Absinthe</i> , 29.	<i>Bec de bourre</i> , 122.
<i>Ache des chiens</i> , 80.	<i>Bec de grue</i> , 114.
<i>Ache noire</i> , 83.	<i>Behen rouge</i> , 39.
<i>Aiguilles</i> , 82.	<i>Bêle</i> , 77.
<i>Aiguilles à la Vierge</i> , 128.	<i>Belladone</i> , 209.
<i>Alleluia</i> , 115.	<i>Betterave</i> , 145.
<i>Amauroque</i> , 30.	<i>Bézards</i> , 131.
<i>Amourette</i> , 188.	<i>Bigarreautier</i> , 99.
<i>Argentine</i> , 98.	<i>Blanquette</i> , 147.
<i>Arrête-bœuf</i> , 108.	<i>Blattaire</i> , 51.
<i>Aster maritime</i> , 34.	<i>Blé noir</i> , 149.
<i>Aunée</i> , 32.	<i>Bleuet</i> , 26.
<i>Acron</i> , 184.	<i>Blosses</i> , 99.
	<i>Bluets</i> , 26.
<i>Barbe de bouc</i> , 162.	<i>Bois de Riville</i> , 72.
<i>Bassinot</i> , 119.	<i>Bois jan</i> , 107.
<i>Baumes</i> , 60.	<i>Bonnet carré</i> , 74.
<i>Beccabunga</i> , 55.	<i>Bonnet de prêtre</i> , 74.

- Bouillon blanc*, 50.
Bouillon noir, 51.
Boulard, 159.
Bourdaïne, 75.
Bourdonnière, 25.
Bourgène, 75.
Bourse, 39.
Bourse à pasteur, 130.
Bourslette, 39.
Bouton d'or, 119.
Branc-ursine, 81.
Brugère, 73.
- Caille-lait blanc*, 41.
Caille-lait jaune, 41.
Camomille romaine, 32.
Capillaire noir, 202.
Capillaires, 203.
Cardes, 145.
Casques, 121.
Casse-lunettes, 57.
Cataire, 62.
Céleri, 76.
Céleri saurage, 76.
Centinode, 148.
Cerfeuil cultivé, 82.
Cerfeuil perpétuel, 83.
Chanvre d'eau, 32.
Chanvre sauvage, 64.
Chanvrin, 64.
Chardon étoilé, 26.
Chardon-Marie, 25.
Chardon hémorrhoidal, 23.
Chardon-Roland, 75.
- Chasse-bosse*, 70.
Chausse-trape, 26.
Chereux de la Vierge, 45.
Chereux Saint-Jean, 45.
Chiendent, 194.
Chiendent à chapelets, 185.
Chou marin, 132.
Chuë, 77, 83.
Cinq-doigts, 120.
Citronnelle, 62.
Claquets, 55.
Clinopode, 61.
Clochettes, 45.
Clochette des champs, 45.
Cochène, 109.
Cola, 132.
Compagnon blanc, 137.
Compagnon rouge, 137.
Conyze, 33.
Coquelicot, 123.
Coquelourde, 137.
Corne-de-cerf, 68, 131.
Cornouiller femelle, 84.
Coudre, 159.
Couleurrée, 152.
Coresce, 101.
Cresson alénois, 130.
Cresson de cheral, 77.
Cresson de fontaine, 127.
Cresson des prés, 128.
Cresson perpétuel, 126.
Cressonnette, 128.
Crête de coq, 57.
Crin végétal, 201.

- Criste-marine*, 81, 147.
Croisette, 41.
Curage, 148.
Cymbalaire, 52.
Cynorrhodons, 93.
Cytise à grappes, 107.

Dame d'onze heures, 165.
Doche, 151.
Doque, 151.
Double feuille, 162.
Douce-amère, 49.
Doucette, 39.
Doure, 75.

Ecuelle d'eau, 75.
Eglantiers, 93.
Enula campana, 32.
Epi à la Vierge, 36.
Epine blanche, 91.
Epine noire, 98.
Epine-Vinette, 116.
Epingles à la Vierge, 114.
Esparcette, 99.
Etoile d'eau, 89.
Euphorbe des jardins, 153.

Faines, 158.
Farouche, 105.
Fausse angélique, 78.
Fausse queue-de-rat, 190.
Fausse scabieuse, 36.
Faux fraisier, 97.
Faux liseron, 149.

Faux panais, 81.
Faux persil, 80.
Faux platane, 109.
Faux saule, 159.
Faux seigle, 193.
Fenouil de mer, 81.
Feu sauvage, 113.
Flaque, 164.
Fleur de coucou, 137.
Foirolle, 153.
Fougère commune, 202.
Fougère femelle, 205.
Fougère mâle, 204.
Fougerolle, 202.
Fragonnier, 167.
Fraisier ananas, 97.
Fraisier des bois, 96.
Fraisier stérile, 97.
Framboisier, 94.

Gants de Notre-Dame, 120.
Gazillon, 101.
Gazon de Mahon, 125.
Gazon d'Olympe, 69.
Gaude, 133.
Génotes, 78.
Giroflée jaune des murs, 125.
Giroflée de Mahon, 125.
Glajeux, 164.
Glayeul des marais, 164.
Gliéru, 84.
Glouteron, 23.
Gloutonnier, 23.
Godets, 85.

- Gradillier*, 87.
Grande chûe, 80.
Grande ciguë, 83.
Grande fougère, 202.
Grande marguerite, 30.
Grande mauve, 112.
Grande ortie, 154.
Grande oseille, 149.
Grande pâquerette, 30.
Gratteron, 42.
Grenouillette, 118, 197.
Grisette, 46.
Gueule de lion, 53.
Guezette, 152.
Gueignier, 99.

Hagues, 91.
Han, 178.
Hane, 25.
Hanette, 172.
Hannebanne, 50.
Hanon, 25.
Héliotrope d'hiver, 35.
Herbe à coton, 27, 478.
Herbe à la biche, 153.
Herbe à la chardronnette, 26.
Herbe à la couleurre, 161.
Herbe à la coupure, 85.
Herbe à Robert, 113.
Herbe au charpentier, 31.
Herbe aux chantres, 126.
Herbe aux chats, 62.
Herbe aux coupures, 38.
Herbe aux écouelles, 54.

Herbe aux écus, 71.
Herbe aux gouteux, 78.
Herbe aux gueux, 116.
Herbe aux mites, 51.
Herbe aux oies, 98.
Herbe aux perles, 46.
Herbe aux poux, 58.
Herbe aux puces, 33.
Herbe aux sorcières, 88.
Herbe aux verrues, 122, 153.
Herbe aux ripères, 45.
Herbe blanche, 31.
Herbe dorée, 84.
Herbe de pirotte, 121, 122.
Herbe du siège, 54.
Herbe grasse, 85.
Herbe Sainte-Barbe, 126.
Herbe Saint-Jacques, 27.
Herbe Saint-Jean, 29.
Herbe Saint-Roch, 33.
Herbe terrée, 62.
Herbet, 201.
Hirernage, 100.
Hyacinthe des bois, 166.

Immortelle maritime, 31.
Immortelles, 29.
Iris gigot, 164.

Jacobée, 27.
Jaile, 177.
Jan, 107.
Jaunets, 119.
Jonc des jardiniers, 168.

- Jonc fleuri*, 193.
Landes, 107.
Langue de bœuf, 203.
Langue de cerf, 203.
Langue de chien, 43.
Lauréole, 151.
Laurette, 151.
Laurier-cerise, 99.
Laurier Saint-Antoine, 87.
Laurier-tin, 40.
Lentilles d'eau, 197.
Lierre-terrestre, 62.
Liguolet, 45.
Lilas des murs, 39.
Lin sauvage, 115.
Liot, 45.
Lis des étangs, 121.
Lucets, 73.
Lupuline, 106.
Lycopode, 208.

Mâche, 39.
Manchettes de la Vierge, 45, 140.
Marceau, 157.
Marguerite dorée, 30.
Marjolaine sauvage, 60.
Maroute, 32.
Marronnier d'Inde, 109.
Marrube aquatique, 60.
Marrube blanc, 63.
Marrube noir, 66.
Matricaire, 30.

Mélier, 91.
Menuchon, 140.
Menuchon rouge, 71.
Mercuriale des bois, 153.
Merisier, 99.
Mil, 195.
Millegreux, 182.
Millet, 195.
Millet des oiseaux, 195.
Minette, 106.
Mondria, 206.
Monnaie du pape, 128.
Morgeline, 140.
Moriauquemin, 63.
Mors du diable, 38.
Moures, 96.
Mourets, 73.
Mouron blanc, 140.
Mouron d'eau, 71.
Moutarde blanche, 131.
Moutarde noire, 131.
Musfle de veau, 53.
Muguet bleu, 166.
Mullu, 30, 33.
Mullu blanc, 30.
Mûres sauvages, 96.
Myrtille, 73.

Naret, 132.
Navette, 132.
Navette d'hiver, 132.
Ne m'oubliez pas !!, 47.
Nielle, 137.
Noisetier, 159.

Nombril de Vénus, 85.

Nummulaire, 71.

Obier, 40.

Œil de perdrix, 137.

Oreille de rat, 18.

Ortie blanche, 65.

Ortie grêche, 154.

Ortie jaune, 65.

Ortie morte, 64.

Ortie puante, 64.

Ortie rouge, 65.

Ortie royale, 64.

Oseille, 149.

Osier blanc, 156.

Osier brun, 156.

Osier fleuri, 87.

Osier franc, 156.

Osier jaune, 156.

Osier rouge, 156.

Osier vert, 156.

Pain à coucou, 115.

Pain de couleuvre, 161.

Pâquette, 34.

Pavelle, 151.

Parencœur, 111.

Pas-d'âne, 34.

Passe-pierre, 147.

Patience rouge, 150.

Patience saurage, 151.

Patte d'oie, 44.

Paves, 196.

Parot cornu, 123.

Peigne de Vénus, 82.

Peignes, 37.

Pensée saurage, 135.

Pensées, 135.

Pentecôte, 128.

Perce-neige, 162.

Perce-pierre, 33, 81.

Perce-pouche, 82.

Persicaire, 148.

Pétasite, 35.

Petit capillaire, 203.

Petit houx, 167.

Petit muguet, 41.

Petit trèfle jaune, 106.

Petite centaurée, 43.

Petite ciguë, 80.

Petite douce, 118.

Petite marguerite, 34.

Petite mauve, 112.

Petite ortie, 154.

Petite oseille, 149.

Petite sauge, 67.

Peuplier de Virginie, 158.

Peuplier d'Italie, 158.

Pied d'alouette des champs,
121.

Pied de lierre, 104.

Pied-d'oiseau, 99.

Pied-pot, 119.

Pilettes, 197.

Piloselle, 18.

Piquets, 107.

Pisaille, 102.

Plane, 109.

- Plantain d'eau*, 198.
Plantain femelle, 68.
Plantain mâle, 68.
Poirée, 145.
Pois gris, 102.
Poirre-d'eau, 148.
Polypode de chêne, 202.
Pomme épineuse, 50.
Pomme de terre, 49.
Pommelière, 120.
Porion, 163.
Poudre à vers, 29.
Pouliot, 60.
Pruneroie, 70.
Prunelles, 99.
Prunellier, 98.
Pruniolle, 70.
Pulicaire, 33.

Quenouille, 196.
Queue de cheval, 89, 207.
Queue d'écureuil, 190.
Queue de lapin, 181.
Queue de souris, 193.
Quintefeuille, 98.

Rabioule, 132.
Raiponce, 36.
Raisin du diable, 152, 165.
Rarenelle, 125.
Ray-grass, 193.
Reine des prés, 98.
Reprise, 85.
Réveille-matin, 153.

Roquette de mer, 130.
Rôs, 185.
Roseau, 179, 191.
Roseau à balais, 185.
Roseau des étangs, 196.
Rose des mares, 121.
Rosier de chien, 92.
Rue des murailles, 203.

Sainfoin, 99.
Sang de dragon, 150.
Sarrasin, 149.
Sauge des bois, 66.
Saule pleureur, 157.
Sceau de Salomon, 167.
Senille, 145.
Serançon, 26.
Serpolet, 61.
Sersifis, 21.
Sen, 40.
Siberi, 149.
Soldanelle, 45.
Sonnettes, 57.
Souci d'eau, 120.
Souci des marais, 120.
Souffloure, 81.
Soufre végétal, 208.
Stramoine, 50.
Succise, 38.
Sucets, 40.
Suie d'enfer, 54.
Surelle, 149.
Sycamore, 109.
Sylvie, 117.

- Tétards*, 25.
Tête de mort, 53.
Tétine de souris, 85.
Tétrahit, 64.
Thé d'Europe, 55.
Thlaspi, 129.
Thym de crapaud, 85.
Tithymale, 153.
Toque, 63.
Tormentille, 97.
Trainasse, 148.
Trèfle blanc, 103.
Trèfle d'eau, 44.
Trèfle des marais, 44.
Trèfle oseille, 115.
Trèfle rouge, 105.
Trèfle semeur, 104.
Tremblotte, 188.
Triolet, 103.
Turneps, 132.

Ulmaire, 98.

Vaudre, 133.
Velrote, 52.
Verge d'or, 34.
Verge de pasteur, 37.
Vermiculaire, 85.
Véronique femelle, 56.
Véronique mâle, 55.
Vesceron, 101.
Vesce saurage, 101.
Vigne blanche, 116.
Vignolet, 116.
Vimple, 196.
Violier, 125.
Volant d'eau, 88.
Voussol, 159.
Vrillée, 45, 149.

Yèble, 40.
Ypréau, 157.
-

OMISSA.

A placer dans la famille des Ombellifères, immédiatement avant le genre *Angelica* :

***Selinum* L. — *Sétin*.**

S. CARVIFOLIA L. — *S. A FEUILLES DE CARVI*. — *S. daucifolia* Chevall. — *Angelica tenuifolia* Riv. 24. Juillet-septembre. TR. SURTAINVILLE: bois de la Poupardière et de la Baronnerie.

Page 18, ligne 4, ajouter aux localités citées pour l'*HIERACIUM SYLVATICUM* Lamk. : SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC: haie près de l'église.

Page 138, l. 6, pour le *SILENE ANNULATA* Thore, ajouter: FERMANVILLE.

Page 173, l. 5, pour le *CAREX ACUTA* L., ajouter aux localités: CHERBOURG: bord d'une mare sur le haut de la montagne du Roule.

Page 176, l. 2, pour le *CAREX VESICARIA* L., ajouter: SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC: bord de la Divette, dans le sud-est de la commune.

Page 187, l. 23, pour le *GLYCERIA PROCUMBENS* Sm., ajouter: littoral de TOURLAVILLE.

Page 190, l. 15, pour le *BROMUS GIGANTEUS* L., ajouter aux localités: SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC: le manoir.

ERRATA.

De la page 18 à la page 33, partout où il y a De., substituez DC.

Page 22, ligne 14, le signe de durée de l'HYPOCHÆRIS GLABRA L. doit être ☉ au lieu de ☿.

Même page, l. 18, après le signe de durée, ajoutez pour l'époque de la floraison du CICHORIUM INTYBUS L.: Juillet-septembre.

Page 26, l. 1, au lieu de *C. Bleuet*, il faut: *C. BLEUET*.

Page 32, l. 16, au lieu de BRICQUEBOS, lisez: BRICQUEBOSQ.

Même page, l. 25, au lieu de H. HELENIUM, lisez: I. HELENIUM.

Page 35, l. 1, supprimez la virgule après *Petasites*.

Page 40, l. 49, au lieu de naturaltsé, lisez: naturalisé.

Page 43, l. 8, au lieu de Fries, lisez Fries.

Même page, l. 22, lisez: Var. *b. E. capitata*.

Page 48, l. 2, le signe de durée du MYOSOTIS CÆSPITOSA Schultz doit être ☽ au lieu de ☉.

Page 55, l. 5, au lieu de Marintvast, lisez: Martinvast.

Même page, l. 41, au lieu de manque, lisez: manque.

Même page, l. 24, au lieu de *rosea*, lisez: *rosea*.

Page 57, l. 6, après le signe de durée, ajoutez, pour l'époque de la floraison du BARTSIA VISCOSA L.: Juin-septembre.

Même page, l. 20, au lieu de *erotina*, lisez: *serotina*.

Page 62, l. 2, au lieu de (*Citronelle*), lisez: (*Citronnelle*).

Page 67, l. 18, ajouter le signe R. pour le PINGUICULA LUSITANICA.

Page 86, l. 25, au lieu de *Groseiller*, lisez: *Groseillier*.

Page 91, l. 48, au lieu de GERMANIGA, lisez: GERMANICA.

Page 94, l. 6, après le signe de durée, ajouter l'époque de la floraison du POTERIUM PLATYLOPHUM Jord. : Juin, juillet.

Page 99, l. 8, au lieu de prêt, lisez : près.

Page 108, l. 20, au lieu de **O. maritima**, lisez : **maritima**.

Page 110, l. 8, après P. CILIOLATA, supprimez Leb., et après le nom français, ajoutez : *P. ciliata* Leb. (non L.)

Page 126, avant-dernière ligne, au lieu de CHERBOURG, lisez : CHERBOURG.

Page 129, ligne 17, le signe de durée de l'ISATIS TINCTORIA L. doit être ② au lieu de Ʒ.

Page 162, l. 3, après le signe de durée, ajouter l'époque de la floraison du LOROGLOSSUM HIRCINUM Rich. : Juin, juillet.

Page 163, l. 7, au lieu de LILIAGÉES, lisez : LILIACÉES.

Page 167, l. 2, au lieu de *Couvallaria*, lisez : *Convallaria*.

Page 168, l. 12, lisez : Var. *b*. **J. longicornis** Bast.

Page 171, l. 21, au lieu de DC., il faut : Willd.

Page 174, l. 1, lisez : Var. *b*.

Page 176, l. 21, au lieu de *Chætophom*, lisez : *Chætophora*.

Page 180, l. 11, au lieu de bulbeuve, lisez : bulbeuse.


Page 187, l. 22, le signe de durée du GLYCERIA PROCUMBENS Sm. doit être ⊙ au lieu de Ʒ.

Même page, dernière ligne, au lieu de R. MEDIA, lisez : B. MEDIA.


Page 194, avant-dernière ligne, après le synonyme *Rottboellia incurrata*, au lieu de L., mettez : L. fil.

Page 202, l. 9, au lieu de affirmation, lisez : affirmation.

NOTA. — Il est à peu près inutile de faire observer ici que, par suite des caractères employés pour les noms français des espèces, ces noms n'ont pas toujours pu recevoir les accents qu'ils comportent.



QK313 .B485
Besnou, Leon/Catalogue raisonne des plan gen



3 5185 00105 8013

