

The studies made on Turkish Carabinae with checklist and bibliography (Coleoptera: Carabidae)

Sakine Serap AVGIN^{1,*}, Pierfranco CAVAZZUTI²

¹Osmaniye Korkut Ata University, Art and Science Faculty, Department of Biology, Osmaniye - TURKEY

²Via Chiesa 1, 12030 PAGNO (CN), ITALY

Received: 13.05.2009

Abstract: A synthesis of the studies carried out so far on Carabinae (Coleoptera: Carabidae) of Turkey is presented. Brief information about them is included here. Additionally, a species checklist and bibliography of Turkish Carabinae are given with important data. This study is intended to be a guide for future work on this subject.

Key words: Carabinae, Carabidae, Turkey

Türkiye Carabinae (Coleoptera: Carabidae) faunası üzerine yapılan tüm çalışmalar, fauna listesi ve biyografisi

Özet: Türkiye Carabinae (Coleoptera: Carabidae) faunası üzerine yapılan çalışmaların bir sentezi ve bu çalışmalar hakkında kısa bilgiler sunuldu. İlaveten, Türkiye Carabinae faunasının listesi ve biyografisi önemli bilgilerle birlikte verildi. Bu çalışma gelecek çalışmalar için bir rehber olacaktır.

Anahtar sözcükler: Carabinae, Carabidae, Türkiye

Introduction

When studies on the species belonging to the family Carabidae are examined, it is evident that most of these studies focus on the subfamily Carabinae, and in particular on the genus *Carabus*.

For instance, we can cite some studies on the biology, morphology, taxonomy, and distribution of the species belonging to the subfamily Paussinae and Carabinae of the Italian fauna (Casale et al., 1982); or a catalogue and distribution of *Carabus* species in the

world (Deuve, 1991); or the nice Březina's catalogue (1999), who for the first time included all the type localities of species, subspecies, and synonyms; or a synthesis of the genus *Carabus* in Europe (Turin et al., 2003); or an illustrated catalogue of the genus *Carabus* in the world (Deuve, 2004).

There are more studies on Carabinae subfamily of Carabidae mainly for 2 reasons. The first reason is that these species are of great importance for biological control, and the second one is that most of

* E-mail: serapavgin@osmaniye.edu.tr

they are big in size, attractive in shape and colour, making them easier to examine.

Most of the Carabinae species are predators. In Turkey, *Calosoma sycophanta* L. is used against *Thaumatopea pityocampa* (Denis & Schiffermüller) (Kanat, 2002).

Each study conducted on Carabinae is very important for ecological and biogeographical aspects and for biological control; therefore, any study carried out on this subject is a contribution to the knowledge regarding environment.

Most of the studies conducted on Carabidae family in Turkey are about species belonging to the Carabinae subfamily. The aim of this study is to provide general information about the studies carried out on the Carabinae subfamily in Turkey, to determine the investigations made on this subject, to present a checklist and bibliography of Turkish Carabinae, and to provide a source for the works to be conducted in the future.

Materials and methods

All the studies on Turkish Carabinae, short notes, all the documents were compiled after a long and meticulous effort, and all the studies were reviewed and evaluated. Brief information about them is presented here. The first species that were described from Turkey, the first records of some species from Turkey, the review of some species, and all similar studies, all the studies of the researchers who study on Turkish Carabinae, namely all the studies on Turkish Carabinae have been revised and this revision has been included in the "Remarks on the studies made on Turkish Carabinae" section of this paper. Additionally, "A Species Checklist and Bibliography of Turkish Carabinae" has been prepared meticulously and it is submitted in the "A Checklist of Turkish Carabinae" and "A Bibliography of Turkish Carabinae" sections of this paper.

Results

Remarks on the studies made on Turkish Carabinae

In Turkey the number of species of Carabidae is reported to be about 1100 (Casale and Vigna Taglianti, 1999). However, it is estimated that this

number is as many as 1200 today. In Turkey, the recorded number of Carabinae species is 87. When the estimated new numbers of species belonging to Carabidae are taken into consideration in Turkey, species belonging to Carabinae is 7 % of them.

When the Carabidae family is examined in general in Turkey, it is seen that studies on Carabinae subfamily are more than the ones of the other subfamilies.

The species belonging to the Carabinae subfamily have been classified in different ways by different researchers.

According to a recent classification by Löbl and Smetana (2003), the species and subspecies belonging to the Carabinae subfamily from Turkey are classified in the genera *Calosoma* Weber, 1801, *Carabus* Linné, 1758, and *Cyclus* Fabricius, 1794.

Among these genera, *Carabus* has the highest number of species and subspecies. There are many studies conducted on this genus in Turkey. Many of them have been conducted by entomologists from some European countries, such as Italy, France, Austria, Germany, Hungary, Czech Republic, Great Britain, Russia, and Sweden. Some of these entomologists are Silvano Battoni, Sandro Bruschi, Achille Casale, Pierfranco Cavazzuti, Achille Costa, G. De Cristoforis, Stefano Dacatra, Alessandro Dalla Torre, Piermauro Giachino, Giorgio Jan, Paolo Mazzi, Gaetano Osculati, Beppe Osella, Maurizio Pavesi, Ivan Rapuzzi, Mario Ruspoli, Arturo Schatzmayr, Enrico Sturani (his father Mario described the larval morphology of some Anatolian species), Franco Tassi, Augusto Vigna Taglianti (Italy), Claude Auvray, Gérard Charet, Philippe Basquin, Raymond Boulben, Philippe Darge, Armand David, Charles Delagrange, Thierry Deuve, Guy Vacher de Lapouge, Bernard Lassalle, Georges Ledoux, Jean-Philippe Legrand, Patrice Machard, Daniel Prunier (France), Carl Blumenthal, Eduard von Bodemeyer, Bodo von Bodemeyer, Carl Escherich, Henri Gadeau de Kerville, L. Ganglbauer, Friedman Göbel, Ernst Görgner, Walter Heinz, Adalbert Kindermann, Frank Kleinfeld, Max Korb, Armin Korell, Horst Korge, Theobald J. Krueper, J. Lederer, Eberhard von Oertzen, Klaus Staven (Germany), Boleslav Březina, Martin Häckel, L. Hoberlandt, Josef Mařan, V.J. Stanek, K. Taborsky (Czech Republic), Joahn Sahlberg

(Finland), Stephan von Breuning, Rudolf Kenyeri, Karl Mandl, Arnold Penther, Harald Schweiger, Leo Weirather, Emerich Zederbauer (Austria), Igor Belousov, Maximilien de Chaudoir, G. Fischer vov Waldheim, C.G. Von Mannerheim, E. Ménétriés, V.I. Motschulski, Victor Shchurov, T. Tschitschrine, Alexandre Zamotajlov (Russia).

In addition, Avgin and Prunier (2007), Avgin and Emre (2008), and Avgin and Prunier (2010) carried out some studies on this subfamily in Turkey.

The first *Carabus* collected in Turkey was the bigger and one of the spectacular species of the world, and described as *scabrosus* Olivier, 1790.

Subsequently, on the first part of the 1800, the Russian G. Fischer von Waldheim, Edouard Ménétriés, Victor I. Motschulski, and Maximilien de Chaudoir explored the Caucasian region and its adjacent eastern Anatolian regions. In their expedition, the following taxa were discovered: *Cyhrus aeneus* Fischer von Waldheim, 1824; *Callisthenes breviusculus orbiculatus* (1839), *Cyhrus anatolicus* Motschulski, 1865; *Carabus gotschi*, *puschkini kolenatii* (1846), *macrogonus* (1847), *victor inconspicuus*, *bischoffi*, *nordmanni* (1848), *scabripennis*, *spinolae lamprus* (1850), *Carabus chalconatus chalcochlorus* (1852), *chevrolati thierki*, *anatolicus* (1857), *bonvouloiri* (1863), *microderus*, *rumelicus* (1867), *acutangulus*, *Cyhrus armeniacus* (1879), *Calosoma sicophanta severum*, *eversmanni Chaudoir* (1850).

At the same time, in 1832, Italian researchers Giuseppe De Cristoforis and Giorgio Jan visited Turkey and described: *Carabus mariettii*, *torosus moestus*, *spinolae*, *chevrolati* and *saphyrinus* De Cristoforis and Jan, 1837, while Gaetano Osculati in the expedition of the 1841-42 discovered *Carabus maurus osculatii* and *cibratus orientalis* Osculati, 1844.

Some of the most important naturalists of the Middle Europe visited Turkey; among others: Adalbert Kindermann (1838, 1850), Theobald J. Krueper (1875), Max Korbe (1886), Eberhard vov Oertzen (1887), and Carl Escherich (1896). The materials they collected were studied by leading scientists of the time, Maximilien de Chaudoir (1850), J. Waltl (1838), L. Ganglbauer (1887), Guy Vacher de

Lapouge (1914), and S. von Breuning (1928). Italian researcher Achille Costa carried out one important research in the southwestern coast of the Anatolian Peninsula.

Leon Fairmaire in 1884-1886 studied the entomological materials collected in the Amanos Mountains by abbot Armand David and Charles Delagrange, and published *C. caramanus* (1886). On the same material S. von Breuning, in 1975, described *C. scabrosus elbursensis* (= *elbursianus* H. de Toulgoët, 1986, new name).

In the last part of the 19th century E. Reitter published the description of some new *Carabus* species: *pirithous* (1896), *gordius*, and *omphreodes* (1898).

Viktor Apfelbeck, short time later (1904), in his very important study on the "Käferfauna of the Balkan peninsula" described *C. graecus thessalicensis* and *wiedemanni burgassiensis*.

The expedition carried out by Eduard von Bodemeyer on the Mount Bolkar, and by Austrian Arnold Penther and Emmerich Zederbauer on the Mount Erciyes, provided some important Carabidologic material. This material was studied by the top specialists of the time: L. Ganglbauer published *Carabus armeniacus korbianus*, *morawitzi* (1887) and *clathratus stygius* (1890). E. Bodemeyer described *C. (Procerus) sommeri sterilis* and *bulgharmaadensis* (1915). G. de Lapouge published *C. torosus bodemeyeri* (1914) and *coriaceus cerisyi bodemeyeri* (1923).

Some naturalists in the beginning of 1900 carried out entomological research. Finnish Joahn R. Sahlberg and his son, in 1904 visited the Central Anatolia, and published the result in his Catalogue of the Coleoptera of the Eastern Mediterranean region (Sahlberg, 1913).

German Bodo von Bodemeyer published the result of his journey of 1911 in Turkey (Bodemeyer, 1927). French Henry Gadeau de Kerville, in 1912 went on an important journey in the Anatolian region from Izmir to Ankara (Kerville, 1939).

At that time, G. Vacher de Lapouge was a prolific author of new taxa: *Calosoma sicophanta prasinum* and *Carabus punctatus vagepunctatus* (1907), *scabriusculus bulgarus*, *wiedemanni bithynus*, *gotschi*

unctus (1908), *torosus escherichi*, *torosus bodemeyeri* and *mulsantianus akbesianus* (1914), *wiedemannii anceps* and *victor transeuns* (1924).

V.J. Stanek in 1931 visited the Mount Ilgaz and discovered *C. staneki*, which was described as new species by F. Štěrba in the same year (1931).

In 1932 Joseph Mařan published a study on Carabidae from the Ilgaz massif, from which he described *Cyclus armeniacus ilgazdaghensis* among other new Carabidae species.

In 1947 the National Museum in Prague organized a very important expedition of scientific research in Turkey, which is considered as the first expedition of the modern time. The eminent entomologists taking part were: L. Hoberlandt, K. Taborsky, J. Mařan, J. Dlabač, S. Jurecek, and others of the Museum of Budapest (Hoberlandt and Taborsky, 1948; Mařan, 1950).

Other 3 important studies on the Turkish fauna followed the post-war period. At first, in 1947, Mařan examined the distribution and the geographical variation of the species *C. (Procrustes) banoni* Dejean, 1829 (*anatolicus* Chaudoir, 1857 included) in the Aegean Islands and in the southern Anatolia. In the second study, Mařan, in 1949, made an important contribution to the knowledge of the geographical distribution of the forms of *C. (Procrustes) coriaceus* Linné, 1758, present in Greece and Turkey, with the description of *cerisyi bodemeyerianus*. The zoogeographical and phylogenetic conclusions of the study are very interesting.

In the last study, dated back to 1950, he showed the results obtained during the scientific expedition to Turkey supported by the Museum of Natural Sciences of Prague in 1947. The descriptions of *C. (Lamprostus) torosus hoberlandti* and *C. (L.) hozari* were presented in a larger and well detailed, critical analysis of the species *C. (L.) torosus* Frivaldszky, 1835, and *C. (Procrustes) chevrolati* Cristoforis & Jan, 1837.

Harald Schweiger (1962) identified some new species of *Carabus* Linné, 1758, and also reported some rare species from Turkey. This author (1964) taxonomically examined 8 *Carabus* species from Turkey. In another study (1964), he examined the species of *Oxycarabus* Semenov, 1898, and their zoogeographic relationships.

The most important contribution to the knowledge of the subgenus *Oxycarabus* Semenov, 1898, is the study carried out by the Austrian Karl Mandl dated back to 1971, in which he divided the subgenus into 4 species: *saphyrinus* Cristoforis & Jan, 1837, *wagneri* Küster, 1846, *pirithous* Reitter, 1896, and *pseudopirithous* Mandl, 1955. In 1975 he completed a careful analysis of some species of *Sphodristocarabus* of the group *tokatensis* Roeschke, 1898, and *macrogonus* Chaudoir, 1847, but also of *blumenthaliensis* Heinz & Korge, 1967, *basilewskianus* Breuning & Ruspoli, 1970, *C. (Lamprostus) phaedimus* Schaufuss, 1882, *spinolae* Cristoforis & Jan, 1837, and *bonplandi* Ménétriés, 1837. In a big study of the 1971 he revised *Sphodristocarabus* belonging to the "macrogonus" species group, giving a complete synthesis of the species: *resplendens* Breuning, 1934, *macrogonus* Chaudoir, 1847, *simonianus* Breuning & Ruspoli, 1970, *scovitzi* Faldermann, 1836a, and *pseudokolatensis* Heinz & Korge, 1967. In that study, a great amount of data from historical bibliographic sources and illustrations are indicated. In 1975, Mandl continued the revision of *Sphodristocarabus* analyzing the "adamsi" species group, distributed in the Caucasus, Transcaucasia, and North-East Turkey, and named many new taxa. In that work, the descriptions of all taxa are presented; moreover, many geographical indications are given, with a rich collection of illustrations of aedeagus drawings, pronotum shapes, and detailed distribution maps. A complete study of *Cyclus* from Anatolia was edited in 1977. In the taxonomic treatment proposed by Mandl, the genus *Cyclus* is represented in Anatolia by 3 species: *aeneus* Fischer von Waldheim, 1824, *armeniacus* Chaudoir, 1879, and *ruspolii* Breuning, 1964. In 1980 he published, with his typical meticulousness and scrupulousness, the description of *C. (Lamprostus) hahni*, in the context of a synthesis on the *Lamprostus* of the western Anatolia. Accurate studies were conducted in 1986 attempting to define the identity of *C. (Lamprostus) bonplandi* Ménétriés, 1836, and of *C. (L.) hozari* Mařan, 1950. Finally, in 1987, Mandl performed a thorough study on the paleogeography, evolution, and the origin of some phyletic lineages of the most important *Carabus* subgenera in Turkey: *Procrustes*, *Lamprostus*, *Chaetomelas*, *Oxycarabus*, and *Megodontus*.

The most important person who characterized the carabidological research in Turkey in the post-war period was Austrian Stephan von Breuning, the author of the famous *Monographie der Gattung Carabus* (1932-1936). Since the 1960s, he published many contributions to the knowledge of the Turkish fauna. He described many new taxa, among which there were *C. (Sphodristocarabus) heinzi* and *C. (Lamprostus) giresuni* (1964). Breuning (1964) explained that the distribution of *Procrustes chevrolati* De Cristoforis & Jan, 1837 has close relationships with geological and climatic events in the area. In 1967 he published a noteworthy study on *C. (Procrustes) chevrolati*, and continued with systematic works, with the descriptions of many other *Carabus* and *Cyphrus* species: *C. (Tomocarabus) maljushencoensis*, *C. (Megodontus) bonvouloiri kolatdaghensis*, *Cyphrus ilgazdagensis drannazdagensis* (1967). In 1972 he described *C. (Sphodristocarabus) schuberti* (a name already assigned and replaced by Heinz, in 1975), and a long list of new taxa, many of which were published in the journal Entomops. Among them, there is one of the most beautiful gems from Turkey: *C. (Titanocochenus) osellai* (now included in *Lipaster*, and downgraded to subspecies of *gordius*), for which Ruspoli was the co-author. "Breuning and Ruspoli" were universally known in the carabidological publications of that period: they carried out long scientific expeditions together in Anatolia. Sometimes other people went with them, for instance Enrico Sturani in 1970. Their collaboration allowed the discovery of many new taxa, among which there were *C. (Tomocarabus) rumelicus zaraensis* (1970), *C. (O.) cibratus haramburae* (1974), *C. (O.) cibratus schubertianus* (1974), *C. (Lipaster) stjernvalli latisi* (1974), *C. (S.) simonianus* (1970), and others.

Carl Blumenthal was one of the most assiduous co-operators in the studies of Breuning and Battoni. He described, for instance, *C. (Lamprostus) rabaroni enricoi* Battoni & Blumenthal, 1972, *C. (L.) erenleriensis karadaghensis* Battoni & Blumenthal, 1972, *C. (Heterocarabus) mariettii sapancaensis* Blumenthal & Breuning, 1966, *C. (H.) mariettii ormanensis* Blumenthal & Breuning, 1966, *C. (Oxycarabus) pirithous sapanae* Blumenthal & Breuning, 1966, and others.

German Walter Heinz also started collecting specimen in Turkey in the 1960s, and later on published the descriptions of some new taxa. The most relevant ones were: *C. (Megodontus) bonvouloiri fortunatus*, *C. (Lamprostus) calley subnigrinus* (1970), *C. (Sphodristocarabus) scovitzi hedini*, *C. (Archicarabus) victor montanellus* (1973), *C. (Pachystus) ganymed* (1975), *C. (Procrustes) bernauerorum* (1977), *C. (Sphodristocarabus) hedini czirkai* (1980). *C. (Sphodristocarabus) enigmaticus* was described together with its subspecies *reisleri* (1980), and represents one of the most interesting species of the Turkish fauna. The collaboration with M. Pavese (Heinz and Pavese, 1994) originated an interesting study on *Callisthenes* from Turkey, with the description of 2 new taxa: *Callisthenes eversmanni pesarinii*, n. ssp. and *Callisthenes peksi*, n. sp.

Since 1989 Heinz, together with Klaus Staven, has published articles on the systematics of the Anatolian fauna. From their collaborations, a lot of excellent studies were derived, rich in biogeographic annotations, containing the descriptions of many new taxa: *C. (Lipaster) stjernvalli tenebrius* (1989), *C. (L.) gordius planostriatus* (1995) and a well-argued study on the subgenus *Lipaster* (1989). Papers on *C. (Sphodristocarabus) rotundicollis aequicostalis* and *C. (S.) tokatensis kirikensis* (1995) followed. In 2000 they published an important study on the distribution and nomenclature of *Chaetomelas*, a subgenus widely spread in Asia Minor and in the eastern Mediterranean region, and in the same year they wrote, in collaboration with B. Lassalle, a development upon the identity of *C. (Lipaster) gordius*.

Armin Korell (1987, 1990) published some studies on *C. (Sphodristocarabus) tokatensis*, and on the same species in Hatay (2001), from which he already described *Procerus syriacus daphnensis* (1985) and *P. syriacus limitaneus* (1988). In 1998 he published a complete study on *C. (Pachystus) trojanus*, a very interesting species spread in the Aegean islands, and in 1999, together with Ernst Görgner, he produced an interesting study on *C. (Procrustes) impressus* Klug, 1832, of the province of Hatay, in which 2 new subspecies, *halfeticus* Korell and *palmyrus* Görgner, were described.

Achille Casale (1973) described *C. (Sphodristocarabus) resplendens cavazzutianus*, and discussed some groups of *Sphodristocarabus* species, giving photographs and drawings of their genitalia.

Pierfranco Cavazzuti, together with Casale, visited Anatolia several times between 1973 and 1991. They described a new subspecies of *Carabus* from Turkey in 1976: *C. (Sphodristocarabus) resplendens lilianae*, an interesting taxon with lively variable colors. In 1984 Cavazzuti published the descriptions of *C. (Sphodristocarabus) simonae*, *C. (S.) tokatensis kosensis*, and *C. (Tribax) curlettii*, a macrocephalous species rated among the most rare and mysterious from Anatolia. Its distribution is point form, localized in the area of Sarıkamış. *C. (Sphodristocarabus) georgia*, another very rare and enigmatic species, coming from the surroundings of Tunceli, was described in 1984. In the following years this author continued the analysis of the Turkish fauna publishing the description of many new taxa, as *C. (Sphodristocarabus) macrogonus azaleae*, *C. (S.) armeniacus sarikamisensis* and *C. (Megodontus) bonvouloiri casalei*, all in the same year (1986) in which *Procerus scabrosus ispiratus* and *P. s. callipygius* were described, as well. *Procerus scabrosus munzurenensis* (1987), a rare endemic from the Munzur massif, was described in collaboration with Lassalle. In the same year (1987) he published a study on the *Lamprostus* from the northern forests in which some new subspecies were described; among them the most important is *C. nordmanni triumphans* with a very variable chromatic range, coming from inviolate forests at low altitude of the Pontic Alps, near Tonya, from where also the earthworm *Eophyla cavazzutii* Omodeo, 1988 comes, one of the biggest Lumbricidae (Oligochaeta) of the Mediterranean basin, which is almost surely a common prey of *Lamprostus*.

In 1989, Cavazzuti presented a monographic paper on *Procerus* Dejean, 1821, treated as a distinct genus. In this work many notes on systematics, biology, habitat, ecology, and distributions were given on all species. This monograph treated all *Procerus* species from Anatolia and included descriptions of new subspecies from this region.

Later, Cavazzuti continued his investigations of the Turkish fauna with a work on *C. (Sphodristocarabus)* species from the medium Valley of the Çoruh River, in

which the diagnosis of *C. (Sphodristocarabus) coruhnehriensis*, a new species, and *C. (S.) enigmatus exiliatus* (1990) are given. *C. (Sphodristocarabus) giachinoi*, *C. (S.) karasudominus*, and *C. (S.) resplendens diogenei* were published in 1991. *C. (Tomocarabus) acutangulus mackaensis* (1991) was described by Cavazzuti, together with Korell; with him he also described *C. (Tribax) merdeniki* (1992), a species with completely unknown habits, which only recently (2008) has been found again by Ivan Rapuzzi. In 1992 he published also a work with the description of 2 new species: *C. (Pachystus) mazzii* from South Anatolia, and *C. (Sphodristocarabus) pavesii*, an interesting species coming, probably, from the mountains located at the east of İzmir, but never found again. In some following studies he gave again descriptions of new *Carabus* from Turkey, among which *C. (Lamprostus) pseudorobustus pseudocolossus*, *C. (L.) nordmanni exsultans* (1993), and *C. (Ischnocarabus) rubizzaniorum* (1994). Moreover, in collaboration with Rapuzzi (1998), he described *C. (Pachystus) pisidicus samai*, a new subspecies from south Turkey, an unexpected discovery in a region very far away from the type locality of the species. In 1999 he described *C. (Lamprostus) spinolae leonidas*, a new unrecognized subspecies of *C. spinolae* that, because of its isolated geographical localization among the southern populations of *C. (L.) torosus*, raises many questions on the dynamics of the original population and on the systematic position of the 2 species. There followed the description of *Cychrus anatolicus ziyathi* (2003), a unique taxon of *Cychrus anatolicus* present in northeastern Anatolia, isolated among numerous populations of *C. aeneus*. In 2004, in cooperation with Myska, he produced a study on some new subspecies of *Procerus*, from the Azerbaijan and the southern Armenia, and one from the Kahramanmaraş zone, in southern Turkey: *C. (P.) scabrosus kahramanicus*.

A more detailed study on Turkish Carabinae was prepared by Cavazzuti (2006). The distribution in Turkey, short definitions, and biologies of the species belonging to this subfamily were reported in this paper.

In addition to these studies, some other studies were also published.

Vigna Taglianti and Bruschi (1976) defined *Carabus (Sphodristocarabus) keltepensis* as a new species for Turkey (in the mountains near Sapanca lake). They also discussed the systematic relations between the species of *Sphodristocarabus* Géhin, and prepared a new identification key.

Casale and Vigna Taglianti (1999) discussed the origin and biogeography of carabids of the Anatolian fauna, presented a short history of its discovery, and gave a checklist of Anatolian Carabidae, with species and subspecies of Carabinae included.

Silvano Battoni published 2 reports on his trips to the Balkans and Anatolia (1973, 1978), and described some taxa: *C. (Procrustes) coriaceus mehmeti*, *C. (Sphodristocarabus) resplendens zanderi*, and *C. (Lamprostus) rabaroni enricoi* (1973) in collaboration with Blumenthal, while he described by himself the taxon *C. (Oreocarabus) staneki yaraligozi* (1982).

Ivan Rapuzzi described (1990) *C. (Ischnocarabus) tenuitarsis prasinosomatus*, a nice subspecies from the surroundings of Çankırı. Later on, he published some studies on *Carabus* from the province of Hatay, in which he described *C. (Lamprostus) hemprichi propheta* (1995), *C. (Procrustes) impressus simulacrum*, and *C. (Chaetomelas) morawitzii discipulus* (1997). In 2000, together with Frank Kleinfeld he described *C. (Tomocarabus) scabripennis martaiellus*, from Abant lake, and together with the same author he published in 2004 a very complete and detailed study on the *Carabus* and *Procerus* from the Near East, including Hatay, in which they gave all the distribution localities, the maps of all taxa in those regions and a rich iconographic documentation.

Georges Ledoux published in 1972 the description of *C. (Cytilocarabus) mahouxi* followed by the description of *C. (Sphodristocarabus) resplendens rizensis*, 1975.

Thierry Deuve produced a great number of studies on Carabids, some of which concern the study of the Turkish fauna. His first publication, together with Simard, in 1977 was the description of *C. (Trachycarabus) ponticola*. He then described *C. (Tomocarabus) simardianus* (1990), from specimens found in the Roeschke collection, about which there are still some doubts. In the same year he published an excellent paper on the new subgenus *Apoplesius*,

localized in the southeastern part of Anatolia, with peculiar characteristics and, together with *Relictocarabus* from the high Moroccan Atlas, representing the remains of a relictual population of the Mediterranean Basin. There followed the description of *C. (Apoplesius) legrandi* (1991), expanding to the Kars region, the range of the subgenus. In the following studies he described: *C. (Sphodristocarabus) scovitzi sarigoelensis* and *C. (Lamprostus) spinolae ladikensis*; he did the latter together with Charet. In 1993 he proposed the division of *C. (Cytilocarabus) cibratus* in 3 different species: *cibratus* Quensel, 1806, *orrectangulus* Géhin, 1885, and *staneki* Sterba, 1931, based on important differences in the morphology of the aedeagus. Then, he described *C. (Cytilocarabus) mahouxi cieloensis* (1994), *C. (Heterocarabus) mariettii hroni* (1997) and *C. (Sphodristocarabus) biroi iorbi* (1998) with Charet. In 2001 he published an interesting systematic study on the *Lamprostus* of the *robustus-nordmanni-torosus* species group, with a great revision of its nomenclature, and later (2002) published a study on the Carabini and Cychrini of the Caucasic and Ponto-Caucasic regions, in which he described some new subspecies of *Cyhrus aeneus* of the eastern Pontic Alps. Later, Deuve gave some systematic studies with the descriptions of *C. (Ischnocarabus) tenuitarsis balgoezensis* (2004) and *C. (Sphodristocarabus) biroi leonardoi* (2005) from the surroundings of Sinop. More recently (2009), Deuve treated the distribution of *C. (Minocarabus) maurus* in Anatolia and Cyprus, and described *C. (M.) maurus smyrnensis* from İzmir.

Bernard Lassalle discovered one of the most interesting and peculiar species from Turkey, described as *C. (Tribax) deuvei* (1986), that Deuve in 1990 attributed to the new subgenus *Apoplesius*, created by himself. Some years later he published the descriptions of some new taxa of *Carabus*: *C. (Sphodristocarabus) rotundicollis aabadensis* and *C. (Heterocarabus) mariettii mouthiezi* (1990). In 1991 he collaborated with Machard, and described many new taxa, almost all coming from the eastern Pontic Alps and belonging to the subgenera *Tribax*, *Megodontus* and *Sphodristocarabus*, but also *C. (Lipaster) osellai bontempsi*, *C. (L.) osellai lasoeli*, and *Callisthenes adehinotus*. Later, he gave the descriptions of *C. (Oreocarabus) cibratus echarouxi* and *C. (O.)*

cibratus bilmenekus (1996), *C. (Chaetomelas) morawitzi tainei* and *C. (Oxycarabus) saphyrinus yenicensis* (1998). In 2004 he reported the findings of the type locality of *C. (Lipaster) gordius*, providing a map of the distribution of *Lipaster* in Turkey and the description of *C. (L.) stjernvalli ilgarensis*.

Patrice Machard published in 1977 a short synthesis on *Lamprostus* from Turkey, where he described: *C. (L.) rabaroni drouxi* and *C. (L.) calley martinae*. In 1979 he published a taxonomic revision of the Turkish taxa of the subgenera *Oxycarabus*, *Lipaster*, *Archicarabus* and *Tribax*, and later on he described some new taxa belonging to the subgenera *Lamprostus*, *Procrustes*, *Sphodristocarabus* and *Tribax*. In cooperation with Auvray (1990) he reported the presence in Turkey, in the region of Kars, of *C. (Procrustes) clypeatus abchasicus*, a species new for the Turkish fauna, previously known only in the Caucasus. In 1994 he published a study on some new *Carabus* from north eastern Anatolia: *C. (Lamprostus) nordmanni subrobustus*, *C. (Archicarabus) gotschi pseudorugosus*, and *C. (A.) victor subminimus* (1995).

Claude Auvray published a pair of studies with Machard (1990, 1994), already cited, and in 2005 a revision of the subgenus *Tomocarabus* in Turkey.

Belousov and Zamotajlov published the astonishing discovery of the subgenus *Cechenochilus* in Turkey in 1999, with the description of the new species *lazorum*. The subgenus, spread in the Caucasian region, was reported for the first time in Turkey, on the Kaçkar massif, where many previous investigations were already carried out by several entomologists. This important discovery allows the possibility of finding other taxa of the same subgenus on the higher massifs of the eastern Pontic Alps.

Finally, concerning the representatives of the genus *Calosoma* (in the widest sense) in Turkey, at least the classic monograph by Jeannel (1940), and the revision by Obydov (2002) of the subgenus *Callisthenes* (treated as distinct genus), have to be cited.

In addition to all these studies, many short papers and notes on Turkish Carabinae were issued by several entomologists in different journals.

Many more important studies should be conducted on this subfamily in addition to the ones already made in Turkey. These studies should:

1. Help to make an identification key for the Carabinae found in Turkey,

2. Provide more detailed studies on the ecology of Carabinae species,

3. Investigate Carabinae species for their functions as predator or prey.

A Checklist of Turkish Carabinae

The checklist of the Carabinae recorded from Turkey is given below.

A total of 365 species and subspecies are included, distributed in 3 genera and 25 subgenera as follows:

Tribe CARABINI Latreille, 1802

GENUS **CARABUS** Linné, 1758: 413

Div. **SPINULATI** Ishikawa, 1973: 46

Subdiv. **LEPIDOSPINULATI** Imura, Kim, Su & Osawa 1998: 20

Subgen. **LIMNOCARABUS** Géhin, 1876: 15

clatratus Linné, 1761: 218

ssp *stygius* Ganglbauer, 1890: 117

Div. **DIGITULATI** Deuve, 1991a: 25

Subgen. **CARABUS** Linné, 1758: 413

granulatus Linné, 1758: 413

ssp *aetolicus* Schaum, 1857: 122

Div. **LIPASTROMORPHI** Deuve, 1991a: 41

Subgen. **TRACHYCARABUS** Géhin, 1876: 33

scabriusculus Olivier, 1795: 47

ssp *bulgarus* Lapouge 1908: 37

= *interruptus* Born 1902: 156

bosphoranus Fischer von Waldheim, 1823: 34

= *laceratus* Csiki 1927: 273

ssp *tscherkessicus* Heinz & Korge, 1964: 236

= *sibiriculus* Mandl, 1955: 246

Subgen. **MIMOCARABUS** Gehin 1876: 36

maurus Adams 1817: 281

ssp **maurus** Adams, 1817: 281

= *discoides* Reitter, 1880: 457

= *gemellus* Fischer von Waldheim, 1844: 14

ssp **hochhuthi** Chaudoir, 1846: 103

- = *maurulus* Mandl, 1955: 247
 ssp *alagoensis* Kraatz, 1897a: 336
 ssp *osculatii* Osculati, 1844: 72
 ssp *geminatus* Reitter, 1896: 147
 ssp *paphius* Redtenbacher, 1843: 981
 ssp *smyrnensis* Deuve, 2009: 216
pumilio Kuster, 1846: (Cah. n. 23)
 ssp *pumilio* Kuster, 1846: (Cah. n. 23)
 = *araratensis* Kraatz, 1896: 336
 Subgen. **LIPASTER** Motschoulsky, 1866: 296
 = *Lamprocarabus* Thomson, 1875: 639
 = *Titanocechenus* Breuning & Ruspoli, 1970: 215
gordius Reitter 1898: 360
 ssp *gordius* Reitter, 1898: 360
 ssp *bontempsi* Lassalle, 1992b: 310
 ssp *osellai* Breuning & Ruspoli, 1970: 87
 = *lasoeli* Lassalle, 1992b: 311
 = *pseudolangneri* Machard, 1979: 290
 ssp *planostriatus* Heinz & Staven, 1995: 15
stjernvalli Mannerheim, 1830: 55
 ssp *stjernvalli* Mannerheim, 1830: 55
 = *boschniaki* Faldermann, 1836a: 24
 = *raddeanus* Schaufuss, 1882a: 526
 = *metzleri* Mandl, 1955: 268
 ssp *posofensis* Auvray, 1994: 137
 = *purpureoviolaceus* Machard, 1979: 290
 = *ilgarensis* Lassalle, 2004: 158
 ssp *latisi* Breuning & Ruspoli, 1974: 238
 = *langneri* Breuning & Ruspoli, 1976: 222
 ssp *tenebrius* Heinz & Staven, 1989: 49
 Div. ARCHICARABOMORPHI Deuve, 1991a: 59
 Subgen. **ARCHICARABUS** Seidlitz, 1887: 6
 = *Deuterocarabus* Reitter, 1896: 141
montivagus Palliardi, 1825: 31
 ssp *bulgaricus* Csiki, 1927: 280
 = *ponticus* Apfelbeck, 1904: 38
wiedemanni Ménétries, 1836: 149
 ssp *burgassiensis* Apfelbeck, 1904: 39
 = *vaitoiani* Strasser, 1900: 148
 ssp *wiedemanni* Ménétries, 1836: 149
 ssp *bythinus* Lapouge, 1908: 19
 = *cekirgensis* Schweiger, 1964b: 160
 = *nilufer* Schweiger, 1964b: 160
 = *goekdaghensis* Mandl, 1955: 252
 ssp *besucheti* Schweiger, 1964b: 161
 ssp *akcakocaensis* Blumenthal & Breuning, 1967: 56
 ssp *winklerianus* Breuning, 1932: 119
 ssp *mengenicola* Schweiger, 1969: 157
 ssp *mussardianus* Breuning, 1964b: 213
 = *zindangensis* Lassalle, 2003: 437
 ssp *paphlagoniensis* Breuning, 1954: 134
 = *patruelis* Schweiger, 1964a: 144
 ssp *anceps* Lapouge, 1924: 181
victor Fischer von Waldheim, 1836: 350
 = *falsarius* Reitter, 1896: 142
 = *motschoulskyi* Kolenati, 1845: 31
 = *nanus* Kraatz, 1897b: 379
 = *dissolutus* Csiki, 1927: 282
 = *obtritus* Lapouge, 1924: 181
 ssp *transeuns* Lapouge, 1924: 181
 = *akkusanus* Breuning, 1964b: 213
 = *pseudotransenus* Machard, 1979: 291
 = *inconspicuus* Chadoir, 1848b: 449
 ssp *loeblis* Schweiger, 1969: 159
 = *torulensis* Lassalle, 2003: 434
 ssp *subminimus* Machard, 1995: 274
 ssp *cordithorax* Blumenthal & Breuning, 1967: 56
 = *hortulanus* Darge, 1994: 15
 ssp *borckanoides* Cavazzuti, 2003: 10
 ssp *montanellus* Heinz & Korge, 1967: 91
gotschi Chadoir, 1846: 77
 ssp *inonunus* Cavazzuti, 2003: 13

- ssp *ilgazicus* Breuning & Ruspoli, 1970: 85
 ssp *regismontium* Schweiger, 1964a: 143
 = *subnivalis* Schweiger, 1964a: 144
 ssp *congruus* Motschoulsky, 1865: 288
 = *turcicus* Motschoulsky, 1865: 288
 = *ottomanus* Reitter, 1896: 142
 = *koyulicus* Lassalle, 2003: 438
 = *kochisarensis* Lassalle, 2003: 440
 ssp *diversus* Schweiger, 1969: 158
 ssp *pseudogotschi* Breuning, 1926: 75
 ssp *nicolae* Auvray, 1995: 274
 ssp *naumanni* Breuning, 1971: 33
 ssp *horioni* Korge, 1968: 37
 ssp *goeksunensis* Breuning, 1966: 24
 ssp *unctus* Lapouge, 1908: 21
 = *bulghardaghensis* Breuning, 1926: 78
 = *demelti* Heinz, 1977b: 12
 = *eregliensis* Breuning, 1974b: 167
 ssp *alayliensis* Cavazzuti, 2006: 53
 ssp *caramanus* Fairmaire, 1886: xxi
 = *mollis* Lapouge, 1924: 183
 = *depressipennis* Mandl, 1955: 262
 ssp *pseudorugosus* Machard, 1994: 141
 Subgen. *ISCHNOCARABUS* Kraatz, 1877b: 78
cychropalpus Peyron, 1858: 356
 = *cychropalpus* Mandl, 1955: 268
tenuitarsis Kraatz, 1877b: 78
 ssp *tenuitarsis* Kraatz, 1877b: 78
 = *cottarellii* Breuning & Ruspoli, 1970: 96
 ssp *balgoezensis* Deuve & Charet, 2004: 36
 ssp *ankarensis* Breuning, 1961: 113
 = *cankiriensis* Breuning, 1962: 37
 ssp *prasinosomatus* Rapuzzi, 1991: 36
 ssp *auvrayi* Charet, 1992b: 21
 ssp *rubizzaniorum* Cavazzuti, 1994: 579
- Div. **METACARABI** Bengtsson, 1927: 83
 Subdiv. **MULTISTRIATI** Reitter, 1896: 55
 Latipalpi Reitter, 1896: 55
 Subgen. **TOMOCARABUS** Reitter, 1896: 135
decolor Fischer von Waldheim, 1823: 72
 ssp **decolor** Fischer von Waldheim, 1823: 72
 = *biseriatus* Chaudoir, 1846: 87
convexus Fabricius, 1775: 238
 ssp **gracilior** Géhin, 1885: 49
 ssp **salax** Motschoulsky, 1865: 286
 ssp **immodicus** Cavazzuti, 2006: 64
 ssp **rhinopterus** Hampe, 1852: 309
 ssp **sultandaghensis** Breuning, 1966: 24
 ssp **acutangulus** Chaudoir, 1879: 109
 ssp **mackaensis** Cavazzuti & Korell, 1991: 99
 ssp **erzeliki** Schweiger, 1962a: 120
 = *abantayaginiensis* Schweiger, 1962a: 121
scabripennis Chaudoir, 1850b: 156
 ssp **scabripennis** Chaudoir, 1850b: 156
 ssp **ponticola** Deuve & Simard, 1977: 1
 = *reticulatus* Hampe, 1852: 308
 ssp **reductus** Roeschke, 1896: 345
 = *nocturnus* Schweiger, 1969: 160
 ssp **subreductus** Breuning, 1977: 48
 ssp **martaiellus** Rapuzzi & Kleinfeld, 2000: 359
 ssp **kocaelicus** Cavazzuti, 2006: 71
 ssp **microderus** Chaudoir, 1867: 259
 = *finikensis* Lassalle, 1993: 304
 ssp **gautieri** Géhin, 1885: 91
 = *ledereri* Gautier, 1868: 322
simardianus Deuve, 1990a: 14
rumelicus Chaudoir, 1867: 259
 ssp **rumelicus** Chaudoir, 1867: 259
 = *guelekensis* Breuning, 1964b: 214
 ssp **zaraensis** Breuning & Ruspoli, 1970: 85
 ssp **cappadociae** Breuning, 1932: 132

- ssp *kurdistanicus* Eidam, 1931: 78
 = *kurdistanicola* Deuve, 1990a: 15
- ssp *syriensis* Breuning, 1943: 14
 Oreocaraboides Deuve, 1997b: 3
- Subgen. **PACHYSTUS** Motschoulsky, 1865: 294
 = *Melancarabus*, Thomson, 1875: 640
- irmasanus* Heinz & Korge, 1967: 92
 ssp *irmasanus* Heinz & Korge, 1967: 92
 = *felix* Heinz & Korge, 1967: 92
- ssp *mazzii* Cavazzuti, 1992: 115
morio Mannerheim, 1830: 58
 ssp *morio* Mannerheim, 1830: 58
 = *olivieri* Castelnau, 1835: 89
 = *carceli* Gory, 1833: 211
 = *acuminatus* Ménétries, 1838: 10
 = *aethiops* Cristoforis & Jan, 1837: 181
 ssp *thessalicensis* Apfelbeck, 1904: 24
 = *cavernicola* Kraatz, 1880: 157
 ssp *muglanus* Cavazzuti, 2006: 86
 ssp *ganymed* Heinz, 1975a: 145

pisidicus Peyron, 1855: 669
 ssp *pisidicus* Peyron, 1855: 669
 ssp *samai* Cavazzuti & Rapuzzi, 1998: 398
tamsi Ménétries, 1832: 109
 Subgen. **CYTILOCARABUS** Reitter, 1896: 193

cribratus Quensel, 1806: 171
 ssp *cribratus* Quensel, 1806: 171
 ssp *orientalis* Osculati, 1844: 72
 ssp *schubertianus* Breuning & Ruspoli, 1974: 229
 ssp *negreianus* Deuve, 1993b: 17
 ssp *pulumuricus* Cavazzuti, 1994: 580
 ssp *haramburae* Breuning & Ruspoli, 1974: 230
 ssp *bilmenekus* Lassalle, 1996: 51
 ssp *maironei* Cavazzuti, 1994: 581
 ssp *echarouxi* Lassalle, 1996: 51
porrectangulus Gehin, 1885: 5

ssp *porrectangulus* Gehin, 1885: 5
 ssp *ispiriacus* Deuve, 1993a: 7
 ssp *farineli* Machard, 1975a: 52
 ssp *tazieffi* Breuning & Ruspoli, 1974: 89
 = *arpaalaniensis* Machard, 1985: 27

staneki Sterba, 1931: 118
 ssp *staneki* Sterba, 1931: 118
 = *kreissli* Schweiger, 1964a: 145
 ssp *graziolii* Cavazzuti, 1987: 502
 ssp *yaraligozi* Battoni, 1982: 64

mahouxi Ledoux, 1972: 87
 ssp *mahouxi* Ledoux, 1972: 87
 ssp *ciloensis* Deuve, 1994a: 17
 Subgen. **PACHYCARABUS** Géhin, 1876: 31
 = *Caucasocarabus* Lapouge, 1930: 241

roseri Faldermann, 1836a: 22
 ssp *roseri* Faldermann, 1836a: 22
 = *sphodrinus* Fischer von Waldheim, 1844: 20
 ssp *ciftekopruleriensis* Machard, 1975b: 142
 ssp *soganliensis* Heinz & Korge, 1964: 230
 Div. **ARCİFERA** Imura, 1996: 7
 Subgen. **HETEROCARABUS** Morawitz, 1886: 49

akensis Haury, 1889: 106
 ssp *akensis* Haury, 1889: 106
 ssp *akensiculus* Cavazzuti, 2006: 108
 ssp *sapancaensis* Blumenthal & Breuning, 1967: 56

mariettii Cristoforis & Jan, 1837: 5
 ssp *mariettii* Cristoforis & Jan, 1837: 5
 ssp *charetianus* Auvray, 1992: 20
 ssp *ormanensis* Blumenthal & Breuning, 1967, 57
 ssp *ativsengueni* Schweiger, 1962a: 122
 = *pseudomarietti* Schweiger, 1964b: 161
 = *petrovitzi* Mandl, 1964: 2
 ssp *necopinatus* Basquin & Darge, 1987a: 406

bischoffi Chaudoir, 1848b: 450
 ssp *bischoffi* Chaudoir, 1848b: 450

- ssp ***balboi*** Cavazzuti, 2005: 114
 ssp ***mouthiezzi*** Lassalle, 1991: 324
 ssp ***ornatus*** Heinz, 1976: 66
 ssp ***muchei*** Breuning, 1961: 115
 ssp ***stephaniruspolii*** Breuning, 1966: 24
 = ***inclarus*** Darge, 1994: 15
 ssp ***terahci*** Charet, 1994: 55
 ssp ***delmastroi*** Cavazzuti, 2003: 13
 ssp ***inxpectatus*** Basquin & Darge, 1987a: 406
 ssp ***hroni*** Deuve, 1997a: 214
 Div. NEOCARABI Bengtsson, 1927: 83
 Subgen. ***SPHODRISTOCARABUS*** Géhin, 1885: 27
 = ***Sphodristus*** Thomson, 1875: 640
pavesii Cavazzuti, 1992: 118
macrogonus Chaudoir, 1847: 8
 ssp ***macrogonus*** Chaudoir, 1847: 8
 = ***theophilei*** Deyrolle, 1869: 6
 ssp ***keltepensis*** Vigna Taglianti & Bruschi, 1976: 209
 = ***kolatensis*** Lapouge, 1925: 162
 ssp ***schweigerinae*** Schweiger, 1962a: 124
 = ***pseudoschweigerinae*** Schweiger, 1964a: 140
 = ***goettingi*** Schweiger, 1964a: 139
 ssp ***drannazdaghensis*** Breuning, 1964b: 214
 = ***clientulus*** Schweiger, 1969: 162
 = ***mollioni*** Breuning, 1976: 229
 ssp ***diogenei*** Cavazzuti, 1991b: 198
 ssp ***resplendens*** Breuning, 1932: 135
 = ***zanderi*** Battoni & Blumenthal, 1972: 52
 = ***eiselti*** Mandl, 1975a: 67
 = ***Cavazzutianus*** Casale, 1973: 133
 = ***chambruni*** Breuning & Ruspoli, 1970: 92
 ssp ***akkusensis*** Breuning, 1964a: 106
 = ***daumani*** Breuning, 1976: 232
 = ***guergentepeensis*** Blumenthal, 1975: 59
 = ***ingloriosus*** Breuning & Ruspoli, 1970: 93
 ssp ***liliana*** Cavazzuti & Casale, 1976: 181
- ssp ***simonianus*** Breuning & Ruspoli, 1970: 91
 = ***pseudosimonianus*** Mandl, 1975a: 70
 ssp ***koselerensis*** Lassalle & Machard, 1991: 66
 ssp ***azaleae*** Cavazzuti, 1986a: 3
 ssp ***giresunensis*** Deuve, 1992a: 55
 ssp ***lemeslei*** Machard, 1995: 273
 ssp ***rizensis*** Ledoux, 1975: 28
 = ***michaelae*** Darge, 1994: 14
 ssp ***pseudokolatensis*** Heinz & Korge, 1967: 97
giachinoi Cavazzuti, 1991b: 192
biroi Csiki, 1927: 75
 = ***biroi*** Csiki, 1927: 75
 = ***kindermannii*** Chaudoir, 1850b: 155
 ssp ***iorbi*** Deuve & Charet, 1999: 174.
 ssp ***leonardoi*** Deuve, 2005: 267
heinzi Breuning, 1964b: 215
 ssp ***heinzi*** Breuning, 1964b: 215
 ssp ***mateuellus*** Deuve, 2003: 264
 = ***matteui*** Breuning & Ruspoli, 1970: 93
gilnickii Deyrolle, 1869: 6
 ssp ***hasandaghensis*** Darge & Basquin, 1990: 5
 ssp ***gilnickii*** Deyrolle, 1869: 6
 = ***acutus*** Lapouge, 1904: 16
 = ***giulielli*** Thomson, 1875: 686
 = ***viridifossulatipennis*** Breuning, 1964b: 214
 = ***brignolii*** Breuning & Ruspoli, 1970: 94
 = ***ovoides*** Machard, 1994: 142
 = ***pseudoelongatus*** Machard, 1994: 142
 = ***yakalamakus*** Lassalle, 1992b: 309
 ssp ***lavezorum*** Darge, 1994: 14
 ssp ***brunneicupreus*** Deuve, 1993b: 20
coruhnehriensis Cavazzuti, 1991a: 106
enigmaticus Heinz, 1980: 80
 ssp ***enigmaticus*** Heinz, 1980: 80
 ssp ***reiseri*** Heinz, 1980: 82
 ssp ***citangineus*** Lassalle & Charet, 1992a: 106

- ssp *bechteli* Charet, 1996: 42
 ssp *exiliatus* Cavazzuti, 1991a: 108
scovitzi Faldermann, 1836a: 20
 ssp *scovitzi* Faldermann, 1836a: 20
 ssp *otigoensis* Deuve, 1993b: 23
 ssp *czipkai* Heinz, 1980: 79
 ssp *bouilloni* Breuning & Ruspoli, 1976: 238
 ssp *hedini* Heinz, 1973: 26
 ssp *sarigoelensis* Deuve & Charet, 1992b: 184
armeniacus Mannerheim, 1830: 59
 ssp *armeniacus* Mannerheim, 1830: 59
 = *subincatenatus* Kraatz, 1878: 108
 = *mutabilis* Géhin, 1885: 29
 = *fulminans* Kraatz, 1878: 108
 = *incatenatus* Mannerheim, 1830: 60
 ssp *korbianus* Ganglbauer, 1887b: 136
 ssp *pseudoarmeniacus* Breuning, 1932: 136
 = *arsiyanagensis* Machard, 1985: 30
 = *robichei* Auvray, 1994: 144
 ssp *sarikamisensis* Cavazzuti, 1986a: 4
 ssp *rotundithorax* Deuve, 2003: 265
 = *rotundicollis* Mandl, 1955: 261
 ssp *basilewskianus* Breuning & Ruspoli, 1970: 90
 ssp *aabadensis* Lassalle, 1990b: 324
 ssp *blumenthaliensis* Heinz & Korge, 1967: 98
 ssp *alagoenoides* Mandl, 1955: 261
tokatensis Roeschke, 1898: 162
 ssp *tokatensis* Roeschke, 1898: 162
 = *almushensis* Mandl, 1975a: 62
 ssp *kosensis* Cavazzuti, 1984b: 135
 ssp *kirikensis* Staven, 1995a: 5
 ssp *simonae* Cavazzuti, 1984b: 132
 ssp *karasudominus* Cavazzuti, 1991b: 195
kurdicus Heinz, 1975b: 196
 ssp *kurdicus* Heinz, 1975b: 196
 = *schuberti* Breuning, 1972: 143
- = *basquini* Darge, 1990b: 32
 ssp *machardianus* Machard, 1986: 208
 ssp *kurdaorum* Lassalle, 1992b: 308
georgia Cavazzuti, 1984a: 496
 = *hardei* Heinz, 1990a: 162
 Subgen. *CECHENOCHLUS* Motschoulsky, 1850: 74
 = *Cechenus* Fischer von Waldheim, 1822: 110
lazorum Belousov & Zamotajlov, 1999: 67
 Subeng. *APOPLESIUS* Deuve, 1990b: 25
deuvei Lassalle, 1986: 36
 ssp *deuvei* Lassalle, 1986: 36
 ssp *hajdaji* Hackel, 2007: 5
pseudodepressus Machard, 1988: 33
legrandi Deuve, 1991b: 20
omphreodes Reitter, 1897: 337
 Subgen. *TRIBAX* Fischer von Waldheim, 1817: 463
 = *Microtribax* Gottwald, 1982: 211
 = *Platyhrus* Kolenati, 1845: 25
 = *Plectes* Fischer von Waldheim, 1823: 52
puschkini Adams, 1817: 292
 ssp *kolenatii* Chaudoir, 1846: 97
 ssp *kintrishensis* Gottwald, 1980: 42
 ssp *ishikawaiianus* Breuning & Ruspoli, 1970: 94
 = *kabacaensis* Machard, 1991: 21
 ssp *zyzzyus* Lassalle, 1992b: 306
 ssp *pseudoponticus* Lassalle & Machard, 1991: 59
 = *ispirensis* Lassalle & Machard, 1991: 60
 = *uskutdagensis* Lassalle & Machard, 1991: 60
 ssp *strobinoicus* Breuning & Ruspoli, 1976: 224
 ssp *zeytinlikensis* Charet, 1996: 41
 ssp *ayrdensis* Blumenthal & Breuning, 1966: 57
 ssp *ponticus* Deyrolle, 1869: 6
 ssp *praenuntius* Heinz & Korge, 1967: 100
 ssp *mescitliensis* Staven, 1998: 408
merdeniki Cavazzuti & Korell, 1992: 61
 = *koropeckyi* Deuve & Macek, 1992: 1

- curllettii*** Cavazzuti, 1984b: 138
 Subgen. ***LAMPROSTUS*** Motschoulsky, 1865: 297
 = *Chaetogaster* Lapouge, 1930: 197
 = *Chaetoprostus* Reitter, 1896: 66
 = *Pseudoprocrustes* Morawitz, 1886: 8
torosus Frivaldszky, 1835: 252
 ssp ***torosus*** Frivaldszky, 1835: 252
 ssp ***escherichi*** Lapouge, 1914: 35
 ssp ***xanthicus*** Darge, 1992: 155
 ssp ***cankirianus*** Blumenthal & Breuning, 1966: 57
 = *basquinianus* Darge, 1992: 156
 = *crudus* Darge, 1992: 157
 = *reynieri* Charet, 1992b: 21
 ssp ***bodemeyeri*** Lapouge, 1914: 35
 ssp ***jani*** Géhin, 1885: 8
 = *moestus* Cristoforis & Jan, 1837: 1
 = *mundus* Lapouge, 1914: 38
 = *hoberlandti* Mařan, 1952: 5
 = *vignatagliantii* Breuning & Ruspolti, 1977: 68
 ssp ***gajaci*** Breuning & Ruspolti, 1979: 281
 = *hahni* Mandl, 1980: 152
 ssp ***procrustoides*** Géhin, 1885: 7
spinolae Cristoforis & Jan, 1837: 5
 ssp ***leonidas*** Cavazzuti, 1999: 406
 ssp ***pseudescherichi*** Breuning, 1962: 37
 ssp ***spinolae*** Cristoforis & Jan, 1837: 5
 = *bonplandi* Ménétries, 1836: 149
 = *obesus* Lapouge, 1909: 117
 = *phaedimus* Schaufuss, 1882a: 520
 ssp ***mercatii*** Breuning & Ruspolti, 1970: 99
 ssp ***rouziei*** Breuning & Ruspolti, 1970: 97
 ssp ***pseudoducalis*** Schweiger, 1964a: 146
 ssp ***usurpator*** Cavazzuti, 1987: 495
 ssp ***sinopensis*** Breuning, 1961: 113
 ssp ***coeruleoviolaceus*** Breuning & Ruspolti, 1970: 99
 ssp ***lohsei*** Heinz & Blumenthal, 1978: 14
 ssp ***vexator*** Schweiger, 1969: 164
 ssp ***salignus*** Schweiger, 1969: 165
 ssp ***ladikensis*** Deuve & Charet, 1992: 125
 ssp ***lamprus*** Chaudoir, 1850b: 154
 ssp ***dominici*** Thomé, 1987: 23
 ssp ***rigouti*** Basquin & Darge, 1986a: 21
 ssp ***nordmanni*** Chaudoir, 1848b: 446
 = *enricoi* Battoni & Blumenthal, 1972: 52
 = *productus* Hampe, 1852: 309
 ssp ***rabaroni*** Breuning, 1964a: 107
 ssp ***sturanicus*** Breuning & Ruspolti, 1979: 281
 ssp ***giresuni*** Breuning, 1964a: 107
 ssp ***paululus*** Heinz & Korge, 1964: 233
erenleriensis Schweiger, 1962a: 127
 ssp ***ahmetustaensis*** Cavazzuti, 1987: 492
 ssp ***bithynicus*** Heinz & Korge, 1967: 102
erenleriensis Schweiger, 1962a: 127
 = *kaynasliensis* Machard, 1975b: 142
 ssp ***karadagensis*** Battoni & Blumenthal, 1972: 51
 ssp ***fortepunctatus*** Battoni & Blumenthal, 1973: 105
 = *rotundicollis* Blumenthal & Breuning, 1966: 57
 ssp ***pseudotorosus*** Schweiger, 1969: 163
 ssp ***hamus*** Basquin & Legrand, 1991: 68
robustus Deyrolle, 1869: 6
 ssp ***robustus*** Deyrolle, 1869: 6
 = *perfectus* Schaufuss, 1882a: 517
 = *callipeplus* Schaufuss, 1882a: 517
 = *semirugosus* Schaufuss, 1882a: 517
 = *sexpunctatus* Schaufuss, 1882a: 517
 = *trapesunticus* Eichler, 1924: 61
 = *triumphator* Schaufuss, 1882a: 517
 = *colossus* Bleuse, 1896: 19
 ssp ***pseudorobustus*** Heinz & Blumenthal, 1977: 219
 = *extremus* Schaufuss, 1882a: 517
 ssp ***yavuzkemalensis*** Deuve & Remond, 2001: 37
 ssp ***egribelensis*** Deuve & Remond, 2001: 38

- ssp *drouxi* Machard, 1977: 174
 ssp *pseudocolossus* Cavazzuti, 1993: 135
 ssp *triumphans* Cavazzuti, 1987: 498
 ssp *exsultans* Cavazzuti, 1993: 137
 ssp *ducalis* Schaufuss, 1882a: 514
 = *singanensis* Breuning, 1932: 160
 = *subrobustus* Machard, 1994: 140
 ssp *kaptanpasa* Cavazzuti, 2001: 396
 ssp *athleta* Semenov, 1897: 193
chalconatus Mannerheim, 1830: 57
 ssp *chalconatus* Mannerheim, 1830: 57
 = *luxuriosus* Motschoulsky, 1844: 10
 = *hozari* Mařan, 1952: 6
 = *hisarensis* Darge, 1990d: 285
 = *koyunensis* Darge, 1990a: 57
 = *maguini* Auvray, 1994: 138
 ssp *chalcochlorus* Chaudoir, 1852: 97
 = *tschimenensis* Breuning, 1964b: 215
 ssp *subnigritulus* Heinz, 1990b: 349
calleyi Fischer von Waldheim, 1824: 96
 ssp *machardiellus* Deuve, 1991a: 138
 = *kurdistanicus* Machard, 1986: 205
 ssp *chaudoiriellus* Deuve, 1995: 74
 ssp *martinae* Machard, 1977: 175
 = *catakensis* Machard, 1985: 28
 ssp *subnigrinus* Heinz, 1970: 372
 ssp *claudaeuvrayi* Cavazzuti, 2001: 395
propheta Rapuzzi, 1995: 473
mulsantianus Morawitz, 1886: 7
 ssp *mulsantianus* Morawitz, 1886: 7
 = *asperatus* Mulsant & Wachanru, 1853: 124
 = *kotschy* Ganglbauer, 1887a: 2
 = *adspersarius* Lapouge, 1907a: 148
 ssp *nurdagensis* Blumenthal, 1967: 122
 ssp *antakya* Korell, 1985: 141
 ssp *akbesianus* Lapouge, 1914: 45
- ssp *aleppensis* Lapouge, 1914: 43
 ssp *bernhauerorum* Heinz, 1977a: 35
punctatus Castelnau, 1834: 89
 ssp *punctatus* Castelnau, 1834: 89
 ssp *vagepunctatus* Lapouge, 1907a: 148
 Subgen. *PROCRUSTES* Bonelli, 1809: 39
 = *Macrogenus* Motschoulsky, 1845: 346
 = *Procrusticus* White, 1845: 111
 = *Procrustocarabus* Géhin, 1885: 4
 = *Pseudoprocrustes* Morawitz, 1886: 8
 = *Sphodristus* Motschoulsky, 1866: 295
payafa White, 1845: 111
 ssp *payafa* White, 1845: 111
 ssp *pseudoacuticollis* Catloš & Moravec, 1999: 110
 ssp *acuticollis* Motschoulsky, 1858: 187
 ssp *drouxianus* Machard, 1986: 206
clypeatus Adams, 1817: 299
 ssp *kurnakovi* Kryzhanovskij, 1968: 174
 = *abchasicus* Motschoulsky, 1850: 88
 = *fischeri* Faldermann, 1836a: 14
 = *rectoimpressus* Motschoulsky, 1850: 88
chevrolati Cristoforis & Jan, 1837: 2
 ssp *internatus* Heinz & Korge, 1964: 235
 = *cifcandaghensis* Blumenthal & Breuning, 1966: 59
 = *salignicola* Schweiger, 1969: 166
 ssp *ilgazdagensis* Schweiger, 1964a: 147
 = *ilgazdagensis* Heinz & Korge, 1964: 234
 = *golkoyensis* Schweiger, 1964b: 162
 = *dadayanus* Schweiger, 1964a: 142
 = *esmeraldae* Breuning & Ruspoli, 1977: 69
 = *portei* Breuning & Ruspoli, 1977: 70
 = *rodriguezi* Breuning & Ruspoli, 1977: 69
 ssp *chevrolati* Cristoforis & Jan, 1837: 2
 = *assimilis* Cristoforis & Jan, 1837: 3
 = *persimilis* Csiki, 1927: 39
 ssp *thierki* Chaudoir, 1857a: 81

- = *wiedemanni* Cristoforis & Jan, 1837: 3
- = *surejae* Csiki, 1927: 39
- ssp *korbi* Breuning, 1928: 1
- = *chauveloti* Breuning & Ruspoli, 1977: 70
- ssp *vanensis* Machard, 1985: 30
- coriaceus* Linné, 1758: 413
- ssp *kindermannii* Waltl, 1838: 452
- = *olympicus* Géhin, 1885: 3
- = *brussensis* Ganglbauer, 1888: 395
- = *caraboides* Ganglbauer, 1888: 394
- = *pseudofurax* Mařan, 1952: 6
- = *mehmeti* Battoni & Blumenthal, 1972: 51
- ssp *cerisyi* Dejean, 1826: 30
- = *melancholicus* Gistel, 1857: 37
- = *minor* Gautier, 1866b: 288
- = *bodemeyeri* Lapouge, 1923: 158
- = *bodemeyerianus* Mařan, 1952: 6
- ssp *mopsucrenae* Peyron, 1858: 357
- ssp *ressli* Mandl, 1961: 30
- = *montisgavurensis* Mandl, 1975a: 78
- anatolicus* Chaudoir, 1857a: 81
- ssp *anatolicus* Chaudoir, 1857a: 81
- = *cypriacus* Roeschke, 1915: 294
- ssp *lycicus* Breuning, 1932: 163
- = *gueneycensis* Catloš & Moravec, 1999: 112
- ssp *resslianus* Mandl, 1963: 48
- impressus* Klug, 1834: 71
- ssp *impressus* Klug, 1834: 71
- ssp *simulacrum* Rapuzzi, 1997: 564
- = *halfeticus* Korell, 1999: 242
- Subgen. *CHAETOMELAS* Thomson, 1875: 635
- morawitzi* Ganglbauer, 1887a: 2
- ssp *morawitzi* Ganglbauer, 1887a: 2
- = *tainei* Lassalle, 1998: 91
- ssp *montesamanus* Mandl, 1967: 385
- ssp *discipulus* Rapuzzi, 1997: 565
- Subgen. *OXYCARABUS* Semenov, 1898a: 507
- pirithous* Reitter, 1896: 66
- ssp *pirithous* Reitter, 1896: 66
- ssp *pseudopirithous* Mandl, 1955: 269
- ssp *kenyeryi* Schweiger, 1962a: 124
- ssp *sapancae* Blumenthal & Breuning, 1967: 58
- ssp *yenicensis* Lassalle, 1998: 91
- ssp *saphyrinus* Cristoforis & Jan, 1837: 4
- ssp *notabilis* Roeschke, 1898: 163
- ssp *akdagicola* Mandl, 1973: 80
- ssp *pseudosaphyrinus* Schweiger, 1965: 121
- = *kainashensis* Schweiger, 1965: 124
- = *boluensis* Schweiger, 1965: 127
- = *ilgazdagicus* Blumenthal & Breuning, 1967: 57
- = *mengenensis* Blumenthal & Breuning, 1967: 58
- = *korgei* Heinz & Korge, 1964: 232
- ssp *rabaronianus* Breuning, 1964b: 216
- ssp *besanconi* Breuning & Ruspoli, 1970: 99
- ssp *ruspolii* Breuning, 1964b: 216
- ssp *juengeri* Breuning & Ruspoli, 1970: 101
- ssp *saphyrinus* Cristoforis & Jan, 1837: 4
- = *wagneri* Kuster, 1846: (cah. 6, n. 12)
- = *artusi* Schweiger, 1965: 128
- = *pseudowagneri* Mandl, 1973: 78
- Subgen. *MEGODONTUS* Solier, 1848: 58
- = *Aulacocarabus* Géhin, 1876: 24
- = *Nabicarabus* Kwon & Lee, 1984: 102
- = *Pachycranion* Solier, 1848: 58
- = *Proteocarabus* Géhin, 1876: 5
- = *Pseudocoptolabrus* Reitter, 1896: 95
- septemcarinatus* Motschoulsky, 1840: 181
- = *trigintiduosulcatus* Lapouge, 1898: 60
- bonvouloiri* Chaudoir, 1863b: 447
- ssp *gracilicollis* Breuning, 1964a: 107
- ssp *bonvouloiri* Chaudoir, 1863b: 447
- = *clandestinus* Schaufuss, 1882b: 558

- = *nobilis* Schaufuss, 1882b: 558
 = *foveicollis* Schaufuss, 1882b: 558
 = *pastillatus* Lapouge, 1902: 310
 = *kolatdagensis* Breuning, 1967: 24
 ssp *kaschkarensis* Blumenthal & Breuning, 1967: 59
 = *soganlidaghensis* Lassalle & Machard, 1991: 64
 ssp *fortunatus* Heinz, 1970: 370
 ssp *casalei* Cavazzuti, 1986a: 6
 Subgen. ***PROCERUS*** Dejean, 1826: 22
scabrosus Olivier, 1790: 17
 ssp ***scabrosus*** Olivier, 1795: 17
 = *olivieri* Dejean, 1826: 24
 = *aegyptiacus* Motschoulsky, 1844: 8
 = *bosphoranus* Motschoulsky, 1844: 4
 = *cribratus* Motschoulsky, 1850: 87
 ssp ***propinquus*** Csiki, 1927: 36
 = *dejeani* Géhin, 1885: 1
 = *angusticollis* Haller, 1885: 200
 = *giganteus* E. Bodemeyer, 1915a: 439
 ssp ***mentor*** Blumenthal & Breuning, 1967: 58
 ssp ***schuberti*** Breuning, 1968: 51
 ssp ***culminicola*** Cavazzuti, 1989: 109
 ssp ***kahramanicus*** Cavazzuti & Myska, 2004: 165
sommeri Mannerheim, 1844: 868
 ssp ***sommeri*** Mannerheim, 1844: 868
 = *breviusculus* Kraatz, 1876: 133
 = *uludagensis* Schweiger, 1964a: 140
 = *basoglu* Schweiger, 1964b: 163
 ssp ***sterilis*** Bodemeyer E., 1915a: 439
 ssp ***dardanellicus*** Kraatz Koschlau, 1886: 421
 ssp ***estegeicus*** Cavazzuti, 1989: 79
 ssp ***bureschianus*** Breuning, 1928b: 109
 ssp ***callipygius*** Cavazzuti, 1986b: 149
 ssp ***cerkes*** Basquin & Darge, 1986b: 20
 ssp ***amasicus*** Csiki, 1927: 36
 = *modestus* Kraatz, 1876: 133
 ssp ***munzurensis*** Cavazzuti & Lassalle, 1987: 71
 ssp ***montisabanti*** Schweiger, 1962a: 126
caucasicus Adams, 1817: 282
 ssp ***armenius*** Zaitzev, 1930: 261
 ssp ***audouini*** Brullé, 1835: 116
 ssp ***colchicus*** Motschoulsky, 1844: 7
 = *shawsheticus* Zaitzev, 1930: 261
 ssp ***ispiratus*** Cavazzuti, 1986b: 146
bulgharmaadensis Bodemeyer E., 1915b: 571
 ssp ***toulgoetianus*** Deuve, 2002b: 281
 = *transversalis* Csiki, 1927: 37
 = *laticollis* Kraatz, 1876: 127
 ssp ***bulgharmaadensis*** Bodemeyer E., 1915b: 571
 ssp ***akbesiensis*** Toulgoët, 1986b: 499
 = *akbesianus* Breuning, 1975b: 132
 ssp ***weidneri*** Lassalle, 1990a: 2
syriacus Kollar 1843: 980
 ssp ***muruvvetae*** Avgin & Prunier, 2007: 83
 ssp ***syriacus*** Kollar, 1843: 980
 = *daphnensis* Korell, 1985: 140
 ssp ***limitaneus*** Korell, 1988b: 176
 Gen. ***CALOSOMA*** Weber, 1801: 20
 Subgen. ***CALOSOMA*** Weber, 1801: 20
sycophanta Linné, 1758: 414
 ssp ***sycophanta*** Linné, 1758: 414
 = *nigrocyanum* Letzner, 1850: 95
 = *marginatum* Letzner, 1850: 95
 = *azureum* Letzner, 1850: 95
 = *purpureoauereum* Letzner, 1850: 95
 = *cupreum* Letzner, 1850: 95
 = *smaragdinum* Rossi, 1882: 204
 ssp ***prasinum*** Lapouge, 1907b: 124
 ssp ***severum*** Chaudoir, 1850c: 422
 = *rapax* Motschoulsky, 1865: 309
inquisitor Linné, 1758: 414
 ssp ***cupreum*** Dejean, 1826: 196

- = *clathratum* Kolenati, 1845: 33
= *viridescens* Reitter, 1896: 46
Subgen. **CAMPALITA** Motschoulsky, 1865: 304
maderae Fabricius, 1775: 237
europunctatum Herbst, 1782: 131
olivieri Dejean, 1831: 559
denticolle Gebler, 1833: 274
Subgen. **CALLISTHENES** Fischer von Waldheim, 1821: pl.7
breviusculus Mannerheim, 1830: 61
= *orbiculatus* Motschulsky, 1839: 88
= *araraticus* Chaudoir, 1846: 104
= *tamerlanum* Zaitzev, 1918: 261
eversmanni Chaudoir, 1850b: 157
ssp *eversmanni* Chaudoir, 1850b: 157
ssp *persicus* Géhin, 1885: 68
ssp *adehinotus* Lassalle, 1992b: 305
ssp *pesarinii* Heinz & Pavesi, 1994: 5
peksi Heinz & Pavesi, 1994: 6
Tribe CYCHRINI Laporte, 1834
Gen. **CYCHRUS** Fabricius, 1794: 440
anatolicus Motschulsky, 1865: 310
ssp *anatolicus* Motschulsky, 1865: 310
= *medodjiensis* Breuning, 1969: 36
ssp *armeniacus* Chaudoir, 1879: 109
ssp *occidentalis* Mandl, 1977: 83
= *armeniacus* Roeschke, 1907: 253
ssp *drannazdaghensis* Breuning, 1967: 24
ssp *frivaldszkyi* Roeschke, 1907: 250
ssp *ilgazdaghensis* Mařan, 1932: 30
= *angustemarginatus* Mandl, 1977: 89
= *ruspolii* Breuning, 1964b: 217
ssp *korgei* Breuning, 1964b: 217
ssp *ponticus* Schweiger, 1962a: 119
= *breunungi* Schweiger, 1964a: 141
= *akcakocae* Breuning, 1969: 36
= *mengenensis* Breuning, 1975a: 48
ssp *ziyathi* Cavazzuti, 2003: 14
aeneus Fischer von Waldheim, 1824: 43
ssp *aeneus* Fischer von Waldheim, 1824: 43
= *granulatus* Motschulsky, 1850: 91
= *signatus* Faldermann, 1836a: 13
ssp *ayderensis* Deuve, 2002a: 122
ssp *baiburtensis* Breuning, 1975a: 48
ssp *hopaensis* Deuve, 2002a: 122
ssp *trabzonensis* Deuve, 2002a: 120

Discussion

Many researchers from different countries of the world came to Turkey and collected samples of Carabinae for many years up to the present and they conducted many research studies, such as the description of the new species that belong to this subfamily, their variety, distribution, and review. Furthermore, some researchers from Turkey have made some important investigations on this subfamily. Combining all these studies and submitting them in one single source will surely be very essential for further studies to be performed in the future. All the studies on Carabinae from Turkey are submitted in this publication from the first described species *Carabus scabrosus* Olivier, 1790 to the last described subspecies *Carabus (mimocarabus) maurus smyrnensis* Deuve, 2009.

Because the checklist and bibliography of this subfamily provide a basis for other studies, submission of these in one single study is of great importance for further studies. For example, the studies of Casale et al. (1982), Deuve (1991), Brezina (1999), Turin et al. (2003), Deuve (2004) are very significant studies that we always utilize regarding Carabinae. Like these papers, this study will certainly act as a basis for future studies in Turkey.

Acknowledgement

The authors thank an anonymous reviewer who highly improved the original version of this manuscript.

References

- Březina, B. 1999. World catalogue of the genus *Carabus* L. Sofia, Moscow: Pensoft Publ., 170 pp.
- Casale, A., Sturani, M. and Vigna Taglianti, A. 1982. *Fauna D'Italia, Coleoptera Carabidae. I Introduzione, Paussinae, Carabinae*. Calderini, Bologna, Italy, 499 pp.
- Deuve, T. 1991. La Nomenclature Taxonomique Du Genre *Carabus*. Bull. Soc. Sciences Nat. Venette-France. 197 pp.
- Deuve, T. 2004. Illustrated Catalogue of the Genus *Carabus* of the World (Coleoptera: Carabidae). Pensoft Publishers. 440 pp.
- Kanat, M. 2002. Çam Keseböceği (*Thaumetopoea pityocampa* Schiff.)'ne karşı biyolojik mücadelede *Calosoma sycophanta* L.'nın kullanımı. In: Proceedings of Pine Processionary Moth Symposium (Ed. M. Kanat), Kahramanmaraş-Turkey pp. 93-101.
- Turin, H., Penev, L. and Casale, A. 2003. The Genus *Carabus* in Europe. Pensoft Ed., 511 pp.

A Bibliography of Turkish Carabinae

- Adams, M.F. 1817. *Descriptio insectorum novorum Imperii Russici, in primis Caucasi et Siberiae. Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 5: 278-314.
- Apfelbeck, V. 1904. Die Käferfauna der Balkanhalbinsel, mit Berücksichtigung Klein-Asien und der Insel Kreta. I. Caraboidea. Friedlander, Berlin, ix+ 422 pp.
- Auvray, C., Charet, G. and Machard, P. 1991. Faune carabologique de Turquie. Description de quatre races nouvelles. Bull. Sciences Nat. 74: 20-22.
- Auvray, C. and Machard, P. 1990. Un Carabe nouveau pour la faune de Turquie (Col. Carabidae). L'Entomologiste. 46 (1): 23-25.
- Auvray, C. and Machard, P. 1994. Faune carabologique de Turquie. Description de sept races nouvelles. Remarques sur les sous-genres *Lamprostus* Motschulsky et *Lipaster* Motschulsky (Coleoptera: Carabidae). L'Entomologiste. 50 (2): 137-145.
- Auvray, C. and Machard, P. 1995. Faune carabologique de Turquie. Description de quatre races nouvelles. Résultats d'élevages (Coleoptera: Carabidae). L'Entomologiste. 51 (6): 273-278.
- Avgin, S.S. and Prunier, D. 2007. Description d'une nouvelle sous-espèce de *Procerus* de Turquie méridionale. Le Coléoptériste. 10 (2): 83-86.
- Avgn, S.S. and Emre, İ. 2008. Some Carabinae (Coleoptera: Carabidae) from Kahramanmaraş and surrounding towns, in South Central Turkey. Entomol. News. 119 (2): 151-170.
- Avgin, S.S. and Prunier, D. 2010. Contribution to the taxonomy of the Genus *Cyphrus* Fabricius, 1794 (Coleoptera: Carabidae) from Turkey and their relations with *Cyphrus* species from Balkans to Caucasus. Türk. Entomol. Derg. 34(3): 307-322.
- Basquin, P. and Darge, Ph. 1986a. Contribution à la faune de Turquie: une nouvelle sous-espèce de *Lamprostus rabaroni* Breuning (Coleoptera, Carabidae). Bull. Sciences Nat. 49: 21-22.
- Basquin, P. and Darge, Ph. 1986b. Deuxième contribution à la faune de Turquie, avec description d'un nouveau *Procerus* (Coleoptera, Carabidae). Bull. Sciences Nat. 52: 20-21.
- Basquin, P. and Darge, Ph. 1987a. Deux nouveaux *Heterocarabus* d'Anatolie (Col. Carabidae). Nouv. Revue Ent. 4 (4): 406.
- Basquin, P. and Darge, Ph. 1987b. Note sur la synonymie de deux *Procerus* (Coleoptera, Carabidae). Bull. Sciences Nat. 56: 21.
- Basquin, P. and Legrand, J.P. 1991. Diagnose d'un *Carabus* nouveau d'Anatolie. (Col. Carabidae). Bull. Soc. Entom. de Fr. 96:68.
- Battoni, S. 1982. Nouvelle sous-espèce de *Carabus staneki* Sterba (Col. Carabidae). Bull. Soc. Ent. Mulhouse. 63-64.
- Battoni, S. and Blumenthal, C. 1972. Expédition entomologique en Grèce et Turquie. Entomops. 26: 51-58.
- Battoni, S. and Blumenthal, C. 1973. Beitrag zur Verbreitung und Systematik der Gattung *Carabus* in Nordanatolien und Griechenland (Col.). Mitt. München Entom. Ges. 63: 93-111.
- Beheim, D. and Breuning, S. Von. 1943. Neubeschreibungen von Caraboidea u. Revisionen an den v. Breuning'schen Monographien von *Carabus*, *Calosoma* und *Ceroglossus* (Kol.). Mitteilungen d. München Ent. Ges. 33 H. 25 pp.
- Belousov, I. and Zamotajlov, A. 1999. The first record of the subgenus *Cechenochilus* Motschulsky, 1850 for Turkey (Coleoptera, Carabidae genus *Carabus* L.). Advances in Carabidology. 67-74.
- Bengtsson, S. 1927. Die Larven der nordischen arten von *Carabus* Lin. Eine morphologische studie. Kungliga Fysiografiska Sällskapets i Lund Förhandlingar (N.F.). 39 (2): 1-89.
- Bleuse, L. 1896. Trois variétés nouvelles de Coléoptères du Genre *Carabus* L. Miscellanea Entomologica. IV (2):18-19.
- Blumenthal, C. 1967. *Carabus (Procrustes) mulsantianus* Mor.n. *nurdagensis* nov. Entomol. Blätter. 68 (2): 121-122.
- Blumenthal, C. 1975. Beschreibung einer neuen *Sphodristocarabus rasse* aus Anatolien (Carabidae, Col.). Kol. Rundsch. 52: 59-60.

- Blumenthal, C. 1976. Beitrag zur Verbreitung und Systematik der Gattung *Carabus* in Griechenland und der Türkei (Col. Carabidae). *Nouv. Rev. Ent.* 6 (2): 113-120.
- Blumenthal, C. and Breuning, S. 1967. Beitrag zur Kenntnis der *Carabus* Fauna Anatoliens (Coleoptera, Carabidae). *Boll. Ass. Romana Ent.* 21: 56-59.
- Blumenthal, C. and Deuve, T. 1986. *Carabus (Chaetomelas) praestigiator pinguis* Lapouge, n. comb. Désignation d'un néotype (Col. Carabidae). *Nouv. Revue Ent.* 3 (4): 438 pp.
- Blumenthal, C. and Heinz, W. 1982. Bemerkungen zu einer Arbeit von K. Mandl mit dem Titel "Eine neue Art der Untergattung *Lamprostus* Motschulsky der Gattung *Carabus* L. und kritische Bemerkungen zu einer Publikation über diese Untergattung aus dem Jahre 1978 (Col. Carabidae)". *Entomologica Basiliensa*. 7: 217-225.
- Bodemeyer, B. 1927. Über meine entomologischen Reisen. I. Kleinasiens. Stuttgart, 85 pp.
- Bodemeyer, E. 1900. Quer durch Klein-Asien in der Bulghar-Dağh. Eine wissenschaftliche Studien-Reise. Emendingen. V+ 169 pp.
- Bodemeyer, E. 1915a. Beiträge zur Feststellung von Verbreitungsdaten paläarktischen Coleopteren. Deut. Entomol. Z. 437-453.
- Bodemeyer, E. 1915b. *Procerus scabrosus* und Varietäten. Deut. Entomol. Z. 570-571.
- Bonelli, F.A. 1809. Observations entomologiques. I. Mem. Acad. Imp. Sci., Turin. 18: 21-78, + Tabula Synoptica (only on the offprint 1810).
- Born, P. 1902. Einige Mittheilungen über rumänische Caraben. Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. 11: 145-158.
- Breuning, S. 1926. Zur Kenntnis asiatischer Caraben. Kol. Rundsch. 12: 67-80.
- Breuning, S. 1928a. Beitrag zur Kenntnis asiatischer Caraben. Coleopterologisches Centralblatt. 3: 1-3.
- Breuning, S. 1928b. Beitrag zur carabafauna von Bulgarien (Carabidae. Col.) mit Berücksichtigung den angrenzenden Gebiete. Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Institutes Sofia. 1: 108-117.
- Breuning, S. V. 1932. Monographie der Gattung *Carabus* (1932-1936), Best. Tab. Europ. Coleopt., 104-110, Reitter, Troppau. 41: 1610 pp.
- Breuning, S. 1950. Einige neue Arten und Rassen der Gattungen *Carabus* und *Cyphrus* aus Ostasien. Ent. Arb. Mus. G. Frey. 1: 198-201.
- Breuning, S. 1954. Weiterer Beitrag zur Kenntnis asiatischen Carabini. Ent. Arb. Munich. 5: 134-135.
- Breuning, S. 1961. Neuer Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Carabus* L. Entom. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden. 26 (13): 113-115.
- Breuning, S. 1962. Neue und interessante Formen der Gattungen *Carabus* L. und *Dorcadion* Muls. aus Anatolien. Reichenbachia. I (6): 37-40.
- Breuning, S. 1964a. Beschreibung einiger neuer Formen der Gattung *Carabus* L. Ent. Arb. Mus. G. Frey. 15: 106-107.
- Breuning, S. 1964b. Beitrag zur Kenntnis der Carabini Anatoliens (Coleoptera, Carabidae). Atti. Soc. Ital. Sci. Nat., Milano. 103: 213-217.
- Breuning, S. 1964c. Die Verbreitung des *Procrustes chevrolati* Crist. und Jan in Anatolia (Coleoptera, Carabidae). Istanb. Univ. Fen Fak. Mecm. (B), 29: 139-141.
- Breuning, S. 1966. Quelques nouvelles formes du genre *Carabus* L. (Coleoptera, Carabidae). Bull. Soc. Ent. Mulhouse, Mars-Avril. 23-24.
- Breuning, S. 1967. Contribution à la connaissance des Carabidae (Coleoptera). Bull. Soc. Ent. Mulhouse. 24.
- Breuning, S. 1968. Description de deux nouvelles races du genre *Carabus* du Proche-Orient. Bull. Soc. Ent. Mulhouse. 51.
- Breuning, S. 1969. Contribution à la connaissance du genre *Cyphrus* (Col. Carabidae). Bull. Soc. Ent. Mulhouse. 36.
- Breuning, S. 1971. Beschreibung einer neuen Rasse der Gattung *Carabus* L. (Coleopt. Carabidae). Kol. Rundsch. 49: 3.
- Breuning, S. 1972. *Carabus (Sphodristocarabus) schuberti* n.sp. Zeitsch. Arbeit. Ost. Ent. 22: 143.
- Breuning, S. 1974a. Quelques remarques concernant l'article intitulé "Beitrag zur Kenntnis der Fauna des Iran und Anatoliens", par Walter Heinz (Entomol. Blätter, 69: 14-36, 1973) (Col. Carabidae, Carabinae). Nouv. Rev. Ent. 4 (2): 115-117.
- Breuning, S. 1974b. Eine neue *Carabus* Art aus Anatolien. Mitt. Zool. Mus. Berlin, L: 167.
- Breuning, S. 1975a. Description de *Cyphrus* nouveaux d'Anatolie (Col. Carabidae). Bull. Soc. Ent. Mulhouse. 1975: 48.
- Breuning, S. 1975b. Description de nouvelles sous-espèces du genre *Carabus* L. (s.l.) (Coleoptères Carabidae Carabinae). Nouv. Rev. d'Ent. 5: 129-134.
- Breuning, S. and Ruspoli, M. 1970. Description de 15 espèces et sous-espèces nouvelles de Carabidae (Col.) d'Anatolie et d'une Section nouvelle. Entomops. 19: 84-102.
- Breuning, S. and Ruspoli, M. 1971. Révision systématique de la faune carabologique d'Anatolie, I. Entomops. 24: 250-256.
- Breuning, S. and Ruspoli, M. 1974. Révision systématique de la faune carabologique d'Anatolie, II. Entomops. 32: 226-238.
- Breuning, S. and Ruspoli, M. 1976. Révision systématique de la faune carabologique d'Anatolie, III. Entomops. 39: 221-242.
- Breuning, S. and Ruspoli, M. 1977. Révision systématique de la faune carabologique d'Anatolie, IV. Entomops. 43: 65-70.
- Breuning, S. and Ruspoli, M. 1979. Deux Carabes nouveaux pour l'Anatolie. Entomops. 48: 281-282.
- Březina, B. 1992. Preliminary checklist of the genus *Carabus* Linnaeus, 1758. Prague: pr. Publ., 48 pp.

Březina, B. 1994. The check-list of the genus *Carabus* (Coleoptera: Carabidae). *Klapalekiana*. 30: 1-164.

Brullé, A. 1835: in: Audouin, J.V. and Brullé, A. Histoire Naturelle des insectes traitant de leur organisation et de leurs moeurs en général, et comprenant leur classification et la description des espèces. Tome V. Coléoptères II. Paris: Pillot. 436 pp.

Casale, A. 1973. Diagnosi di un nuovo *Carabus (Sphodristocarabus)* d'Anatolia (Col. Carabidae). Osservazioni sistematiche e corologiche su alcuni gruppi di specie della Turchia Settentrionale. *Boll. Mus. Civ. Venezia*. 24: 133-142.

Casale, A. and Cavazzuti, Pf. 1976. Un nuovo *Carabus (Sphodristocarabus)* d'Anatolia, sistematica del gruppo e nota sinonimica. *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia*. 28: 181-184.

Casale, A. and Vigna Taglianti, A. 1999. Caraboid Beetles (excl. Cicindelidae) of Anatolia, and their Biogeographical Significance (Coleoptera, Caraboidea). *Biogeographia, Lavori della Società Italiana di Biogeografia*, Siena, Italy. 20: 277-406.

Castelnau de Laporte, F.L. 1834. In: Études entomologiques, ou descriptions d'insectes nouveaux et observations sur la synonymie. Méquignon-Marvis, Paris (1835). Pp 1-94.

Čatloš, D. and Moravec, F. 1999. Two new subspecies of the genus *Carabus* from southern Turkey. *Acta Entomologica Slovenica*. 7: 109-118.

Cavazzuti, Pf. 1984a. Un nuovo *Carabus (Sphodristocarabus)* dell'Anatolia (Col. Carabidae). *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat.*, Torino. 2 (2): 495-502.

Cavazzuti, Pf. 1984b. Descrizione di nuovi "Carabus" L. dell'Anatolia. Osservazioni sistematiche, corologiche e biogeografiche (Col. Carabidae). *Riv. Piem. St. Nat.* 5: 131-141.

Cavazzuti, Pf. 1986a. Description de trois sous-espèces nouvelles de *Carabus* d'Anatolie (Col. Carabidae). *Bull. Soc. Sciences Nat.* 50:3-8.

Cavazzuti, Pf. 1986b. Due nuove sottospecie di "Carabus (Procerus)"

scabrosus" Olivier dell'Anatolia settentrionale (Col. Carabidae). *Riv. Piem. St. Nat.* 7:145-152.

Cavazzuti, Pf. 1987. Nuovi *Carabus* dell'Anatolia Settentrionale (Col. Carabidae). *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat.* 5 (2): 491-507.

Cavazzuti, Pf. 1989. Monografia del genere *Procerus* (Col. Carabidae, Carabini). L'Artistica, Savigliano, pp. XII+200, 27.

Cavazzuti, Pf. 1990. Posizione sistematica e descrizione del maschio di *Carabus (Tribax) curlettii* Cavazzuti, 1984 (Coleoptera, Carabidae). *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat.* 8 (2): 445-451.

Cavazzuti, Pf. 1991a. Note su *Carabus (Sphodristocarabus)* della media valle del Coruh Nehri, con descrizione di una specie e di una sottospecie nuova (Coleoptera, Carabidae). *Riv. Piem. St. Nat.* 11: 105-116.

Cavazzuti, Pf. 1991b. Nuovi *Carabus (Sphodristocarabus)* dell'Anatolia settentrionale e orientale (Coleoptera, Carabidae). *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat.* 9 (1): 191-204.

Cavazzuti, Pf. 1992. Due nuove specie di *Carabus* L. s. l. dell'Anatolia meridionale e occidentale (Coleoptera, Carabidae). *Lambillionea*. XCII, 2:115-123.

Cavazzuti, Pf. 1993. Due *Carabus (Lamprostus)* Motsch. inediti della provincia di Giresun nell'Anatolia Nord-orientale. *Lambillionea*. 93 (2):135-138.

Cavazzuti, Pf. 1994 (4-XII). Contributo alla conoscenza del genere *Carabus* in Anatolia. Descrizione di una nuova sottospecie di *C. (Ischnocarabus) tenuitarsis* Kraatz e di due nuove sottospecie di *C. (Oreocarabus)* del gruppo "cribratus Quens." (Coleoptera, Carabidae). *Lambillionea*. 94: 577-584.

Cavazzuti, Pf. 1999. Nuovi *Cyprus* F. della Cina e un nuovo *Carabus* L. (*Lamprostus*) dell'Anatolia. (Coleoptera, Carabidae). *Lambillionea*. 99 (3): 402-409.

Cavazzuti, Pf. 2001. Due *Lamprostus* inediti delle Alpi Pontiche orientali. (Coleoptera, Carabidae). *Lambillionea*. 101 (3):395-398.

Cavazzuti, Pf. 2003. Carabini della Turchia. Descrizione di tre nuove sottospecie del genere *Carabus* e una di *Cyprus* dell'Anatolia occidentale e settentrionale (Coleoptera, Carabidae). *Coléoptères*. 9 (2): 9-17.

Cavazzuti, Pf. 2006. Faune des Carabinae de Turquie. Magellanes, Collection Systématique. 13, 155 pp.

Cavazzuti, P. and Casale, A. 1976. Un nuovo *Carabus (Sphodristocarabus)* d'Anatolia. Sistematica del gruppo e nota sinonimica (Col. Carabidae). *Boll. Mus. Civ.* 28: 181-184.

Cavazzuti, Pf. and Dacatra, S. 1993. Descrizione del maschio di *Carabus (Apoplosius) deuvei* Lassalle, 1986, e note complementari sulle reali affinità di *Apoplosius Deuvei*, 1990. *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat.* 11 (2): 267-271.

Cavazzuti, Pf. and Ghiretti, D. 1992. Schedario Iconografico del genere *Carabus* L. Volume I, LXV Subgen. *Lamprostus* Motschulsky. 69.

Cavazzuti, Pf. and Ghiretti, D. 2003. Catalogo Iconografico del Genere *Carabus*. Parte 1. SPINULATI: *Apotomopterus*, *Euleptocarabus*, *Limnocalabus*. CD rom.

Cavazzuti, Pf. and Ghiretti, D. 2004. Catalogo Iconografico del Genere *Carabus*. Parte 2. DIGITULATI: *Ohomopterus*, *Isiocarabus*, *Archaeocarabus*, *Carabus*, *Lichnocarabus*, *Nesaeocarabus*, *Eucarabus*, *Parhomopterus*, *Eurycarabus*. CD rom.

Cavazzuti, Pf. and Ghiretti, D. 2005. Catalogo Iconografico del Genere *Carabus*. Parte 3. LIPASTRIMORPHI: *Morphocarabus*, *Lipaster*, *Mimocarabus*, *Ophiocarabus*, *Cryptocarabus*, *Cyclocarabus*. ARCHICARABOMORPHI: *Archicarabus*, *Ischnocarabus*, *Gnathocarabus*. CD rom.

Cavazzuti, Pf. and Ghiretti, D. 2006. Catalogo Iconografico del Genere *Carabus*. Parte 4. TACHYPOGENICI: *Tachypus*. METACARABI: *Cathoplus*, *Homoeocarabus*, *Hemicarabus*, *Stephanocarabus*, *Scambocarabus*, *Tomocarabus*, *Semnocarabus*, *Ulocarabus*, *Tanaocarabus*, *Carpathophilus*, *Aulonocarabus*, *Leptocarabus*, *Pachystus*. CD rom.

- Cavazzuti, Pf. and Ghiretti, D. 2007. Catalogo Iconografico del Genere *Carabus*. Parte 5. METACARABI: *Cavazzutiocarabus*, *Orinocarabus*, *Oreocarabus*, *Zheduocarabus*, *Rhigocarabus*, *Meganebrius*, *Pachycarabus*, *Mesocarabus*. ARCIFERA: *Ctenocarabus*, *Hygrocarabus*, *Platycarabus*, *Chaetocarabus*, *Heterocarabus*. CD rom.
- Cavazzuti, Pf. and Ghiretti, D. 2008. Catalogo Iconografico del Genere *Carabus*. Parte 6. NEOCARABI- 1: *Microplectes*, *Sphodristocarabus*, *Cechenochilus*, *Tribax*, *Archiplectes*, *Pagocarabus*, *Aristocarabus*. CD rom.
- Cavazzuti, Pf. and Korell, A. 1991. Ein neuer *Carabus* (*Tomocarabus*) aus Nordost-Anatolien (Coleoptera, Carabidae). Entomol. Z. 101 (6): 99-104.
- Cavazzuti, Pf. and Korell, A. 1992. Eine neue *Carabus* (*Tribax*)-Art aus der östlichen Türkei (Coleoptera, Carabidae). Entomol. Z. 102 (4): 61-66.
- Cavazzuti, Pf. and Lassalle, B. 1987. Un nouveau *Procerus* d'Anatolie (Coleoptera, Carabidae). Nouv. Rev. Ent. 4 (1): 71-72.
- Cavazzuti, Pf. and Myška, J. 2004. Descrizione di tre nuove sottospecie di *Procerus* Dejean (1826) del Medio Oriente (Coleoptera, Carabidae). Lambillionea. 104 (2): 165-170.
- Cavazzuti, Pf. and Rapuzzi, I. 1998. Una nuova sottospecie di *Carabus* (*Pachystus*) *pisidicus* dell'Anatolia meridionale (Turchia). (Coleoptera, Carabidae). Lambillionea. 98: 398-400.
- Charet, G. 1993. Un nouveau *Carabus* (*Heterocarabus*) *marietti* d'Anatolie (Coleoptera, Carabidae). Bull. Acrop. 18: 55.
- Charet, G. 1996. Description de deux nouveaux Carabes du nord-est de la Turquie (Coleoptera, Carabidae). Coléoptères. 2 (3): 34-43.
- Chaudoir, M. de. 1846. Carabiques. Pp. 47-209. Carabiques nouveaux de la Crimée. Pp. 227-234. In: Chaudoir, M. de and Hochhuth, H.: Enumération des carabiques et hydrocanthares recueillis pendant un voyage au Caucase et dans les provinces transcaucasienes par Baron M. de Chaudoir et le Baron A. de Gotsch. Kiew: J. Wallner, 268 pp.
- Chaudoir, M. de. 1847. Observations. Kiew, 16 pp.
- Chaudoir, M. de. 1848a. Mémoire sur la famille des Carabiques. Première partie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 21 (1): 3-134.
- Chaudoir, M. de. 1848b. Description d'une espèce nouvelle de Cicindèle trouvée en Russie et de quelques Carabes inédits de Russie et du nord de l'Anatolie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 21 (2): 442-452.
- Chaudoir, M. de. 1850a. Mémoire sur la famille des Carabiques. 2e partie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 23 (1): 3- 85.
- Chaudoir, M. de. 1850b. Supplément à la faune des carabiques de la Russie. 4. Trois espèces nouvelles du groupe des Amaroides. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 23 (3): 62-206.
- Chaudoir, M. de. 1850c. Mémoire sur la famille des Carabiques. 2e partie (continuation). Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 23 (2): 349-460.
- Chaudoir, M. de. 1852. Mémoire sur la famille des Carabiques. 3e partie. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 25 (1): 3- 104.
- Chaudoir, M. de. 1857a. Einige Bemerkungen zur « Naturgeschichte der Insekten Deutschlands », (fortgesetzt von Dr. Schaum, 1. Lief.). Entomologische Zeitung Stettin. 18: 75-82.
- Chaudoir, M. de. 1857b. Mémoire sur la famille des Carabiques. 6e partie (continuation). Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 30 (3): 1-64.
- Chaudoir, M. de. 1863a. Enumération des cicindélées et des carabiques recueillis dans la Russie méridionale, dans la Finlande septentrionale et dans la Sibérie orientale par MM. Alexandre et Artur de Nordmann. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 36 (1): 201-232.
- Chaudoir, M. de. 1863b. Description de quelques nouvelles espèces de cicindélées et de carabiques. Ann. Soc. Entomol. Fr. (4) 3: 447-450.
- Chaudoir, M. de. 1867. Description de carabiques nouveaux. Ann. Soc. Entomol. Fr. (4) 7: 259-262.
- Chaudoir, M. De. 1879. Description de *Cyhrus* et d'un *Carabus* nouveaux provenant des chasses de m. Theophile Deyrolle dans l'Asie Mineure. Le Naturaliste. 1 (14): 109-110.
- Cristoforis, J. De and Jan, G. 1837. Description de huit espèces nouvelle de *Carabus* du Bosphore. Guérin's Magasin de Zoologie (Classe IX): pl. 181-183 + pages 1-6.
- Csiki, E. 1927. Carabidae: Carabinae (Partes 91 et 92). In: Junk W. & Schenkling S. (eds.): Coleopterorum Catalogus. Volumen I. Carabidae I. Berlin.: W. Junk, 621 pp.
- Daniel, K. 1908. Die *Cyhrini* der paläarktische Region. Münch. Kol. Zeitsch. 3 (3): 261-294.
- Darge, Ph. 1990a. Introduction au Genre *Carabus* en Turquie. Priv. publ., Ph. Darge. 83 pp.
- Darge, Ph. 1990b. Un nouveau *Sphodristocarabus* du Turc. (Coleoptera, Carabidae, genre *Carabus*). Lambillionea. 90 (3): 31-33.
- Darge, Ph. 1990c. La répartition altitudinale de quelques *Procerus* en Anatolie (Coleoptera, Carabidae, genre *Carabus*). L'Entomologiste. 46 (2-3): 99-101.
- Darge, Ph. 1990d. Cohabitation de deux espèces de *Lamprostus* et description d'une nouvelle sous-espèce de *Lamprostus chalconatus* Mann. (Col. Carabidae). Nouv. Revue Ent. 6 (3): 285.
- Darge, Ph. 1992. Turquie: Les Carabes du Köroglu Daglari (Coleoptera, Carabidae). Lambillionea. 92 (2): 153-160.
- Darge, Ph. 1994. Diagnose de quelques nouveaux Carabes anatoliens (Coleoptera, Carabidae, Carabus). Bull. Soc. Ent. Mulhouse. (1): 14-16.
- Darge, Ph. and Basquin, P. 1990. Un nouveau *Sphodristocarabus* d'Anatolie orientale (Coleoptera, Carabidae, genre *Carabus*). Lambillionea. 90 (1): 5-7.
- Darnaud, J., Lecumberry, M. and Blanc, R. 1984. Coléoptères Carabidae. Le genre *Procerus* Dejean, 1825. Iconographie entomologique. 16: 1-5.

- Dejean, P.F.M.A. 1826. Species général des Coléoptères, de la collection de M. le Comte Dejean. Tome second. 1, viii+ 501 pp. Crevot, Paris.
- Dejean, P.F.M.A. 1831. Species général des Coléoptères, de la collection de M. le Comte Dejean. Tome troisième. 5, viii+ 883 pp. Méquignon-Marvis, Paris.
- Deuve, T. 1990a. Nouveaux Carabidae des genres *Ceroglossus* Solier et *Carabus* L. (Coleoptera). Bull. Sciences Nat. 64: 14-16.
- Deuve, T. 1990b. Nouveaux Carabus d'Asie (Coleoptera, Carabidae). Bull. Sciences Nat. 66: 25-28.
- Deuve, T. 1990c. Sur la présence de peuplements relictuels de *Carabus* dans le bassin Méditerranéen (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Bull. Mus. Natn. Hist. Nat. Paris. 4 (12): 455-467.
- Deuve, T. 1991. Nouveaux *Cyphrus* et *Carabus* d'Asie. Bull. Soc. Sciences Nat. n° 70: 17- 21.
- Deuve, T. 1992a. Descriptions de deux Nouveaux *Carabus* et *Cyphrus* d'Asie, et note sur l'identité de *Carabus hozari* Mařan (Coleoptera, Carabidae). Bull. Soc. Sciences Nat. 75: 52-60.
- Deuve, T. 1992b. Note sur deux *Carabus* de Turquie (Coleoptera, Carabidae). Revue Fr. Ent. 14 (4): 184.
- Deuve, T. 1993a. Rectifications et notes taxonomiques dans les genres *Carabus* L. et *Cyphrus* F. (Coleoptera, Carabidae). Bull. Soc. Sciences Nat. 78: 5-9.
- Deuve, T. 1993b. Descriptions de nouveaux *Carabus* asiatiques et note sur l'identité de *Carabus careniger* Chaudoir, 1863 (Coleoptera, Carabidae). L'Entomologiste. 49: 17-31.
- Deuve, T. 1994a. Nouveaux *Carabus* d'Asie (*Apotomopterus*, *Carabus*, *Leptocarabus*, *Oreocarabus*) (Coleoptera, Carabidae). Lambillionea. XCIV, 1: 15-18.
- Deuve, T. 1994b. Une classification du genre *Carabus*. Bibliothèque Entomologique, vol. 5. Sciences Nat ed. Venette. 296 pp.
- Deuve, T. 1995. Contribution à la connaissance taxonomique des genres *Carabus* et *Cyphrus* en Asie (Coleoptera, Carabidae). Revue Fr. Ent. 17: 69-76.
- Deuve, T. 1997a. Nouveaux *Carabus* L. et *Cyphrus* F. de la Chine, de l'Asie centrale et de la Turquie d'Asie (Coleoptera, Carabidae). Coléoptères. 3 (14): 209-229.
- Deuve, T. 1997b. Catalogue des Carabini et Cyprini de Chine. Mémoires de la Soc. Ent Fr. Vol. 1: 236 pp.
- Deuve, T. 1998. Un nouveau *Sphodristocarabus* des Alpes Pontiques (Coleoptera, Carabidae). Revue Fr. Ent. 20 (4): 174.
- Deuve, T. 2001. Note sur *Carabus (Lamprostus) robustus* Deyrolle, 1869, bona species, et descriptions de nouveaux *Carabus* L. et *Cyphrus* F. d'Asie (Coleoptera, Carabidae). Coléoptères. 7 (3): 23-47.
- Deuve, T. 2002a. Carabini et Cyprini mal connus des régions Caucasiennes et Pontico-Caucasiennes (Coleoptera, Carabidae). Coléoptères. 8 (5): 93-125.
- Deuve, T. 2002b. Nouveaux taxons dans le genre *Carabus* L., 1758 (Coleoptera, Carabidae). Coléoptères. 8 (19): 267-282.
- Deuve, T. 2004. Un nouvel *Ischnocarabus* d'Anatolie (Coleoptera, Carabidae). Revue Fr. Ent. 26 (1): 36.
- Deuve, T. 2005. Trois nouveaux *Carabus* L., 1758, de Chine et Turquie (Coleoptera, Carabidae). Coléoptères. 11 (22): 267-272.
- Deuve, T. 2009. Sur la présence de *Carabus (Mimocarabus) maurus* en Anatolie occidentale et à Chypre (Coleoptera, Carabidae). L'Entomologiste. 65 (4): 215-217.
- Deuve, T. and Charet, G. 1992a. Note sur une population particulière de *Lamprostus* à Lâdik, en Turquie (Coleoptera, Carabidae). Lambillionea. XCII (2): 125-127.
- Deuve, T. and Charet, G. 1992b. Note sur deux *Carabus* de Turquie (Coleoptera, Carabidae). Rev. Fr. d'Ent. 14: 184.
- Deuve, T. and Charet, G. 1998. Un nouveau *Sphodristocarabus* des Alpes Pontiques (Coleoptera, Carabidae). Revue Fr. Ent. 20 (4): 174.
- Deuve, T. and Charet, G. 2004. Un nouvel *Ischnocarabus* d'Anatolie (Coleoptera, Carabidae). Revue Fr. Ent. 26 (1): 36.
- Deuve, T. and Macek, J. 1990. Sur la présence de *Carabus saulcyi* en Syrie dans le Djebel Ansariye (Coleoptera, Carabidae). L'Entomologiste. 46 (1): 11-16.
- Deuve, T. and Macek, J. 1992. Un *Tribax* nouveau de l'Anatolie orientale, Turquie. Opusc. Zool. Flumin. 80: 1-6.
- Deuve, T. and Remond. 2001. Macek J. 1990.
- Deuve, T. and Simard, A. 1977. Description d'une espèce nouvelle de *Trachycarabus* récoltée en Anatolie septentrionale (Col. Carab.). Bull. Soc. Ent. Mulhouse, Suppl. Juillet/Septembre. 2 pp.
- Deyrolle, E. 1869. [Chasse en Asie Mineure] Petites Nouvelles Entomologiques. 1: 6.
- Eichler, W. 1924. Nouvelles espèces et variétés de coléoptères du Caucase et de l'Asie-mineure. Pol. Pismo Entomol. 3: 61-68.
- Eidam, P. 1931. Bemerkenswerte und neue Caraben der Sammlung Leonhard (Dahlem). Wiener Entomologische Zeitung. 48: 77-80.
- Fabricius, J.C. 1775. Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. Flensburgi et Lipsiae: Libraria Kortii, xxxii + 832 pp.
- Fabricius, J.C. 1787. Mantissa insectorum, sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus. Tom.I. Hafniae: C.G. Proft, xx + 348 pp.
- Fabricius, J.C. 1794. Entomologia systematica emendata et aucta, secundum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. Tom. IV: Hafniae C.G. Proft, [6]+ 472+[5] pp.
- Fairmaire, L. 1884. Liste des Coléoptères recueillis par l'abbé David à Akbés (Asie Mineure). Ann. Soc. Entomol. Fr. (6) 4: 165-180.

- Fairmaire, L. 1886. [New varietes]. Bulletin de la Société Entomologique de France: xxi-xxii.
- Faldermann, F. 1836a. Coleoptera Persico-Armeniaca. I. Pentamera. In: Additamenta entomologica ad faunam Rossicam in itineribus Jussu Imperatoris Augustissimi annis 1827-1831 a CI. Ménétriés et Szovitz susceptis collecta, in lucem edita. Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 4 [1835]: 1-310+ 10 pls.
- Faldermann, F. 1836b. Bereicherung der Käferkunde des Russischen Reichs. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 9: 351-398.
- Faldermann, F. 1837. Fauna Entomologica transcaucasica. Coleoptera II. Nouvelles Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 5: 1-433.
- Faldermann, F. 1838. Fauna Entomologica transcaucasica. Coleoptera III. Nouvelles Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 6: 1-338.
- Faldermann, F. 1839a. Supplementum ad faunam Trans-Caucasicam. Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 6: 1-34.
- Faldermann, F. 1839b. Fauna Entomologica Transcaucasica. Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, Suppl. 3: 1-70.
- Fischer von Waldheim, G. 1817. De coleopteris quibusdam novis. Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 5: 463-471.
- Fischer von Waldheim, G. 1821. Entomographie de la Russie [Entomographia imperii Russici]. Genres des Insectes [Genera insectorum systematicae exposita et analysi iconographica instructa]. Volumen primum. Genera Coleopterorum. Moscou: Semen. xi + 104 pp. + 1 pl.
- Fischer von Waldheim, G. 1822. Entomographie de la Russie [Entomographia imperii Russici]. Entomographie de la Russie [Entomographia Ruthenica]. Volumen primum. Moscou: Semen, 210 pp.
- Fischer von Waldheim, G. 1823. Entomographie de la Russie [Entomographia imperii Russici]. Tome II. Moscou: Semen, 40 pls.
- Fischer von Waldheim, G. 1824. Entomographie de la Russie [Entomographia imperii Russici]. Tome II. Moscou: Semen. xx + 264 pp.
- Fischer von Waldheim, G. 1828. Entomographie de la Russie [Entomographia imperii Russici]. Tome III. Moscou: Semen. viii+ 314 pp.+ 18 pls.
- Fischer von Waldheim, G. 1836. *Carabus victor*. Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 9: 350.
- Fischer von Waldheim, G. 1844. Spicilegium Entomographiae Rossicae. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 17 (1): 3-144.
- Franzen, M. 1990. Ein Nachweis von *Carabus (Chaetocarabus) intricatus* Linnaeus 1791 aus der europäischen Türkei (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z., 100 (20): 390-392.
- Frivaldszky von Frivald, I. 1835. Közlések a Balkány vidékén tett természettudományi utazásról. Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. 2: 235-276, pl. 1-7.
- Gadeau de Kerville, H. 1939. Voyage zoologique d'Henri Gadeau de Kerville en Asie Mineure (Avril-Mai 1912). Récit sommaire du voyage et liste méthodique des Invertebrés et des Vertébrés récoltés en Asie-Mineure. Lechevalier, Paris, 1-148 pp.
- Ganglbauer, L. 1886. Revision der caucasischen *Plectes*-oder *Tribax*-Arten. Deut. Entomol. Z. 30: 305-336.
- Ganglbauer, L. 1887a. Bemerkungen zu einer Arbeit von August Morawitz. Societas Entomologica. 2: 1-2.
- Ganglbauer, L. 1887b. Die Arten der *Sphodristocarabus*-Gruppe. Deut. Entomol. Z. 31: 129-143.
- Ganglbauer, L. 1887c. Ergänzungen zu Revision der *Plectes*-oder *Tribax*-Arten. Deut. Entomol. Z. 31: 144.
- Ganglbauer, L. 1888. III. Carabidae (Carabus, Procrustes). Deut. Entomol. Z. 383-397.
- Ganglbauer, L. 1889. Zur Kenntnis der *Plectes*-oder *Tribax*-Arten. Deut. Entomol. Z. 321-322.
- Ganglbauer, L. 1890. *Carabus (Limnocarabus) stygius* n. sp. Wiener Entomologische Zeitung. 9: 117.
- Ganglbauer, L. 1891. Cicindelidae, Carabidae. Pp. 1-58. In: Heyden L. von, Reitter E. & Weise J.: Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae. Mödling: E. Reitter, viii+ 420 pp.
- Gautier des Cottes, C. 1866a. Descriptions d'espèces nouvelles de carabiques propres à la faune méditerranéenne, suivis de quelques observations. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 2: 107-109.
- Gautier des Cottes, C. 1866b. Nouvelles entomologiques II. Description d'une nouvelle espèce de *Feronia*. Notes sur les moeurs de l'*Harpalus melancholicus* (Dej.) et sur l'habitat de l'*Ilybius guttiger* (Gyll.); monographie du genre *Procrustes* (Bonelli). Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée. (2) 18: 277-293.
- Gautier des Cottes, C. 1868. VIIIIm Recueil. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 2: 321-327.
- Gebler, F.A. Von. 1833. Notae et addidamenta ad Catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae operis, C.F. Von Ledebours Reise in das Altaigebirge und die soongarische Kirgisenebene (Zweiter Theil. Berlin 1830). Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 6: 262-309.
- Géhin, J.B. 1876. Catalogue des coléoptères carabiques de la tribu des carabides. Nancy: (s.n.), 72 pp.
- Géhin, J.B. 1885. Catalogue synonymique et systématique des coléoptères carabiques de la tribu des carabides. Remiremont and Prague: (s.n.), xxxviii+ 104 pp.+ 10 pl.
- Gistel, J.N.F.X. 1857. Achthundert und zwanzig neue oder unbeschriebene wirbellose Thiere. Straubing: Schorner, 94 pp.
- Gory, H.L. 1833. Centurie de carabique nouveaux. Ann. Soc. Ent. Fr. 2: 168-247.
- Gottwald, J. 1980. Revision der Untergattung *Tribax* der Gattung *Carabus*. (Coleoptera, Carabidae). Acta Entomol. Bohemos. 77: 25-45.

- Gottwald, J. 1982. Zur Taxonomie und Nomenklatur von Tribax und verwandten Untergattungen der Gattung *Carabus* (Coleoptera, Carabidae). Acta Entomol. Bohemos. 79: 207-220.
- Guichard, K.M. and Harvey, D.H. 1962. Collecting in Turkey 1959, 1960 and 1962. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Ent.). 19: 223-250.
- Häckel, M. 2007. In: Březina B., Häckel M. and Sehnal, R. 2007. Three new subspecies of *Carabus* from Qinghai and Sichuan provinces. Central China, and a new record of *Carabus (Apoplesius) deuvei* from Turkey (Coleoptera, Carabidae). ANIMMA.X, 19: 1-7.
- Haller, G. 1885. Entomologische notizen. II. Ueber einige neue oder wenige bekannte Varietäten von Coleopteren. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 7: 198-200.
- Hampe, C. 1852. Verzeichniss der im Kaukasus, in Transkaukasien, Armenien, West-Persien gesammelten Koleopteren mit Beschreibung von 16 neuen Arten, pp. 302-315. In: Wagner M.F.: Reise nach Persien und dem Lande der Kunden. Band 2. Leipzig: Arnoldi, iv + 316 pp.
- Haury, C. 1889. *Carabus akensis* n. sp. Le Naturaliste. (2) 3: 106-107.
- Heinz, W. 1965. Käferfunde in Kleinasiens (Coleoptera, Carabidae). Reichenbachia. 6: 15-23.
- Heinz, W. 1970. Über Carabini Anatoliens und Persiens. Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden. 36 (10): 361-375.
- Heinz, W. 1973. Beiträge zur Kenntnis der Fauna des Iran und Anatoliens. Neuer und systematisch neu bewertete *Carabus*-arten (Col. Carabidae) sowie Bemerkungen zur Verbreitung wenig bekannter Arten. Entomol. Blätter. 69 (1): 14-36.
- Heinz, W. 1975a. Über *Carabus*-Arten aus Anatolien und Iran, mit Beschreibung einer neuen Art aus dem Subgenus *Pachystus* (Col. Carabidae). Entomol. Z. (Frankfurt). 85 (13): 144-147.
- Heinz, W. 1975b. Über *Carabus (Sphodristocarabus)* Arten aus der Osttürkei, mit Beschreibung einer neuen Art dieses Subgenus (Col. Carabidae). Entomol. Z. (Frankfurt). 85 (17-18): 196-199, 201-204.
- Heinz, W. 1976. Über eine neue Unterart des *Carabus (Heterocarabus) muchei* aus dem westlichen Pontus (Col. Carabidae). Entomol. Z. (Frankfurt). 86: 65-68.
- Heinz, W. 1977a. Beitrag zur Kenntnis der südanatolischen *Carabus* Arten aus dem Subgenus *Procrustes* Bon. (Coleoptera, Carabidae). Nachrichtenblatt Bayer. Ent. 26 (3): 33-38.
- Heinz, W. 1977b. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Carabus* L. (Col. Car.) Die Verbreitung der Untergattung *Archicarabus* in der Süd und Osttürkei mit Beschreibung einer neuen Subspecies. Kol. Rundsch. 53: 9-13.
- Heinz, W. 1980. Beitrag zur Kenntnis der gattung *Carabus* in der Turkei. Turk. Bit. Kor. Derg. 4 (2): 77-84.
- Heinz, W. 1988. Richtigstellende Bemerkungen zu der Arbeit Korells (1987) "Über *Carabus (Sphodristocarabus) tokatensis* Roeschke und seine "Formen" in dieser Zeitschrift. Entomol. Z. (Frankfurt). 98 (22): 335-336.
- Heinz, W. 1990a. Ein neuer *Carabus (Sphodristocarabus)* aus der östlichen Zentraltürkei (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. (Frankfurt). 100 (3): 161-164.
- Heinz, W. 1990b. Eine neue geographische Rasse des *Carabus (Lamprostus) chalconatus* Mann. aus der Nordost-Türkei. Entomol. Z. (Frankfurt). 100 (18): 347-349.
- Heinz, W. 1998. Über *Carabus (Tribax) puschkini* Adam 1817 in der Nordost-Türkei (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. (Frankfurt). 108 (10): 396-411.
- Heinz, W. and Blumenthal, C. 1977. Beschreibung einer neuen *Carabus* Art aus dem Subgenus *Lamprostus* (Col. Carabidae). Entomol. Z. (Frankfurt). 87 (19): 219-220.
- Heinz, W. and Blumenthal, C. 1978. Versuch einer systematischen Neugliederung der mit *Carabus (Lamprostus) torosus* Frv. und *spinolai* Crist. et Jan verwandten Formen (Col. Carabidae). Stuttgarter Beitr. Naturk.(A: Biologie). 315: 1-31.
- Heinz, W. and Korge, H. 1964. *Cychrus* und *Carabus*funde in der Pontischen Gebirgen Kleinasiens. Reichenbachia. 3 (19): 227-236.
- Heinz, W. and Korge, H. 1967. Über *Carabus*-Arten Anatoliens. Entomol. Blätter. 63 (2): 87-105.
- Heinz, W. and Pavesi, M. 1994. Neue systematische Erkenntnisse an türkischen *Calosoma* - (*Callisthenes*) Arten mit Beschreibung von zwei neuen Species (Coleoptera, Carabidae, Calosomatini), Coleoptera. Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen, Heft 7: 1-13.
- Heinz, W. and Staven, K. 1989. Geographische und systematische studien an den Arten der *Lipaster*-Gruppe der Gattung *Carabus* L. (Coleoptera, Carabidae). Entomologische Zeitschrift mit Insektenbörse. 99 (4-5): 33-40, 49-55.
- Heinz, W. and Staven, K. 1995. Eine neue Unterart des *Carabus gordius* aus Nordost-Anatolien, Türkei. Coleoptera. Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen. 13: 13-18.
- Heinz, W. and Staven, K. 2000. Beschreibung einer neuen Subspezies von *Carabus (Lamprostus) sirus* Roeschke, 1898, aus Jordanien und Bemerkungen zur Nomenklatur und Verbreitung der *Carabus (Chaetomelas)*-Arten des Nahen Ostens (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 110 (5): 147-151.
- Herbst, J.F.W. 1784. Kritisches Verzeichniss meiner Insekten-Sammlung. Pp. 1-151. In: Füessly J.C.: Archiv. der Insectengeschichte. Hefts 4-5. Zürich und Winterthur: H. Steiner, 151 pp.
- Hoberlandt, L. and Taborsky, K. 1948. Results of the zoological scientific Expedition of the National Museum in Praha to Turkey. I. Introduction. Acta Entom. Mus. Nat. Pragae. 26 (346). 1-10.
- Imura, Y. 1996. A Revised Classification of the Major Divisions and Subdivisions of *Carabus* (s. lat.) (Coleoptera, Carabidae). Elytra, Tokyo. 24 (1): 5-12.
- Imura, Y., Kim, C.G., Su, Z.H. and Osawa, S. 1998. An Attempt at the Higher Classification of the Carabina (Coleoptera, Carabidae) Based on Morphology and Molecular Phylogeny, with Special Reference to *Apotomopterus*,

- Limnocarabus* and *Euleptocarabus*. Elytra, Tokyo. 26 (1): 17-35.
- Ishikawa, R. 1973. Notes on Some Basic Problems in the Taxonomy and the Phylogeny of the Subtribe Carabina (Coleoptera, Carabidae). Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo. 16 (2): 191-215.
- Ishikawa, R. 1978. A Revision of the Higher Taxa of the Subtribe Carabina (Coleoptera, Carabidae). Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo, Ser. A (Zool.). 4 (1): 46-68.
- Ishikawa, R. 1979. A Preliminary Revision of the Carabogenici of the Subtribe Carabina (Coleoptera, Carabidae). Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo, Ser. A (Zool.). 5 (2): 95-114.
- Ishikawa, R. 1984. Phylogeny and Subgeneric Classification of the Genus *Chaetocarabus* Thomson (Coleoptera, Carabidae). Kontyû, Tokyo. 52 (1): 94-109.
- Jeannel, R. 1940. Les Calosomes. Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle, (N.S.). 13 (1), Paris, 240 pp., 8 pl.
- Keith, D. 1991. Sur les routes d'Anatolie. Lambillonea. 91 (4): 266-271.
- Kleinfeld, F. and Rapuzzi, I. 2004. Zur Faunistik der *Carabus*-und *Procerus*-Arten im 'Nahen Osten' (Coleoptera: Carabidae, Carabini). Lambillonea. 104 (2): 3-70.
- Klug, J.C.F. 1832. Decas tertia. Sheets a-f, pl. xxi-xxx. In: Symbolae physicae, seu icones et descriptiones insectorum, quae ex itinere per Africam borealem et Asiam occidentalem Friderici Guilelmi Hemprich et Christiani Godofredi Ehrenberg studio novae aut illustratae redierunt. Berlin: Mittler, 42 unn. Sheets +50 pl.
- Klug, J.C.F. 1834. Uebersicht der Carabici der Sammlung. Pp. 48-82. In: Klug F. (ed.): Jahrbücher der Insektenkunde, mit besonderer Rück sicht auf die Sammlung im Königlich Museum zu Berlin. Erster Band. Berlin: Theod. Chr. Friedr. Enslin. 396 pp. + 2 pl.
- Kolenati, F.A. 1845. Meletemata Entomologica. Fasc. I. Insecta Caucasi, cum distributione geografica. Coleopterorum pentamera carnivora. Petropoli: Imperialis Academiae Scientiarum. 88 pp. + 2 pl.
- Kollar, V. 1843. L. Redtenbacher, Bemerkungen über die in Syrien von Theodor Kotschy gesammelten Käfer, in Russegger, J., Reisen in Europa, Asien und Afrika. Ester Band, zweiter Teil, Stuttgart. Abschnitt: Natuhistorischer Anhang (Zoologie, Entomologie): 980-981.
- Korell, A. 1983. Kritische Betrachtung der Taxa *Carabus* (*Chaetomelas*) *morawitzi* Ganglbauer und C. (*Ch.*) *montesamanus* Mandl (Col.: Carabidae). Entomol. Z. 93 (13): 247-253.
- Korell, A. 1985. Zwei neue *Procerus* und *Carabus* formen aus der südlichen Türkei (Col.: Carabidae). Entomol. Z. 95 (10): 140-142.
- Korell, A. 1987. Über *Carabus* (*Sphodristocarabus*) *tokatensis* Roeschke 1898 und seine Formen (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 97 (16): 235-240.
- Korell, A. 1988a. Ein bemerkenswerter Fund von *Procerus syriacus* Kollar 1843 in der Provinz Hatay, Türkei (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 98 (7): 92-95.
- Korell, A. 1988b. Beschreibung des *Procerus limitaneus* n. ssp. (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 98 (12): 176.
- Korell, A. 1990. Erwiderung, betreffend die Bemerkungen von Heinz (1988) über *Carabus tokatensis* Roeschke (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 100 (23): 448-452.
- Korell, A. 1998. Über *Carabus* (*Pachystus*) *trojanus* Dejean 1826 und seine Formen (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 108 (7): 288-293.
- Korell, A. 1999. In: Korell A. and Görgner E. 1999. Zwei neue Subspezies des *Carabus* (*Procrustes*) *impressus* Klug 1832 aus dem nördlichen und östlichen Verbreitungsgebiet in der Turkey und in Syrien (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 109 (6): 239-245.
- Korell, A. 2001. Die Arten der Gattungen *Carabus* Linnaeus, 1758 und *Procerus* Dejean, 1828 der Provinz Hatay, Südturkey (Coleoptera: Carabidae, Carabini). Nachr. Entomol. Ver. Apollo, N.F. 22 (2): 66.
- Korell, A. and Görgner, E. 1999. Zwei neue Subspezies des *Carabus* (*Procrustes*) *impressus* Klug 1832 aus dem nördlichen und östlichen Verbreitungsgebiet in der Turkey und in Syrien (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 109 (6): 239-245.
- Korell, A. and Kleinfeld, F. 1997. Weitere Bemerkungen zu *Carabus tokatensis* Roeschke (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 107 (7): 311-312.
- Korge, H. 1968. Einige Überlegungen zur Taxonomie der Gattung *Carabus* L. und Beschreibung zweier *Archicarabus* Rassen aus dem pontischen Gebiet (Coleoptera: Carabidae). Nach. Bl. Bayerisch. Ent. 17: 34-41.
- Kraatz, G. 1876. Revision der *Procerus*-Arten. Bull. de la Soc. imp. des Naturalistes de Moscou. 51 (2): 125-147.
- Kraatz, G. 1877a. Die *Calosoma* des Caucasus. Deut. Entomol. Z. 21: 48.
- Kraatz, G. 1877b. *Ischnocarabus*, eine neue Untergattung von *Carabus*. Deut. Entomol. Z. 21: 78-80.
- Kraatz, G. 1877c. Ueber die Arten der Gattung *Melancarabus* Thoms. Deut. Entomol. Z. 21: 249-256.
- Kraatz, G. 1878. Ueber die Arten der Gattung *Sphodristus* Ths. Einer Untergattung von *Carabus*. Deut. Entomol. Z. 22: 97-112.
- Kraatz, G. 1884. Neue Käfer-Arten aus Malatia im südlichen Kleinasien. Deut. Entomol. Z. 28: 231-234.
- Kraatz, G. 1897a. Bestimmungstabelle 34 der europäischen Coleopteren. Carabidae. I. Abtheilung Carabini. Deut. Entomol. Z. 1896: 330-336.
- Kraatz, G. 1897b. Ueber die Varietäten des *Carabus wiedemanni* Mén. Deut. Entomol. Z. 377-380.
- Kraatz-Koschlau, A. von. 1884. Kritische und nicht kritische Bemerkungen über die *Procerus*-Arten. Deut. Entomol. Z. 386-400.
- Kraatz-Koschlau, A. von. 1886. Ueber *Procerus*. Deut. Entomol. Z. 30: 421-422.
- Kryzhanovskij, O.L. 1968. Novye i maloizvestnye zhuzhelitsy (Coleoptera, Carabidae) fauny SSSR i granichashchikh s nim stran. Entomologicheskoe Obozrenie. 47: 160-175.
- Kryzhanovskij, O.L., Belousov, I.A., Kabak, I.I., Kataev, B.M., Makarov, K.V. and Shilenkov, V.G. 1995. A Checklist of the Ground-Beetles of Russia and Adjacent Lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Serie Faunistica 3, Pensoft Publishers, Sofia-Moscow. 271 pp.
- Küster, H.C. 1846. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Viertes Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, (not paginated).

- Kwieton, E. 1986. Esquisse de la zoogéographie dynamique de la Turquie, à la base des Coléoptères Tenebrionidae. *Acta Entomol. Bohemos.* 83: 279-293.
- Kwon, Y.J. and Lee, S. 1984. Classification of the subfamily Carabinae from Korea. *Insecta Koreana.* (4): 1-363.
- Laporte, F.L.N. De [comte de Castelnau]. 1834. Pp. 1-94, pl. 1-2. In: Etudes entomologiques, ou description d'insectes nouveaux; et observations sur leur Synonomie. Paris: Méquignon-Marvis. 159 pp.
- Lapouge, G. de. 1898. Phylogénie des *Carabus*. *Bull. Soc. Sci. Med. Ouest Fr.* 7: 59-83, 421-436.
- Lapouge, G. de. 1901. Phylogénie des *Carabus*. *Bull. Soc. Sci. Med. Ouest Fr.* 10: 325-344.
- Lapouge, G. de. 1902. Phylogénie des *Carabus*. *Bull. Soc. Sci. Med. Ouest Fr.* 11: 306-317.
- Lapouge, G. de. 1904. Tableaux de détermination des formes du genre *Carabus*. L'Échange, Revue Linnéenne. 20: 15-16.
- Lapouge, G. de. 1905-1908. Descriptions des larves de *Carabus* et de *Calosoma*. *Bull. Soc. Sci. Med. Ouest Fr.* 14: 273-293; 15: 70-91; 16: 34-54; 17: 150-177.
- Lapouge, G. de. 1907a. Tableaux de détermination des formes du genre *Carabus*. L'Échange, Revue Linnéenne. 23-143.
- Lapouge, G. de. 1907b. Collections recueillies par M. de Morgan dans le nord de la Perse. Carabes et Calosomes. *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., Paris* 1907: 124-127.
- Lapouge, G. de. 1908. Tableaux de détermination des formes du genre *Carabus*. L'Échange, Revue Linnéenne. 24: 18-21, 37-38, 52-53.
- Lapouge, G. de. 1909. [new taxa]. In: Barthe E.: Tableaux analytiques pour la détermination des Carabidae de la faune franco-rhénane, comprenant toutes les espèces, variétés, races et aberrations. I. Carabidae. *Misc. Entomol.* 17: 49-128.
- Lapouge, G. de. 1913-1927. *Carabus* nouveaux ou mal connus. *Misc. Entomol.* 21-30, 248 pp.
- Lapouge, G. de. 1930. Coleoptera Adephaga. Fam. Carabidae: Subfam. Carabinae. Deuxième partie. Genera Insectorum. Fascicule 192. Bruxelles: Desmet-Verteneuil, pp. 155-291.
- Lapouge, G. de. 1931. Coleoptera Adephaga. Fam. Carabidae: Subfam. Carabinae. Troisième partie. Genera Insectorum. Fascicule 192. Bruxelles: Desmet-Verteneuil, pp. 293-580.
- Lassalle, B. 1986. Description d'une nouvelle espèce de *Tribax* (Col. Carabidae). *Nouv. Revue Ent.* 3(1): 36 pp.
- Lassalle, B. 1990a. Carabes d'Anatolie. *Bull. Sciences Nat.* 63: 2-3.
- Lassalle, B. 1990b. Deux nouveaux Carabes d'Anatolie (Col. Carabidae). *Nouv. Revue Ent.* 3: 324.
- Lassalle, B. 1992. Nouveaux *Callisthenes* et *Carabus* de Turquie (Coleoptera, Carabidae). *L'Entomologiste.* 48 (6): 305-312.
- Lassalle, B. 1993. Nouveaux *Antisphodrus* et *Carabus* d'Anatolie (Coleoptera, Carabidae). *L'Entomologiste.* 49 (6): 303-306.
- Lassalle, B. 1996. Deux nouveaux *Oreocarabus* d'Anatolie (Coleoptera, Carabidae). *Bull. Acrop.* 27: 51-53.
- Lassalle, B. 1998. Nouveaux Carabidae du Moyen Orient (Coleoptera, Carabidae). *L'Entomologiste.* 54 (2): 87-92.
- Lassalle, B. 2004. Carabes nouveaux ou mal connus (Coleoptera, Carabidae). Le Coléoptériste. 7 (3): 155-159.
- Lassalle, B. and Charet, G. 1992. Description d'une nouvelle sous-espèce de *Sphodristocarabus*: *Carabus (Sphodristocarabus) enigmaticus citamgineus* n. ssp. (Col. Carabidae). *Nouv. Revue Ent.* 9 (2): 106.
- Lassalle, B. and Machard, P. 1991. Faune carabologique de Turquie. Description d'une espèce nouvelle, *Tribax pseudoponticus* Lassalle et Machard, suivie de la description de quatre races nouvelles d'Anatolie (Coleoptera: Carabidae). Biocosme Mésogéen, Nice. 8 (2): 59-69.
- Ledoux, G. 1972. Contribution à l'étude des Coléoptères Carabidae de Turquie. Une nouvelle sous-espèce de *Carabus (Oreocarabus) cibratus* Quensel. *Bull. Soc. Ent. Fr.* 77: 86-88.
- Ledoux, G. 1975. Contribution à l'étude des Coléoptères Carabiques de Turquie. *Carabus (Sphodristocarabus) resplendens rizensis*, n. ssp. *Bull. Soc. Ent. France.* 80: 28 pp.
- Letzner, K. 1849. Bei Ustron in dem Beskiden gesammelte Käfer. Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur (Breslau). 95-97.
- Linné, C. von. 1758. *Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genere, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata. Tomus I.* Stockholm: Laurentii Salvii, iv + 824 pp.
- Linné, C. von. 1761. *Fauna Suecica sistens Animalia Sueciae Regni. Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes.* Ed. 2. Stockholmiae: Sumtu a Literis Direct Laurentii Salvii. 45 + 578 pp.
- Löbl, I. and Smetana, A. 2003. Catalogue of Palearctic Coleoptera. Volume I. Archostemata-Myxophaga-Adephaga. Apollo Books. Stenstrup, Denmark. 819 pp.
- Machard, P. 1975a. Description d'une nouvelle sous-espèce d'*Oreocarabus cibratus* Quens. *Carabologia.* I (2): 47-52.
- Machard, P. 1975b. Carabidae de Turquie. Description de deux sous-espèces nouvelles et note sur les races du *Carabus (Lamprostus) rabaroni* Breuning. *Carabologia.* I (4): 142-143.
- Machard, P. 1977. Faune carabologique de Turquie: les *Lamprostus* d'Anatolie (Col. Carabidae). *L'Entomologiste.* 33 (5): 174-178.
- Machard, P. 1979. Révision systématique de la Faune carabologique de Turquie. *Entomops.* 48: 283-293.
- Machard, P. 1985. Faune carabologique de Turquie. Description de quelques formes nouvelles. Précisions sur la répartition de quelques races d'Anatolie (Col. Carabidae). *L'Entomologiste.* 41 (1): 27-32.
- Machard, P. 1986. Faune carabologique de Turquie. Description de deux races et d'une espèce nouvelles d'Anatolie (Col. Carabidae). *L'Entomologiste.* 42 (4): 205-210.
- Machard, P. 1988. Faune carabologique de Turquie. Description d'une race nouvelle. Compléments des descriptions de deux autres races. (Col. Carabidae). *L'Entomologiste.* 44 (1): 33-34.
- Machard, P. 1994. In Auvray, C. and Machard, P. 1994. Faune carabologique de

- Turquie. Description de sept races nouvelles. Remarques sur les sous-genres *Lamprostus* Motschulsky et *Lipaster* Motschulsky (Coleoptera: Carabidae). L'Entomologiste. 50 (2): 137-145.
- Machard, P. 2005. Le genre *Tomocarabus* Reitter ses espèces et races de Turquie (Coleoptera, Carabidae). Bull. Entomol. Tourang. 26 (2): 51-54.
- Mandl, K. 1955. Ergebnisse einer Revision der Carabiden Sammlung des Naturhistorisches Museums (4 Teil). Ann. Naturhistor. Mus. Wien. 60: 236-272.
- Mandl, K. 1961. Wissenschaftliche Ergebnisse einer Anatolien Expedition im Jahre 1960. Die Cicindelen und Caraben Arten (Col.). Kol. Rundsch. 39: 28-32.
- Mandl, K. 1963. Wissenschaftliche Ergebnisse einer Expedition nach Anatolien im Jahre 1962. Die Cicindela, Carabus und Calosoma Arten (Carabidae, Coleoptera). Kol. Rundsch. 41: 45-50.
- Mandl, K. 1964. Neue Carabus-Formen aus Europa und Vorderasien. Z. Arggem. Öst. Ent., Vienna. 16 (1-3): 17-25.
- Mandl, K. 1967. Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Turkey, Cicindelidae und Carabidae-Carabini. Ann. Naturhistor. Mus. Wien. 70: 379-386.
- Mandl, K. 1971a. Revision der macrogonus-gruppe der Sectio *Sphodristocarabus* des Genus *Carabus* L. Entom. Arbeit. Mus. G. Frey. 22: 38-92.
- Mandl, K. 1971b. Kritische Untersuchungen über die bisher beschriebenen Formen der Sectio *Oxycarabus* Sem. des Genus *Carabus* Linné. Verh. Naturf. Ges. Basel. 81 (1): 69-89.
- Mandl, K. 1973. Fragmenta carabologica. Beschreibung einer neuen Untergattung und Zweier neuer Rassen. Mitteil der Entom. Gesell. Basel. 23: 77-89.
- Mandl, K. 1975a. Weitere beiträge zur kenntnis des Carabini (Carabidae, Col.). Kol. Rundsch. 52: 61-85.
- Mandl, K. 1975b. Revision der unter adamsi Adams zusammengefassten Formen der Sectio *Sphodristocarabus* des Genus *Carabus* Linné (Carabidae, Col.). Ann. Naturhistor. Mus. Wien. 79: 245-336.
- Mandl, K. 1977. Studien über die *Cychrus*-Fauna Anatoliens (Col. Carabidae). Mitt. Münch. Ent. Ges. 66: 81-99.
- Mandl, K. 1980. Eine neue Art der Untergattung *Lamprostus* Motschulsky der Gattung *Carabus* L. und kritische Bemerkungen zu einer Publikation über diese Untergattung aus dem Jahre 1978 (Col. Carabidae). Entomol. Basiliensa. 5: 151-161.
- Mandl, K. 1983. Die Geschichte des *Carabus bonplandi* Ménétriès. Entomol. Basiliensa. 8: 108-117.
- Mandl, K. 1986. Fragmenta Carabologica 3: Bemerkenswerte Feststellungen über die Verbreitung einer *Carabus (Lamprostus)* Art: hozari Mařan (Carabidae, Col.). Kol. Rundsch. 58: 55-59.
- Mandl, K. 1987. Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei (Cicindelidae und Carabidae-Carabini). Ann. Naturhistor. Mus. Wien. 70: 379-386.
- Mannerheim, C.G. von. 1830. Description de six nouvelles espèces de Carabes de l'Arménie turque. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 2: 53-62.
- Mannerheim, C.G. von. 1844. Relation d'un voyage fait en 1844 en Suéde, en Denmark et dans le nord de l'Allemagne. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 17: 844-872.
- Mařan, J. 1932. Vier neue Carabiden von Ilgaz-Dagh in Kleinasien. Časopis Čsl. Spol. Entom. č. 1-2. IV: 30-35.
- Mařan, J. 1947. O geografickém rozšíření a rasách druhu *Procrustes banoni* Dej. Acta. Mus. Nat. Pragae. Vol. III. B. 4: 159-165.
- Mařan, J. 1949. Contribution to the Knowledge of the Geographical Distribution of new and little known forms of the species *Procrustes coriaceus* L. (Coleoptera, Carabidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae. XXVI, 368: 1-12.
- Mařan, J. 1950. Contribution to the knowledge of the geographical distribution of new and little known forms of the species *Procrustes coriaceus* L. (Coleoptera, Carabidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae. XXVI (368): 1-11.
- Mařan, J. 1952. Results of the Zoological Scientific expedition of the National Museum in Praha to Turkey-6: Coleoptera I. Carabidae, Carabinae. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae. 26 (380): 1-9, 3.
- Ménétriès, M. 1832. Catalogue raisonné des objects de zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse entrepris par ordre de S.M. L'Empereur. St.-Pétersbourg: l'Académie Impériale des Sciences. 271 + xxxii + v pp.
- Ménétriès, M. 1836. Insectes nouveaux de la Turquie. Bull. Scient. Ac. Imp. St. Peters. I (20): 149-151.
- Ménétriès, M. 1839. Catalogues d'insectes recueillis entre Constantinople et le Balkan. Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg. (6) 5: 1-52.
- Ménétriès, M. 1840. Insectes de Turquie. Mém. Ac. Imp. Sci. St. Peters. III: 11-12.
- Morawitz, A. 1886. Zur kenntnis der adephagen Coleopteren. Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg. (7) 34 (9): 1-88.
- Motschulsky, V. De. 1839. Coléoptères du Caucase et des provinces transcaucasasiennes. (Continuation). Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 12: 68-93.
- Motschulsky, V. De. 1840. Énumération systematique des insectes décrits et figurés par T. Victor dans les Mémoires et le Bulletin de la Société Imperiale de Moscou depuis 1836-1840. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 13: 181-203.
- Motschulsky, V. De. 1844. Insectes de la Sibérie rapportés d'un voyage fait en 1839 et 1840. Mém. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg. (5): 1-274.
- Motschulsky, V. De. 1845. Observations sur le musée entomologique de l'Université Impériale de Moscou. 1Er article. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 18: 332-388, pl. 5-7.
- Motschulsky, V. De. 1850. Die Käfer Russland. I. Insecta Carabica. Moscou: W. Gautier. iv + xi, 91 pp.
- Motschulsky, V. De. 1858. Nouveautés. Études Entomologiques. 7: 187-190.
- Motschulsky, V. De. 1865. Énumération des nouvelles espèces de Coléoptères rapportés de ses voyages. 4-ème article. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 37 (4): 297-355.
- Motschulsky, V. De. 1866. Énumération des nouvelles espèces de Coléoptères rapportés de ses voyages. 4-ème article. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 38 (4): 227-313.

- Müller, G. 1932. Neue und wenig bekannte Carabide, von Leo Weirather auf der Balkanhalbinsel und in Kleinasien gesammelt. Koleopterol. Rd. 17: 209-223.
- Mulsant, E. 1853. Description d'une espèce nouvelle de carabique. Opuscules Entomologiques. 2: 124-126.
- Obydov, D. 2002. Révision du genre *Callisthenes*. Coll. Systématique, Vol. 6, Magellanes. 126 pp.
- Olivier, A.G. 1790. Encyclopédie métodique, ou par ordre de matières; par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes; précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, ornée des pourtraits de Mm. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'Encyclopédie. Histoire naturelle. Insectes. Tome cinquième. Livraison 41. Paris: C.J. Panckoucke. 368 pp.
- Olivier, A.G. 1795. Entomologie, ou histoire naturelle des insectes. Avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome troisième. Paris: Lanneau. 557 pp. + 65 tab.
- Omideo, P. 1988. The genus *Eophyla* (Lumbricidae, Oligochaeta). Boll. Zool. 55: 73-84.
- Osculati, G. 1844. Note d'un viaggio nella Persia e nelle Indie Orientali negli anni 1841-1842. Coleopterorum species novae. P. 72. In: Note d'un viaggio nella Persia e nelle Indie orientali negli anni 1841-1842. Monza, 73 pp. + 1 pl.
- Pallardi, A. 1825. Beschreibung zweier Decaden neuen und wenig bekannter Carabicinen. Wien: Heubner, 44 pp.
- Peyron, E. 1855. Description d'une nouvelle espèce du genre *Procrustes*. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 2: 669-670.
- Peyron, E. 1858. Catalogue des Coléoptères des environs de Tarsous (Caramanie) avec la description des espèces nouvelles. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 6: 353-434.
- Quensel, C. 1806. In: Schönherr, C.J. *Synonymia insectorum*, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insekten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum geordnet. Mit Berichtigungen und Anmerkungen, wie auch Beschreibungen neuer Arten. Erster Band. Eleutherata oder Käfer. Erster Theil. Lethrus-Scolytes. Stockholm: A. Nordström. xxii + 293 pp. + 3 pl.
- Rapuzzi, I. 1991. Descrizione di una nuova ssp. di *Ischnocarabus tenuitarsis* Kr. dell'Anatolia centrale (Coleoptera, Carabidae). Lambillionea. XC, (4): 35-39.
- Rapuzzi, I. 1995. Una nuova specie di *Carabus (Lamprostus)* della Turchia meridionale (Coleoptera, Carabidae). Lambillionea. XCV, 4: 473-476.
- Rapuzzi, I. 1997. Contributo alla conoscenza dei *Carabus* L. del vicino oriente (Coleoptera, Carabidae). Lambillionea. XCVII, 4: 563-568.
- Rapuzzi, I. and Kleinfeld, F. 2000. Nuovi o interessanti *Carabus* d'Asia (Coleoptera, Carabidae). Lambillionea. C (3): 359-366.
- Ratti, P. C., Casale, A., Cavazzuti, Pf. and Battoni, S. 1990. Les Coléoptères du Monde. Carabini I. Ed. Sciences Nat., Venette. 27: 122 pp.
- Redtenbacher, L. 1843. Illustrationes et descriptiones Coleopterorum novorum Syriae. Pp. 971-990. In: Russegger J. von: Reisen in Europa, Asien und Africa, mit besonderer Rücksicht auf die naturwissenschaftlichen Verhältnisse der betreffenden Länder unternommen in den Jahren 1835 bis 1841. Band 1 (Teil 2). Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung [pages unknown].
- Reitter, E. 1880. In: Leder, H.: Beitrag zur kaukasischen Käfer-Fauna. Unter Mitwirkung hervorragender Fachgenossen. Verhandlungen der Kaiserlich-königlichen Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 29: 451-488.
- Reitter, E. 1896. Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. XXXIV. Heft: Enthaltend: Carabidae, 1. Abtheilung: Carabini, gleichzeitig mit einer systematischen Darstellung sämtlicher Subgenera der Gattung *Carabus* L. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn. 34: 36-198.
- Reitter, E. 1898. Neue Coleopteren aus Europa und den angrenzenden Ländern. D. Entom. Zeit. 337-360.
- Roeschke, H. 1898. Carabologische Notizen II. Entom. Nach. (Berlin). 24: 162-165.
- Roeschke, H. 1907. Monographies der Carabiden-Tribus Cychrini. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. 5: 99-277.
- Roeschke, H. 1915. Diagnoses neuer *Carabus*-Rassen (Col.). Entomol. Mitteil. 4: (10-12): 294 pp.
- Rossi, G. De 1882. Die Käfer der Umgegend von Neviges. Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Preussischen Rheinlande, Westfalens u. Des Regierungsbezirks Osnabrück. 39: 196-215.
- Ruspoli, M. 1965. Deux voyages carabologiques en Grèce et en Anatolie. L'Entomologiste. XXI (1-2): 5-15.
- Ruspoli, M. 1970. Recherches carabologiques en Anatolie. Entomops. 19: 81-83.
- Sahlberg, J. 1913. Coleoptera mediterranea orientalia, quae in Aegypto, Palaestina, Syria, Caramania atque in Anatolia occidentali anno 1904 collegerunt John Sahlberg et Unio Saalas. Finska Vetensk.-Soc. Förhndl. (A) 55 (19): 1-282.
- Sbordoni, V. and Vigna Taglianti, A. 1989. Zoological researches in the Near East by the Universities of Rome. 121. List of contribution. Fragm. Entomol. 21: 117-130.
- Schatzmayr, S. 1935. Risultati scientifici delle cacce entomologiche di S.A.S. Il Principe Alessandro della Torre e Tasso nelle isole dell'Egeo. Boll. Lab. Zool. Gn. Agr. R. Ist. Sup. Agr. Portici. 28: 231-246.
- Schaufuss, L.W. 1882a. *Carabus nordmanni* Chaud. Und Verwandte desselben. *Nunquam Otiosus*. 3 [1879-1880]: 513-527.
- Schaufuss, L.W. 1882b. Neue Coleopteren-Arten und -Varietäten. *Nunquam Otiosus*. 3 [1879-1880]: 552-560.
- Schaum, H.R. 1857. Beitrag zur Käferfauna Griechenland. Erstes Stück: Cicindelidae, Carabici, Dytiscidae, Gyrinidae. Berliner Entom. Zeit. 1: 116-158.

- Schweiger, H. 1962. Neue Carabiden aus Kleinasien (Ergebnisse der österreichisch-türkischen Anatolien expedition 1). Entomol. Blätter. 58 (2): 119-127.
- Schweiger, H. 1964a. Neue und wenig bekannte Carabiden aus Kleinasien (Ergebnisse der österreichisch-türkischen Anatolien expeditionen). Istanb. Univ. Fen Fak. Mecm. (B), 27: 137-154.
- Schweiger, H. 1964b. Türkiyenin yeni ve az tanınmış Carabus nevileri. Neue und wenig bekannte Carabus-Formen aus der Turkey, (Coleoptera, Carabidae). Istanb. Univ. Fen Fak. Mecm. (B), 27: 159-167.
- Schweiger, H. 1965. Die anatolischen Arten der Gattung *Carabus* L.Sektio: *Oxycarabus* Sem. (Coleoptera, Carabidae). Istanb. Univ. Fen Fak. Mecm. (B), 29: 107-137.
- Schweiger, H. 1969. Neue *Carabus*-Formen aus Anatolien (Col. Carabidae). Entomol. Blätter. 64 (3): 157-167.
- Schweiger, H. 1970. The Genus *Carabus* in Israel. Israel Journ. of Ent. V: 21-55.
- Seidlitz, G.K.M. 1887. Fauna Baltica. Die Käfer (Coleoptera) der deutschen Osteeprovinzen Russlands. Zweite neu bearbeitete Auflage. Königsberg: Hartungsche Verlagsdruckerei. x1 + 16 [Gattungen]+ 96 pp. [Arten].
- Semenov, A.P. 1897. Symbolae ad cognitionem generis *Carabus* (L.) A. Mor. I. Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 30: 193-229.
- Semenov, A.P. 1898a. Symbolae ad cognitionem generis *Carabus* (L.) A. Mor. I. Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 31: 315-541.
- Semenov, A.P. 1898b. Coleoptera nova Rossiae Europeae Caucasicae V. Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 31: 542-554, 595-602.
- Solier, A.J.J. 1848. Observations sur les genres *Procrustes*, *Procerus*, *Carabus* et *Calosoma*. Studi Entomologici. 1: 48-62.
- Staven, K. 1995a. Eine neue Unterart des *Carabus (Sphodristocarabus) tokatensis* aus der Provinz Erzurum in Nordost-Anatolien (Coleoptera, Carabidae). Coleoptera. 9: 3-8.
- Staven, K. 1995b. Fund eines Hybriden zwischen *Carabus coriaceus* Linnaeus und *Carabus pirithous* Reitter in Nordwest-Anatolien, Türkei (Coleoptera, Carabidae). Coleoptera. 9: 9-12.
- Staven, K. and Heinz, W. 1995. Untersuchungen zur Rassenstruktur des *Carabus (Sphodristocarabus) rotundicollis* Mandl (Coleoptera, Carabidae). Coleoptera. 13: 1-11.
- Staven, K. and Heinz, W. 1998. Über *Carabus (Tribax) puschkini* Adam 1817 in der Nordost-Türkei (Coleoptera, Carabidae). Entomol. Z. 108 (10): 398-411.
- Staven, K., Heinz, W. and Lassalle, B. 2000. Klarung der Identität von *Carabus (Lipaster) stjernvalli gordius* Reitter, 1898, und daraus resultierende Konsequenzen für die Taxa der Untergattung *Lipaster* Motschulsky, 1865 (Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 110 (4): 119-122.
- Štěrba, F. 1931. *Cytilocarabus* (Reitt.) *staneki* sp. n. Časopis Československé Společnosti Entomologické. 28: 118-119.
- Strasser, F. 1900. *Carabus wiedemannii* var. *vaitoianii*. Societas Entomologica. 14: 148.
- Sturani, M. 1971. Elevages de quelques espèces de Carabes d'Anatolie. Entomops, Nice. 21: 155-176.
- Tassi, F. 1968. Appunti coleotterologici da un viaggio in Grecia e Turchia. Bull. A.R.D.E. 23 (1): 5-17.
- Thomson, C.G. 1875. Några anmärkningar öfver arterna af slägten *Carabus*. Opuscula Entomologica. 7: 613-729 + 2 unn.pp.+1 pl.
- Thomé, C. 1987. Contribution à la faune entomologique de Turquie: une nouvelle forme de *Lamprostus rabaroni* Breuning (Coleoptera, Carabidae). Bull. Sciences Nat. 54: 23.
- Toulgoët, H.de. 1975a. Les types du genre *Carabus* (S.L.) du Museum d'Histoire naturelle de Paris (Coléoptères, Carabidae, Carabinae) (1). Nouv. Rev. Ent. V (2): 13-29.
- Toulgoët, H.de. 1975b. Les types du genre *Carabus* (S.L.) du Museum d'Histoire naturelle de Paris (Coléoptères, Carabidae, Carabinae) (2). Nouv. Rev. Ent. V (3): 221-237.
- Toulgoët, H.de. 1976. Les types du genre *Carabus* (S.L.) du Museum d'Histoire naturelle de Paris (Coléoptères, Carabidae, Carabinae) (3). Nouv. Rev. Ent. V (1): 25-43.
- Toulgoët, H.de. 1978. Les types du genre *Carabus* (S.L.) du Museum d'Histoire naturelle de Paris (Coléoptères, Carabidae, Carabinae) (1e.supplément). Nouv. Rev. Ent. VIII (2): 125-130.
- Toulgoët, H.de. 1986a. Les types du genre *Carabus* (S.L.) du Museum d'Histoire naturelle de Paris (Coléoptères, Carabidae, Carabinae) (2e.supplément). Nouv. Rev. Ent. 3 (4): 499.
- Toulgoët, H.de. 1986b. *Carabus (Procerus) scabrosus akbesiensis* nom n. pour *C. (P.) scabrosus akbesianus* Breuning 1975, homonyme secondaire de *C. (P.) mulsantianus akbesianus* Lapouge 1914 (Col. Carabidae). Nouv. Revue Ent. 3 (4): 499.
- Vigna Taglianti, A. and Bruschi, S. 1976. Un nuovo *Sphodristocarabus* di Turchia (Coleoptera, Carabidae). Fragm. Entomol. 12: 207-220.
- Vigna Taglianti, A. and Zapparoli, M. 1999a. Zoological researches in the Near East by the Universities of Rome. 185. Addenda to the list of contribution. Fragm. Entomol. 32.
- Vigna Taglianti, A. and Zapparoli, M. 1999b. Il contributo italiano alle ricerche faunistiche in Anatolia. Biogeographia. Vol. XX: 7-30.
- Waltl, J. 1838. Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren der Turkey. Isis (Dresden). 6: 449-472.
- Weber, F. 1801. Observationes entomologicae, continentibus novorum quae condidit generum characteres, et nuper detectarum specierum descriptiones. Imperis Bibliopolii Academic Novi, Kiliae. xii+ 116 pp.
- Zaitzev, P. 1918. Predstavitieli roda *Calosoma* v faune Kavkazskogo kraja (Col., Carabidae). Izvestiya Kavkazskogo Muzeya. 11: 261-271.
- Zaitzev, P. 1930. Die Untergattung *Procerus* Dej. In den Kaukasusländern. Magazin for Study of Transcaucasia (Tiflis). (A) 1: 1-13.